





FRIDERICI HOFFMANNI CONSILIARII MEDICI

Et Professoris Regii nōc nōn Com. Palāt. Cāsar.

MEDICINÆ RATIONALIS SYSTEMATICÆ TOMUS TERTIUS,

Quo vera therapie fundamenta, medendi methodus & leges tam naturæ quam artis, nec non selectissima remedia cum eorundem physico-mechanico operandi & dextre applicandi modo fideliter traduntur, omnia solidis ratiociniis demonstrantur, & compluribus practicis observationibus illustrantur.

O P U S

Non tam ad praxin vulgarem quam rationalem tutam & compendiosam adornandam perutile ac necessarium.



VENETIIS. MDCCXXXVII.
APUD SEBASTIANUM COLETI.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

**DEO TRIUNI
OMNIPOTENTI RERUM SALU-
BRIUM CONDITORI**

**Benignissimo Viræ ac Salutis nostræ in-
stauratori**

E T

*Sapientissimo salutaris scientiæ doctori omnisque medicationis
auspici sacrum*

NEC NON

**Ingenuæ posteritati medicæ dicatum esse
hoc opus.**

PRÆFATIO



Quamvis complures eoque nobilissimæ ac utilissimæ scientiæ ad ornandum & perficiendum Medicum scitu sint necessariæ; nihil tamen est, quod ad scopum medicum obtinendum propius pertineat & cui cetera omnia adeo serviant, quam ipsa praxis rationalis clinica. Potissimum vero hoc & princeps studii medici caput quam utile & necessarium, tam parum ab omni usque eo tempore excultum, & ad perfectionem laudabili conatu perductum conspicitur. Possidemus certe egregios & multis experimentis ac inventis anatomicis, physico-mechanicis, botanicis, chymicis & physiologicis refertos plures libros; sed de ejusmodi scriptis, quæ pluribus praxin rationalem, specialissimam, individua-lem & clinicam solide doceant ac perpetuæ veritatis de hac præcepta tradant, si eloqui licet quod verum est, gloriari possumus. Nolo equidem merita laude Veterum & Recentiorum SENNERII, SYLVII, RIVERII, VVILLISII, SYDENHAMII, PLATERI, MORTONIS, CRAANII, BONTEKOE, ETTMULLERI, VVALDSCHMIDII, DOLÆI, VVEDELII prædicos defraudare egregios labores: verum quam multa adhuc in iisdem circa adæquatas causas, morborum & symptomatum genealogiam, remedium quoque vires & genuinum usum in variis calibus deficiant, ii demum, qui in artis exercitio versantur & prolata theoremata ad resolvendas morborum historias, aut consilia inde capienda applicare volunt, rectius intelligunt. Doinceps neminem in medici argumenti scriptis vel mediocriter versatum latet, quam dissidentes, inter Medicos haud exigui etiam nominis, circa morborum ætiologiam & pathologica fundamenta, quæ tamen basin veræ therapie constituunt, regnent opiniones. Quot sunt & ante aliquot lustra fuerunt amplissimæ famæ Medici, qui applaudentibus multis ex acido & viscido, acido, bile & pituita morborum duxerunt primordia? Quot porro innotuerunt, qui ex varii generis salibus acribus, acidis, ponticis & humorum multifaria intemperie, materiales omnium fere morborum derivarunt causas & ad easdem removendas & remedia & medendi methodum direxerunt? Alibi Cartesiana & corpusculari philosophia maxime imbuti, diversum & peregrinum ætherem, specifica & morbifica fermenta, turbatam sanguinis & humorum crasin atque texturam & varias materiarum peccantis peregrinas & heterogeneas, ratione figuræ & magnitudinis qualitates, ad evolvendas morborum causas in partes vocarunt. Nonnulli contra repudiatis excessivis salinis qualitatibus & potentis, ex sola sanguinis & humorum nimia abundantia, spissitu-

tudine & excretionum defectu pathologicam doctrinam errere & stultissime fatentur. Ut discrepantes mirum Medicorum sententias de causa & principio motuum & mutationum, quæ in corpore humano subinde contingunt, præteream. Et quum in morbis tum avertendis, tum curandis, præcipuum medentis auxilium a remedium congruorum usu, quæ quasi ipsius instrumenta sunt, omnium consensu petidebeat: illæ adeo dis cordes Practicorum de medicamentorum viribus, facultatibus in hoc vel illo morbo opiniones, utiq; luculenter arguunt, plurimos sanitatis præsidiorum, imprimis magnæ efficaciz, sive sic dictorum heroicorum, genuinas virtutes, usum atque applicationem laudasse. Quod, ne gravius dictum videatur, liceat in confirmationem adducere exempla. Quot adhuc sunt & olim fuerunt, qui magnum istud & incomparabile sanguinis missionis auxilium penitus rejicere haud veriti sunt? Quam diversus Medicorum est sensus, de venæsectionis in febribus sive continuis, sive intermittentibus, nec non exanthematicis, purpura, variolis, morbillis, petechiis; item erysipelaceis, arthriticis & catarrhalibus, puerperarum quoque morbis administratione, aliis eandem prorsus repudiantibus? aliis contra dilaudantibus & necessariam judicantibus. Quæ opium pro basi habent, & olim ab antiquissimis Medicorum, & nostro ævo a celeberrimis Chymiatris, inter panaceas & incomparabilis in multis morbis & enormi motuum impetu componendo efficaciz relata fuerunt; quum jam non desint, quæ eadem propter virus quod recondunt naturæ viribus inimicissimum tantum non infamia censent. Peruvianus ille ex America allatus cortex ad expugnandam intermittentium contumaciam usque eo non modo in Germania nostra, sed & in exteris regionibus ceu specificum venditatus fuit remedium, qui a nonnullis tanquam intutum & damnosum pharmacum fere ex toto rejicitur. Ex Marte præparatis medicamentis olim a QUERCETANO, HARTMANNO, MICHAELIS, LUDOVICI, WVILLISIO, SYDENHAMIO, & VVEDELIO in morbis ex mensium vitio, item ad cachexiam & hypochondriacam passionem sanandam laus adscripta est maxima; sed complures iidem in morbis hæc ipsa plus damni quam emolumenti asserere non dubitant. Salia ex animantium ægno volatilia & concinnati ex iis spiritus volatiles oleosi, ante aliquot lustra a Germanis æque ac Belgis, ceu spectatæ virtutis adversus chronicas potissimum affictiones celebrabantur, quorum usus, quasi nimiam & noxiam sanguini inducerent commotionem, jam plane evilesceere incipit. Mixtura sic dicta simplex Paracelsi & confectæ ad hujus exemplar a Chymiatris, potissimum MICHAELIS, tincturæ bezoardicæ, in pluribus morbis, acutis æquæ ac chronicis, usui quondam erant egregio; ast ab hodiernis quibusdam, cur nescio, nisi forsitan camphoræ, vel acidorum conubium, spernuntur & minoris pretii essentiz aliæ præferuntur. Purgantibus acrioribus, nec non aloeticis, quæ basin fere omnium pilularum constituunt, usi fuerunt veteres & recentiores; quæ tamen ob virulen-

virulentam quam ratione & experientia teste obtinent indolem, merito suspecta sunt. Neque minus mirum profecto discrepantes Practicorum sunt sententiae, de thermarum, acidularum & foteriorum aliorum fontium elementis, viribus ac usu, ita ut a plerisque propter acidum & vitriolicum elementum, fluidis & solidis infensum, quam maxime infecura censeantur, ab aliis vicissim ob innocentiam & præstabilem virtutem, in omnibus fere modis commendentur. Nihil jam dicam, quantopere de mercurialium, emeticorum, antimonialium, nec non fonticulorum, vesicatoriorum, setaceorum, & hirudinum usu medico, in diversum abeant sententiae; hoc autem, quod omnium maxime mirum adiciendum: cunctos ad confirmandas suas adeo discordes sententias, ad unam tamen eandemque experientiam confugere & adhaerere provocare, cui an fidendum sit, prudentes judicent atque periti; id minimum procerto asserendum: nullibi in pervestigandis effectuum causarum tam crebro fallaciam causae ut causae committi, quam in medicis rebus. Decumana certe sunt, quae de pharmacorum virtute in botanicis, chymicis & pharmaceuticis libris vel scripto consignata sunt mendacia, & adeo increvit medicamentorum ex universo naturae penu simplicium & compositorum, indigenorum & exoticorum, Galenicorum & chymicorum supellex, ut propter immensum fere numerum; nec diligentissimus ad singulorum penitiorum cognitionem pertingere queat, primum vero artis opera tentans non possit non mirum turbari atque confundi. Gravis quoque oppido est illa formularum sarcina, quam ex amplissimo materiae medicae apparatus confectam, Medici, quasdam illarum in quovis morbo usui commendantes, tam scripto, quam dicto, suis liberaliter obtrudunt: quas tamen omnes, si quis peritior & virtutum in se remediis solide ignarus curatius paullo expendit, ultro perspicit, propter inconcinnam differentis indolis ingredientium congeriem, parum, vel nihil auxilii inde posse expectari, sed morbum multo magis trahi, neutiquam abigi. Contra ea simplicissima, securissima & spectatae adversus morbos arcendos æque ac per sanandos præsidia, ut aqua pura simplex, sive calide in infuso, sive frigide assumpta, balnea aquae dulcis, lacticina & maxime lac asinum, serum lactis rite paratum, minerales aquae, item ex nitro & salibus neutris parata, plurimis medentum ignota plane sunt, vel minimum pensis ab ipsis habentur. Et quod maximum fere est, quoniam optima etiam medicamenta nihil valeant, nisi eorundem usus debito ordine, regimine, tempore, mensura & methodo ad morbi curationem perite dirigatur: plures tamen sunt, qui tumultuarie sine certa ratione medicationem instituunt, ac si unum non statim juvat, alterum promunt & subinde medicamenta commutant, alii methodo plane contraria incedunt, ut rarissime duos aut tres Medicos, qui eandem ad lectum de methodo porrigendi medicamenta foveant sententiam,

invenias, plurimos autem in morbis eorumque causis recte cognoscendis & distinguendis, in judicio de morborum eventu, medicamentum effectum, item in signis prognosticis ex urina, pulsu, sanguine, dierum criticorum habitudine aliisque desumendis, mirum discrepare, errare & hallucinari cum tædio videas. Ex quibus omnibus quisque sagacior haud difficulter perspiciet, non tam firmis & inconcussis, ut communis fere opinio, praxin clinicam insistere fulcimentis, ut potius pluribus adhuc difficultatibus, defectibus & erroribus tanquam morbis prematur, qui utique convenienti Medico & medicina opus habent. At vero ad tollenda hæc artis medicæ opprobria & incrementa ipsius ex voto promovenda, neutiquam certe apti sunt, qui tantum agunt sectarios & magistri sui verbis atque praxibus semel haustis principii tanquam saxo adhærent, nec volunt admittere, quæ nunquam audiverunt, vel didicerunt, qui magnifica arcana & certa specifica in quovis morbo quaerunt & jactitant & exotica pretiosa, ex auro etiam deprompta, item varia composita chymica, domesticis, simplicibus & facile parabilibus ac diæteticiis remediis præferunt. Neque illi ad perficiendam praxin clinicam quicquam conferre poterunt, qui absolutas quasdam vires & virtutes, in his vel illis morbis, nulla habita ratione individui & conditionis solidarum ac fluidarum partium, medicamentis assignant, qui non ex morborum historiis complete & accurate notatis capiunt suamque theoriam praxi applicandam hausierunt & qui non ex ipsis de remedium effectum, viribus & operationibus, immo de eventu ipsius morbi, judicare didicerunt, sed una eademque methodo semper morbum unum tractari posse sibi persuadent. Neque etiam illi evitendæ ad altius fastigium artis nostræ erunt idonei, qui observationes & veritates facti variaque occurrentia phaenomena non clare, distincte & ordine explicare consueverunt quædam in usum practicum inde elicere norunt. Sunt autem hi maxime, qui nec debitis subsidiis, ut philosophia naturali & experimentalis, mechanica, chymica & anatomica, scientia corporis humani ejusque partium instructi sunt, quique artem solide demonstrandi non callent, non recte definire, distinguere & apte res inter se connectere, nec factus phantasie a clavis conceptibus, speciosa nomina a causis & rebus, res morales & metaphysica a physicis & quæ necessario fieri debent, veritates ab opinionibus & apparenter veris distinguere unquam didicerunt. Nam profecto ego quidem asseverare plane non dubito: ob ignorantiam, quæ olim regnavit & adhuc apud plurimos regnat structura corporis humani & principiorum mechanicorum, præsertim doctrinæ illius de motibus, ejus causis, legibus, & effectibus in rerum natura, & ex defectu sufficientium observationum practicarum, artem nostram non meliora potuisse capere incrementa, sed omnium dissensionum, opinionum atque errorum causam atque originem inde merito esse petendam. Quare etiam cum illis nunquam facere possum, vel potero, qui ad explicandas res medicas, novum quasi systema condituri, plane incongrua quædam & inaudita principia.

eipia, vel sola prorsus nomina nihil significantia, aut naturæ rationalis sensus, instinctus, conamina, molimina, pro veris & formalibus morborum causis venditant, omnes præternaturales, & morbosos motus in se & sua natura ratione intentionis bonos & salutares censent, & omnium quoque ac singulorum motuum & diversarum mutationum in corpore humano causam efficientem directricem, non tam physicum ex pura necessitate agens, sed morale, intentionale, rationale, pro arbitrio suo cuncta administrans principium, constituunt; eo quod admissio moraliter & intentionaliter, quandoque cum ratione, quandoque erronee, ad certum finem agente motus principio, uno quasi ictu omne quod certum, quod demonstrative verum in rebus medicis, practicis potissimum, penitus coarctat atque expirat. Quod si enim rebus physico-mechanicis corporeis, quæ necessario, non pro arbitrio aliter atque aliter agunt, quo præcipue elementa, alimenta, medicamenta, immo partes solidæ & fluidæ corporis nostri pertinent, potentiam & efficaciam movendi & mutationes efficiendi in motibus vitalibus & naturalibus denegare, & causas moralibus atque arbitrariis, quæ capui humanæ non obviæ, nec in potestate Medici sunt, eandem tribuere velimus: nihil certe, nihil demonstrative de rebus, quæ ad vitam faciunt & morbos inferunt, nihil quoque solidi & firmi de remedium effectui atque operatione, proferre & determinare poterit Medicus. Ne dicam suppositas ejusmodi metaphysicas theorias, tironum ignaviam & ignorantiam in rebus physicis, utpote inertibus per se, & superiori principio agenti subjectis, mechanicis quoque & anatomicis, mirum fore ac promovere. Quamvis vero non is sim, qui penitus neget, esse animæ spiritualis potentiam, regimen & influxum, admodum tamen limitatum, quoddam ex solidis partibus, præsertim externas, ad motum excitandi, & fluidum quod immediate movet artus subtilissimum quodammodo dirigendi, licet etiam probe gnarus sim, principii sensitivi vim imaginativam magnas turbas in motibus naturalibus efficere posse: his tamen minime induci possum, ut a particulari ad universale concludam & credam, omnes motus vitales, systole namque & diastole solidorum, fluidorum progressum, atque motus secretorios & excretorios ab iisdem causis semper dirigi. Quin potius firmum semper erit manebitque, res corporeas, quæ ab extra intra corpus operantur, regulis & legibus motuum & effectibus necessariis, pro dispositione causarum in corpore humano, non secus ac in microcosmo, esse subjectas, adeo ut positis certis ad agendum requisitis in corpore nostro causis, certi semper ex necessitate non absoluta, sed hypothetica, & indeclinabiles proveniant effectus. Nihil enim in corpore humano contingit, quod non certas suas, adequatas & sufficientes habeat causas. Et licet has veras invenire atque erui res non adeo facilis sit, neque omnibus expedienda de felici tamen pervestigatione & progressu scientiæ causarum non dubitandum, vel desperandum, modo longiore observatione & profundiore meditatione at-

tem

tem nostram tractet quisque pro viribus, & physico-mechanica paullo subtilioris indaginis principia, diversas quoque motuum leges, in universa rerum natura inquirat & ad corpus humanum paullo sollicitius applicare discat. Quum vero morborum historia omnis fere pathologiae, prognoscos, therapiae & intimioris virium, quae insunt medicamenti notitiae sit basis, seu fundamentum; ad provehenda feliciter praxeos clinicae incrementa nihil utique magis erit necessarium ac utile, quam ut Medici diligentes & attenti sint in consignandis observationibus practicis & morborum historiis, quae quo pleniores sunt, nullis plaue omiſſis circumſtantiis, eo majorem ulum atque utilitatem in ratiocinando praebent. Hinc etiam merito inter characteres indocti, & infelicitis Medici referendum, quando statim audito vix morbo, vel perceptis quibusdam ipsius tantum symptomatibus, ad formulas praescribendas promptus est, antequam de aegrotantis natura & constitutione, morbi indole, causſis, ſtatu, progressu & aliis necessariis phaenomenis plenius certior factus. Neque tamen ſufficit practicarum tantum observationum uberi instructum esse apparatus, sed accedat etiam necesse est solida in anatomicis, physico-mechanicis, chymicis ſcientia ſive vera theoria medica, quae clavis historiarum de morbis & causſis diverſiſſimorum phaenomenorum eruendis infervit; his enim amico junctis conſubio, demum fiet, ut ex multis particularibus veritatibus & regulis, univerſales, ſive axiomata reſultent, quorum copiam ſi quis ſibi comparabit, ſi proſecto aptiſſimus erit demonstrative & ſcientifice reſolvendis & explicandis quibuſcumque etiam diſſicillimis in re medica caſibus & ad ſuppeditandum accommodatum conſilium. Adhaec incrementis ſolidae praxeos clinicae quam maxime ſervit, ut paucis & ſelectis Medicis, bene tamen longiori uſu cognititis & exploratis remediis, utatur. Nam ſub tanta ut proſtat medicaminum multitudine, medens ad veram ſingulorum notitiam pervenit & ſolidi quid in praxi praestare poterit nunquam, ſed potius unacum natura eximie turbabitur. Mihi certe a multis jam annis vix duodecim clasiſſica quaſi medicamenta a me ipſo ſolicite conſecta fuerunt frequentissima, quorum virtutem in variis morbis & varia circumſtantiarum conditione exploratam penitus habeo, ut interius vix aliis quam his optimo cum ſucceſſu utar. Quae quum ita ſint, id ſane uſque eo quam maxime mihi agendum eſſe ratus ſum, ut ſolidis hiſce fundamentis, omnia quae dicto quae ſcripto traderem, inniterentur, eandemque mihi etiam in elucubrandam medicinam hoc rationali ſystematica, propoſui normam. In primo & ſecundo tomo quid praestiterim, qui veritatis & candoris cupidi Jegerunt judicent, in hoc autem tertio excutienda mihi quam maxime ſuſmi verae therapiae, tuta nempe ac rationalis fundamenta, quae ad tria potiſſimum genera referenda eſſe arbitror, quorum primum eſt, ut Medicus ſolidas obſervationes & morborum historias accurate & ſolide conſignare diſcat; alterum, ut ex regulis mechanicis, quae materiam & motuum indolem atque effectus tradunt, theoriam ſuam formet & cauſ-

& causas; phenomena ac quæcunque fiunt & eveniunt in corpore humano, recte & ordine explicare eorumque causas ac rationes reddere possit; ac tertium demum, ut medicamentorum facultates eorumque modum operandi probe noscat, paucis tamen & selectis recte utatur & quæ insalubria sunt, vel minus juvant remedia, a salutaribus discernere discat. Ita autem in perficiendo hoc labore versatus sum, ut varias inanes ac dubias in re medica opiniones atque hypotheses rejecerim, omne auctoritatis præjudicium seposuerim, & nonnisi ea, quæ ad valetudinem cum vita tuendam morbosque sanandos manifestum usum, utilitatem & conspicuam applicationem habere possunt, attulerim. Neque etiam quisque candoris & veritatis amans vitio mihi vertet, quod hac usus sim libertate & a nonnullorum celeberrimum nostro tempore virorum, qui ceterum non parum opis ad illustrandam artem nostram attulerunt, placitis discesserim. Quod vero libri hujus editionem licet ab eruditis crebro sollicitatus eo usque distulerim, hanc maxime factum ob causam; quod ego quidem quam optime facere censeam Medicos, qui perpetuas & tempus sustenturas practicas veritates posteris tradere propositum ceperunt, arduum hoc tempus ad maturam ætatem, quin senectam differunt, quo longiori & multiplici experientia instructi, quæ usui sint ipsi edocti prius sint, nec errores aut opiniones disseminent, ut quidem fieri solet ab iis, qui vel juvenes minusque in artis operibus excitati practicos conscribunt & ex auctoribus compilant libros. Neque etiamnum hoc opus therapeuticum pro vulgo Medicorum scripsi, qui præsidii ad scientiam & veram theoriam medicam pertinentibus destituti, nec historias morborum curant, nec earum causas recte inquirere sciunt, multo minus motuum regulas & leges in genere & œconomiam motuum vitalium in specie, in quonam ea consistat, pernoscuunt, nec selectu remediorum probatissimorum utuntur, nec de avertendis morbis eorumque causis primario solliciti sunt, sed tantummodo certa arcana magnifice commendata acquirunt & variis inhiant formulis ad præservandos etiam difficiles morbos, in quibus tamen incongrua quam servant methodo, plus damni, quam salutis afferunt. Neque etiam eorum usui accommodavi hunc meum laborem, qui recte judicandi, ratiocinandi & philosophandi facultate destituti, præjudiciis magistri occæcati quasi sunt, tantummodo haulti opinionibus firmiter inhærescunt & ad perfectionem jam perductam medicam scientiam autumant. Sed dicata est opera Medicis eruditis & qui solidi quippiam docere vel discere cupiunt; qui artis firmitudinem ex certis principiis physico-nempe mechanicis, materię naturam, affectiones & dispositionem ad motum, item motuum causas, regulas, leges & effectus dilucide exponentibus, petunt, adstruunt & agnoscunt, horum usum in ipsa medica praxi, morborum causis cognoscendis & remediis inveniendis esse longe amplissimum, & qui

P R E F A T I O.

& qui etiam paucis & selectis remediis vitam & sanitatem tueri, morbos avertere & persanare tuto & compendiose student. Hos certe non pœnitebit repetita lectione hæc quæ scripsimus capita perlustrare, & assidua meditatione in suum convertere usum. Nam licet is non sim, qui mihi tantum arroganter tribuere velim, ut credam, doctrinam medicam a me traditam omnibus numeris esse absolutam, cui nihil adjici vel subtrahi possit: hoc tamen dicere & mihi vindicare licebit, quod viam Medico ingrediendam ad ultiores in re medica progressus faciendos compendiose, & recte præmonstraverim. Et quicumque hunc in finem prolata a me in hoc tomo utilissima præcepta penitus cognita habebit atque perspecta; is etiam mox b. c. D. subsequaturum, qui specialiora de morbis omnibus sigillatim tractabit, longe majori cum fructu suo poterit impendere commodo. Summo autem Numini, cujus gratias omne omnino quicquid a me factum in acceptis refero, devotissimas reddo gratias, ac ut clementer efficere velit, quo veritas in physicis etiam & medicis rebus, magis semper eniteat, & falsæ ac detrimētosæ opiniones pessundentur, precor ac voveo.

CON-

CONSPECTUS TOTIUS OPERIS. S E C T I O I.

De rationalis therapiae fundamentis, historia morborum completa, notitia mechanismi corporis sani & ægrotantis, mutua motuum inter se conspiratione, nec non prædictione ex motuum morbosorum natura recte formanda.

CAPUT I. De vera therapia medica natura & fundamentis in gene-	pag. 1
II. De historiis morborum recte consignandis, seu primo therapie medicae fundamento.	3
III. De morbis caute discernendis & recte dignoscendis.	6
IV. De genealogia morborum ex turbato solidorum & fluidorum mechanismo, ad explicationem historiae morborum & veram ac solidam therapiam.	30
V. De consensu partium nervosarum generatim & singulatim cum ventriculo, præcipue passionum & symptomatum origine.	46
VI. De fluidorum vitii ex vitiosa solidorum dispositione.	64
VII. De causis morborum & quidem latentibus recte cognoscendis.	69
VIII. De damnis ex cohibita cuticulari excretionem.	90
IX. De vitii ex turbatis sanguineis aliisque evacuationibus.	102
X. De generatione morborum ex morbis.	116
XI. De rationali pulsuum explicatione & judicio in morbis recte ex iisdem formandis.	130
XII. De judicio ex sanguinis inspectione & examine recte eliciendo.	144
XIII. De judicio ex urina aliisque excretis in morbis rite ferendo.	149
XIV. De criticis & criticis diebus in experientia rationali fundatis.	170
XV. De certis imminenti in morbis periculi ipsiusque moris indicis.	178
XVI. De causis mortem in morbis prognosticis.	187

S E C T I O I I.

De methodo , ordine & legibus medendi , tam naturæ quam artis , nec non de remediis eorum quatuor generibus , operandi & recte applicandi modo unacum cautelis & observationibus utilissimis.

CAPUT I. De optima natura morbis medendi methodo.	202
II. De methodo, ordine & legibus artis in medendo.	216
III. De medicamentorum viribus & causis ignorantia eorum.	236
IV. De medicamentorum quatuor summis generibus & operandi modo, speciatim alterantibus.	241
V. De evacuantibus.	250
VI. De roborantibus.	272
VII. De sedantibus.	278
VIII. De specifica quorundam remedium certis in morbis efficacia.	282
IX. De venesectione aliisque sanguinem subtrahendi modis.	290
X. De balnearum , pediluviorum & clysterum usu medico.	306

NOI REFORMATORI

DELLO STUDIÒ DI PADOVA.

COncedemo Licenza a *Sebastiano Coleti Libraro* di poter ristampar il Libro intitolato *Friderici Hoffmanni Medicinæ Rationalis Systematica, Vol. sex* giusto l'essemplare stampato nell'anno 1732. con licenza di Superiori.

Dat. 21. Giugno 1736.

(Z. Pietro Pasqualigo Reformator.

(Michiel Morosini K. Reformator.

Agostin Gadaldini Seg.

I

S E C T I O I.
D E
RATIONALIS THERAPIÆ
MEDICÆ FUNDAMENTIS.

Historia Morborum completa, Notitia mechanismi Corporis sani & ægrotantis, Mutua Motuum inter se conspiratione, nec non prædictione ex Motuum morborum natura recte formanda.

C A P U T I.
D E V E R Æ
THERAPIÆ MEDICÆ

Natura & fundamentis in Genere.

QUum solidæ, hoc est, demonstrativæ, therapie medicæ principia & fundamenta, a quibus certa & tuta medendi methodus potissimum pendet, tradere jam constitutum sit: non incongruum fore duxi, si prius paucissimis attingerem, quam arcta & quam amica inter scientiam physiologicam, pathologicam ipsamque therapiam intercedat connexio; quo tam necessarius præcipuarum artis medicæ partium nexus eo clarius innotescat. Nimirum physiologia motuum vitalium, qui corruptibilem nostram machinam a præsentaneo interitu vindicant, & moribus, tam progressivis, quam intestinalis, nec non secretoriis & excretoriis, absolvuntur, ac universi partium corporis functiones secundum

naturam efficiunt, & moderantur, indolem, causas atque effectus perquam clare & perspicue explicat. Pathologia vero ea est scientia, quæ motus hos vitæ inservientes præter naturam turbatos, & inde pullulantes actionum læsiones, proponit, earumque indolem, nec non multiplices a quibus dependent causas, accurate & solide indagat atque scrutatur. Et therapia denique est prudentia, corruptos & inversos vitales motus, functiones ipsius corporis diversimode lædentes, per congrua remedia, debito tempore & accommodata methodo, in integrum restituendi & amissam sanitatem revocandi. Ex quo utique conficitur, nullam solidam & veram therapiam medicam doceri, vel addisci posse, nisi veræ & rationalis

Tom. III.

A nalis

nalis physiologiæ ac pathologiæ præcepta prius cognita fuerint atque perspecta. Sane, nemo unquam firmis rationibus mortis & morborum causas demonstrare poterit, quam qui vitæ ac sanitatis naturam & fontem exacte intellexerit. Neque etiam ullus medentur solide & rationi congruenter declarabit, quibus auxiliis & qua methodo, morborum præternaturales motus, qui sanitatem labefaciunt & machinæ nostræ perniciem intentant, in ordinem redigendi sint; nisi ante mortis & morborum causas atque effectus intime perspexerit.

Postequam igitur in primo medicinæ rationalis systematicæ tomo philosophiam corporis sani & integri; in secundo philosophiam corporis ægroti, sive pathologiam, plenius pertraxi: succedit jam tertius, qui solida præcepta & fundamenta artis therapeuticæ tradet, quæ luculenter quemvis edocebunt, non perfunctorie, palliative & ambigue, sed cum ratione, certa & explorata convictione, quin etiam indubia successus spe, morborum curationes moliendas esse & sciendas.

Asserui vero therapiam esse prudentiam, per quam habitum cum recta ratione effectivum, sive practicum, intelligo: & rectam hanc medendi rationem, in acri & firmo medici judicio consistere, persuasissimus sum; adeo ut, quo magis ipse subacta & præsentis iudicandi facultate polleat, eo feliciorum illum habendum esse existimem. Nunquam enim properato, temere uti inconsiderate is, qui salutari arte fessos levare nititur, agere, sed diu meditando, solícite inquirendo & studiose deliberando, ex claris & jam cognitis principiis judicare & demonstrare debet, quare in hoc vel illo morbo quædam remedia, ex fonte chirurgico, pharmaceutico, aut etiam dietetico, deprompta, juvent, adeoque præscribenda: & vicissim, cur alia noceant, & a curatione plane excludenda sint. Neque salubria & in-

salubria in sanandis morbis tantum nosse sufficit, sed medicus perspicaci etiam judicio determinare debet, quo tempore, quo ordine, quo loco, quocum regimine & qua mensura, seu dosi, pro corporis ægrotantis, morbi & symptomatum conditione, medicamina offerenda, nec non, quibus de causis & quem in finem, hæc vel illa potissimum in usum vocanda sint. Tandem exigitur etiam a medente, ut de morbi decursu atque eventu, nec non remediorum effectu, certum iudicium & verax præfagium interponere possit, quo certe ad famam, existimationem & celebritatem consequendam nihil magis facit.

Quum autem ad rectum in therapeuticis iudicium stabilicendum, plura, quæ accurate prius tenenda sunt, pertineant, eo quod iudicium hoc actus voluntatis est, & jamjam eorum, de quibus sententia ferenda, exquisitam notitiam supponit: rerum in hoc tomo dicendarum ordo utique exigere videtur, ut de iis, quæ ad iudicium therapeuticum exacte formandum scitu & cognitu valde sunt necessaria, ante agamus, quam ad ipsam specialem morborum considerationem eorumque medelam descendamus. Videlicet primum & potissimum therapeuticæ veritatis, ipsiusque iudicii medici fundamentum est, perfecta & omnibus numeris absoluta ægrotantis & morbi historia, quippe quæ, præterita & præsentia, omniaquæ quæ affligunt, fideliter, perspicue & ordinatim enumerat; quo ex ipsa futura certo dijudicari possint. Alterum est exquisita notitia mechanismi corporis tum sani, tum ægrotantis, sive cognitio effectuum, legum & genii motuum in genere, non solum qui vitæ ministrant, sed etiam qui morbos excludunt, secundum quæ iidem jugiter & nunquam non operationes suas edunt. Deinde palmarium quoddam momentum conficit consideratio communicationis motuum in machina nostra præternaturalium, qualis

nimi-

nimirum & quanta cum his, vel illis partibus fit; quo medicus claras & perspicuas symptomatum rationes, quæ vulgo consensui partium tribuuntur, inde desumere ac derivare queat. Tum ordo & series causarum, quæ functiones præter consuetam naturæ normam immutant, & morbi ficæ dicuntur, quæ multiplicis sunt generis, earumque ratio & modus operandi, studiose rimanda & penitus animo concipienda sunt: quod fusius jam & luculenter satis in secundo hujus operis tomo excussit. Præterea eximium iudicii medici argumentum suggerit contemplatio naturæ motuum vitiorum, certis morbis solennium, quinam videlicet horum ad corporis conservationem, & quinam ad ejus destructionem, sive mortem tendunt, ex qua postea veracem & firmam prædictionem de exitu morbi, tum ratione salutis & mortis, tum longinquitatis & brevitatis, nec non solutionis & discessus, summa cum prudentia depromere medentis est. Porro mechanica remedium operandi ratio, quæ aut circa materiæ, quæ morbum facit, vel correctionem, vel evacuationem, aut etiam motuum vitia emendanda versatur, tam a priori, elementis nempe & principiis quibus agunt, quam a posteriori, per idem idem confirmatam experientiam, mente comprehendere & explorata esse debet. Non minus etiam illi, qui morbis medelam afferre tentat, summo eo annitendum est studio, ut animo complectatur, firmiterque teneat accommodatam componendis & in pristinum ordinem reducendis morbosus motibus methodum, necnon, quod præcipuum est, solidas medendi, tam rationi congruas, quam crebrioribus experimentis comprobatas, leges. Succedunt tandem observationes & cautiones, in omnis generis remedium usu provide adhibendæ & applicandæ, quas altius animo infixas, memoria custodire debet is, qui cum ratione & exoptato successu in artis, quæ mortalium sa-

luti præest, exercitio versari gestit.

Hæc sunt solida illa & firma fundamenta, quibus omne therapeuticum iudicium superstruendum est: jam unumquod vis eorum seorsim curatius enucleabo & uberius illustrabo.

C A P U T II.

D E

Historiis Morborum recte consignandis, cum Primo Therapiae Medicæ Fundamento.

Primum itaque iudicii therapeutici principium sunt historiæ morborum. Hæc autem, ut insignem, tam in ipsa medicatione, quam vera prædictione, utilitatem ferant, recte utique concinnandæ sunt, ita ut non manca, mutilæ, aut necessariis circumstantiis privata, sed potius, quoad fieri potest, omni ex parte completæ, integræ atque perfectæ sint. Quemadmodum enim in iure ad decidendas ex æquo controversias & solidum iudicium ferendum, integra facti, ut dicere amant legum periti, species, cum singulis circumstantiis requiritur: ita idem in medicina obtinet. Sane medicus parum solidi de indole morbi judicabit, minus quoque aptum & salubre consilium exhibebit, nisi prius omnium phenomenorum circa morbum observandorum exacta notitia fuerit instructus. Et hæc circumspexio eo magis necessaria est, quia eorundem morborum non eadem semper sunt causæ, eademque prorsus symptomata, subiecta quoque differunt, quoad ætatem, sexum, temperamenta, vitæ rationes, consuetudines & plura alia, quæ ad producendos fovendosque morbos concurrunt: adeo ut interdum certum constantemque morbi ejusque symptomatum naturam perturbent, & difficile sit veritatem indagare; nisi complexus horum omnium plene annotetur & sagaci rationis usu perspi-

ciatur & perpendatur. Sapissime etiam unicum in morbo phenomenon tanti momenti est, ut longe alia medendi via sit ineunda. Quandoque minima visa circumstantia maximæ est considerationis, ideoque non facile quippiam est prætermittendum. Præclare hanc in rem commentatur Baglivus lib. 3. *Prax. med. cap. 3. natura*, inquit, *nihil frustra molitur, minimaque sunt sapientis magnarum rerum initia, & minima quoque ad notitiam grandium nos ducunt.* Eandem quoque sententiam exemplo illustrat, hunc in sensum pergens; *status pedendo emissi judicantur motus viles & nulli ad curationem momenti, & tamen, si in dysenteria status, qui prius non aderant, per inferiora exire incipiunt, brevi sanitatem promittunt, ut nos aliquoties observavimus.* Proinde quisque qui therapie medicæ manum admovere tentat, totus in eo esse debet, ut plenas & perfectas, nec fictitiis circumstantiis corruptas observationes, condat & undequaque colligat. Quia vero rariores eæ deprehenduntur in monumentis tum veterum, tum recentiorum medicorum; vehementer certe optandum foret, ut quisvis ad cultiorem in arte salutari eruditionem aspirans, hominumque sanitati fideliter invigilans medicus, casus in artis exercitio occurrentes, præsertim notabiliores, plenissime consignare, atque hoc pacto indefesso studio artis medicæ incrementum promovere anniteretur.

Ad integrum vero historiam de morbis contextendam, non solum requiruntur circumstantiæ, quæ corporis ægrotantis naturam & constitutionem intime pat faciunt, ac morbi genium & indolem exhibent, sed etiam ea, quæ vires & effectus produunt remedium phenomena, annotanda. Subjecti quod patitur accuratio cognitio, quantum conferat ad rationem, in primis symptomatum, in eodem morbo non raro mire dissidentium, in diversis subjectis detegen-

dam ac medendi methodum invenientiam, res tam clara est, quam quæ clarissima. Etenim pro differente corporum indole ac conditione, idem morbus ab eadem causa productus diversis plane symptomatibus incedit. Quemadmodum enim idem alimentum, idem purgans, vel emeticum, vel aliud quodvis heroicum remedium, idem quoque venenum, longe alios, diversilimisque effectus pro differente corporum indole edit: ita etiam morbificæ causæ, ejusdem indolis, plane multis modis dissidentem morbi faciem, ratione symptomatum, ratione periculi & salutis, in aliis atque aliis subjectis exhibent.

Necessarium igitur est, ut in condenda perfecta morbi cujusdam historia, mentio in primis iniciatur ætatis, sexus, structuræ partium solidarum, sive habitus corporis & virium, nec non hæreditariæ ad hunc vel illum morbum dispositionis. Et sane ætatis, tam ad morbi genium perspicendum, quam ejus curationem legitime adornandam, maximum est momentum & mira diversitas: eo quod procedente eadem, solidorum structura & fluidorum ipsiusque sanguinis crasis atque temperies, adeoque & humorum motus multum immutantur. Scilicet in pueritia insignis fibrarum mollietates, remissio, laxus & rarus habitus, cum seri abundantia, adest; juvenes autem fibras tenas & strictas obtinent, sanguinemque calidiorem & mobiliorem alunt; & senibus propria est magna solidorum rigiditas & viarum atque canalium angustia, nec non sasso-sulphurea humorum dyscrasia. Ex qua differente partium constitutione, universi certe fluidorum & solidorum mechanismi diversa indoles, & dependens hinc ad certos morbos proclivitas, dissidentes etiam mores & inclinationes, non solum derivari debent, sed pro hac ipsa etiam.

etiam varietate varia quoque & accommodata methodus excogitanda & adhibenda : id quod experientia luculenter confirmat, ipsisque medicum sagacioribus apprime cognitum est.

Præterea differentiarum sexus exacte ratio habenda est, quum feminarum ob menstruum sanguinis fluxum, vel primum erumpentem, vel minus ordinate succedentem, vel plane tandem subsistentem, nec non ob partus & puerperii labores, multo pluribus ac ipsi viri & peculiaribus prorsus afflictionibus, non solum sint obnoxie, sed systema etiam nervorum longe imbecillius in ipsis sit, & hinc motuum æstus, spasticis ac convulsivis tractionibus & distensionibus, vehementius afficiatur & facilius etiam ad integritatem reducat, quam in virili & nobiliori sexu.

Plurimum quoque refert nosse : an ægotans laxi & solutioris, an strictioris, habitus sit? an vasa exiliora & copiosiora, an capaciora & pauciora obreant? Siquidem sub angustia & tenuitate canalium fibrarumque remissione, longe difficilius fluidorum & progressivus, & secretorius, & excretorius motus procedit : multo autem expeditior & promptior est, ubi fibræ magis tensæ, & strictæ, vasaque non nimis angusta, sed ampliora sunt. Unde observamus, illos multo magis morbis & morbosis afflictionibus patere, difficilius etiam sanescere his, in quibus ob validiorem fibrarum motricium potentiam, fluidorum cursus per corporis compagem citatior est. Id quod etiam de corporum macie & obesitate tenendum est.

Porro color faciei & cutis dispiciendus. Floridus enim pulcher & nitidus aspectus de lymphaticorum humorum puritate & pelluciditate; lividus vero, luridus & flavescens, de eorundem impuritate salino-sulphurea, & vacillante secretioni dicorum organorum, in primis hepatis, officio, evidens præbet indicium.

Tom. III.

Et sicuti testante quotidiana observatione, viscerum & fibrarum debilitas, labes, vitia & inde pullulantes morbi, plerumque ad liberos propagantur : ita maxime omnium medicum de his percontari oportet : utpote quæ ad prædictionem non fallacem promendam multum faciunt. Nam imbecillitates & morbi, qui a natiuitate infestant, ægrius semper sanationem admittunt, facile recurrunt & medentibus multum negotii facessunt.

Neque virium sollicita exploratio intermittenda est : utrum scilicet natura depressæ fuerint? an vero sub morbi, præsertim acuti, initio, quod inter pessima signa connumerandum, statim concussæ & prostratæ apparuerint? In robore enim & vigore virium, quæ non aliter nisi motu & impulsu fluidorum sese produnt, magnum sanitatem recipiendi, & vitam, quæ a viribus nomen sortita, servandi, præsidium collocari, indubium est.

Non solum autem corporis conditionem scrutanda, sed ipsius quoque animi indoles perquirenda, & quibus morbis is laboret considerandum. Quum enim amicabilem admodum & magna sit motuum, tam animi, quam corporis conspiratio & communio; prudens certe & rebus suis satagens medicus, ex mentis, ad has vel illas impetuosas commotiones dispositione & proclivitate, recte, & ad veritatem accommodate argumentari potest, ad solidorum & fluidorum mechanismum, & dijudicare, quomodo hic sit comparatus. Nam major & vegetior fibrarum, solidorumque tensio & mobilitas, ad iracundiam animum disponit; laxitas vero & deficiens eorum vis motrix, angustum, demissum, timidum & pavidum illud reddit. Ira etiam solidorum tonum & stricturam augendo, fluidis impetuosiores motum inducit : timiditas vicissim, robur solvendo & deiciendo, ut remissius truantur & tardius circumagantur, efficit. Terror valide superficiem & extrema cor-

A 3 poris

poris constringit, sanguinemque ad interiores & nobiliores partes, præcordia nempe & caput, impetuosè reprimendo, graves ingignat affectus, nervosi maxime generis, id quod sensim enereat & languore frangit. Idem præstat diuturnus moeror, qui sæpius quidem ex vitio viscerum & cursu humorum impedito, ut in hypochondriaco nialo affectu constat, originem nanciscitur; sed dum nociva sua efficacia solidas maxime partes aggreditur, mirifice vires universi corporis atterit ejusque functiones, robur fibrarum minuendo, illasque laxando, labefactat. Quid? quod ii, qui attentius & curiosius morbis sanandis præstant, subinde experiuntur, difficulter admodum ægitudines elidi & expugnari, si animus non est compositus atque pacatus, sed patheticarum commotionum intemperie diversimode jactatur. Præterea in medica hac animi consideratione inquirendum etiam est: num forsitan, quod litteratorum maxime vitium est, ex nimia studiorum intemperantia, profundis, & mentem fatigantibus meditationibus, quæ in disciplinis abstractivis, ut in metaphysicis & mathematicis, familiars, nec non intempestivis lucubrationibus, consumitis spiritibus, sic dictis animalibus, ingens cerebro & nervosis partibus illata fuerit debilitas? utpote quæ, postea ad gravissimos capitis morbos, apoplexiam nempe, melancholiam, maniam, memoriæque debilitatem promptum parat aditum, & vix summo labore resarcitur. Dici enim vix potest, quanta consensio cerebro ejusque membranis, cum ventriculo eique annexis intestinis, ceu valde nervosis, nec non aliis exquisito sensu præditis partibus, intercedat: quo fit, ut nimium literis sese ingurgitantes, plerumque depressa ciborum confectione & vacillante digestionem, nec non seigniori & difficiliiori intestinalis excretionis successu, maxime omnium vero familiarissimo ipsi morbo, sic di-

cto hypochondriaco, affligantur & exacercentur.

Porro ad pleniorum morbi historiam consignandam referendum etiam est, ut medicus non solum ubi locorum ægotans degat, & quo cælo & aere fruatur, sed etiam quo victu utatur, curatius pernoscat. Altiora enim & sublimiora loca, ob liberiorum ventorum perflatum aere puro gaudent, ideoque salubriora sunt; humiliora autem & depressiora, aere magis condensato, crassiore, impurisque vaporibus referto infesta sunt. Et nihil certe ad ingenerandas graves & chronicas passiones, neque minus ad vigorem & robur solidis & motricibus partibus subtrahendum validus est, quam si quis sub cælo graviore, impuro & vappido aere, cibum & somnum capit; eo quod hic ipse una cum esculentis & potulentis, ipsaque inspiratione, interiora corporis subintrans, humoribus sese intimis commiscet, & fluidum illud aereo-æthereum contaminat, ut motibus in corpore non ea, qua decet efficacia, præesse possit, sed functiones partium inde gravissime luan.

In victus autem ratione potissimum dispiciendum: num ægotans duriore & crassiori victus generi, cujus census sunt cibi ex mari deprompti, carnes induratae, salinae & infumatae, panis grossior, assuetus? quippe quod in locis maritimis recepti usus est, & ad dyscrasiam, sive impuritatem sic dictam scorbuticam, ibi locorum endemicam, multum confert. Vel etiam explorandum est: an decumbens fructibus horæis, aut etiam acetariis, farinaceis cum butyro, ovīs & saccharo frixis, quod mulierculis iolenne, nimium delectetur. Alii caseum in deliciis habent, eoque immodice vescuntur, qui tamen & obstructioni & calculorum generationi multum velificatur.

Maxime omnium vero potus consueti genus considerare & explorare decet: eo quod, maximum sane est mo-

momentum, quod ad texturam & crasin sanguinis, humorumque constituendam potus confert; qui quo magis est temperatus, aqueus & dilutus, eo salubrior quoque existimandus est, quum ad sustinendum vitalem humorum motum, tres liquidi partes, & una tantum solidi desiderantur, & secundum naturam recipiantur. Hinc cerevisiæ nimis crassæ & nutrites, multo magis acefcentes, nec non omnes potus nimium spirituosus, vini & frumenti etiam spiritus, matutino inprimis tempore & ventriculo vacuo copiose ingurgitatus, mirum quantum sanitatem lædunt, quin sensim frangunt atque prosterunt. Inde enim viscera indurantur, polyposæ concretiones hinc & illinc in cavitatibus generantur, & humores a debita temperie deturbantur, ut postmodum ad hæticam, cachexiam, hydropem, apoplexiam & subitam mortem promptus fiat transitus. Quum vero homo ad tuendam valetudinem copioso liquido indigeat; nihil certe parciore potu, in quo feminæ, & qui vitæ sedentariæ incontinentius dediti sunt, plerumque delinquant, damnosus est, & intensius: siquidem hoc pacto, ob necessari fluidi defectum, minimi tubuli, e quibus emunctoria corporis organa penitus coagmentata sunt, viscido & crasso humore infarciuntur, occluduntur, & obstructions secundæ plurimorum morborum genitricæ exsurgunt. Præterea sedula inquisitione etiam percontandum: num a largiore, nimis frigido haustu, corpori fundanti & impense calefacto ingesto, morbus sua duxerit primordia? Quod si enim primam morborum originem perquisitus scrutamur, nihil certe frequentius occurrit, quam quod a potu nimis pertrigato, largiter & celeriter, post intensam corporis commotionem & exercitationem, vel post effectum quandam vehementiorem animi, aut succedente critica aliqua & salutari sanguinis excretionem, in-

gurgitatio, universa functionum & motuum vitalium æconomia illico turbetur ac pervertatur; ita prorsus, ut ipsa veneni virulentia, neque citius neque potentius destructionem & exitium inferre queat.

Accedit vitæ genus decumbenti huc usque solitum atque familiare, in cuius contemplatione hæc potissimum expendenda: an sit laboriosum, inquietum & sedentarium? an aulicum? an militare? an curis & laboribus mentis adstrictum? Nec non quale opificium tractet atque exerceat? an scilicet metallis & mineralibus fovendis, igne coquendis & perficiendis operam det? Nam quamlibet vitæ generis rationem, peculiare suos alere morbos, non modo indubia experientia comprobatur, sed sensus etiam & solido argumentorum robore in elegantissimo libro, quem *Rammazzinus de morbis artificum* composuit, abunde evictum atque excussum est.

Tandem eximium momentum ad interiorem statum, a naturali ordine descendentis notitiam, ipsa consuetudinis ratio subministrat. Quam enim nullus fere homo sit, qui non peculari quadam rerum non adeo salubrium assuetudine teneatur in victu, potu, somno, motu, exercitio venereo, tabaci, suffimigi, vel sternutationis causa adhibiti, usu, nostro ævo potus coffeæ sortitione, quin etiam, quod inprimis hypochondriaci solitum, nimia ipsorum medicaminum assumptione, aliisque rebus: certe, singula hæc errata, naturæ corporis nostri minus proficua, probe inquirenda sunt, & noxa ab iis illata studiosè pensitanda.

Nihil vero, nostra quidem sententia, ad ægri naturam & morbi generationem plenius cognoscendam & intelligendam, plus adjuvanti affert, quam excretorum modum & rationem rectè examinare atque perpendere. Ea enim excretionum indoles, conditio, quin etiam necessitas est, ut sine his valetudo salva persilire ne-

A 4 queat:

queat : propterea quod in homine, non amplius quoad corporis molem incrementum, tantum egeri debet, quantum ingeritur, & deficiente, vel suppressa consueta & salutari per varia organa, superfluum, inutilium & mixturam animali ac vitæ inimicorum eliminatione, & vestigio plurimarum morborum causarum propullulant; ita, ut non fallaci præfatio exinde morbi prævideri atque prædicti possint. Inprimis autem id vacationis genus, quod per alvum succedit, eo studiosius est considerandum, quo majus momentum est, quod ad sanitatem illibatam præstantiam, conficit. Etenim alimentarius ille & excrementitius intestinorum canalus, si diutius retinet ea, quæ e corpore proferenda sunt, gravissimum non solum morborum fomes & minera excludit, sed sedes etiam illorum ac domicilium in hoc erigitur atque firmatur. Hinc si alvus incipit officii sui oblivisci, & præter consuetudinem obleserit, in proclivi & pro certo est judicare, morbum vel præsentem, vel certe futurum esse. Præter alvinam hanc excretionem, attenta etiam contemplatione, exploranda est perspiratio, quæ per universale illud corporis colatorium, extimam cutem, perficitur, & qua, secundum *Sanctorii* calculum, plus ejicitur, quam per omnia reliqua emunctoria. Hujus salutaris successus ex vestitu, ad corpus fovendum & inæquabili semper calore servandum, apto, nec non temperato pedum tepore, & madore optime dignoscitur; vicissim autem pedes siccæ & frigidi, tubulosum cutis corticem strictiorem & sordium per hunc exhalationem sufflaminatam esse, subindicant: Hinc si sub frigido, humido, mutabili & inæquali aere, nec non vernali & autumnali tempore, tempestatibus crebrioribus, vicissitudinibus interpolatis, exclusio sordium per halitus valde diminuitur, corpora fiunt languida, & morbi, qui populares habent circuitus, perquam familiariter insistant.

Quum vero homo plerumque plus alimenti assumat, plus etiam feri & sanguinis ingenere, quam natura corporis ferre & in usum convertere potest, ut ordinariæ etiam excretiones sæpe supervacuis humoribus evahendis non sufficiant, extraordinarii subinde & statim nonnunquam temporibus, mensibus & annis recurrentes motus excretorii contingunt, quibus vel ipse sincerus sanguis nimis abundans, uti sit in sexu sequiore, per uteri, & in nobiliore, per ani venas, nec non in pueris & adolescentibus, per narium stillicidium, foras dimittitur; vel etiam humores serosi & impuri per largiores sudores, per copiosas alvi defectiones, per narium in coram deſtium, nonnunquam validiori tussi, per diuturniorem viscidæ ac glutinosæ humoris excretionem, cum singulari saninitatis commodo ejiciuntur; quæ salutares & consuetae ejectiones, si deficiunt, vel profus supprimuntur, metus est, ne gravissimi morbi exinde emergant. Nihil vero æque perniciosum atque exitiale est, quam si critica ejusmodi, præsertim sanguinis, excretiones, celerrime & uno quasi ictu, sistuntur, cujusmodi noxia vi potissimum pollet, tum gravis animi affectus, inprimis extrema & minima, valorum oscula conſtrigens terror, tum aer nimis frigidus, aut frigus externum inconsideratius corpori admissum; siquidem exinde exitiales humorum sunt stagnationes, & subitæ ac capitales noxæ in motuum vitalium ordinem redundant. Idem sentiendum est de excretionibus illis, quibus plurimi morborum solvuntur, & quæ propterea vocantur critica; si nempe medicus, vel ægrotans, easdem perperam & pessimo consilio compescere tentet: quippe cohibitis illis & compressis, facillime morbus non solum recrudescit & redit, sed pejor etiam multoque periculosior resultat.

Præ.

Præterea ad genuinam morbi indolem exactius intelligendam, plurimum facit curiosis sciscitari & percontari: quibus morbis per vitam decursum æger fuerit obnoxius? an forsan quidam haud ita diu præcesserit, & qua methodo quibusque auxiliis is fuerit sublatu? Nam turpe quidem dictu, sed proh! verissimum est: ex temeraria & imprudenti morborum, inprimis febrium, medicatione, damnosissimam & maxime periculosam nonnunquam symptomatum oriri causam, ita ut, fugato ambigue priori morbo, alius & longe gravior irruat, ac diutissime infestet. Sæpenumero etiam, is, qui e morbo convaluit, salutaribus Medici præceptis minus obtemperat, sed pro cæco libidinum impetu, gravissimos & nocivos in rerum non naturalium usu errores admittit, & hoc pacto de novo mineram morbiferam colligens & cumulat, ipse sibi damnum procurat & morbum contrahit. Novimus sane plures, qui morbo superato & funditus exspirato, ex intemperanti & nimia ciborum ingestione, suppressa per subcutaneos tubulos ex incuria ordium exhalatione, nec non neglecto debito evacuationis alvinæ successu, in pessimas ægitudines iterum inciderunt, & per diuturnum tempus cum iisdem consistati sunt.

Nonnunquam etiam morbi mire complicantur, ita ut sæpenumero hypochondriaco malo jam antea affectus, aut cachexiæ implicitus, scorbutica labe infectus, debilitate capitis affligus, hæmoptysin passus, phthisi emaciatus, hæmorrhoidum minus legitimo successu laborans, calculo excruciatu, vel etiam podagræ doloribus detentus, alium adhuc dirum morbum, sive acutum, sive chronicum, nanciscatur: ubi utique in medicatione summa adhibenda est prudentia, & longe alia medendi via ineunda, quam in alio ægotante, eodem quidem morbo decumbente, sed visceribus integris, ac viribus non-

dum attritis & per antegressam valetudinem exhaustis.

Pari ratione ad exquisitius de morbis illisque medendi methodo iudicium ferendum multum certe valet, corporis laborantis, quoad viscerum & nervosarum partium dispositionem, plenior cognitio, in qua potissimum despicendum: utrum corpus succo & sanguine nimis sit fartum, vel an impura excrementitiorum & serosorum humorum sentina scateat, sive an sit cacochymicum? Qualis sit ventriculi & intestinorum ratio? an ructibus, flatibus & spasmis cum alvi strictura exerceantur, & æger sit hypochondriacus? Quæ hepatis sit conditio? An inoffensus sanguinis per hoc viseus transitus? an humoris bilioli in eodem secretio debita & non sufflaminata? id quod ex faciei colore & diminuta corporis nutritione patescit. Porro disquirendum: an tenera illa vesicularis & vasculosa pulmonis substantia adhuc sit salva & integra? quippe quod exspiratio vel facilis vel difficilior, nec non rejectio humoris ex ore, luculenter produunt. Denique etiam temperies cerebri & systematis nervosi consideranda est, & ex natura somni, animi affectibus, mentis etiam & phantasie interturbatione, prudenter dijudicanda.

Exacte sic perspecta corporis ægotantis natura, ad ipsum morbum quocum æger consistatur, paulo penitus considerandum, ejusque indolem & peculiarem genium intimius indagandum, transeundum, & maxime omnium videndum est: utrum malum populares habeat circuitus & epidemium sit? an ejus virulentia per exanthemata se prodit? ex quo materiam, quæ morbum facit, renuitas & virulenta indoles potissimum dignosci potest, quippe quæ, dum nervosis partibus insidet, præcordiorum anxietatem, inquietudinem, extremorum frigus, conatum vomendi, capitis & dorli circa primam lumborum vertebra, dolorem, pulsus ce-

leritatem cum duritie junctam, mentis turbationem & spirandi difficultatem promptissime concitat; relegato autem ad corporis corticem noxio humore, horrida hæc symptomata plurimum de vehementia remittunt & tantisper conquiescunt. Scrutandum præterea est: an cum ingenti virium prostratione & intenso partium languore & summa inquietudine, morbus ægrum apprehenderit; utpote quod occultæ humorum corruptionis, quæ vulgo malignitatis nomine venit, haud dubium subministrat indicium.

Et quum nulla fere febris vel alius morbus sit, in quo non sensibiles symptomatum remissiones vel intermissiones conspicuæ sint; medicus certe, actiones non naturales, quam vitales & animales, quomodo tam intra, quam extra paroxysmum comparatæ sint, sedulo pensitare debet. Nam in accessionibus & impetu ac vigore morbi, in quo motus & solidorum & fluidorum intensiores & accelerioresprehenduntur; necessarium est, ut omnia ea, quæ motus cum excretionibus augent & exacerbant, penitus absint & prorsus intermittantur: contra vero diebus vacuis & intercalariis, nec non paroxysmo silente, ubi omnes motus, maximeque pulsus, ob insignem solidorum succedentem atoniam & debilitatem, sunt imbecilles & languidi, ea, quæ materiæ peccanti commovendæ & exterminandæ inserviunt remedia, perquam opportune propinari possunt. Maxime vero omnium in morborum incremento dispiciendum est: quas functiones maxime, animales, an vitales, vel naturales? iidem lædant & labefactent; quippe ex hujus læsionis gravitate, morbi causæque morbificæ vehementia judicanda est. In acutis ex somni, respirationis, nec non pulsuum conditione atque natura, morbi genium & vim uberius & perquisitus cognoscere, solerti & perspicaci medico datum quidem est atque concessum; sed dolendum

certe, quod perpauci sint, qui ex arteriarum pulsatione, sanguinis per universum corpus, & præcipue pulmones, circuitum, atque etiam systematis nervosi & fluidi nervei, quod veteres spiritus animales vocarunt, naturam & constitutionem indagare atque perspicere norunt. Plane mirabilis enim cerebri & cordis est conspiratio, ita, ut quisvis cerebri vel nervorum morbus, quisvis etiam animi ex affectu motus, pulsus illico mutet. Porro quum nemo ex morbo, nisi inflammatione & sphacelatione, æternamoriatur, & in acutis quidem ventriculi & membranarum cerebri inflammationes facile secedant & interitum inducant; in chronicis vero viscerum sphacelationes, lethalem vitæ catastrophem imponant; medicus certe oculum & animum ad funesta hæc symptomata comprimis advertere & dirigere debet, quo exinde perquam utilia consuetaria in usum suum elicere possit. Neque minus diligens suscipienda est investigatio in primarum viarum sub totius morbi decursu conditionem: an scilicet sordibus relectæ sint, vel sordescere incipiant, & quidem sub initium vel progressum morbi? Qualis sit excretionis alvinæ ratio? quæ resectorum copia, color & qualitas? utpote quæ de functionum naturalium vitata vel legitime comparata constitutione, haud incertum præbent indicium. Urina etiam contemplanda, qualis hæc reddatur colore, consistentia, indole & quantitate, e quibus, collatis aliis in morbo phenomenis, spasmodicæ partium internarum stricturæ cognosci, & actus præternaturalis augmentum vel decrementum judicari potest.

Uterius ad integram morbi historiam contexamus, nihil aptius iudico, quam si medicus probe & summa cura operationes remediorum, quæ præscribit, observet, & omnes, quæcunque post medicaminis usum inciderunt mutationes, studiose annotet,

notet, inprimis: utrum symptomatum vis, ac vehementia inde tantisper vel mitigata, vel adauſta ſit? an vero nihil plane horum contigerit? Quam enim totius therapia cardo in eo poſitiſſimum vertatur, Medici etiam peritia ex eo maxime pateſcat, ſi is in graviore morbo apta & idonea ad oppugnandum eum ſciat exhibere, remedia: certe qua ratione medens palmario hoc ſuo officio ſatisfacere & auxilia utiliter & convenienter applicare poſſit, ſi non extracta illorum notitia fuerit imbutus, equidem non video. Hanc vero remediorum intimiorem cognitionem animo rite concipiendi, vix certior, rectior & compendioſior datur via, ac per obſervationes & morborum historias, quæ ſimul medicaminum propinatorum uſum, genuinam applicationem & certos effectus recentent atque complectuntur. Et hinc demum vera, certa & non fallax de remediorum viribus & efficacia, quæ tantopere in deſiderio eſt, experientia, proficiſcitur & medenti innoſceſcit. Jam dudum enim non ſolum *Ceſus* monuit, ſed experientia etiam calculo conſtat, eadem medicamenta, quæ in eodem morbo uni ſubjecto maxime proficua ſunt, alteri graviffime nocere; quo ſit, ut ipſi medici, remedium quoddam mirificis laudibus & encomiis extollant, alii vero illud ipſum plane damnum atque reſiciant, utriſque ad experientiaſyſtem confugientibus, cujus tamen ea ratio eſt, ut nunquam fallere poſſit, ſi modo omnes & ſingula circumſtantia, omniaque phenomena, quæ in perfecta ſubjecti & morbi historia commemorantur, exacte penſitentur, neglectis autem, ut perditos plerumque mos obtinet, iſdem, hæc ipſa utique anceps eſt ſummeque ambigua. Nam vires & operationes remediorum neutiquam ſunt abſolutæ, ſed conditionatæ, hoc eſt, ad varias conditiones & circumſtantias, tam individui, quam morbi, nec non cauſas, tempora aliaque id genus relatæ; ideoque

eum omnino in finem accuratæ obſervationes & exactæ curationum hiſtoriarum conſcribuntur, quo genuinæ medicamentorum virtutes, in tot diverſis naturis, locis atque temporibus, perſcipiantur & intelligantur. Hinc præſtantiffimum proſpecto eſt *Hippocratis* monitum libro de decentiſſimis. *Sint*, inquit, *in memoriam tibi morborum curationes & harum modi, quotuplifier & quomodo in ſingulis ſubjectis ſe habeant: hoc enim principium in medicina eſt, medium & finis.*

Quam vero morbi, præſertim acuti, ſæpiſſime ſine ullo medico & pharmaceutico ſubſidio, aut aliis per artem adhibitis auxiliis, ſolius naturæ beneficio, & nonniſi domeſticis quibusdam remediis, temporis præſertim diuturnioris tempeſtivate, ceſſant, quin non raro rectius perſequentur, ac ubi ingens pretioſiſſimorum medicaminum copia exhibitæ fuit: multum proſpecto ad therapiam rite inſtituendam & convenienter perſiciendam proficit, omnes ſedulo annotare circumſtantias, ſub quibus, quo tempore, quo ordine, quibus excretionibus, quo ſymptomatum ſucceſſu, morbus decurrit & tandem ſolutus fuerit. Optandum hinc quam maxime foret, ut accuratæ proſtarent obſervationes de ſingulorum morborum in diverſis individuis naturali proceſſu, ac ſpontaneo decurſu, ubi nimirum totum opus naturæ commiſſum, nec ullum plane adhibuit medicamentum, & in quibus omnes circumſtantia tam nude & ſimpliciter enumeratæ ſunt, quam ſe invicem non interrupta ſerie exceperunt. Ita firmius ſane iudicium de viribus remediorum interponi poſſet, & non ſolum faciliſſimum eſſet iudicatu, utrum affectus alicuius exacerbatio, quæ poſt medicaminis uſum contigit, ex immutabili naturæ lege, atque cauſarum nexu profluere, an vero a remedio illo ſtriſſe & abſolute inducta fuerit, ſed viceſim etiam longe certiori argumentatione concludi poſſet, remiſſio & allevatio ſym-

symptomatum, administrationi remedi succedens, huiusne an naturæ operationi, an utriusque simul adscribenda sit & tribuenda. Non infrequenter enim fit, ut medici arcanis suis accepta ferant, quæ suffragante tantum natura quoad afflictionum mitigationem, vel totius morbi curationem, evererunt, unde tam gloriosa simplicium & compositorum medicamentorum encomia in libris practicis & botanicis prostant, quæ tamen plerumque omnem spem & expectationem, tam medicis, quam ægrotantibus, fallant atque destituunt.

Denique ad observationes & completas morbi historias adornandas, sectio cadaverum morbis defunctorum maxime referenda est; quandoquidem non facile aptius & certius ad naturam causæ morbificæ & sedem affectam pernoscendam, immo ad mortis causas detegendas medium, sectione & inspectione solentiori cadaverum eorum hominum, qui iisdem morbis extincti sunt, invenitur. Quanquam enim non omnia, quæ in dissectis corporibus observantur, semper primæ & proximæ morborum causæ sint, sed sæpius effectus tantum causarum acque ipsius mortis sistant; nihilominus non raro tamen accidit, ut hac ratione genuina morborum atque symptomatum insolitorum causæ manifestæ fiant. Obversantur sane animo plurimi casus, ubi tum in ipsis morbis, tum in eorum causis cognoscendis, non incelebres etiam, sed magni nominis medici, valde hallucinati sunt, maxime aliena de morborum quorundam indole, & causis proferendo, quorum erroneas cogitationes post mortem apertio evidentissime relutavit. Facta enim sectione, ut plurimum polyporum in corde vel vasis majoribus concretiones, aut empyemata in pectore abscessus mesenterii, calculi in bilis conceptaculo, vel urinaria vesica, rupta sanguinea vel lymphatica vasa, ingentes glandularum tumores, scir-

rositates, vel corruptiones putredinosæ viscerum, uterus disruptus, in conspectum venerunt, de quibus nihil plane antea suspitionis fuit. Monendum tantum est, ne in cadaverum dissectionibus, causam morbi confundamus cum causa mortis, quod a pluribus ingenuis medicis fieri assolet, quibus sufficiens peritæ ad iudicium aptum de læsionibus partium, quæ in sectionibus deprehensa fuerunt ferendum, deest. Nonnulli etiam data opera causam mortis pro causa morbi venditant, ut hoc pacto aliis imponant, quasi nulla arte morbus, quo vita defectus æger medicamentis potuisset submoveri, & sub hoc inclinabilis moriendi necessitatis prætextu famam suam salvam atque integram conservent.

Dissectiones itaque cadaverum frequentiores & solentiores a medicis anatomes peritis maiorem in modum commendandæ sunt; eo quod vera causarum morbi cognitio, & prudens remediorum ad eas auferendas applicatio, duo quasi poli sunt, circa quos tota praxis medica vertitur. Et ut accuratior causæ morbificæ cognitio non semper satis sit ad morbum tollendum, sed is sæpe remediorum efficaciam vincat; non tamen ideo inquisitio diligentior cadaverum; tantquam labor parvæ utilitatis incusanda, quod a nonnullis sciolis, qui sapientiam suam non ex puro naturæ sonie, sed ex lutulentis lubricis phantasæ speculationibus, haurire sagunt, fieri consuevit, siquidem ad minimum id emolumentum inde resultat, ut medicus an morbus similis occurrens, sanationem admittat, necne? & quanam medicamenta huic malo avertendo idonea sint, quæ non? dijudicare possit. Profecto enim ex unica per anatomen circa morbi alicujus causam facta observatione, plus utilitatis in praxin, præsertim si eadem affectio iisdem plane circumstantiis stipata denuo occurrat, redundabit, quam ex mille subtilibus theoretico-

ticorum rationeulis, ex fictitiarum hypotheseum serinio depromptis. Pulchre hanc in rem scribit Baglivus lib. 1. *Praxeos med. cap. 5. §. 6.* dum ait: *errant, qui putant, se morbos feliciter curaturos, quia doctrinam thesaurizandi ad amissum callent; errant, inquam, quia medicus ad multo aliores respicere debet, ut innocentem artem a calumniis vindicet, egrosque a morborum tedio ad salutis tranquillitatem revocet: eadavera hominum morbis dentiorum secunda sunt ei, manusque inquinanda, ut inveniat, quae morbi sit sedes, quae cause, qui exitus antecedentium symptomatum, qui demum effectuum omnium in antecedenti morbo observatorum eventus.*

Reliquum nunc est, ut, præter ea, quæ jam sparsim in ipsa tractatione monuimus, etiam dicamus, quinam fructus ex medicorum plenioribus observatis in perfectionem & certam rationem artis nostræ redundent. Sunt vero hi eximii. Neque enim alia via vel methodus superest, qua morbos a se invicem probe distinguere, eorumque causas multum quoque dissidentes cognoscere possimus, quam per multiplices & recte institutas observationes. Ad prudentem etiam prognosin, sive judicium de morbi eventu formandum, certior & melior, quam per observationes, nulla ratio inveniendi. Quam infinitè circa morborum prognosin regulæ in Hippocratis aliorumque veterum monumentis quidem prostant; sed maxima ex parte fallaces sunt, tantum abest, ut pro universalibus sententiis & aphorismis veris haberi possint. Idque accidit eam maxime ob rationem, quia non ex integris morborum historiis, sed ex earum fragmentis tantum, & quibusdam, non omnibus & singulis circumstantiis, depromptæ sunt. Igitur longe perfectior & hæc doctrina de prognosi speranda nobis erit, modo ex multiplici observatione & accuratiori consideratione circumstantiarum prognosticas regulas elicere

incipiamus. Neque dici satis potest, quam utilia corollaria in usum futurum, ratione methodi medendi, ratione applicationis remedium, & in cognoscendo, quænam ex horum genere noceant, vel prosint, hauriri queant. Medico enim nunquam desistendum est ab observationibus & experimentis, neque ulla, licet etiam minoris momenti videantur, negligenda sunt. Nos certe non facile casum quendam prætermittimus, quia vix ullus incidit, ex quo non quippiam adhuc addicere possimus, quum ad minimum, quod jam inventum & cognitum fuit, exinde confirmetur.

Inter alios vero fructus, quos ex recte confirmatis morborum historiis expectare possumus, insignis omnino etiam est is, quod ad diversas medicorum hypotheses, opiniones & controversias in praxi decidendas reddamur aptissimi. Quod si enim ulla certe medica disciplina, innumeris opinionum figmentis, sectis & dissensionibus immerfa est. Ex harum vero dissidentium fœdendarum labyrintho nosmet extricandi non meliorem novimus viam, quam si earum applicationem ad medicas observationes, quæ genuinum ac immutabilem naturæ ordinem & processum in vitæ, sanitatis ac morborum negotio complectuntur, urgeamus: tum enim clarissime elucescet, quæ firmo stent talæ & ad veritatem accedant, ac vicissim, quæ a verò abudent & luxuriantis imaginationis sortis sint.

Quot diversissimæ medentium in praxi medica, circa remedium valentiorum & heroicorum, e. c. venesectionis, foniculorum, vesicatoriorum, purgantium, emeticorum, mercurialium, opiatorum, chinæ, salium volatilium, martialium sunt sententiæ, hi eadem laudant, illi damnant, & omnes pro veritate sententiæ suæ acriter pugnant, ut demum cui assensum præbere possis, nescias. Hic certe non accommodatior emer-

gen-

gendi ex hisce difficultatibus patet via, quam observationes cum cura & diligentia conscriptas de illis morbis, in quibus damnum vel salutem hæc medicamenta attulerunt, consulamus, quippe tunc facile apparebit, pro differenti circumstantiarum ratione, in eodem morbo remedia hac insignem opem, vel luculentum etiam damnum attulisse, adeoque in se non esse nociva, sed in medicos culpam esse refundendam, qui iis non recte usi sunt.

Adhæc integrè atque exactè morborum historiæ hanc quoque eximiam utilitatem asserunt, ut eorundem originem, primordia atque generationem exinde percipiamus ac discamus. Etenim quemadmodum nihil in rerum natura sine causa evenit, & effectus semper proportionati sunt viribus causarum suarum: ita etiam graves & plane inordinatè motuum vitalium mutationes, ac inde dependentes turbata & læsæ functiones, ab efficacibus & sufficientibus causis ut proveniant necesse est. Has sollicita & sedula indagine pervestigare oportet medicum. Quocirca præter considerationem ætatis, habitus corporis & temperamentum, nec non dispositionis ad morbos, secundum ordinem rerum non naturalium, quibus unusquisque quotidie indiget, itemque quoad regimen in vitæ ratione inquirere decet medicum: in quonam deliquerit vel errores admiserit æger, quo deinde his exploratis ac junctum pensitatis, proximè, quæ morbum facit causæ, generatio elucescat. Nam si quispiam originem morborum curate investigaverit, semper observabit, causas plures, quæ medicis remotæ dicuntur, concurrere ad causam proximam, quæ posita morbus ponitur, constituentem. Et has remotas, sive antecedentes causas, iis rebus contineri, quæ maxime sunt externæ & ab arbitrio ac potestate utentis pendent, exploratum est.

Quo facilius autem & crebrius errata inconveniienti harum rerum usu

committuntur, præsertim ab iis, qui viles illarum, tam ad juvandum quam nocendum aptas, plane ignorant, quorum tamen maxima pars est: eo facilius quoque, certior magisque obvia est enata inde ad morbos dispositio, quia ipsa eorundem origo. Hinc dici vix potest, quantum utilitatis exactior primæ morborum generationis cognitio, nobilissimæ medicinæ parti, præservatoriæ, conseruat. Quod si enim ex crebrioribus observationibus perspectum habeamus, a quibus causis pregressis, & admissis in vitæ ratione delictis, morbus in hoc vel illo corpore incunabula traxerit; in prono deinde ac facili est, salutare consilium aliis impertire, a quibus scilicet, valetudini dispendiosis rebus, sibi cavere ac temperare debeant, ne in eundem morbum incendant. Et utinam hæc præstantissima artis nostræ pars, quæ afflictionibus morbofis avertendis addicta est, quæ nihil utilius, & quæ etiam in potestate medici plus posita, quam morborum sanatio, nostris temporibus majori studio & solertia excuteretur, & hunc in finem uber observationum idonearum apparatus colligeretur; tunc utique futurum esset, ut mortales, & vitam a morbis magis immunem, & diuturniorem ducerent.

Sed hæc de modo conscribendi observationes morborum in uno individuo earumque insigni utilitate dicta sunt: nunc etiam perpauca subjicienda erunt monita, observanda iis, qui historias de affectibus vel epidemiis, sive populariter in loco quodam grassantibus, vel endemiis, sive certis regionibus inquilinis & quasi propriis, rite concinnare ac colligere nituntur. Scilicet quum multi morborum, ac inprimis omnis generis febres, tam malignæ & periculi plenæ, quam contagio infestæ, continuæ, æque ac intermittentes, exanthematicæ & catarrhales, arthriticæ, ac rheumaticæ, nonnunquam certo quodam annitempore, regionem vel urbem universali quasi labe inundent & multos simul
inva-

invadant, sæpius etiam gravioribus aut mitioribus, imis peculiaribus symptomatibus stipatæ sunt, & non unam semper eandemque, sed subinde aliam atque aliam medendi rationem exposcant: causæ utique popularis huius incurfus & singularis tamen quæ obrinent genii, non aliæ esse possunt, quam quæ pluribus hominibus sunt communes & in omnes æque cadunt. Jam vero si oculos circumferimus, exploratione curatius instituta, aeris potissimum insalubrem conditionem, ejusque communem omnibus sub eadem plaga usum, inculcandam esse; patet: eo quod non solum fluidum illud catholicum aerium-ætherium et lacticum, ad motus qui vitæ præstant conservandos & immutandos, prout ex physiologicis constat, multum facit, sed ipse etiam aer mutatus, fluidorum temperiem & solidorum constitutionem afficit, iisdemque aliam & præternaturalem habitudinem inducere potest. Etenim quam ingentes mutationes diversum tantum solis ad telluris superficiem positum subsequatur, anni tempora luculenter arguunt, quibus si accedunt tempestatum vicissitudines, a ventorum varietate & sibi invicem succedentium diuturniori ex certis plagis statu oriundæ, ut cælum vel nimis frigidum, nebulosum & pluviosum incumbat, vel æstuosum & siccum regnet: utique corpora his exposita non possunt non inde graves alterationes tam quoad ipsam partium constitutionem, quam ordinatum motum successum incurere, eo pluribus solennes quo minus quispiam ambientis aeris accessum arceret potest.

Verum hæc generalis aeris, quoad tempestatum vices contemplatio, quæ plures sæpe regiones tangunt & latissime se diffundunt; non sola sufficit ad eruendam morborum epidemiorum generationem. Nam multiplici observatione constat, sub eadem plaga & cæli constitutione, hunc vel illum morbum unius tantum loci incolas af-

figerè, proxime adjacentes ab eodem vel plane immuni vel minimum mitius & parcius infecto; id quod variolarum, dysentericæ ac purpuræ exemplis inprimis confirmatum habemus. Quare simul ratio habenda fluidis aeris cuius loco proprii, quod mirifice pro varia indole exhalationum, tam ex patulis stagnorum ac paludum conceptaculis, quam reconditis ibi in terræ sinu mineris sulphureis, vitriolicis, aluminosis, bituminosis, salinis, ipsi insinuatæ, discrepat. Quæ effluvia; & inde dependens ipsius aeris, cuius loco & urbi quasi propria varietas, non luculentius demonstrari potest, quam ex cerevisiarum diversitate, utpote quæ, licet ex eadem potentia iisdemque aliis ingredientibus, eodem quoque modo & artificio, quin eadem aqua coquantur, mirifice tamen & sapore, & colore, & virtute differunt.

Non minus ad meliorem & specia-liorem causarum, quæ morbos epidemios gignunt, cognitionem, ipsius loci situs, aquarum indoles, receptum vitæ genus & sueta victus ratio pensanda sunt: quo ex omnibus his inter se comparatis ac simul consideratis, innotescat, in quo epidemiorum morborum causæ indole, materia, textura, potentia ac virtute differant, & partium corporis structuram motusque turbent, ac præter naturam afficiant. Quin prævisis sic causis & concurrentibus circumstantiis, in proclivi est, non tantum imminentem cuius regionis epidemiam luem prædicere, verum etiam utilissima suggerere consilia, quo pacto eadem arceri, vel congruis auxiliis mature abigi possit. Et quamvis hoc negotium admodum arduum & perdifficile esse videatur: spem tamen non penitus abiiciendam esse reor, modo plures periti & rerum naturalium gnari medici, unitis consiliis, in diversis locis, per omnes decurrentium annorum periodos, singulis diebus, cæli mutationes, tempestatum vices, ventorum status,

rus, & in barometris vel thermometris exacte conspirantibus, liquidi ascensum & descensum, nec non in hygrometris siccitatis & humiditatis differentias, curate annotarent, & simul quoque locorum situm, victum in genere & specie, præsertim eorum qui in morbo epidemicos incidunt, quibus symptomatibus hi incedant, quem exitum sortiantur, quæ medicamenta respuant, quæ admittant, exponerent. Intensissime itaque optandum ac serio monendum est, ut omnes, qui historias ejusmodi popularium morborum contexere sibi sumunt, quemadmodum id laudabili instituto per aliquot annorum decursum quidam exorsi sunt, ad omnia hæc inculcata monita studiose attendant & ad earum normam observationes consignent, emolumento certe non satis deprædicando.

CAPUT III.

De Morbis curate discernendis & recte, dignoscendis.

§. I.

AD therapiam tuto, & feliciter instituendam nihil æque conferre, ac morborum, quorum sanationi medicus manum admoovere sibi sumit, causas, symptomata atque peculiarem indolem probe nosse, res est, de qua inter medicos, rationali artis culturæ vacantes, nulla unquam fuit relictæ dubitatio, ut potius jam apud præcos medicinarum auctores inter universales aphorismos relatum legamus: quod qui bene cognoscat, idem quoque bene curet. Et certe veritas hujus dicti in aprico posita est; siquidem plures utique sunt morbi, qui maximam inter se alunt cognationem tantamque procedunt symptomatum similitudine, ut eorum interior indoles & specialis differentia, vel a sagacissimo Medico interdum vix deprehendi, cognosci & erui queat.

§. II.

Quare quum unus morbus alterum, tam invasionis modo, quam symptomatum plurimorum paritate, tam exacte sæpius referat, ut primo statim intuitu vix alius ab alio exquisitè possit discerni; utique maxime necessarium est scire: quænam speciales notæ characteristice attendi debeant, ex quibus post modum intimior de morbo aliquo possit obtineri cognitio. Si quid enim est, quod medicum reddit fama celebrem, & quasi *iri Deus*, profecto est illa doctrina, quæ ipse inductus ad firmum & indubium de genuina indole ac certo eventu morbi proferendi judicium, redditur longe capacissimus. Contra vero nihil perinde existimationi medicorum detrahit, quam si hac in parte turpiter impingant & fallacem inprimis circa morbi cujusdam processum atque exitum interponant sententiam; quandoquidem de iis, quorum veritatem dies futurus commonstrare debet, alienum quis sovet conceptum, error ipsius facile fit evidens ac manifestus. Nam qui circa nudas theoreticas in medicina veritates singulares ex phantasiæ potius fonte, quam ipsa ex rei natura desumptas opiniones alit, is ea propter ignominia læbè haud incurrit, quoniam maxima hominum pars incapax plene est de rebus medicis solide judicandi, & connexionem theoreticorum axiomatum cum practicis perspicendi. Haud injuria vero ignarus medicaster imprudenti præmium fert ignominiam, quum non levis ex ignorantia casuorum morbi & neglecta inter morbos apparenter cognatos distinctione, in medicina faciendâ & indicationibus medendi eliciendis, emergat difficultas. Etenim quem morborum origo & primordia sesellerunt, is, secundum præclarum medicorum Ciceronis, Celsi, effatum, minus recte curam suscipit: & vicissim, qui ad cognoscendum sufficit medicus, ad sanandum etiam sufficit, quemadmodum sapienter proditum est ab Hippocrate *Lib. de arte* §. 20.

§. III.

§. III.

Verum enim vero, quo excellentiori usu ac doctrina sese commendat, eo minus vulgo ejus rationem haberi constat. Dicit certe vix potest, quam turpiter nonnunquam ludibrio vulgi sese exponant medici etiam n, quorum eruditio in reliquis medicinz partibus non mediocris est, si v. c. utrum a prole expansum pro hydropse ascite, vel ascitem pro imprægnatione venditant: si febrem malignam, periculi raro expertem, pro benigna catarrhali: si inflammationem ventriculi & intestinorum, pro solo dolore colico: asthma flatulentum pro catarrho suffocativo: syncopen pro apoplexia: variolas pro petechiis: purpuram pro variolis: dolorem pro calculo pro affectu ischiadico, molimine hæmorrhoidali vel dolore colico & que plura sunt, habeant. Ecquis hic non clarissime perspicit, medicum in morbis hisce distinguendis hallucinantem, tum in prognosi facienda, tum in curæ administratione legitimam, quam facile peccare posse? Alia enim remedia hydropicus & cachecticus status, alia imprægnatio, rufus alia febris maligna, quam benigna catarrhalis, postulant. Quæcunque profunt in dolore colico, illa ipsa in ventriculi inflammatione maxime nocere possunt. Secus procedendum in cura asthmatis flatulenti, quam catarrhi suffocativi. Sic etiam methodus, qua utimur in syncopitici excitandis, non sufficit in apoplexia auferenda. Longe alia quoque medendi via ineunda in calculosa affectione, quam in ischiadica, & urgente hæmorrhoidalis sanguinis congestione ex colicis torminibus. Variolarum, petechiarum, purpuræ diversa itidem inter se est conditio, & diversam quoque ex parte therapiam & medicam tractationem requirunt. Ut adeo pateat, ingentem intercedere differentiam inter medicos artis suæ gnaros & rerum suarum fatigantes, qui doctrinam & distinguendis morbis ex observationibus conqui-

sitissimis rite hauserunt, & inter illos spurios Æsculapii filios, qui hujus doctrinæ prorsus rudes, fortunæ tantummodo omnia committunt.

§. IV.

Ne igitur medens in re tanti momenti impingat, sed morbum quem curandum suscipit ab aliis, eadem ferme facie incidentibus, curate discernere possit, animo imbibenda & firmiter tenenda sunt, & indicia certa & notæ characteristicæ, quæ unicuique propriæ sunt, eundemque producant manifestant. Nimis vero longum foret singulas morborum species percurrere, eorumque differentias inter se conferre; ideoque mihi suffecerit communissimos, difficulter tamen distinguibiles, in medium attulisse, in quo differant indicasse & mutuo demum comparasse. Et febris quidem denominatio permultis morbis communis est, qui tamen ratione causarum, indolis, periculi & medendi methodi quam maxime discrepant, eamque ob causam caute sunt distinguendi. Scilicet est febrim quoddam genus ephemera dictum, quod præcipuum & peculiare id obtinet, ut intra breve temporis spatium, & plerumque intra 24. horas, perspiratione auctiori ad finem pertingat. Alia febris species est synocha, his a reliquis dignoscenda signis si primo horror & refrigeratio levior, quam in ceteris est, dein parum remittunt symptomata, quam ob causam a veteribus febris continentis nomine insignita fuit. Solet quoque maxime circa auroram adoriri & terminatur ut plurimum hæmorrhagiis narium vel sudoribus largis, circa quantum vel septimum diem erumpentibus. Causa a tertiana continua, in qua simillima præsto sunt symptomata, differt in eo, quod in hac exacerbatio tertio die observetur, in caussa vero singulis diebus ea præfens sit.

§. V.

Febris porro maligna, æt. & r. x. ita dicta, discrepat ab aliis febribus, v. g. semitertiana, synocha putrida, febre ardente biliosa inflammatoria, quæ in-

B

flam-

Inflammationem ventriculi vel intesti-
norum junctam habent, periculo. Ratio
autem distinctionis in eo posita est,
quia febres malignæ, stricte sic dictæ,
contagio ortû debent, quo recensitæ fe-
bres inflammatorie carent. Dein cau-
sam quoque agnoscunt diversam, quæ in
sic dictis inflammatoris est status ad
sphacelum transiens, in malignis vero
lymphæ magis fermentescibilis, putri-
da, nervorum fluidum celeriter eadem
corruptione contaminans; unde subita-
nea virium corporis præstatio jungitur.
Distinguitur identidem hæc febris
maligna a cathari quod in eo in illa
reperitur & mox ab initio morbi vi-
rium adit effectio, cum perpetua agry-
pnia, quam mentis perturbatio eandem
excipit, maculæ quoque rubræ, petechia-
rum nomine venientes, vel etiam pur-
pura, plerumque; alba, ipsis complicantur
& lunellum exitû minantur, quæ cum-
cta in benignis catarrhalibus non ob-
servantur, ubi potius feri erodens salina
qualitas coryzam, gravedinem, rauce-
dinem, tussim & pectoris oppletionem
& quasi erysipelaceum intra fauces as-
peramque arteriam ardorem causat. Ubi
naque hæc signa non adfunt, ibi etiam
perperam catarrhalis febris judicatur.
Illud tamen non inficias eundem, fe-
brem catarrhalem malignam æque ac
benignam, cum malignis petechalibus
multum alere convenientiæ, adeo, ut
ab incautis minusque exercitatis medi-
cis sæpissime confundantur, eo quod le-
nissime line magno æstu, dolore atque
anxietatibus eminentibus procedunt,
in utriusque defectio mucidæ materiæ
per tussim jungitur & circa vespæram
symptomatum fit exacerbatio.

§. VI.

Accedunt aliæ febrium species &
quidem mesentericæ, quæ quo fre-
quentiores, eo difficilius vulgo digno-
scentur, ita, ut sub malignarum titulo
plerumque vendantur. At vero longe
distinctissimæ sunt ab his, quoniam
non epidemice grassantur, neque con-
tagio aut exanthematibus infestæ sunt,
neque celerem mortem inferunt, sed

ultra vigesimum primum diem ut plu-
rimum trahuntur, & lubentissime in
hecticas lentasque degenerant. Signa
reliqua, quibus hæc febres ab aliis di-
stinguuntur, præter jam prolata, sunt
extremarum frigus, urinæ tenues,
paucum spissamenti & subdidentis se-
dimenti dimittentes, tussis copiosæ
sine multa materia, siquidem non co-
cta, sed cruda exspuunt, faucium dolor
& rubor, perpetuum cibi fastidium,
litis defectus, febris uno die remissior,
altero gravior, iterumque exacerbatus
hemitritorum more insulsum, quæ si-
gna sigillatim collegit Hippocrates. Lib.
1. popular. §. 1.

§. VII.

Quod attinet ad febres purpuraceas,
variolaceas, morbillosas & petechia-
les, ea facillima ratione ex cutis efflo-
rescentiis dignoscuntur. Dissert enim
purpura rubra a petechiis & febre sic
dicta purpurata maligna, dum in hæc
maculæ non sunt elatæ, nec cutim sca-
bram reddunt, neque cum frigore, æstu
volatice, pruritu & ardore cutis, ac
summa oppressionis pectoris erumpunt,
uti purpura tam rubra, quam alba,
quæ & tangentibus & videntibus
sele conspicuam præbet: & iisdem no-
tis distinguitur quoque a morbillis.
Petechiarum a variolis in eo diversa
est ratio, quod septimo plerumque die,
non vero ut variolæ quarto erumpant,
ac sine elevatione & suppuratione su-
perficiem obsideant: a morbillis au-
tem distinguuntur, quod minoris am-
bitus maculæ sint, quam in his, neque
instar morbillorum tantisper emineant.
Variolæ & morbilli primo eru-
ptionis die ægrius discernuntur, secun-
do autem facillime, quia illæ mox
sele efferre, pustulasque protrudere so-
lent. Differunt vero utraque a pur-
pura, quod neque cum horripilatione
cutis ejusque scabritie prorumpant
neque tactui ita sele offerant. Vari-
olæ & morbilli respectu periculi etiam
dispersecuntur in malignæ & benignæ
indolis, item in regulares & irregula-
res. Distingui etiam merito debent va-
riolæ

riolæ verè à spuris, quæ vulgo dicuntur, *Vasser-Pocken*, *Spitz-Pochen*, & rumpunt cum vesiculis magnis pelucido humore oppletis, minori symptomatum agmine, vehementia & sine periculo.

§. VIII.

Jam ad febres intermittentes transi-
tum facimus. Differt quotidiana inter-
mittens à quotidiana continua, qualis solet esse sæpius catarrhalis benigna & maligna, dum in hac remissio tantum sit symptomatum, & singulis diebus exacerbatio, non autem plenaria intermissio, uti in quotidiana intermittente; quæ etiam differt à febre lenta & hæctica, siquidem illius paroxysmus tempore matutino, harum vero circa tempus vespertinum ingruit. Dein discernitur quoque à tertiana duplici, quæ etiam singulis diebus accidit, sed ita, ut ejus accessiones non sint æquales, id est, non quovis die in eundem temporis articulum incidant, sed altero tantum die sibi respondeant, ut tempus paroxysmi; qui invasit primo die, congruat cum tempore paroxysmi tertii diei, & tempus paroxysmi secundi diei conveniat cum tempore quarti diei.

§. IX.

Variz autem sunt tertianarum species & differentiz: distinguitur enim in simplicem & duplicem. Illa est, quando uno die, qui spatium 24. horarum complet, plenaria est febris & symptomatum intermissio; in hac vero singulis diebus paroxysmus recurrit, ita tamen, ut subinde alternis diebus ratione temporis convenientiam invicem monstrent. Rarius quoque tertiana duplex in principio invadit, sed potius simplicem sequitur. Deinde dispecitur in legitimam & notham, seu spuriam: illa dicitur, quando horrorem insignis æstus sequitur, cum siti, capitis dolore, quæ ultra decem horas non facile durant, urina flammea secedente; hæc vero non adeo magno æstu stipatur, ad 20. horas & ultra extrahitur, uri-

nam turbidam reddit, non flammeam, & finito paroxysmo, insignem languorem & concussionem quasiartuum, als vvenn alle Glieder zerfchlagen wvaren, cum inappetentia post se relinquit. Distinguuntur alias quoque tertianæ in cholicas & pituitosas in regulares & irregulares, vernaes & autumnales, epidemicas & endemias; sed quoniam exigua admodum difficultas in hisce discernendis occurrat, quum ex ipso apposito epitheto differentia satis superque pateat, earum nomina tantum attigisse suffecerit.

§. X.

Accedimus nunc in explicatione differentiz februm ad quartanam, quæ dividitur in legitimam ac simplicem, & in duplicem ac notham, dein quoque in intermittentem & continuam. Simplex & legitima est, si quarto quoque die revertitur paroxysmus, si vero intra quatuor dierum spatium duo paroxysmi ingruunt, febris quartana duplex audit. Notha quartana dicitur ea, quæ non servat tempora ordinaria invasionis, quæ sunt post meridiem ac vespere. Quartana continua vocatur, ubi paroxysmi quarto quidem die redeunt, intra id vero tempus febriles motus non plenarie silent, sed symptomatum tantum remissio adest, & languor corporis, cum lento & præternaturali calore & pulsu celeri, remanet.

§. XI.

Febris porro lenta & hæctica ita distinguitur, ut hæctica superveniat hydropi, phthisi, atrophiz, vel cachexiz scorbuticæ, & incunabula trahat ex viscerum, aut ipsius mesenterii apostematibus, vel etiam glandularum mesentericarum, corruptione, putredine, induratione, camque ob causam sit insanabilis. Lentæ vero febres ex febribus maxime diariis quotidianis, tertianis, duplicibus oriuntur, si ex perversa methodo per adstringentia styptica & nimis calida tractentur. Nascitur quoque febris

B 2 lenta

lenta a virium debilitate summa, ob præcedentes enormes hæmorrhagias, uteri v.g. in abortu, vel a gravioribus vulnerationibus, item a longioribus morbis prægressis; siquidem ob virium imbecillitatem ventriculus debilis multas ingenerat cruditates, a quibus postea lentæ febres suam originem nascuntur. Lentæ quoque febris ab hæctica in eo dispar est ratio, quod longe gravioribus hæc stipata sit symptomatibus, siquidem pulsus continuo celer micat, etiam matutino tempore, post somnum peractum, unde genæ quovis tempore aliqua rubedine tinctæ observantur, major quoque præfens est virium resolutio, ac in lenta, ubi mane, & antecibus arteriarum idus remissior, & naturali similis, vesperti vero & post cibum celerior sit, genarum rubor cibo sumto tantummodo se prodit, minorque virium adest prostratio, quippe adhuc extra lectum versari febre lenta laborantes possunt.

§. XII.

Hicce deductis inflammatorix febres expendendæ, e quibus frequentissimæ sunt peripneumonia & pleuritis. Admodum autem conspicua est peripneumonix ac pleuritidis veræ & spurix differentia: siquidem pleuritis spuria ea est inflammatio, quæ membranas & musculos intercostales tantum occupat, & ad rheumatismi potius speciem referenda est; vera autem pleuritis sedem suam habet in ipsa pleura, quæ intus thoracis cavitatem involvit, & plerumque in consensum trahit annexos subinde pulmones, & peripneumonia ipsam pulmonum substantiam occupat. Porro in pleuritide spuria sit dolor etiam exterius manifestus, dum tactu manuum exasperatur, isque magis vagus, quam fixus est, quandoque latius se extendit & usque ad scapulas propagatur: tussis magis sicca, quam humida, omnis cruoris experti, cum febricula quadam leniori complicatur, vesperti potissimum incommoda

est, & hic morbus intra breve plerumque temporis spatium sæpius sine venæsectione, discutitur. Contra ea in pleuritide vera, dolor est acutior, magis fixus, febris intensior, respiratio difficilior. Et in peripneumonia hæc omnia quidem concurrunt, sed dolor non ita impensus est, licet ad dorsum & scapulas se extendat, major visitur pectoris oppressio, respirandi difficultas, & sputum cruentum, sanguine fusco tinctum, creatu rejicitur.

§. XIII.

Ad inflammationem ventriculi quod attinet, differt illa a cardialgia, neque cum ipsa debet confundi. Nam licet in utroque morbo adsit maxima anxietas, inquietudo, *daß sie sich hin und wieder schmeissen im Bette*, & dolor pressorius atq; ardens circa præcordia, in eo tamen subest differentia, quam inflammationis ventriculi dolor sensum intensissimi ardoris præ se ferat & quasi instar prunæ sit; deinde, quod nec alimenta, nec medicamenta facile ferre, sed ab illis ingravescere soleat, item quod febris cum pulsu celeri & inæquali, depresso ac debili, ventriculi inflammationi juncta sit, quod secus evenit in cardialgia. Distingui etiam debet inflammatio ventriculi ab inflammatione hepatis, & quidem concavæ partis, qua ventriculus tegitur, non solum vehementia symptomatum, sed etiam quod ardor circa scrobiculum cordis in ventriculo inflammato est vehementissimus & fixus, in hepaticide vero ad latus magis dextrum & spurias costas vergit, neque ab assumtis dolor & anxietas increfcit, ut sit in ventriculo inflammato. Discrepat etiam ventriculi inflammatio ab ejus erosione; nam illa subito oritur passioque est acutissima, & sicuti spasmus ortum debet, ita cum spasmus violentis & symptomatibus gravissimis stipata est. Dolor vero ex erosione non tam ardens est neq; stricturis spasticis infestus, sed malum potius chronicum febrem lentam comitem habens, nisi quod in eo simi-

limi-

similitudo cum inflammatione ventriculi adfit, quod ad assumpta dolor anxius exasperetur. Denique inflammatio ventriculi, a veneno caustico animique vehementiori affectione orta distingui debet ab ea, quæ fit ex potu frigido corpori calefacto immisso, quæ non tam horridis & atrocibus symptomatibus est infesta, neque tam violentas in totum corpus exercet spasticas contractiones, sed febre magis lenta & putrida, nisi mature succurramus, jugulat.

§. XIV.

Angina præterea species variæ sunt & pro earum differente indole, diversa quoque sortiuntur nomina, quas distincte nosse in praxi non minus utile, quam necessarium est. Nimirum quando inflammatio obsidet interiores partes laryngis, præsertim musculosas, extus autem nec rubor, nec tumor quidam apparet, sed magnâ adest respirandi angustia ad suffocationem usque, vocari solet cynanche, & intra viginti quatuor horas sæpius necat, dum complicata est exquisita acuta febris. Altera species anginæ, in qua interiores pharyngis musculi magis affecti sunt; & ubi major difficultas deglutendi, quam respirandi est, pariter sine insigni externo rubore vel tumore, dicitur synanche. Quando vero inflammatio vergit ad partes exteriores, adeoque tumor & rubor magis est conspicuus, tunc, si malumprehendit gutturis seu laryngis partes, paracynanche, si vero pharyngis exteriora occupat, parasyynanche appellatur.

§. XV.

Distingui etiam solet angina in veram & spuriam. Illa fit a stasi sanguinis inflammatoria & morbus maxime acutus est, ob febrem impenitentem, & talis plerumque est interior: hæc notha vero, pro causa magis agnoscit congestionem sanguinis, vel etiam lymphæ, in partibus oris, faucium & colli glandulosis, febrem magis comitem habet lymphaticam & minus alit periculi, sed diutius affligit, De-

Tem. III.

inde angina opime dispesci potest in siccam, valde ardentem, & humidam, sive mucosam. Illa fit a sanguinis stasi in morbis maxime acutis; in hac vero muco copioso & lingua & faucium regio obducta & quasi inviscata est ac febribus catarrhalibus complicatur, neque minus scorbuticis, cachecticis familiaris est, & diutius durat, orisque fetore molesta est.

§. XVI.

Ab hisce inflammationum speciebus discernenda porro est inflammatio oris & esophagi mucosa, quæ vocari solet prunella, & febribus acutis exanthematicis supervenit, vel etiam pleurumque inflammationi ventriculi succedit. Dicitur a nonnullis Germanico idiomate *die Hertzbraune*, & malum est admodum anceps ac periculosum, in quo muco etiam incrustata sunt narium interiora, sub quo ardens inflammatio delitescit. Differt etiam angina ab aphthis, sive pustulis ardentibus in lingua, & faucibus; siquidem angina latius diffunditur & vicinas partes late in consensum rapit, in aphthis vero tantum arduentes & dolentes vesiculæ in lingua vel faucibus certas modo partes obsident.

§. XVII.

Denique angina sicca interna, quæ vocari solet cynanche, non confundi debet cum spasmo, histericarum fauces firmiter constringente & respirationem ac deglutitionem difficilè reddeente; quia hic sine periculo & facilius transit & facile etiam vincitur: in angina autem vera sanguinea interna, non tantum dolor ardens & pungitivus, circa interiora faucium percipitur, sed & lingua sanguine turgens, tumida ac rubicunda fit, quandoque nigra redditur, facies rubore innata est, temporum arteriæ valide pulsant, in quibusdam etiam cephalalgia, in aliis somnolentia, in nonnullis lipothymia visitur, externo ut plurimum frigent & alvus adstricta est.

§. XVIII.

Ab angina pergitur ad phreaticum, B 3 dem,



dem, quæ est inflammatio membrarum cerebri & sese manifestat delirio feroci, cum oculis rigentibus fulgentibusque febre ardente, vigilis assiduus, rubore faciei, arteriarum vehementi, non secus ac si in cranii cavo pulsarent, & circa tempora vibratione. Differt phrenitisa mania, quod illa affectus acutus, & ut plurimum febrium symptoma valde periculosum, mania vero malum est chronicum sine periculo & febre. A phrenitide porro mentis alienatio, aliis febribus jungi solita, gradu dignoscenda, quia mitius procedit & facilius abigitur. Distat etiam phrenitis a malancholia, quæ itidem malum est chronicum, & collecto in visis, præsertim capitis, sanguini crasso originem debet. Tandem etiam differentia intercedit inter phrenitidem & hydrophobiam. Etenim hydrophobia a canis rabidi morsu inducitur, ejusque specialior notha characteristica est liquorum omnium aversatio, adeo ut affecti viso tantum liquore aliquo, mirum inhorrescant & motibus convulsivis corripiantur.

§. XIX.

Hepatis inflammatio duplex est, vel enim in parte concava consistit, vel in parte convexa. Signa, quibus illa cognoscitur, sunt singultus, vomitus, cardialgia, ardor & dolor fixus sub scrobiculo cordis, versus latus dextrum, febris, tussis sicca, inspiratio difficilis, alvus adstricta. Quando vero in convexa parte erysipelacea inflammatio hepatis affectum est, tunc in costis spuris lateris dextri dolor gravativus, constrictivus & punctorius percipitur cum tussi, febre, respiratione difficili. Et hac ratione mentiri solet pleuritidem spuriam, a qua tamen discriminatur febre ac respiratione remissiori, & dolore infra diaphragmatis regionem urgente: quibus accedit, quod pleuritis spuria facilius discutitur & die septimo ut plurimum finitur sudore vel hæmorrhagia; in hepatitide vero, si res male succedit, convulsiones præsto sunt, vel si diutius perdurat,

quippiam hydropici, vel hæctici, ob abscessus latentes, post se relinquit.

§. XX.

Nephritis pura & simplex, quæ est levior renum inflammatio, in eo a nephritide calculosa discedit, quod in illa dolor circa lumbos fixus, sed tendens & pressorius diuturnus esse solet, in calculosa vero longe acerbior, qui etiam locum mutat & se magis extendit ad ilia; siquidem exquisitus ille dolorificus sensus, qui a calculo fit, demum in uretheribus, eorumque principio, non vero in renali substantia, sese exserit. Deinde in calculosa nephritide sabulum crassum per urinam secedit, quod in nephritide simplici non contingit, utut crystalli rubicundæ & pellucidæ vitri urinalis parietibus sese apponant. Neque etiam nephritis cum malo ischiadico confundi debet, quod quidem facile accidit, quia in hoc dolor sæpius per totum femur excurrit, quod inde stupor atque rigore afficitur, nihilominus tamen disparitas utriusque exinde patet, quod ejus dolor nephriticus in loco, quo renes situm habent, pertinacius consistat, quam ischiadicus dolor ossi coxendicis fixus magis inhæreat. Tum in nephritide crebrior ad urinam est stimulus, parciore tamen ejus fluxus, quod secus in ischiadica affectione observatur.

§. XXI.

Ex inflammationibus, quæ partibus externis incumbunt, frequentius occurrit erysipelas, quod superficiei tantummodo cutaneam rubore, tumore & dolore afficit, eaque propter probe distinguendum est a phlegmone, in qua ipsos sub stratos musculos inflammatio simul corripit. Phlegmonem autem a gangrena discernere idem tamen oportet; siquidem in hac inflammatio aliquando profundius serpit & non modo musculosas, sed & tendinosas ac nervosas partes occupat, atque adeo cum intensiori ardore & dolore, tum profundo ac latius se extendente duro tumore ac rubore, qui

tandem in livido-nigricantem transit, cognoscitur.

§. XXII.

Devenimus nunc ad varias hæmorrhagiarum species, e quarum censu, quæ non parum periculi alit est hæmoptylis, sive sanguinis floridi e pulmonibus per tussim rejectio. Hæc curate distinguenda est a sputo cruento, quod ex interiori gurgulionis, faucium ac narium ductu emergit, & potius screatu, quam tussi, succedit, parcius etiam esse solet. pituita remixtum & obscuro sanguineo colore tinctum. Deinceps vera hæmoptylis discernenda quoque est ab illo sputo cruento, quod parciore in quantitate ex fauciatas arteriæ asperæ vasis cum tussi ejicitur, & cum pruritu ac sapore falso jungi suevit. Multum quoque hæmoptylis distat a vomitu cruento, siquidem in illa sanguis tenuis, nitide floridus, arteriosus, non sine magno nisu ac labore eliditur, in sanguinea vero vomitione cum anxio conatu crassus, coagulatus & nigricans cruor, ex venosis magis vasis elapsus, citra tussim exturbatur. Neque ipse vomitus cruentus sine discrimine considerandus & excipiendus est, sed ratione causarum multum differens, aliam & diversam medendirationem quoque desiderat. Alius enim est a causa materiali caustica erodente, in ipsius ventriculi cavo contenta, quemadmodum fit a venenis causticis & fortioribus emeticis assumtis; alius vero oritur a motu sanguinis impetuosiori, ex aliis & remotis partibus ad ventriculi vasa, præsertim brevia, quæ facile perforantur, delati, quale quid fieri suevit in mensibus, & hæmorrhoidibus subito & cum violentia quadam repressis; atque ejusmodi vomitus plerumque suas statas ac certas periodos servare solent.

§. XXIII.

Porro in mictione cruenta hæc potissimum distinctio observatu digna est, quod alia fiat ex calculo asperiori, uretherum vel urethræ vascula dilace-

rante, quæ tamen rariore est, neque facile in nephriticis comparet, & exigua etiam tunc stillat sanguinis quantitas: contra vero si citra quandam violentiam a sanguinis impetu, ad renum substantiam ex aliis partibus raptò exoritur, sincerus largiter sæpius sanguis sine singulari incommodo vel sensu cum urina emittitur, & interjecto pauco tempore, ad fundum colorem non rubicundum, sed ex bruno fuscum exhibens, secedit. Affectus hic familiaris accidit ætate gravibus, vegetis tamen & plethoricis, ac sæpius sine periculo contingit. Stillicidium sanguinis ex præputio rariore quidem affectus est, a nobis tamen binis vicibus observatus in plethoricis & senio jam proximis, his a mictu cruento notis dignoscendum, quod guttatim stillat sanguis, & quidem continuo, etiam si urina non reddatur, quum in mictu cruento nunquam, nisi simul cum urina, sanguis proliciatur.

§. XXIV.

Tum fluxus sanguinis periodicus, qui in gravidis quandoque salutariter contingit, probe etiam discerni debet ab eo, qui abortum minatur. Scilicet quando sanguis periodice & paulatim per tres vel quatuor priores menses maneat, tunc fluxus est salutaris: si vero largius sanguinis profluvium ex internis uteri vasis apertis succedit, vix sine gravidæ & embryonis detrimento fit. Quin si fluxus est vehemens, indicium præbet totalis separationis secundinæ & subsequatur abortus; si moderatus, pars tantum abscessit, & fetus salvari potest. Et hoc sanguinis stillicidium, si periodo catameniorum respondet, & oritum uteri sub fluore clausum contrestatur nullique partus dolores superveniunt; tunc probabiliter inferitur, non ex ipso utero, verum e vagina tantum scaturire hunc latrem. Contra vagæ sive erraticæ magis & periculose judicandæ excretiones sanguinolentæ, quæ male ad calculum tributui lunaris exsolvantur, iusto copiosiores prodeunt, quæ ostium

uteri patulum & conatus partus imminuentis junctio simul habent .

§. XXV.

Præterea etiam hæmorrhoidum fluxus a dysenteria rite est distinguendus, quum ambo convenientiam in eo exhibeant, quod utroque in affectu sanguis excrementis intermixtus secedat . At si paulo curatius reliquorum symptomatum inter se comparisonem instituamus, tum facillima ratione differentia harum fluxionum inter se invicem patefcat. Etenim in hæmorrhoidum fluxu sanguis cum excrementis prodit sine ullis torminibus & dolorificis spasmodis, ac ejusmodi etiam fluxio critica & salutariter succedit : contra vero in dysenteria cum atrocissimis spasmodis & torminosi doloribus stercora sanguinolenta deiciuntur & universum corpus inde gravissime affligitur, præsertim si intestina tenuia simul patiuntur, ubi primis morbi diebus adsunt vomitus, singultus, anxietates præcordiorum, appetitus prostratus, & virium insignis languor. Denique dysenteria alba a rubræ & carnosæ indole haud parum ablutit; in alba enim parum cruoris manat, ingens autem mucii copia excernitur, in rubra autem sanguis copiosior, cum frustis parvis carneis, quandoque rejicitur.

§. XXVI.

Nunc sequuntur dolores, e quibus si, qui caput divexare solent, frequentiores sunt, & pari ratione admodum variare, præsertim quoad causas & generandi modum, observantur. Etenim causæ cephalalgicæ si est sanguinis impetuosior ad caput congestio, tum calore, rubore & tumore faciei, cum magna arteriarum, quæ sunt in collo & temporibus, pulsatione se exserit, quinimmo dolor & ardor interdum ad oculi bulbos se extendit, atque extremorum refrigeratio plerumque jungitur. Si pertinacior est cephalalgia & veneret contagii soboles, noctu magis, quam interdiu ingravescit, & plerumque certæ parti firmitus dolor inhi-

det, ut cutis ibi a subdito humore viscido non raro in tumorem attollatur. Porro quemadmodum frequentius causa doloris in capite partibus externis cranii & maxime pericranio in hæret, ita, si in cerebri meningibus sedem suam ac domicilium habet, cum vertigine, rubore oculorum, stupore, oblivione, auditus gravitate infestat, & vel paralyfin, vel apoplexiam præcedit, aut sequitur.

§. XXVII.

Alia vero doloris capitis causa est effusio feri & sanguinis e vasorum alveis & in sinuofitibus ossium frontis firmiter impacti, quod si accidit dolor est pertinax, acerbus, fixus, & supra oculos in radice frontis per dies notestque urget. Interdum quoque caput male habet ex cruditatibus in ventriculo obhærescentibus, quæ rostitibus, phlogosi ac primarum viarum spasmodis sefe produnt, dum quoque ingestis flatulentis dolor augetur, vomitu vero, evacuantibus & stomachicis medicamentis minuitur. Alia adhuc, sed minus a medicis cognita est cephalalgicæ causa, si lymphæ extravasata in ventriculis cerebri secedit & stagnat, neque per infundibulum, aut glandulam pituitariam secerunt; quo casu interiora totius capitis continuo dolent, & doloris allevatio non certius & commodius impetratur, quam abstinencia a potu, & feri per evacuantia aut diuretica in cachecticis & cacochymicis absumptione ac eliminatione.

§. XXVIII.

Inter omnes dolorum species cardialgia acerbitate ceteras facile superat. Hæc autem est dolor spasmodicus orificiorum ventriculi, tam dextri, quam sinistri, qui tamen longe multumque ratione causarum differens est. Scilicet alius est a causa intra ventriculum hærente, materia nempe acri, caustica, ut a veneno assumto; item in cholericâ passione, vel etiam dysenteria, ab acerrima caustica bile proficiscens. Alia vero cardialgia est a sanguine, suppresso menses vel hæmor-

rhoid-

rhoidum fluxu ad membranas ventriculi nerveas regurgitante, easque nimium tendente. Hinc enim est, quod affectus hic feminis, quibus post quinquagesimum annum menstrua purgatio vel parcius accidit, vel plane subsistit, præsertim si spongiosioris habitus sint, admodum familiaris esse observetur, & in curando eo, convenientes vel per scarificationem aut venæ incisionem sanguinis missiones, omne pene observant punctum; quum vicissim in illa cardialgia, quæ a materia acri causata suscitatur, demulcentia, oleosa, temperantia, lac asinum, vel infusum florum chamomillæ saturatum, cum cremore lactis, interposito pulvere absorbente, desideratissimam opem ferant. Deinceps cardialgia jure meritoque etiam distinguui debet ab inflatione ventriculi dolorifica, quæ a flatibus misce stomachum distendentibus subnascitur. In hoc affectu sub costis spuriis, præsertim in sinistro latere, dolor, & sub cordis scrobiculo, versus dextrum, tumor instar vesicæ statu distentæ, frequentius visitur & percipitur, adest simul magna spirandi cum anxietate difficultas, quæ eo gravior est, quo magis diaphragma a distento stomacho, sursum urgetur & pulmonum expansioni obicem ponit. Et hoc malum admodum solenne est infantibus, qui adhuc lactantur, si ipsum lac in ventriculo cavo stagnans, coagulatum & corruptum in flatu explicatur. Frequentius quoque accidit hypochondriaci, præsertim si nimium & cum magna aviditate cibos, qui ob viscosam & ægrius solubilem substantiam flatuum proventus faveant, ingerunt.

§. XXIX.

Neque parum refert, ut medicus dolorem colicum probe discernat ab eo, qui ex calculi descensu per urethras oboritur. Quippe in calculo renali dolor profundus pressiorius lumbis quasi infixus pertinaciter hæret, cum quadam horripilationis intercurrente sensu; adsunt porro nausea, vomitus &

tormina etiam ventris, & ubi calculus per urinarias vias iter conficit, tunc ad regionem ossis ischii dolor etiam excurrit, & stuporem femori ejusdem lateris non infrequenter inducit: urget præterea creber ad urinam emittendam conatus, quæ cum stranguria mingitur & sæpius sabulum deponit. In dolore vero colico res secus se habet; tunc enim dolor & tormina magis circa umbilicum colliguntur, vagantur, & nunc huc, nunc illuc discurrunt, & plerumque flatibus ventris distenditur. Non raro tamen contingit, ut colica simul sit nephritica, inde dijudicanda; quod in ea gravissima tormina ventrem torquent, cum alvo fortiter adstricta, vomitu, cephalalgia, extremorum frigore, mingendi stimulo, & nec finito paroxysmo, urina sabulosa secedat, vel calculi etiam excretio sequatur. Deinde dolor colicus a dolore, qui hypochondriacos excruciat, in eo diversus observatur, quod hic in hypochondriis magis, ille vero circa umbilici regionem potius consistat. Dein in hypochondriacis latus, præsertim sinistrum, tumere solet, quia ibi in coli flexuris status incarcerati hærent, & crebrius quoque hic dolor recurrit, quam communiter sic dictus colicus.

§. XXX.

Verum enim vero quum doloris intestinorum varix etiam sint causæ, diversis etiam signis ut a se invicem mutuo dignoscantur, necesse est. Si igitur flatu in causa sunt, tunc magna inflatio fit abdominis & quandoque tam ingens, ut hernia circa umbilici regionem a flatibus protuberet. Et talis colica in dispositis, præsertim in corporibus infirmis & senilibus, ex refrigeratione abdominis, aut tantummodo pedum, vel a frigido, item sæculento potu, cibo flatulento, carne vervecina, præsertim frigido potu superingesto, quam facile excitatur. Et quia multi ex calculosis ad colicam flatulentam valde proclives sunt, hinc crebrius nephriticum malum

lum

lum cum colico complicatur.

§. XXXI.

Quod si vero, prout frequentius obvium est, dolor intestinorum flatulentis, maximis anxietatibus & dolore dorsu sensivo alvoque; pertinaciter clausa infestat & torquet agros, & ex levi occasione aut errato irritatur faciesque simul est cachectica; tunc plerumque causa vitii hæret in visceribus abdominis, per quæ sanguis non recte & libere trajicitur, sed in intestinorum volumine stagnat, & quum exitum ibi per vasa hæmorrhoidalia non inveniat, intra intestinorum membranas hærens, ea nimium distendendo & lancinando, hanc colicam parit, quæ ob genus nervosum graviter simul afflictum, convulsiva audit. Eadem sanguinis stagnatio si fir ab hæmorrhoidibus conluetis non rite fluentibus, vel præpostere cohibitis, atrocem intestinorum dolorem parit, qui exinde vocari solet hæmorrhoidalis: & si in foemina, a mensium inordinato & pariori successu, sanguis ad intestinorum volumen refluit & tormenta inducit, colica audit hysterica. Alia denique est species colicæ, quæ dicitur biliosa, & cholericæ constitutionis hominibus, nec non iracundiæ deditis sensibilibus perquam familiaris est. Hæc cum vomitu, capitis dolore vel etiam diarrhæa sæpius complicatur, & quia spasmodica constrictione liberior bilis descensus ad intestina inhibetur, ipsa ad habitum corporis regurgitans, colorem flavescens ei inducit.

§. XXXII.

Multum etiam interest, ut medicus colicæ spasmodicæ, sive convulsivæ, genium, ab aliis colicæ speciebus probe discernat. Illa sæpe horrendum in modum non modo intestina, sed & alias universi corporis nervas & membranaceas partes per consensum exagitat, siquidem vehementior spasmus per universum fere genus nervosum dispergitur, ut non modo ventriculus & intestina sursum & deorsum

trahantur, & alvus, omnibus spretis enematis, arctissime claudatur, sed & muscoli abdominis cum umbilico introrsum stringantur & ad interiora arctentur. Et quia violentia spasmia ad partes genitales sæpius pertingit, fit, ut testiculi retrahantur, & contractis vesiculis seminalibus, involuntaria seminis fiat excretio, ob urinarias autem vias spasmo affectas, urina difficulter reddatur. Si etiam ad pneumonicos nervos vehementia spasmii penetret, respiratio valde auhelosa ac difficilis est, cum valido motu thoracis. Quin malo ingravescens, cerebri etiam membranas ac nervi patiuntur, & vertigo, scotomia, levior mentis alienatio, virgilia & extremarum partium refrigeratio intensa, & pedum ac brachiorum vehementissima agitatio, observatur, non raro etiam tam atrocem dolorem harum partium resolutio, sive paralysis sublequitur.

§. XXXIII.

Sunt autem hujæ affectui gravissimo spasmodico quam maxime obnoxii metallurgi, qui mineras saturinas igne tractant & improvide copiosum lithargyrii fumum ore hauriunt atque cum saliva deglutiunt. Perquam etiam familiaris est hæc spasmodica affectio scorbuticis cachecticis, præsertim ubi consuetus hæmorrhoidum fluxus desinit, vel non rite procedit, vel non rite procedit, aut si intermit, tens febris temere vel imprudenter adstringentibus validioribus cohibita est. A vermibus, a calculo ductibus biliosis vel cystidi fellæ inharrente, idem malum non semel ab auctoribus observatum fuit. Ut hinc clarissime videamus, in hac passione, non tam peccare materiale, mobilem, aut quæ corrigi vel evacuari facile possit, causam, ut in colica biliosa, flatulenta vel viscida sit, quam potius nervosis membranaceis partibus, quæ tam faciles sunt ad subeundos hos spasticos motus, vitium inesse. Etenim & cardialgiam & dolorem intestino-

rum

rum convulsivum, in sensu exquisiti-
ori præditis corporibus, sæpissime
a cohibita iracundia, affectibus animi
gravioribus, terrore, crebra ira, &
in adolescentibus, a nimio & intem-
pestivo veneris, nec non largo po-
tuum spirituosorum usu, ortum traxif-
se observavimus.

§. XXXIV.

Quum vero ingens plerumque in
morborum cognitione admittatur
confusio doloris arthritici & rheuma-
tici, operæ pretium visum est, ambo-
rum differentiam hoc loco planius si-
stere. Uterque quidem dolor spasticus
est, & partibus membranaceis infe-
stus, rubore, ardore, dolore, tu-
more & partis ad movendum impo-
tentia, sese prodit; in eo tamen di-
scrimen comparet: quod arthriticus a
sero tartareo acri, intra juncturas ar-
ticulorum obhærescente, proficiscatur,
in rheumatico vero materia illa
serosa salino-caustica, membranis mus-
culorum & ligamentis articulorum
exterius potius insidet. In arthritide
quoque tum glandulæ, quæ in articu-
lationibus reconduntur, mucosæ, a cl.
Anglo *Clopton Havers* inventæ, tum
ligamenta glandulosa, materiam ar-
thritidis evomunt: contra ea in rheu-
matismo stagnans illud acre serum, ex
sanguine in canalibus nimium conge-
sto, inter membranarum & musculo-
rum interstitia magis secedit & colli-
gitur. Ex quo jam facile apparet ra-
tio, quare rheumatismi curatio, mi-
nus laboris vel difficultatis habeat,
quam articularis morbi, & quare ar-
thritis, topicis cujuscumque fere ge-
neris adhibitis, minus feliciter com-
ponatur, quum rheumatici dolores
eisdem sæpius mitigentur.

§. XXXV.

Deinceps probe etiam notari debet
illa differentia, quæ inter dolorem ar-
thriticum & inter dolorem artuum
venereum intercedit. Ille interdum
magis affligit, hic vero noctu ingra-
vescit; arthritico quoque febrilis que-
dam commotio associatur, cujus ve-

neris expertus est. Arthritis porro sta-
ta sua & anniversaria tempora obser-
vare solet & acrioribus pharmacis, ut
mercurialibus, mirum exacerbat; quum
contra dolores luis Gallicæ con-
tinuo fere affligant, & nonnisi hæc
præidiis facile auferantur. Tandem
etiam peculiarem adhuc differentiam
ponendam esse existimo inter dolores
artuum v. g. crurum aut pedum cum
tensione, rigiditate, imbecillitate
movendi junctos epidemice quasi gra-
fantes, & inter veros arthriticos. Au-
diuntur enim sub certa temporum
& tempestatum constitutione passim
ejusmodi querelæ de doloribus cru-
rum, ut alii de tensivo, alii de obtu-
so & contusivo, alii de pungente in
profundo circa ossa tarsi & metatarsi
hærente, conquerantur, cum immo-
bilitate, stupore & rigiditate harum
partium, & doloris a motu graviore
augmento. Afficiuntur autem, pro-
ut observavi, hoc dolore maxime ii,
qui sanguinem e vena pedis mitten-
dum curarunt & acri frigidiusculo cor-
pora exposuerunt, quo facto ingens
mox sequuta fuit affecti membri debi-
litas, & successit postea dolor, qui ad
aliquot menses duravit & pro arthri-
tico ac podagrico vulgo habitus fuit;
sed quum nulla febricula, nullus tu-
mor, rubor aut ardor simul apparue-
rit, neque tam in juncturis, quam
potius in ipso perioestio, animadversus
fuerit, jure meritoque eum distinguen-
dum a vero arthritico esse judicamus.

§. XXXVI.

Progressum nunc facimus ad eos
morbos inter se bene discriminandos,
qui convulsivi vel spasmodici quippiam
tovent, e quibus pectoris illa ingens
concussio, quæ tussis vocatur, non
postremum sibi vindicat locum. Per-
quam plurimæ etiam pro differentia
causarum & sedis affectu, dantur tus-
sis species; nobis vero jam tantum-
modo commodum visum est, eam tus-
sim, ubi causa hæret in ipsis pulmo-
nibus, ab ea, ubi in aliis, præsertim
nervosis partibus, & præcipue stom-
acho,

cho, consistit, certis notis atque indicibus a se invicem mutuo discernere, quippe quæ distinctio non parum utilitatis in medendo affert. Si igitur causa subsistit in pulmonibus, respirationis semper adest quædam difficultas, quæ motu, vel exagitatione corporis aut sanguinis, augetur, adest quoque plerumque vox clangosa, dolor pressorius in pectore & rauco quædam. Si sicca est & per longum tempus durat, plerumque tubercula dura, vel vomica pure repletæ in causa sunt, & tussis phthisica est; si vero est humida cum ejectione materis copiosæ viscidæ stipata, indicium est magnæ cavitatis & secessionis humorum e tubulorum alveis in pulmonibus; atque in ejusmodi tussi pulmonali difficilis est in latere affecto decubitus, siquæ pus purum vel sanguine tinctum simul eliditur, de pulmonibus affectis non amplius dubitandum erit.

§. XXXVII.

Tussis vero stomacalis alia identidem humida, alia etiam sicca est. Si humida, lentum & copiosum sputum post sumtum cibum maxime ejicitur & sæpius quoque simul vomitus movetur, a pectoralibus, dulcibus increbescit tussis & circa matutinum tempus maxime suum refumit impetum. Adfunt quoque simul multæ spasmodicæ & flatulentæ in abdomine afflictiones, neque excretiones per alvum suum servant ordinem, neque in feminis menses recte procedunt. In tussi vero convulsiva, ferina & sicca causa maxime hæret in stomachi tunica nervis, ac vehemens tunc totius thoracis concussio adest, cum sono profundo, ac post passum, post potum etiam frigidum, aut acidum assumptum, valde augetur. In hac tussi pertinaciori plerumque hypochondria laborant, vel diathesis scorbutica, falsa sanguini intermixta; quare non infrequenter ejusmodi tussi purpura jungi solet. Si vero latitat materia in duodeno, quale quid sæpius contingit in febribus intermitten-

tibus, præsertim tertianis, item in hypochondriacis; tunc ructus acidi & flatus præsto sunt, & in paroxysmo, post horripilationem, infestat, ac facile vomitum, qui valde biliosus & acidus adest, proritat. Infantili ætati tussis convulsivæ admodum sunt familiares, partim quod eorum systema nervorum ad spasmos convulsivos motus admodum proclive est, partim etiam, quia cruditates acidæ biliosæ in ventriculo & duodeno in his solentius stabulantur. Vomitus quoque infantum tussi frequenter accedit; interdum vero plane sicca est, atque ita invalescit, ut suffocationis metum adesse judicaveris.

§. XXXVIII.

Asthma, frequentissimum malum, uti diversas suas agnoscit causas ac causarum sedes; ita etiam non parum inter se differentiz alit. Frequentius hæret vitium in stomacho, & tunc flatulentum est; & fit ab inflato ventriculo, diaphragmatis liberum descensum impediens. Frequens malum est hypochondriacis, imbecillitate ventriculi laborantibus, ab ingestis præsertim flatulentis, malum recrudescere, & vomitu humoribus rejectis, mitigari solet. Asthma convulsivum, ab asthmate humorali, immo sanguineo, multum distat; nam periodicum est & certis tantum temporum intervallis infestat, maxime vero noctu invadit; spiritus sæpe adeo est angustus, ut collo extenso erectoque corpore eundem trahat æger necesse sit. Adest sæpius sudor frigidus, siquæ ad viginti & ultra horas durat, animi defectio accedit. Percipitur maxime compressio constrictoria circa thoracem, quæ sæpius usque ad collum & jugula propagatur. In hoc affectu subest plerumque vitium in visceribus abdominis, præsertim hepate, & facile cachecticus subsequitur status. Si vero polyposum in cordis vasis obhærescens concrementum asthma parit, vel illud exacerbatur, tunc cordis palpitatio jungitur. Si denique quod

quod frequentioris observationis est, asthmatis convulsivi & suffocatorii causa est ingens aquarum in thoracis cavitate extravalatio; dolor simul extra paroxysmum fixus in latere thoracis, quæ aqua comprehenditur, percipitur & pes ejusdem lateris, vel ambo, intumescunt, & paroxysmus est diuturnus ac vehementissimus, cum maxima anxietate, licet sine tussi, & plerumque etiam necare solet.

§. XXXIX.

Non minus & differentia quedam inter asthma convulsivum, & catarrhum suffocativum adstrui debet; siquidem hic paralysis quedam species est, nervorum paria, quæ respiratori inferviunt, tangens, quæ ex improvise adoritur, cum magna anxietate, stertore & sono quasi spumido, inter respirandum vultus rubore intumescit & suffocatio imminet: asthma vero convulsivum servat magis suas periodos & chronicum malum est, quom suffocativus catarrhus ad passiones acutas non sine ratione referendus sit. Deinde quoque in hoc perpetuus quasi materię affluxus percipitur, qui in asthma deficit, ingens etiam virium jactura, plus catarrhum suffocativum, quam convulsivum asthma comitatur. Est autem catarrhus suffocativus maxime familiaris senibus, imbecillioribus, immo infantibus, præsertim retropulsis exanthematibus, variolis, morbillis, tinea capitis, achoribus faciei, scabie & hujus generis aliis.

§. XL.

Accedimus jam ad gravem illum apoplexiæ morbum, qui quomodo ab aliis affectibus differat, dispiciendum est. Cum syncope multum alit convenientiæ, quom in utroque omnium sensuum, tam internorum, quam externorum, fiat obliteratio; in eo tamen conspicua est differentia; quod in hac pulsus & respiratio non amplius percipiatur, facies palleat & omnia frigeant, in illa vero, præter durantem spiritum, florida sæpe & rubra

facies sit, atque artieriarum pulsatio adhuc observetur. Majoris difficultatis est, veram apoplexiæ a spuria distinguere. Hæc frequentissimum hysteriarum symptoma est, & a violentia spasmodorum in abdomine proficiscitur, quibus sanguis ex mensium stagnatione redundans, magno impetu ad cerebrum delatus, in ejus vasibus subsistens, omnem sensum ac motum intercipit, salvo tamen pulsu & spiritu. Vulgo habetur pro syncope, vel etiam epilepsia hysterica, sed minus recte, raro quoque feralis est, sed ubi remittit strictura, vel sanguis largius ex pertusa vena subrahitur, facile discuitur. At vero magis terere debet apoplexia vera, quæ ob sanguinem, vel serum, vasorum alveis elapsam, subito sæpius jugulat. Deinceps apoplexia perfecta a debiliore ita etiam est distinguenda, quod illa ex vasorum cerebri ruptione, hæc vero ex horum tantummodo nimia distensione & sanguinis ibi facta stagnatione subnascatur, & sæpius paralyticum sensuumque debilitatem inducat, vitam autem non adimat.

§. XLI.

Quod attinet ad paralyticam, identidem hæc recte in veram & spuriam dispescitur. Illa in ipso cerebro, vel principio spinalis medullæ, fixam habet sedem, sensumque fere omnem ac motum sufflammat: spuria vero mitior est, neque tam altas radices agit in cerebro, sed quibusdam nervorum paribus, ad certam partem decurrentibus, tantummodo inhaeret, & sensum ac motum quodammodo lædit. Hæc quoque a colicis, cardiacis & spasmodicis gravioribus passionibus, si præsertim a sanguinis stagnatione in plethoricis sunt, originem suam sæpissime trahit, quando nimirum sanguis ad nervos, vel etiam musculos, qui manus vel pedes movent, transfertur, & stagnatione viscidum serum deponit, quod membranis nerveis incumbens, motus quidem impotentiam, sensu tamen

men

men & dolore residuo, efficit.

§. XLII.

Distingueretiam convenit epilepsiam a convulsionibus. In illa affectus sunt cerebri membranæ, in hisce vero membranæ & nervi spinalis medullæ magis patiuntur, neque pollices tam fortiter contracti sunt, licet maximum robur sub artuum agitatione deprehendatur. Motus convulsivi etiam invadunt maxime pueros circa decimum quartum ætatis annum, ex suppressa iracundia, terrore gravi, intempestivo veneris exercitio, corporis refrigeratione, vel etiam vermium morfu, ac tam mira sæpe artuum totiusque corporis est distortio atque quassatio, ut ob insolentiam fasciis vulgo tribuantur. Mens quoque in quibusdam variis phantasmatis turbatur, sique non opportuno ac prompto auxilio oppugnatur malum, ita vires sumit, ut vigesies & sæpius quoque quotidie ingruat. Epilepsia autem accessionum periodos magis circa lunæ phases statas, neque tam crebras, servat, ac tempore pubertatis plerumque cedit. Denique catalepsis differt ab apoplexia, quod illa de repente invadat, & membra rigida in ea positura ac situ detineat, in qua accedens eaprehendit. In utroque vero affectu sensuum omnium ad tempus abolitio, cum stupore ac sopore quodam, præsens est.

C A P U T IV.

De Genealogia morborum ex turbato solidorum & fluidorum mechanismo, ad explicationem Historiæ morborum & veram ac solidam therapiam.

*Altera
therapiæ
fundamentum
est cogniti-
onis & consa-
rum
morbis.*

§. I.

Cognito sic atque perspecto, ex allatis superiori capite characteribus notis, quis & qualis sit morbus; necessarium porro est, ut Medicus formalem ejus essentiam, gene-

logiam, causarum primordia & ubi sedem obtineat, curate scrutetur, quippe quod alterum veræ pathologiæ ac therapiæ fundamentum est. Nam profecto exquisitor cognitio modi, quo morbi succrescunt, planam ac facilem ad eos tam arcendos, quam perferandos, viam medenti pandit. Hinc licet in secundo medicinz rationalis systematicæ tomo de morborum ortu & causis copiose satis egerim: haud supervacaneum tamen fore duxi, si succinctam pathologiæ synopsis, proximas morborum quorumvis causam complectentem, hoc loco infererem. Enimvero si fateri liceat quod res est, solida pathologiæ fundamenta usque eo minus recte, hoc est, cum connexione ac demonstratione, exposita sunt, ut potius passim quamplures hallucinationes ac ipsis in exercitio artis obviis factis minus respondentibus opiniones deprehendantur

§. II.

Scilicet varii quidem sunt modi, hypotheser atque principia, quibus tum ab antiquioribus, tum a recentioribus, medica disciplina fuit tradita: nulla tamen, ut verum fatear, faciliior, simplicior & naturæ magis consentanea salutaris artis doctrinæ pertractandi ratio mihi unquam visa est, quam quæ a primo & antiquissimo Medicinæ parente, Hippocrate, in ipsius monumentis, immortalis memoria dignis, proposita est. Gravissimus enim hic auctor, non ex solis materiæ affectionibus, respectibus & qualitatibus physicis, neque etiam ex speciosis nominibus, sed potissimum ex proportionibus, mensura & temperamento, tam motuum, quam humorum corporis nostri, nec non eorum, quæ ingeri & egeri debent, adeoque pure mechanice, solidas rationes, in difficultibus rebus medicis explicandis, scit & docte deducere annisus est, usus maxime ad hoc ministerio scientiæ physicæ; anatomicæ & observationum clinicarum.

§. III.

§. III.

Quod
vix po-
tio a
dogma-
to usque
sur.

Sane primus fuit magnus hic natura consultus, qui artem nostram, ex vero non minus, quam apposite, per subtractionem eorum, quæ superflua sunt, & additionem, quæ deficiunt, per convenientia nimirum remedia, definivit: Primus porro fuit, qui corpus humanum ex partibus solidis, fluidis & impetum facientibus, sive spirituosus, constare, illud permeabile esse ejusque partes invicem consentire & conspirare, rectissime docuit. Hic quoque primus omnium de sanguinis progressu & circuitu, ejus motu inæquali & a partibus exterioribus ad interiores resiliente, & rursus ab his ad illas converso, in scriptis suis, præsertim libro de flatibus, luculentam mentionem injecit. Idem præterea peritissime in medioeritate ac temperie sanitatis fundamentum, in nimio vero, & tam ratione quantitatis, quam qualitatibus, excessivo, quod naturæ humanæ inimicissimum judicat, læsionum & morborum causas constituit. Denique ex omnibus primum asseruit, naturam corporis humani esse optimam morborum, ut cum ipso loqui liceat, præservatricem & curatricem, immo omnis rationationis in Medicina principium.

§. IV.

Sed per-
peram
Hippoc-
ratem
doctri-
nam de-
serva-
runt po-
steri.

Tam itaque vehementer optandum foret, ut qui post Hippocratem vixerunt artis professores, & inter hos maxime Galenus cum suis sectatoribus, his tam egregie jactis a summo viro fundamentis pressius insisterent, & divinam artem magno apparatu observationum practicarum, nec non inventis anatomicis, quæ artificiosissimam corporis structuram pandunt, atque experimentis physico-mechanico-chymicis, quæ rerum corporearum vires, quibus ad vitam continuo homo eget, & motuum quibus vita conservatur leges, recludunt, melius excolere, ulterius perficere & confirmare, per tot sæculorum decursum operam impendissent. At vero, si

verum saporem fateri liceat, otiosis potius speculationibus & sterilibus ratiociniis ex Philosophia potissimum Aristotelica, secundum quatuor elementa desumptis quatuor qualitatibus, humoribus, temperiebus, & intemperiebus, nec non variis animæ & spirituum potentiis & facultatibus, vix aliud egerunt, quam ut majorem progressum & latiora artis incrementa mirum quantum retardarint, tantum abest, ut quicquam solidi ad amplificandam illam addiderint. Neque melioris notæ sunt quorundam nostri ævi Medicorum principia atque hypothese, quæ partim ex corpusculari Cartesii Philosophia, partim ex Chymicorum potentiis salinis, & sulphureis, partim etiam ex Metaphysicorum scholis, ortum trahentes, ac specioso multorum, ut obscurorum, sic sterilium nominum, fuso innixæ, ad solidam theoriam & rationalem Medicinam stabilendam, parum adjumenti attulerunt.

§. V.

Quod igitur
vix po-
tio a
dogma-
to usque
sur.

Ego vero quamdiu per divinam gratiam promovendis artis medicæ incrementis, in publico etiam docendi munere, mentem & operam adjeci, id maxime mihi agendum duxi, ut vetustissima illa ab Hippocrate inventa & felici auspicio inchoata mechanice circa corporis humani naturam & accidentia ratiocinandi methodus, ulterius luculentioribus observationibus, nec non anatomicis, item physico-mechanicis & chymicis inventis atque experimentis, illustraretur, confirmaretur & ad uberiorem perfectionem traduceretur. Proinde jam etiam hæc instituti erit ratio, ut breviter, solide tamen, ex simplicissimis & veris naturæ principis, motu nempe atque materia illiusque affectionibus & legibus in microcosmo, vitæ, sanitatis & mortis naturam, morborum & varii generis symptomatum genealogiam, cui deinde rationalis therapia, sive vera remedia inveniendi & applicandi methodus, fir-

firmiter superstruenda, in usum maxime discitentium & futuræ praxeos, eruam, atque ingenue exponam.

§. VI.

Ingeni-
rindum
prima
quum
medici-
na prin-
cipium.

Quemadmodum autem ad omnem in disciplinis demonstrationem ac veritatem, prima quædam simplicia & intellectu facilia principia seu fundamenta requiruntur, e quibus, tanquam notis, multa incognita & difficilia phenomena apta serie clare deduci, explicari atque resolvi debent: ita pari modo, in Medicina rationali reddenda, sive scientificæ tractanda, idem merito faciendum esse judico. Inquirendum videlicet tale principium ac fundamentum est, in quo non modo vitæ, mortis, sanitatis ac morborum ratio continetur, sed ex quo etiam, ceu fonte, accommodata omnium, quæ in naturali & præternaturali statu occurrunt ac in morborum historiis continentur, explicatio, promi, nec non ea, quæ in hoc vel illo casu salubria & insalubria sint, peti possunt. Quoddam vero hoc sit principium, de eo discors admodum est Medicorum sententia. Qui corpus nostrum mære passivum atque ad motus edendos ineptum judicant, rebus quoque corporeis vim & efficaciam in istud agendi denegant, immateriale quoddam principium, quod apte plerumque & sapienter motus exsequatur & dirigat, animam nempe, sive rationalis sit, sive sensitiva, universæ medicæ doctrinæ fundamentum esse contendunt. Alii spiritus in cerebro & sanguine contentos, æthereæ, sulphurææ, mobilis & elasticæ naturæ, motuum vitalium causam, eorumque considerationem in pathologicis & therapeuticis utilissimam ac potissimam esse, asserunt.

§. VII.

Sed na-
turæ cor-
poris
humani
Hippo-
craticæ,
quæ a-
quabili

Nos cum Hippocrate naturam corporis humani principium omnium sermonis & ratiocinationis in Medicina esse censuimus. Per hanc vero nihil aliud intelligimus, quam perennem sanguinis & fluidorum per corpus me-

re tubulosum & hydraulicum, beneficio systoles & diaholes, quæ in omnibus canalibus viget, progressivum & in circulum abeuntem motum; ut adeo vita in corpore humano nihil aliud sit, quam motus fluidorum, a solidis, præsertim corde & arteriis, & solidorum, non fluidis, quo salvo, machina ratione mixtionis suæ maxime in putridam corruptionem prona, ab hac immunis persistit, & quo prius extincto, putrefactio mortifera incipit.

§. VIII.

Quamvis autem de penitus inquirendis remotioribus motuum vitalium causis non valde sumus solliciti, eo quod subtilior talis theoria, non tam ad scopum medicum, quam potius ad physicam, seu metaphysicam scientiam sublimiorem spectet; non dubitamus tamen asserere: motum illum systoles & diaholes in universo vasorum systemate, qui fluida movet, eorumque cursum moderatur & dirigit, neutiquam persistere posse, nisi ad tunicas fibroso-nervæas, e quibus vasa coagmentantur, sanguini per arteriolas, & liquido, cuiuscumque sit indolis, per nervulos, liber pateat affluxus, adeo, ut hoc intercepto, repente omnis motus concidat. Porro firmiter asserimus: sanitatem, quæ in libero & ordinato functionum, tam animi, quam corporis, exercitio consistit, a motu systoles & diaholes in solidis & progressivo fluidorum in vasibus, imperturbato & æquabili, a partibus internis & vasibus majoribus, ad extimos & minimos canaliculos vergente, unice dependere, quo integro acinso, humorum utilium, qui ad usum retineri debent secretionibus, & inutilium ac superfluum excretionibus saluberrimæ, legitime persiciuntur.

§. IX.

Hoc itaque posito sanitatis fundamento, læsionem functionum corporis nostri, quæ formalem morbosum status rationem exhibet, a vitioso soli-

solidum
tum &
fluidum
tum mor-
tu con-
flatur.

Ex his
ergo
hoc mo-
tu pro-
xima
vita sui
natura
causa
peten-
da.

Et hinc
morbosum
vitalium
causa
essendo

Perver-
situr
autem
quodam-
modo
1) per
spasmi

2) per
spasmo-
dicas
fibrilla-
tas,

3) per
convul-
sivos e-
pilepti-
cos mo-
dos,

4) per
atoniam

solidorum & fluidorum motu unice deducimus; qui, sicuti variis modis lædi potest, ita etiam morborum, seu potius motuum morbosorum, causas formales & proximas varias adstruimus. Attenta tamen in omni morbo, seu statu præternaturali, observatione compertum habemus, motum illum vitalem a partibus interioribus ad exteriores, constrictione minimorum vasculorum & fibrillarum spastica, valde intercipi, ac inverso plane cursu, a circumferentia ad centrum urgeri, & deinde rursus cum impetu a penetralibus ad ambitum, accelerata systole & diastole, agi, qualis motus, si universum corpus afficit, febris dici solet. Deinceps id quoque observatu constat, motum intensiorem systoles, sive spasmi, certas nonnunquam tantummodo partes occupare & fluidorum motum ibi turbare, qui motus vocari siveit spasmodicus. Porro in quibusdam morbis animadvertimus, motum reciproco constrictionis & expansionis in partibus musculosis, tam internis, quam externis, præter voluntatem intendi, qui convulsivus, aut si enormis, epilepticus dicitur. Tandem etiam in plurimis morbis obviu, motum activum systoles in solidis valde esse remissum ac resolutum, & fluidorum progressum inde retardari, quæ affectio, si levior, atonia, si gravior, paralysis vocatur, & secunda est morborum mater.

§. X.

Constitutis sic quatuor motuum morbosorum generibus, primo loco istos recensebimus, qui ex aucta spastica vasorum & fibrarum strictura in externo corporis habitu, sanguinem & fluida ad interiora urgente, subnascuntur, quos inter maxime eminent febris. Nulla enim ejus species est, sive sit intermittens, sive continua, eaque vel benigna, vel maligna, acuta, sive lenta, inflammatoria, sanguinea, aut lymphatica vel biliosa, item, cum vel sine ex-

To.m. III.

an:hematibus, sive denique symptomata, in qua non sub accessione, progressu, immo tempore exacerbationis, partium extimarum refrigeratio, summæ cutis ejusque pororum constriction, vasorum detumescencia, horripilatio, partium rigor, sudoris suppressio alvique constipatio, observetur. Nullam porro febrem videas, qua sanguis non ab exterioribus ad interiora, cor & appensos eidem majores canales, superiores quoque partes pellatur & congeratur, ut hinc dolor dorsi & capitis, præcordiorum anxietas, inquietudo, spirandi difficultas, pectoris oppressio, pulsuum durities & frequentia, oboriantur, vel plane, coacto ad cerebri & ipinalis medullæ membranas sanguinis impetu, deliria, convulsiones, ac epilepsie, nonnunquam in principio, quandoque etiam, quod magis periculofum, in vigore, accedant. Nulla demique febris, vel motus febrilis species discedit ac solvitur, nisi spastica illa in superficie entis & minimis vasculis strictura intermittat, vel plane remittat, ut liberior & æqualis sanguinis ad exteriora & emunctoria affluxus restitatur, quem mollior & validior arteriarum pulsatio, sudor vel maior & perspiratio auctior, nec non alvus solutior & urina crassior, tanquam bonæ criseos signa, sequuntur, vel comitantur. Et duplici hoc motu, omnis febris, sive motus febrilis, essentia & natura continetur.

§. XI.

Post febres multi alii adhuc sunt morbi & motus morbofi, in quibus pariter sanguis a partibus exterioribus & inferioribus, ad interiores ac superiores cursus præter naturam convertitur. Videlicet obviu hoc est in omnis generis hemorrhagiis, tam salutaribus, sive criticis, quam pernicialibus, sive symptomatonicis. Menstrualis illa sanguinis in feminis, & hæmorrhoidalis in masculis effusio,

Hæmorrhagia critica & symptomatonica.

C fio,

‘fio, antequam succedat, inferiora refrigerant, cutis stringitur, in dorso circa pubem & os laerum dolor percipitur, artus lassantur, genae gracilescent & pallent, demum pulsus intenditur & tunc sanguis effluit. In narium stillicidio extremae & inferiores partes levius minimum quoque frigent, facies vero rubet ac tumet, vasa temporum intensius falliunt, gravativus dolor caput obsidet, & sub aucto arteriarum pulsu, sanguis stillat. Haemoptysin porro nunquam non antecedit extremorum, praesertim pedum, frigus, lassitudo, status in abdomine, alvi adstrictio, pectoris oppressio & difficilis spiratio. Ipse cruentus vomitus, & nigri cruoris per anum secessus, nec non mictus sanguinolentus, nunquam accidunt, nisi praecesserint spatium in abdomine, dolor in dorso, ani constipatio, cum cutis & extimarum partium refrigeratione ac detumescencia, arterius semper citatus & ad tactum durius micantibus.

§. XII.

*Inflam-
matio
necrom-*

Eadem ratione inflammationum genesis contingit. Phrenitis idiopathica aequae, ac symptomatice in febribus continuas, vix aliter inducitur, quam cum horrore & vigore in corporis cortice, alvo compressa & urina tenui aquosa, rapti interea sanguine ad caput, in quo arteriae, tam internae, quam externae, fortiter pulsant, facies rubet, oculi scintillant & nares siccae & calidae sunt. Et quia sanguis copiosius appellitur, quam canalium sanguiferorum diameter capere potest, neque per nares exsolvitur, ad lateralia arteriolarum, non cruoris, sed feri, vel lymphae trajectui dicata vasa, cogitur, in quibus statim concipiens, dolorem, ardorem, ac delirium cum phantasiae turbatione ingignit. Reliquae inflammationes, in oculis ophthalmia, in faucium & asperae arteriae principio, angina,

in pulmonibus, pleuritis, & peripneumonia, in ligamenti hepatis membranosis, hepatitis, in renum substantia, nephritis, nec non ea, quae in ventriculo, intestinis, utero & vesica consistunt, non alio etiam modo subnaescuntur, quam quod sanguis per spasmos & dolores, in abdomine & intestinis praefertim, & minoribus valorum propagibus repellatur, & inde ad alias partes fortiori appulsu congeratur; unde sapissime observavi peripneumoniam & pleuritidem, perpeffo prius colico dolore, accessisse. Insuper inflammationes illae dolorificae, quae extremas partes cum dolore, & rubore obsident, ut erysipelas in cute vel facie, rheumatismi in membranis musculorum, arthritis in ligamenti nervis juncturarum, podagra in pedibus, gonagra in genubus, chiragra in manibus & ischiatis in ossibus ischii, eodem obtinent natales: quandoquidem ante earundem accessionem, cutim plerumque horripilatio & refrigeratio tangit, vasa detumescunt, vires cum appetentia languent, praecordia anguntur, quandoque etiam vomitus exoritur & feces retinentur, luculento indicio, spasmi extrema ac interiora stringi, ipsumque sanguinem retro agi.

§. XIII.

Accedunt graves illi capitis & cerebri affectus, insultus sive paroxysmi epileptici, maniaci, apoplectici, paralytici ac soporosi. Dum enim in his sanguinis & humorum impetus ad caput, & maxime ejus interiora, urgetur, neque exitum sibi invenit, cruor vel in vasis membranarum cerebri stagnat, & principia nervorum comprimendo, apoplexiam, leviorē tamen sive spasmodicam, hysteris & hypochondriacis familiarem, inducit, vel ruptis plane ob nimiam distensionem plexus potissimum choroidei valculis, effunditur, ac ventriculi illapsus, fu-

*Gravis
quidam
capitis
morbi.*

nestam graviorem apoplexiam gignit, vel serum ob moram secedit, ac in substantiam cerebri & spinalis medullæ descendens, paralyfin nec non soporosos affectus & memorie imminutionem suscitatur, vel denique raptu velocius & cum impetu per cerebrum sanguine, distentis quoque simul nimium minimis canalibus, furor exoritur. Hinc est, quod semper ante incursum horum morborum, in extremis frigus ac horripilatio sentiatur, & maxime in hypochondriacis, iisdem maxime obnoxiiis, dolores & spasmi in ventriculo, in dorso, hypochondriis & abdomine, membrorum lassitudo & alvus compressa, advertatur. Quinimmo in epilepsia, compressis per spasmum venis externis jugularibus, facies a copiosioris sanguinis appulsu, non modo turget, sed & colore ex rubro nigricante perfunditur, motu arteriarum velociori ac duriori, quam in apoplecticis insulibus visitur.

§. XIV.

Porro omnis seri copiosioris & violenti in coryza, per glandulosam faucium & narium substantiam, in tussi humida, ex pulmonum bronchiis, ac in diarrhea seri acris, salii & bilioli largior & salutaris sæpe excretio, cum horripilatione cutis, extremorum refrigerio, artuum lassitudine, corporis languore ac perspiratione suppressa, accedit, & vernali potissimum, nec non autumnali tempore, quo ob aerem frigidum & humidum cortex corporis constringitur & fluida ad interiora sese recipiunt, solennis est. Neque effrenis salivæ profusio argento vivo proritata, quæ mihi aliquoties lethalis visæ est, sine ingenti & continua refrigeratione extremorum, cutis conspatione, alvi siccitate & urinæ difficultate, observatur.

§. XV.

Omnis quoque febrilis, vel alius morbus recidivans, perfrigeratis prius notabiliter artubus, dorso dolente, viribus languentibus, corpore lasso,

horroris cujusdam sensu & alvi obstipatione, incipit ac repetit. Inprimis frequentissime observationis est exanthemata, in acutis quidem variolas & morbillos, purpuram rubram & albam, nec non petechias, in chronicis scabiem, pustulas vel falsas alias acres & erodentes cutis desquamationes, post spasticam tubulorum cutis crispaturam, incauta perfrigeratione, vel topicis adstringentibus improvide applicatis, inductam, disparere, rescitari, ac ad interiora recedere, gravius damnum certo invectione. Quin sæpius vidit, oedematosos pedum tumores, accessione febris intermittens, cui horror & extremorum stupor junctus, evanuisse, sed intro pulsos, pectoris suffocationem intulisse.

§. XVI.

Nec denique in artis exercitio versantibus ignotum esse poterit, quam læva pathemata subitam lochiorum, menium & hæmorrhoidum fluxus suppressionem, consequi soleant, nullam certe aliam ob causam, quam quod, quæ sanguinem plorant vascula, vehementiori strictura, vela frigida aura, vel animi affectu, vel etiam medicina præpostere adhibita, afficiantur, quibus compressis, motus antea eo directus retrocedit, & sanguinem ad nobiliora viscera & majores canales trudit, ubi copiosius collectus, varias & difficiles turbas suscitatur, in intestinis quidem, acerba tormina, in ventriculo, cardialgiam, in præcordiis, summas anxietates, in thorace, spirandi angustiam & difficilem ad suffocationem usque anhelitum, in dorso, dolores, in artubus, lassitudinem, languorem & movendi impotentiam, in corde, palpitacionem ac tremorem, immo syncopen cardiacam, in capite, cephalalgias, aurium tinnitum, scotomiam, quandoque vertiginem, nonnunquam plane epilepsiam, melancholiam, live anxias & meticulosas cogitationes, cum perversa phantasia impressione, ac in universo corpore,

Ceterum
ubi &
dilatatio
vires
suffusa

Suffusio
quoque

Retuldi
va mor.
bonum.
& flores
siccitas
cunctas
revertit
dentes

languores viriumque jacturam.

§. XVII.

*Nemo
en his
morbus
solu-
tur,
quam
spasmo
soluatur.*

Et hæc cuncta timoris & periculi plena atrocita mala, in omnibus quos recensui morbis, febribus, inflammationibus, doloribus, profluviis, aliisque, prius non desinunt ac laborantes deserunt, quam sanguinis ac fluidorum a centro ad peripheriam, ab interioribus ad exteriora & vasorum minima, beneficio naturæ vel congruis remediis, repetat aut restituantur. Quare etiam perfecta solutionis morbi quam Græci crisin vocant, certa indicia præbent pulsus mollior & sedatior, calor per omnem corporis ambitum aequaliter diffusus, tepidus ex auctiori perspirationis successu maior ac sudor, somnus placidior, alvus solutior & urina crassior, facile sedimentum ponens, ex quo potissimum Veteres, coctam esse febrilem & morbosam materiam, augurabantur.

§. XVIII.

*Morbosi
igitur
motus
non per
se ex
sua na-
tura
sunt solu-
turi.*

Quæ quum ita fiat, nemo certe, qui allata curatus expendi, facile in eorum sententiam descendet, qui haud ferentur affirmare: & febres, & omnes hos plane morbosos motus in se & sua natura esse salutare, ad vitam conservandam & corpus ab interitu vindicandum, a sapienti natura provido consilio institutos. Qui enim motus ejusmodi spastici, qui circulum sanguinis vitalem, liberum, æquabilem, ad exteriora corporis per minima vascula iter legentem, sistunt, cohibent, ac pervertunt, naturæ amici & salubres dici possent? quum non modo excretiones saluberrimas, sine quibus vita consistere prorsus nequit, interceptant, ac sordes ad interiora reprimant, sed & attenta observatio doceat, sub eisdem lethalem vitam catastrophæ induci. Certe in omnibus chronicis & acutis morbis ipsisque febribus, quando ægri occumbunt, ex eisdem motibus mortis signa desumuntur, quæ inter tanquam ipso eventui toties comprobata referuntur maxime extremorum frigus, horror

& rigor partium, sudor frigidus, & exanthematuni, si adsunt, retrocessio, facies contracta, nares acuminatæ, tempora collapsa, respiratio anxiosa & difficilis, summa virium prostratio, cum pulsu inæquali, debili, contracto vel etiam intermittente, inlequente demum mentis ac sensuum enotione, aut convulsione. Ipse quoque notavi, eos, qui ex intermittente moriuntur, in ejusdem accessione & frigore, ubi omnia a spasmo costricta rigent, perire & omnes, qui ex præcedente morbo ad intellectus hos motus prout sunt, ut hypochondriaci, hysterici, hæmorrhoidum vel mensium suppressione laborantes, his in morbis acutis per se non adeo periculosos, repentinis, jugulari.

§. XIX.

Quapropter nulla certe alia ratione, nulloque alio respectu, hi motus, per se morbos, vocari possunt salutare, quam quod per accidens, licet sæpius, per eisdem, alter iste, re vera per se salutaris dicendus, sanguinis nempe a partibus internis ad externas tendens progressus, mechanica quadam ratione excitetur, augeatur, ac per ejusdem appulsum, interventu mechanicorum, quibus a summo opifice machina animalis sapientissime instructa est, motuum, ipsius morbi caulam, vel stagnantem materiam resolvendo, vel eandem expellendo, auferatur. Et hoc demum sensu, febres ad Celsi loquendi modum medicinalia & præsidia corporis appellari, vel ut Hippocrati aliisque Veteribus solenne, denominatio pugnat naturæ cum morbo, nec non naturæ optimæ morborum medicatricis, admitti poterit, intelligendo per morbum perniciem illos ipsamodicos & xxi morbosos motus, vincendos per naturam, hoc est, salutarem illum ab interioribus ad exteriora corporisque ambitum vergentem sanguinis & humorum motum.

*Sed tan-
tum per
accidens
sunt
salutari-
facti.*

§. XX.

*Alterius
classis
morbi,
cu spaf-
mo par-
ticulari,
atque
delu-
di dele-
tes in
capite
Or.*

§. XX.

Atque hi sunt natales morborum quos spafmi sanguinis & fluidorum motum retroagendo ingignunt: jam etiam illustrabimus perniciosos illos effectus, quos idem spafmi in partibus, ubi incipiunt & fixam habent sedem, fulcitant. Incipiemus a doloribus, quorum causam plerumque præbent spafmi, dum scilicet nervosæ tunicas, quæ acutiori sensu præditæ, gravius & pertinacius infestant, & tantum pro diversitate locorum diversam fortuntur denominationem. Videlicet vehemens ejusmodi spastica stricture, externas capitis membranas, ut pericranium, attenuans, cephalalgiam, modo in sinu pite, modo in occipite, parit, si dimidiam cranii partem, in sinistro vel dextro hemisphærio, detinet dolor vocatur hemicrania, quando vero circumscriptæ tantum certæ regioni insidet, clavus audit. Idem hic spasmus ad ligamenta nervosa dentium defendens, odontalgia, & valde nervosam meatus auditorii membranam exercens, otalgia vocatur. Ventriculi tunica nervæ, nec non orificia, crispata & spastice contracta, cardialgiam, cum ingenti circa præcordia anxietate & angustia faciunt. Intestina quum spafmi exagitant, & quidem tenuia, dolor ilei, circa umbilicum subsistens, urget; si in consuetis hypochondriorum crassa, præsertim colon, tormina vocantur colica; & quando infirmam voluminis regionem, a stagnatione maxime sanguinis hæmorrhoidalis, dolor hæmorrhoidum cæcarum nominatur.

§. XXI.

*Alitq;
corpo-
partibus*

In uretheribus reliquisque urinæ evahendæ dicatis & ex tunicis penitus nervosis & musculosis conflatis canalibus, si quando infixus major calculus, hinc distractionem, hinc crispaturam, causatur, immanis dolor, cum dysuria & aliis gravibus symptomatibus stipatus, gignitur. Stricto

Tom. III.

autem & corrugato vesicæ sphinctere, ardens urinæ stillicidium, quod stranguriam dicunt, adest. Dolorificus porro hic spasmus, ligamenta, quæ artus vinciunt & continent, obfidens, articularum morbos excludit, & denominatione a proxima parte desumpta, podagræ, gonagræ, chagræ, vel ischiaticis, vel etiam extremam tantum musculorum membranam sollicitans, rheumatismi, vel pleuram, pleuritidis spurix nomine, in Medicorum scholis insignitur. Ipsum periosium ubi lacinatur & spastice quoad certam partem affligitur, acutissimus crudelis dolor suscitatur, in lue venerea & paronychia obviis, cui atrocitas non cedit is, qui facta in luxatione ossium dislocatione, ægros angit.

§. XXII.

His non minora, sed majora utique sunt damna, quæ perniciosales spafmi, locis, quæ saluberrimis excretionibus vacant, firmius inhaerentes, intentant. Nimirum tubulosa & cribrosa cutis substantia, e cujus spiraculis copiosissimi tetri vapores exhalant, spasticam stricturem, vel ab acri frigore improvide admisso, vel per consensum ob affectas interiores partes, fit in febribus & doloribus, patiente, excrementitix illæ salinæ & sulphureæ activæ admodum indolis sordes, in corporis penetralia resorptæ, vel febres catarrhales ipsamque coryzam ac tussis cient, vel ad intellinorum tunicas latæ, & bile acriori reddita, diarrhæa cum torminibus concitant, vel ad renale emunctorium & urinarios ductus appullæ, copiosiores quidem urinam, sed cum difficili mictu, efficiunt, quid? quod eadem superficialis tubulorum in cute stricture; liberam perspirationem sufflaminantes, ad tomitem chronicarum passionum, primis in viis, præsertim duodeno constituendam, multum conferant.

*De as-
suta spaf-
mi ef-
fectu in
corpo-
re, Or.
Or. 1]
causis e-
manantibus.*

C 3

§. XXIII.

§. XXIII.

3) In-
est in-
rum qu-
simus.
Alimentaris ille canalis ab oſophago ad anum porrectus, ingeſtorum digeſſioni & reſiſtarum ex his ſecum excretioni dicatus, ſi hoſtili ſpaſmo ſtringitur, maxima inde & varia in corporis integritatem redundat noxia. Inprimis alvi contumax adſtrictio, plerumque debetur ſpaſmis, qui vel iſtis in inteſtinis, & maxime inferiori coli portione & recto conſiſtunt, vel per conſenſum & ſtrictis remotioribus partibus eo propagantur. Suppreſſa autem hac ratione alvi evacuatione, ſcybala non modo retinentur, ſed & omnes ſtatus cum iſtis ſordibus ad ſuperiora & tenuia inteſtina, immo ſæpius ad ſtomachum, reprimuntur, ubi propter inſflationes inde pullulantes, multa eaque gravia inſequuntur ſymptomata, id quod hypochondriaco vel hyſterico malo laborantium exemplo luculenter patet. In medio inteſtinorum hoſpitans ſpaſmus, motum perſiſtalticum invertit, & ad ſuperiora non modo ſtatus, ſed & ſæces excernendas urget, ut ſurſum latæ, per os ac vomitum rejiciantur, quod ſæpiſſime fit in paſſione iliaca, præſertim incarcerata hernia ſtipata.

§. XXIV.

Spas-
sim illo
Ileon ſicuti inteſtinorum eſt tenuiſſimus & ſenſationis exquisitiſſimæ; ita hoc modo præter naturam affectum, non ſolum atrociffima circa umbilicum tormina, ſed etiam deſectiones crebras & copioſas parit, ut in colica cum diarrhea juncta, ſive biliola, aut ubi draſticum purgans fuerit aſſumtum, contingit. Vehemens quoque ſtrictura ſpaſtica, quum occupat inferius oriſcium ventriculi ejuſque motum ſubvertit, vomitus vel conatus ad vomendum emergit; quando vero ambo oriſcia, ſiniſtrum & dextrum obſerantur, ipſe ventriculus ſtatuſque turget & mirum diſtenditur, unde in hyſtericis & hypochondriacis troculenta ſæpe pathemata. Nonnunquam etiam clauſo adhuc pyloro, ſtomachus ſuperius laxatur, &

patecto exitu, ipſi ſtatus ingenti copia & cum impetu & faucibus erumpunt & ruſtus fiunt.

§. XXV.

3) In-
adbi-
lus bi-
liario.
Et quia totum ſyſtema vaſorum biliariorum, quæ in hepate & extra illud diſcurrunt, & motu idemtidem perſiſtaltico, quem nonnulli recentiorum oſcillatorum dicere malunt, biliolum ſuccum demum ad duodenum trudent, ſpaſmis pariter ex facili patet, obtunicas, quibus canales biliares inſtructi ſunt muſculares & nerveas, ſit, ut pro diverſitate ſtricturæ in vaſa hæc cadentis, variz affectiones morboſæ reſultent. Nam oriſcio ductus choledochi conſtipato, ut ſæpe accidit ab ira retenta, nec non in cardialgia, in vomitu, vel ab aſſumto purgante aut veneno, bilis motu etiam inverſo perſiſtaltico regurgitat ad lymphæ & ſanguinis maſſam, & iſteritium cuti inducit colorem, ſimul quoque craſſimam temperatam & benignam ſanguinis & humorum corrumpit ac deſtruit. Ductus cyſtici & hepatici, quando ob bilem nimis acrem redditam, vel modo dictas cauſas artius adducuntur, ipſa bilis ingenti in copia amandatur ad duodenum, & ſedès vel vomitiones admodum biliolaſ efficit, ipſumque cholemicum ſæpe parit morbum. Deſcenda vero in duodeni cavo bilis tam copioſa & vitioſa, cum aliis corruptis ibi ſtulantibus male coctis, ſuccis facile in corruptionem abit, & gravium ſymptomatum atque inflammationum fomitem præbet.

§. XXVI.

4) In
urina
urina
Idem de ſyſtemate ductuum, qui urinam vehunt, tenendum. Hi enim quum non minus perſiſtaltico, hoc eſt, reciproco ſyſtoles ac diaſtoles motu gaudeant, intensiori facta per ſpaſmum ſyſtole earum, & quidem ubi uretheres renibus implantantur, urinx fluxus plane interceptitur, ac retentus ſaluſ latex non modo renale conceptaculum valde diſtendit, ſed & ad ſanguinis maſſam redit, ut ſi diu-
tius

tius perfliterit malum, gravis ad suffocationem usque anhelitus, vel etiam tumor hydropicus, aut convulsiva quedam affectio, quin non raro mors, ingruunt. Clausura uretherum ad ingressum in vesicam, quancunque etiam ex causa, contingente, urina e pelvi jugiter stillans appensos uretheres cum saxissimo dolore mirum expandit, ut instar farcininis diducti post mortem appareant. Quando vero spasmus ad vesicę sphincterem vergit, urina non redditur, sed vesicam implet ac ampliat. Urethra demum a graviore strictura compressa, mictum difficilem cum ardore & dolore, sive stranguriam, conciliat.

§. XXVII.

Uti vero excretoria, sic quoque secretoria corporis organa, detrimetosa spasmus nonnunquam tangit, admissio inprimis externo frigore, vel perpeffo graviore terrore. Sic ductus mammarum lactiferi eidem crebrius obnoxii sunt, ut non solum secretio lactei liquoris in glandulosa mammarum substantia impediatur, sed etiam inde tumores, in abcessus & ulcera desinentes, contrahantur. Faucium & palati glandulosa compages, ex qua continuo lymphaticus & salivialis succus stillat, ubi arctius stringitur, quod non tantum in æstu præternaturali, sed etiam febrium accessione, nec non in aliis affectibus internis spasmodicis contingit, fauces ardeunt & sitis accenditur. Pariter tunica villosa intestinorum tenuium, quę tota vasculosa & cellulosa si inflata exsicceatur apparet, spasmodice contrahitur, ob tunicam nerveam cui infernitur, & tunc parum humoris ex ingessis pervenas lacteas ad massam sanguinis fertur, unde corpus emaciatur, imus contra venter intumescit, immo durus ac renitens a flatibus intro coactis fit, ac ita tandem tympanitis gignitur. Vicissim quum glandulę, quę salivalem latorem in fauces eructant, medicamen-

to mercuriali ad iteratas fortiores stricturas sollicitantur, salivę ingens exoritur profluvium, quod etiam evenit, in hypochondriaci ab humore stimulante acri acido.

§. XXVIII.

Superiores & nobiliores corporis partes, quo magis reliquis in æconomia animali præstant, eo gravius detrimentum, si infesto spasmus premuntur, ipsa corporis patitur integritas. Diaphragma, & maxime ejus portio nerveo-tendinosa, quando præter naturam valide contrahitur, asthma nascitur sic dictum spasmodicum, cum sensu coarctationis & compressionis circa præcordia, solenne hypochondriaco malo vexatis symptoma. Quin spasmus hoc diutius septo incumbente, summa spirandi urget angustia, quam haud raro œdematosus, sive hydropicus inferiorum partium tumor, insequitur, eo quod cava vena, ex hepate emergens ac per diaphragmatis substantiam nerveo-tendinosam transmissa, hoc corrugato, simul angustatur, ut sanguis per adductum ejus alveum difficulter ad cor volvatur, & liberiori transitu exclusus, non tantum in inferioribus partibus, verum etiam in venę portę ramis & plurimis abdominis visceribus copiosius collectus, restagnet ac mota serosam in poros dimittat portionem, unde tumores. Vasa & ramificationes asperę arteriæ per pulmonum substantiam dispersę, tunicis muscularibus & nerveis vestitę, quando vehementiam spasmi experiantur, quod non raro fit in hærente iisdem intus genita, vel retropulsa quadam acri, serosa, exanthematica materia, ingens pectoris oppressio & respiratiois difficultas oritur, quę, propulsa ad habitum corporis perniciosa illa materia, protinus cessat. Laryngis & pharyngis nerveis & muscularibus partibus, quum insidet spasmus, contractivus quidam circa gulam observatur sensus, haud secus ac si palus ibi infixus hæreret, quod hy-

Terre-
la dia-
phrag-
mati.

aspera
arteria.

Larys-
gis &
pharyn-
gis.

stericis, spasmo ventriculi laborantibus, familiare.

§. XXIX.

*Cerebrum
ejusque
membranas
nisi, prout
jussit
dura
mater.* Longe magis adhuc terrent spasmi sensibilibus cerebri membranarum. Nam dura sic dicta mater, per quam sinus venosi feruntur, & a qua, tantam matre, omnes membranæ nervosæ originem sortiuntur, ob texturam prorsus nervosam ac fibrosam, motu tonico vitali, systole & diastole, pollet, & sanguinis per caput & cerebrum progressum, nec non fluidi tenuissimi in nervorum principia ingressum, quam maxime moderatur. Quapropter laeso ejusdem motu eoque per spasmos intensiore facto, non mirum est, perquam sæva pullulare pathemata. Inprimis hoc loco ceu perpetuæ veritatis assertum inculcandum: quod animi dispositio, inclinatio ejusque varii motus, immo impressiones & functiones in judicando, a sanguinis & fluidorum motu ac transitu per cerebrum ejusque membranas, plurimum dependant; hic vero sanguinis cursus, pro varia duræ potissimum meningis textura, tono ac motu succedat atque regatur. Et hanc ob causam mentis emotionem sive delirium, tam melancholicum, quam furibundum, aliaque gravia in capite mala a præternaturali hujus membranæ constitutione quam maxime arcessenda esse judico.

§. XXX.

*Unde
melan-
cholia.* Scilicet quando ita stringitur dura mater, ut sinus venosi angustentur, & hinc per ipsam sanguis impeditius trahatur, in animo varix anxietas & sine omni causa formidolosa ac tristes comparent phantasie, ad desperationem quandoque accedentes, cum intellectus errore, qui affectus melancholia vocatur, in spasmodico-hypochondriaco malo obviis. Ubi vero durante tali strictiore duræ matris habitudine, sanguis a caussis in corporis interioribus delitescens, vel etiam ab iracundia, cum impetu ad caput rapitur, insaniam furibunda cum lædendi

impetu, vehementi odio & ira sine evidenti causa, nascitur. Et nunc facile intelligitur, quare melancholia facile transeat in furorem, & hunc sæpe melancholia excipiat. Quod si vero sanguinis progressus ob rigidum duræ matris spasmodum sistitur, & vasa cruore repleta nervorum principia comprimunt, levior species apoplexiæ gignitur, quæ nobis dicitur spasmodica, & crebro visitur in gravi affectione hysterica, ac tempestive admissa venesectione, repente nonnunquam tollitur.

§. XXXI.

*in sen-
sibus
sensu
la illi.* Neque senforia a crispatura spatiosa penitus sunt immunia. Si ad nervos pertingit opticos, quod aliquoties vidimus a vermibus, visus ad tempus perit, vel duplicatur. Si ad interiores aures, quæ labyrinthum cochleam & meatum auditorium succingunt, tunicas fertur, non modo tinnitus & susurrus molestissimus, sed & intolerabilis anxietas a sono externo acuto percipitur. Nervi linguales spasmo correpti, quod etiam aliquoties in verminantibus observatum est, aphoniam sive loquelæ defectum inferunt. Internum narium spatium, unicum sinubus ossium cranii, tunica valde nervosa & glandulosa, quæ pituitaria vocatur, obductum est, quæ ubi spasmo, sive acri frigore, sive ab austero humore huc delato, aut nimio pulveris tabaci usu, adstricta, non modo mucis excretio cum odore impeditur, sed & gustus simul læditur. Insignis enim est laporis & odoris sympathia, utpote membrana narium pollicæ ossi palati parti, quæ columellam apprehendit, appenditur, & ex pari quinto nervi ad palatum & nares etiam mittuntur. A spatiosa hujus membranæ strictura deducenda etiam mihi videtur ratio, quare semina hysterica & qui gravibus pathematibus spasmodicis affliguntur, suaveolentia, quæ penetranti agilitate stricturas intendunt, ægerrime ferre queant; adeo ut si factum fuerit, universo nervorum systemate in consensum tracto, levissimi

ma

ma symptomata, syncope, summa præcordiorum anxietas, spirandi angustia, in quibusdam convulsionibus, proritentur.

§. XXXII.

In medulla spinali accedunt febres. Neque dubium est, quin membranae, quæ medullam in spina continent cingunt, & ejusdem sunt structurae, naturæ & usus cum membranis cerebri, spatiosa strictura afficiantur, idque secundum meam sententiam sæpiissime, maxime omnium vero in principio omnium febrium, præsertim intermittenter contingit. Nam illa per universum corpus conspicua horripilatio, refrigeratio, pororum cutis corrugatio & vasorum ejusdem palloræ detumescencia, neque minus oscitatio, pandiculatio, sunt affectus nervorum, qui ex medulla spinali suam accipiunt originem. Idem quoque dolor circa primam vertebra lumborum, qui plerumque ab initio omnium motuum febrilium obviis, id adstruere videtur. Quod argumentum tamen in peculiari dissertatione, de vera motuum febrilium indole ac sede fusius prosequutus sum.

§. XXXIII.

Superest adhuc alia motuum præternaturalium, qui morbos proxime efficiunt, species explicanda, cujus indoles non tantum in intensione & aucta fortius systole, seu contractione, sed etiam reciproca & successiva vehementiori expansione, seu dilatatione, consistit. Dicuntur hi motus convulsivi, & incipiunt in locis nervosis, sive immediate, sive per consensum valde irritatis, & demum transeunt ad musculos, etiam eos, qui voluntatis arbitrio subiecti sunt, quos dire & horribiliter sæpius agitant, distorquent & e situ suo dimoveant. Quod si dura mater cerebri, cujus actio & conspiratio cum membranis nerveis universi corporis, inque primis medullæ spinalis maxima, convellitur, universalis hæc est convulsio, particularis magis, si membranae & nervi medullæ spinalis, in hoc

vel illo latere, tali motu afficiuntur. Sæpe ipsa spina, vel antrosum, vel retrorsum, horribiliter curvatur, jactatur & distorquetur, modo totum corpus flectitur, modo certi artus, manus vel pedes, hinc inde agitantur.

§. XXXIV.

Hiscæ motibus internæ quoque musculosæ & nobiliores partes obnoxie sunt. Cordis quippe palpitatio, quæ e sede sua validissime dimovetur, non nisi convulsionis species est. Diaphragmatis succensus, quo thorax cum impetu ampliatur & rursus angustatur, cum intensiori expiratione rectissime etiam ad convulsionem referri potest. In apoplexia, epilepsia & gravibus quibusdam capitis morbis, ipsius thoracis convulsio conspicitur, quæ cum intensiori facta respiratione, thorax vehementer diducitur & repente etiam contrahitur, lethale ut plurimum in apoplexia signum. Quando diaphragmatis musculus convellitur, fit singultus, cujus causa ut plurimum hæret in ventriculo. Quandocunque larynx valde nervosa & tunica quæ bronchia pulmonum cingit nerveo glandulosa, a sero acri irritatur, pectoris etiam fit convulsio & succussio, cum vehementi conatu expectorandi, in tui sic dicta serina, seu convulsiva. Quamprimum fibræ nervosæ nares obliucentes ab acri quodam stimulo vellicantur, illico, ob comæatum nervi intercostalis, diaphragma per inspirationem altiore deprimitur; & mox spasmo remittente, violenter retractum, fortiorem expirationem, cum vehementi aeris exufflatione præstat. Quin notabile est, quod a titillatione super costas facta, diaphragma motu reciproco agitatam, cachinnis moveat.

§. XXXV.

Percommode quoque in convulsionum censum vomitum referre licet, quia fortiori strictura pylori & fundi ventriculi, aucta vero nimium expansione orificii sinistri & œsophagi, per-

particularis motus convulsivus artus.

Intra corpus palpitatio cordis, sistens convulsivum.

Singultus, convulsivus.

Stroniatio.

Familia.

perficitur. Non raro ex intestinis tenuibus, ut fit in passione iliaca, contenta vomitu rejiciuntur, quod non sine inverto motu peristaltico, qui in succedanea contractione & relaxatione consistit, fieri potest. In cholera ac diarrhea, qua fordes mucosae, & biliosae brevi tempore ingenti copia eijciuntur, ejusmodi convulsivam affectionem, non modo intestinalium, sed & ductuum biliariorum, adesse, censendum est. Rustuum impetuosa e stomacho fortiter contracto expulso, hypochondriacis perquam frequens, eo quoque referri debet. Præmatura foetus in utero exclusio, sive abortus, nunquam sine ejus convulsione contingere potest, neque partus legitimus aliter peragitur, ita tamen, ut convulsiva agitatio non tantum uterum, sed verum etiam partes vicinas in regione pubis & ossis sacri tangat, & musculos quoque dorsi & abdominis in consensum trahat. Nam ejusmodi vehementes spasmos, sive restrictivos motus partium, subsequitur tandem mira officii uteri interni dilatatio.

§. XXXVI.

Expōsit sic iis morbis, quorum formæ ratio in convulsione versatur: transeundum nunc est ad eam affectionem classē, qui ex toni, seu potentie motricis, in nervosis & musculosis partibus, item in ipsis canalibus qui fluida vehunt, imbecillitate, seu nimia remissione, aut exsolutione, quam Græci atoniam, vel si gravior affectio, paralyfin vocant, subnascuntur, quippe qui non levius periculum, ac priores, vitæ intentant, sed certo respectu gravius. Quicumque paulo curatius ipsius mortis theoriam scrutatur, is non a vero aberrabit, si censet, eandem in plenaria, & universali resolutione, seu potius extinctione motuum, qui in corde, arteriis membranis & omnibus musculis vigent, consistere. Nam simulac motus ille activus systoles cordis, & arteriarum silet, vel extinguitur, protinus tota œconomia reliquorum mo-

tuum & functionum aboletur. Si systole cordis ad tempus intercipitur, syncope, quæ imaginem mortis præbet, oritur. Sub languida valdeque imbecilli cordis & arteriarum pulsatione, quæ fit sæpius a metu vel magna mœlitia, vires naturæ ita exolvuntur ac prosteruntur, ut anima, cujus operatio in sensu & cogitatione consistit, deliquium quoddam patitur. Mors, quæ venenum assumptum sequitur, ab extincta vi motrice cordis oritur, dum illud vel narcotico quodam vapore hanc supprimit, vel ob vehementiam spasmodum, cor quassantem fluidum, quod motum prestat, penitus dissipatur, ut ex toto desinat systole.

§. XXXVII.

Lubet vero sigillatim damna certarum partium ex atonia exponere. Græves illi cerebri morbi, stupor, sopor, torpor, continua ad somnum propensio sensuum, memoriæ & ingenii abolitio, vix gigni possunt, nisi sub magna atonia, & imbecillitate ac systole perperita duræ matris, nervorum & membranarum nervosarum, si nempe fluido summæ activitatis, tenuissimo, & purissimo, quod veteres spiritum animale vocant, variis de causis destituuntur. Gutta serena, sive plenaria visus obscuratio, salvo oculo, nihil aliud quam nervi optici paralyfin indicat. Sique hi nervi a vicina carotide, sanguine distenta, paulo arcuati comprimuntur, vertigo fit, quæ tamen etiam a spasmus nonnunquam suam petit originem. Solutio penitus nervorum acusticorum vigore, quod vel a nimia ibi exundante humiditate, aut ocellalescentia fit, surditas est. Molestus ille aurium tinnitus, qui in interiori aure, intra tympanum & tubam Eustachianam, continetur, a nimia humiditate membranarum, quæ osses has partes cingunt, demum in vapores resoluta, producit. Nervus linguales, uti spasmus contracti ita etiam paralyfi resoluti, loquelam auferunt. Nimirum relaxatæ ab incumbente

Syncope

Animi deliquium

Græves cerebri morbi

Gutta serena

Vertigo

Surditas

Abdomen

Cholera diarrhoea

Rustuum

Abortus, sive partus

Atonia, seu debilitas

Mors ipsa

*Odor le
& de
glutino
nis vi
cia,
Catar
rhus
suffoca
tiones.*
bente sero tunica nervosæ, quæ ossa
narium squamosa involvunt, quod fre
quentius fit in coryza, odoris sensum
auferunt. Nimia musculorum pha
ryngis laxitas efficit, ut difficulter ore
ingesta deglutiuntur, quod etiam fit,
si tunica nervæ œsophagi, ab humore
pituitoso nimium relaxata fuerit.
Nervorum pneumonicorum, & qui
ad bronchia porriguntur paralysis,
spiritum intercipit & catarrhum sic
dictum suffocativum infert.

§. XXXVIII.

*Paill
quart
ant &
tati si
moru
affluat*
Imprimis nimia tunicarum nervae
rum ventriculi atonie gravi detrimen
to corpus maectat; quippe hac præsen
te, ingesta non tantum gravativo do
lore epigastri regionem premunt, ve
rum etiam diutius ibi hærentia & mo
ra corrupta, stomachi inflationem &
anorexiam causantur. Idem evenit,
si a tono suo admodum dejectum est
intestinum duodenum, quod alter &
succenturiatus quasi secundum no
stram sententiam ventriculus & alte
ra chyli officina; quandoquidem hu
mores ex ventriculo appelli, moram
in ejus cavo nectentes, si in corru
ptionem abeunt, multorum morbo
rum causam præbent, adeo ut sedes
ac seminarium fiat multarum ægritu
tudinum. Labefactatus quoque peri
stalticus intestinorum reliquorum mo
tus, flatulentias, borborygmos, mur
mura ac sonitus in ventre parit, qui
si in acuto & periculoso morbo com
parent, lethalis internæ sphacelatio
nis indicium præbent. Sphincteris
qui vesicam & anum claudit paralyti
ca resolutio, involuntarium urinæ &
secum secessum affert, atque in mor
bis robur virium naturæ exsolutum
subindicat. Laxata nimis atque re
missa tubulosa cutis secretoria compa
ges, magnam imbecillitatem prædit,
ac ut sudores frigidi, vel plane colli
quativi, manent, efficit.

§. XXXIX.

*De mor
bis an
atonia
la pul
monibus*
Nobiliora porro viscera robore de
bito orbatæ, variis & pernicialibus
morbis ortum præbent. Sic pulmones

infirmati, copioso humorum affluxui
& collectioni patent, unde tussis hu
mida & copiosa, vel etiam asthma sic
dictum pituitosum, quin sic alleclus
salforum & acrium humorum decu
bitus, ad abscessus, exulcerationes,
vomicas ipsiusque pathisici mali ge
nerationem quam facile disponit. Ho
patis & lienis viscus, propter vim mo
tricem tonicam amissam, humorum
insarctibus, vasorum obstructionsibus,
indurationibus quoque & scirrhefen
tiis obnoxium est, & hinc diræ illæ
chronicæ passionēs, iæterus niger &
flavus, cachexia, scorbutus, hydrops,
incunabula trahunt. Ipsa vasa sangui
fera, præsertim arteriosa, robore
haud raro exuuntur, ut languente eo
rundem motu, sanguis difficulter cur
sum conficiat, spilletur, passim in
alveis stagnet minimosque obstruat,
& sic signatur sic dicta plethora ad vi
res, secunda morborum matrix, quæ
frequentissime causam constituit mor
bificam in corporibus imbecillis ab al
io morbo brevi liberatis.

§. XL.

Et quum nullum viscus in univer
so corpore ægrius per copiosissima va
sa sanguinem transmittat, simulque
ad dejectionem toni ac roboris & hinc
oriendam humorum stagnationem ac
tumorum generationem, tam procli
ve sit, quam hepatis & in feminis ute
rus: grave utique & frequens da
mnum ex iis imminet. Nimirum ad
vehit ad hepatis sanguinem vena sic
dicta portæ, quæ, si robur obtusum
est, minus expedite ac promte sangui
nem per hoc mere vasculosum viscus
trajicere & propellere valet, sed cruor
regurgitat ad illas partes illaque vi
scera, quibus vena hæc propaginet
suas inserit, stomachum puto, omen
tum, pancreas, lienem ac totum in
testinorum volumen, & propter sta
ses atque stagnationes, parit ibi dolo
res, spasmos, flatus, obstructions,
indurationes, corruptiones, absces
sus, hæmorrhagias, aliasque timoris
& periculi plenas passionēs. Uterus
vero

vero mille ærumnarum, juxta *Hippocratem*, mulieribus auctor, si copiosissimi tortuoso ductu per ejus compagem discurrentes canales, ob remissum robur sanguini trudendo non sufficiunt, is pariter relabitur ad vasa hypogastrica arteriosa & ad viscera abdominis reliqua, unde non secus ac in nobiliori sexu pathemata sic dicta spasmodico-hypochondriaca, in feminis hysterica dicta, suboriuntur. Ipsa quoque uteri vasculosa substantia, stagnante sero ac sanguine facta, immodicum mensium aut feri mucidi profluvium, abortum & sterilitatem, tumore ingentis magnitudinis, carcinomata, quia in ipso cavo, varias concretiones carneas, quæ molarum nomine notæ, contrahit.

§. XLI.

In re-
nibus,

In tubuloso renum colatorio, debito robore desituto, serum a sanguine effuse secedit & diabetes pascitur, quæ plus urinx redditur, quam liquidum assumtum. Ex eodem etiam fonte, destructo nempe renum tono, calculi renalis petenda est generatio. Quod si enim transitus sanguinis per vasa emulgentia languida tarde & difficulter succedit, retardatur simul excretio urinosi liquoris, qui in tubulis urinaris prope peivim subsistens, dimittit crassam, tartaream & mucidam materiam, successive in calculos concre-
Et ves-
centem. Pariter si vesica enervis, vi, ut ita loquar, expultrice privata, urinam non reddit, hæc retenta, mora illa crassum ponit ac mucidum sedimentum, quod sensim solidescens, calculo generando ansam præbet. Insuper hebetata vesicularum & vasorum seminalium contractilitas, in causa est, ut lymphaticus & seminalis liquor copiosius in loculis colligatur, ac demum nimium congestus per pollutionem nocturnam, immo ipsam benignam gonorrhœam, sponte exsillet.

Passi-
femina-
libus,In mē-
branis
spina-
lis mē-
delle.

§. XLII.

Denique etiam membranæ & nervi spinalis medullæ, variis de causis sæpe penitus a tono ac robore dejiciun-

tur, quod. si in uno latere accidit, hemiplegia, sive paralyxis sit, dextræ, vel sinistræ lateris, sub qua sensu & motu orbantur partes lateris, ad quas nervi ex spina feruntur. Si autem non in ipsa spinali medulla, sed extra eam discurrentes nervi ac membranæ nervosæ artuum, v. c. brachiorum & pedum, obtunduntur, motus affectus partis remanente quodammodo sensatione, exspirat, & affectus vocari solet paretis.

§. XLIII.

Quum itaque omnes omnino morbi ad motus, nimium vel intensos, vel debiles atq; remissos, ortum referant, ita quidem, ut hi chronicæ & rebelles, illi autem acutæ & celeres magis passiones invehant; quæstio nunc disquisitione haud indigna incidit: spasmi, an atonia partium sit deterior & negotio vitali magis insensa? Nos ingenue & libere profiteamur, atoniam esse pejoris indolis ad lanitatem cum vita subruendam, quam spasmum. Nam licet ipse spasmus atrox dolores, ingentes molestias atque anxietates pariat; sapius tamen per accidens utilissimum effectum præstat, dum motu solidorum & fluidorum aucto, causæ morbificæ, ex qua ipse pullulat, submovendæ infervit, stases, stagnationes & infarctus dissolvendo, & humores vitiosos, temperie & quantitate peccantes, exturbando, ut hoc lacto, morbus ipse feliciter solvatur atque discedat. Deinde longe facilius est, motus excedentes impetuosos componere ac sedare, quàm deficientes plane revocare & excitare; quandoquidem atoniæ ea est ratio, ut exhaustis naturæ viribus, sanguine nempe & succo nerveo consumptis, subnascatur, quorum jactura non tam prompte resarcienda. Debilitas quoque sive vis motricis in partibus languor, causa plerumque est sanguinis in certo loco congectionis, stasis, stagnationis, corruptionis, immo vicerum infarctus, e quibus postea, ceu proximis causis, febres, spasmi & præternaturales motus succrescunt, vel denuo

Atonia
Spas-
mo de-
terior:

denuo repetunt ac recidunt. Neque etiam ullus morbus ullumq; symptoma gignitur, nisi præcedat eximia generis nervosi infirmitas; aut nobiliorum partium atonia, sive hæc in ventriculo, intestinis, systemate vasorum meseraicorum, membranis cerebri aut medullæ spinalis, sive etiam ipsi excretoriis, consistat; quo etiam fit, ut roborantia & balsamica medicamina, languidam partium facultatem rescillantia, ad morbos arcendos efficacissima sint præsidia.

§. XLIV.

Porro, qui motus microcosmicos eorumq; indolem attentius expendit, compertum habet, spasmodum, qui truculenter in morbis torquet & exagitat corporis partes, in iisdem semper motus impotentiam, sive imbecillitatem, relinquere, & hanc plerumque causam esse repetentis denuo paroxysmi. Atroces dolores excipit demum partium affectarum intumescencia, inflammationem acutam, sphacelatio, quæ summus atoniæ gradus. Vehementem illam in febrium insultibus externarum partium stricturam; in declinatione magna cutis relaxatio cum sudore copiosq; sequitur, æstum antea intentum, cutis refrigeratio, pulsus celerum ac durum, die vacuo tardus ac molliter undulans. Convulsivi truculenti motus, artibus quos exagitarunt, ingentem post imbecillitatem atque languorem conciliant. Ipse quoque observavi, post vomitiones & dejectiones alvi creberrimas, immo validiorem purgantium operationem, alvum claudii & ventriculi atque intestinorum robur mirum atteri, quod potissimum ubi flatuum proventus testatur. Ut adeo perpetua hæc sit microcosmica lex, in pathologicis studiose inprimis observanda: quod spasmus relinquit atoniam, & atonia vicissim spasmi ingignendis veliscitur.

§. XLV.

Monendum tamen est, quod tam imbecillitas, quæ auctore *Celso*, omni-

bus morbis patet, quam ipse spasmus, certis etatibus, ratione partium quas afficit, certis quoque ratione stricturæ corporibus, magis vel minus foletis atque familiaris sit. Enimvero historia medica experientiæ innixa testatur: atoniam & infirmitatem capicis & quæ ad illud pertinent partium, infantibus & pueris esse frequentissimam, ac inde veram morborum, quæ teneriorem ætatem infestant & capiti plerumque incumbunt, derivandam esse originem. Hanc enim sæpius achoribus, tinea capitis, aurium & oculorum defluxionibus, glandularum tumotibus, coryza, natium stillicidiis, sanguinolentis & mucosis epilepsia quoque corripit, res est inter omnes notissima. Currente juvenili & prima virili ætate, spasmodicæ stricturæ in præcordiis ac pectore, in universum quoque motus solidorum & fluidorum intensiores, frequentius conspiciuntur. Hinc enim est, quod juvenes ac viri ad inflammationes pulmonum, pleuritidem veram ac spuriam, peripneumoniam, hæmoptysin, phthisin, hecticam, asthma, inflationes ventriculi & affectum hypochondriacum, qui in præcordiis maxime sedem obtinet, immo ad febres ardentes biliosas, tertianas & continuas, admodum sint proclives & crebrius iisdem tenentur. In adultioribus tandem, debilitas & atonia inferiores inimo ventre sitas partes magis corripit. Et hanc ob causam etate ingravescente, morbi, qui in abdomine sedem & originem habent, quam maxime affligunt, quorum in numero sunt renum & vesicæ calculus, colica, diarrhæa, cachexia, hydrops, scorbutus, micus cruentus, fluxus hæmorrhoidum nimius, tumores pedum oedematosi, atrophia, anorexia & stranguria, infesta senibus pathemata.

§. XLVI.

Et hisce autem omnibus uberius hætenus excussis, perquam dilucide apparere arbitror: quod solus spasmus & simplex atonia, æquabilem, libe-

De
mobis
atoniæ
ex hoc
fonte
derivandi

Omnes
igitur
morbi
sunt
generis
nervosi
affectiones

rum

Spasmi
autem
atoniæ
hæc illi
lex, lan-
guis

rum ac proportionatum sanguinis. omnisque generis fluidorum motum, quo excretionum successus & integritas functionum animi & corporis proximè nititur, turbando ac pervertendo, universam vitalem œconomiam subruant ac destruant, quod hinc universa pathologia longe rectius atque facilius ex vitio motuum microcosmicorum in solidis, quam ex variis affectionibus vitioforum humorum, deduci atque explicari possit, adeoque omnis generis aggritudines internæ, ad præternaturales generis nervosi affectiones sint referendæ. Etenim læsis quocunque modo vel nervis per corpus discurrentibus, vel membranosis quibusvis ac nervosis partibus, illico motuum anomalix, modo leviores, modo graviores subsequuntur. Deinde attendenda observatio docet, motus quovis morbosus, principaliter sedem figere, & tyrannidem exercere in nervosis corporis partibus, cujus generis præter omnes canales, qui systaltico & diastaltico motu pollentes, contentos succos trudent, universum nimirum intestinorum & ventriculi ab œsophago ad anum canalem, totum systema vasorum arteriosorum, ductuum biliariorum, salivarium, urinariorum, & subcutaneorum, sunt quoque membranæ nerveo-musculares cerebri & medullæ spinalis, præsertim hæc, quæ dura mater vocatur, organis sensoriis obductæ, nec non tunicæ illæ ac ligamenta, quæ ossa cingunt artusque firmant. Nam nullus dolor, nulla inflammatio, nullus spasmus, nulla motus & sensus impotentia, nulla febris, aut humoris ullius excretio accidit, in qua non hæ partes patiantur. Porro etiam omnes, quæ morbos gignunt causæ, operationem suam potissimum perficiunt in partes motu & sensu præditas, & canales ex his commentatos, eorum motum, & cum hoc fluidorum cursum, pervertendo; ita tamen, ut sicuti varix indolisunt, sic etiam varix in nerveas partes agant. iisdemque noxam affri-

cent. Demum omnia quoque eximie virtutis medicamenta, non tam in partes fluidas, earum crasin ad interperiem corrigendo, quam potius solidas & nervosas, earundem motus alterando ac moderando, suam edunt operationem: de quibus tamen omnibus, in vulgari usque eo recepta morborum doctrina, altum est silentium.

CAPUT V.

De Consensu Partium Nervosarum generatim & sigillatim cum ventriculo, præcipua passionum. & symptomatum origine.

§. I.

OMnis generis morbos & præternaturales motus ad duo genera, <sup>Trastanti-
ratio.</sup> ipsalium nempe & atoniam, referri posse, & generis nervosi maxime esse affectiones, superiori capite succincte & distincte docuimus: jam sequitur, ut consensum, sive potius mutuam illam conspirationem & communicationem motuum vitioforum, quam partes nervosæ, motu ac sensu exquisito gaudentes, inter se alunt, tradamus, ac in primis quam singularis ventriculo, cum nervosis universi corporis partibus, sympathia intercedat, edisseramus; exposituri simul, quod non modo omnes quæ motus præternaturales cient causæ; sed & medicamenta, proxime nervosas partes, & maxime ventriculum committentis, virtute sua ac operatione afficiant. Et hac demum ratione fiet, ut genealogia multarum passionum & symptomatum in morbis, quæ eo usque abstrusa admodum atque incognita fuit, ipsorum quoque remedium effectus ac operandi modus, clarius innotescant & perscrutantur.

§. II.

Videlicet: corpus nostrum esse machinam, & artificio & usu omnibus aliis, quæ ab humana arte proficisci possunt, longe superiorem & perfectiorem, dudum quidem sagacissimi <sup>Partes
in corpore
tanquam
machina
natura</sup> Mc.

Medicorum agnoverunt; non tamen facile firmius ad idem demonstrandum suppetit argumentum, quam exquisita illa mutua connexio & coordinatio, inque eundem finem conspiratio partium, quæ undiquaque in universa compage conspicitur. Hinc etiam est, quod unus partem vitium, aut lesio, mox, ob arctum hunc nexum, in alia transeat, ut inde omnes machinæ motus inordinari fiant, vel sensibilem turbationem patiantur: haud secus ac videmus, laxo ab unico rotulæ dente in machinis artificialibus, protinus earum motus inde reddi inordinatos.

§. III.

*In partem
structuram
motum* Sicuti vero omnis machina tantummodo cum in finem constructa est, ut ex sua structura convenientes edat motus: ita animadvertisimos, corporis nostri structuram, maxime esse hydraulicam & vasculosam, quo fluida diversis generis jugi & continuo motu, vi & potentia morrice, non modo cordis atque arteriarum, expansiva, & contractoria, sed & aliorum ductuum secretoriorum & excretoriorum, per diversissimæ amplitudinis tubulos circulari in orbem motu ferantur & variegatim indolis humores, pro diametro & directione canalium, & fecernantur, & excernantur. Animadvertimus porro machinam corporis nostri ex meris fibris ac membranis nervosis elasticis, contractilibus & expansilibus, esse contextam, atque in iis ipse motus quosdam tensivos, tremulos, oscillatorios celebrari, qui tam motibus vitalibus secundandis, quam ad differendam materiam principio, quod in animantibus est, sentiendi ac percipiendi, servantur. Et quia præterea totum systema nervorum & membranarum coheret ac misce inter se conexum est, non aliter fit, quam in chordis tentis, ut fibrilla una pulsa, altera quoque moveatur, in quo quidem tantua illa conspiratio fibrarum & membranarum, qua motus vitiosos & præternaturales invicem com-

municant, constituit. §. IV.

Atque hæc harmonia ac sympathia partium nervosarum, maximi momenti & usus est in pathologicis, adeo, ut sine ejusdem accurata notitia, plurima, quæ in morbis accidunt symptomata, quomodo producantur, vix ac ne vix quidem explicari possit. Quapropter merito doleadam esse arbitror, quod hæc doctrina in libris medicis hucusque partim minus recte pertractata, partim etiam penitus neglecta & prætermissa sit. Opera hinc pretium urique fore duco, si tam utile argumentum pervestigatus paulo & subtilius in præsentis disquisitione agitem atque expendam. Prius vero quam id exsequar, ante omnia in genere tenendum est: quod partes nervoso membranaceæ, inter quas ejusmodi consensus quam maxime viget, sint primo membranæ cerebri & spinalis medullæ, deinde membranæ nervæ, quæ organa sensuum, oculos, aures, nares, ora & fauces interiorius investiant, ac porro membranæ, quæ ovis generis ossa succingunt, caput, dentes, articulos ipsosque musculos. Tum quoque totus iste canal, qui a pharynge ad anum usque elongatur, ac oesophagus, ventriculus totumque intestinorum volumen constitit, & mere nervosus ac membranaceus, est, conspectus consentit. Idem præterea consensus in universo systemate ductuum biliariorum, urinariorum cum vesica, & qui glandulas constituunt ac ex iisdem liquorem secretum devehunt, & denique in ipsa cute, quæ ex meris fibris tendinosis & nervis contexta est, per ordinem corporis ambitum, observatur atque succedit. Omnium itaque & singularum harum partium mira invicem est connexio, conspiratio, sympathia & motuum quoque ac lesionum communicatio, quando a causa quadam violenta, sive subtiliori, sive crassiori gravius afficiuntur.

§. V.

Quemadmodum vero nobiles hæc par-

*Totius
symp-
tomæ
essentia*

*Omne
symp-
tomæ*

*Et
necesse
est*

branofas. Simul acenim hæc a cauffa quadam vehementer commoventur, concutiuntur, vel ostenduntur, aut comprimuntur, lancinantur, pun- guntur & trahuntur, protinus ratio- ne fenfus dolor, ratione motus contra- ctio, crispatura, strictura & partium vicinarum, præfertim vaforum, com- preffio præfto eft: unde magis in cir- cuitu sanguinis & humorum æquali turbatæ atque anomalæ exoriuntur.

§. VIII.

Sed perverfa & minus rationalis cogitatio & impreffio, quæ sub animi quodam impetu fit, quæ & directe & proxime nervofas invadit partes, in- gentes turbas in tota æconomia mo- tuum vitalium & animalium excitat. Sciendum autem eft, vim perverfæ cogitationis & impreffionis nihil quidem corporei effe; attamen, fimulac inhiit in corpus & nervofas partes præter naturam exagitat, meros effe- ctus corporeos, videlicet vel partium vehementem stricturam, contra ctio- nem, aut earum refolutionem, laxi- tatem & flacciditatem producit. Qua- re etiam ea remedia, quæ fpasmodice contractos nervos molliunt, leniunt & efferos motus fedant, perquam felici- ter acerbis illis fymptomatibus, quæ animi impetuofo quidam motus concitat, opponuntur. Eum vero in finem hæc adduximus, ut addifcamus, ab animi motu, seu ideali atq; incorpo- reo tantum actu, univerfum genus ner- vorum ita affici & commoveri poffe, ut omnium partium munera inde la- bem contrahant & periclitentur.

§. IX.

Deinceps quanta læfio & pernici- toti corpori accedat ex gravi percuffio- ne capitis & cerebri, ac principii ner- vorum inde facta fola commotione, falva partium internarum textura, fenfum abolitio cum corporis lapfu in terram, naufea, vomitus, omnium virium fimul & femel facta convulfio, fatis abundeque declarant. Et quod magis mirandum eft, fola commotio- ne corporis & capitis externa, in fano

homine, confeftim acerba fymptoma- ta produci poffunt, cujus rei exem- plum navigationis infueti præbenr, quos navi maris fluctibus jactata, vel in gyrum circumacta, vertigo, naufea, e- normis vomitus, cum fumma anxietate, pallor faciei, virium languor, appeti- tus proftitatio, fatis misere excruciare folent, quæ morborum ærumnæ vix ul- lam aliam agnofcunt cauffam, quam quod nervorum in capite principium in folito motu agitur & commovea- tur.

§. X.

Igitur minime molis sæpius materia & leviffima cauffa, modo in nervofis partibus in folentem quandam motio- nem vel agitationem excitare poffit, magnis præter naturam motibus pro- vocandis apta eft. Fumus tabaci, et- iam non adeo magna quantitate ore hauftus, quas novæ ingentes anxietates cum fudore frigido, faciei pallo- re, vomitione, naufea ad animi fere uf- que defectionem, in infuetis producit. Effluvia fupendæ quamquam funt ex- igitatis, quæ ex fuaveolentibus, molcho, zibetho & floribus jafmini exhalant; attamen tanta efficacia pol- lent, ut feminam, cujus nervi enormi- bus anomalis contractionibus affueti funt, id eft, quæ fecundum veterum loquendi modum fenfibiliffimæ eft in- dolis, vehementiffime affligant, syn- copen inferendo, ufum vitæ ad tempus fuspendant, corpus humi profternant, vel graves anxias & fuffocatorias pe- ctoris oppreffiones & fpirandi anguf- tias concitent, quæ afpectu horrenda fymptomata, fetido naribus admoto vapore, ex tempore & miraculi inftar fifti poffunt, eam videlicet ob ratio- nem, quod exhalationes tenuiffimæ fuphureæ, intimæ ad nervofas partes fiant admiſſionis, & contrarium fuaveolentibus effectum, nempe fedati- vum, in iis exerant. Extenim quando vapor, odore per nares fufceptus, ner- vorum ramulos, ex quinta conjuga- tione prodeuntes, præter naturam af- ficir, protinus hujus in foliti motus communicatio, mediante pari inter-

Hinc facile afficitur ab animi parte.

At commotio interna ut externa.

Atque molis materiæ.

costali & octavo, transit ad fauces atq; ventriculū, cor & pulmones, unde horum symptomatum ratio petenda est.

§. XI.

Alusq; Simili ratione quando subtilissima caustica materia, live venenata, in cute laxiata nerveg fibrillę interius tanguntur, quod fit, si cum punctura vel mortu virus sese altius insinuat, in morsu viperę, scorpionum, canis rabidi, vel instrumeto, succo hellebori albi, oleo tabaci, aut linimento, quod arsenicum ingreditur, imbuo, in quas non horribiles universum systema nervorum commotiones & spasticas stricuras conjicitur? unde acerbissimorum, maxima ex parte l thalium symptomatum, origo. Febris enim, syncope, sudor frigidus, faciei pallor, vomitus, nausea, flavus color faciei, artuum convulsio, mentis emotio, alvi pertinax restrictio, urinę suppressio, summa anxietas, inquietudo, spirandi angustia, non nisi affectus sunt præter naturam & supra modum generis nervosi commoti, quibus gravissimis & funelli certo effectus afflictionibus, non alia ratione, nili mature, & statim interitua, antequam motuum vitalium œconomia prorsus destructa fuerit, medicina, eaque specifica, succurre licet. Nam, si unquam tantopere a Medicis collaudata specifica locum inveniunt; certe tunc opem conferunt præstantissimam, ubi genus nervosum ex minima, virulenta tamen causa, in pessimis vitæ inimicos motus & contractiones abreptum fuerit; si videlicet contrarię indolis materia, eas maturiori exhibitione cita ope compellunt. Quam gravia & funesta symptomata post medicamentorum lepticorum, ut est arsenicum, factam partibus tendinosis & nerveis exterius tantum applicationem sequantur, legi meretur *obferv 80. Cent. 6. Hildani*, qui refert: virum robustum, qui tumore carcoso laboravit & cui Chirurgus pulverem ex arsenico applicuit, mox in dolorem vehementem, vigiliam,

febrem ardentem, & continuum cibis fastidium ac vomitum incidisse, & tandem delirio, & syncope exorta, intra paucos dies mortuum esse.

§. XII.

Multo magis a solido, & rigido corpore, quodcumque nervi portio læditur, acerbis & gravia in toto corpore visuntur symptomata. Ita tenuissima acu vel lanceola, ex purissimo chalybe confecta, quando in ferienda vena improvide leditur substratus nervus vel tendo, in corpore etiam exquisitè sano, dolor, tumor durus, partis inflammatio, cum horrore, febre, vigilia, & quandoque, nisi cito succurramus, spliacelus & mors consequitur. Qualia trista exempla complura sæpius, non sine dolore, in praxi conspiciuntur. Neque tantum Chirurgi, qui læsionem inferendo primam occasione malis subministrant, sed & ipsi maxime Medici, qui progredienti malo commoda medicina, quæ tantummodo in principio in unico emolliente consistit, non satis dextre & mature occurrunt, inculpandi sunt. Anni jam aliquot exacti sunt, ubi juvenis, medicinę culturę addictus, subito febre, cum siti, vigilia, summa anxietate levique delirio corripiebatur; quæ quum per sex dies durasset, in consilium vocor, inquisivi in causam, edixit: bene se sanum & valentem fuisse, simulac vero cuspis cultelli scriptorū, de mensa forte delapsi, incididerit in dorsum pedis, ingentem dolorem ibi fuisse excitatum, & ab eo tempore graviter se laborasse. Locus affectus erat durus, tumidus & bruni coloris: applicuimus cataplasma emolliens ex floribus emollientibus, croco etiam in lacte decocto, insuper dedimus emulsiones papaveraceas, cum pulveribus bezoardicis, quo facto, mox omnia symptomata interitum minitancia ex toto conquieverunt. Quam infeliciter pedum clavi, in senio præsertim confectis & scorbuticis cor-

Magis commoventur nervi a crassioribus materiis.

Ut p. h. Alia tendunt.

Clavo exciso.

poribus, non raro exciduntur, tristissimis exemplis ac huiusmodi indices se-
re edocemur. Tendinibus enim cum
superfedeant clavi; hinc quo altius a-
dignatur cultelli cuspis, eo facilius fit,
ut tendo subjectus pungatur, unde ex-
citialis, ob sphacelum exorientem, cor-
poris ruina pendet. Spinæ vel levis fe-
licia membranosis, vel tendinosis lo-
cis altius, v.g. infra ungues imixta, bre-
vi etiam in sano homine, similis gene-
ris symptomata, dolorem, tumorem,
ruborem, partis pulsationem & febrē,
cum siti & vigilia parit. *Hildan. Gent.*
5. obs. 2. complura exempla proponit,
ubi a punctura sping in pede vel in di-
gito manus facta, dolor maximus, in-
flammati febris, delirium & sphace-
lus obortus fuit. Non ita pridem a cau-
stico, ad excitandum fonticulum, in lo-
co incongruo improvide posito, in ho-
noratori femina ingentem totius bra-
chii tumorem doloremque usque ad
humeros & pectus pertingentem, cum
febricula notavimus; ubi tamen mox
externis & internis convenientibus
auxiliis, divina sub Numinis gratia,
suppetias tulimus. Quod vero sphace-
lus, in primis in extrema ætate & leor-
butico corpore, tam facile nervosis
partibus, præsertim extremis membra-
nis insideat, sed non tantum propter
nervorum lesionem fit, verum quod
exinde membranæ nervæ constri-
ngantur, & interpositis numerosis venis
& arteriis sanguis immotus detinea-
tur, quin sphacelofam corruptionem
quam facile ruit.

§. XIII.

Quam gravis ex punctura vespæ-
tum, præsertim in locis membranosis
& tendinosis, ut sunt carpi manuum
& temporis capitis, junctura artuum, pa-
thematibus laborantibus, compluribus ob-
servationibus, hinc inde in Medicorum
clarilunorum monumentis annotatis,
edocemur. Inter has notabilis est ea,
quam in medium producit *Hildanur*
obs. 87. Gent. 4. ubi femina a vespa pun-
ctionem circa carpum sinistram acce-
pit, & protinus ingens dolor in loco at-

fecto, cum lipothymia, exortus est, qui
ab initio manum quidem & carpum
solum occupavit, mox tamen per to-
tum corpus expansus, acerbior factus
est, quin eodem die etiam vesicæ, sero-
so & pellucido humore repletæ, efflo-
ruerunt; convulsi tamen, inunctio-
ne facta ex oleo scorpionum. Et *obs.*
ervatione 80. l.c. refert, juvenem robu-
tum & plethoricum, a vespa in dex-
trum faciei latus, haud procul a mino-
ri cantho oculi, punctum fuisse, ubi in-
gens dolor & inflammatio cum gan-
græna faciei sequuta est. Idem laudatus
auctor *Gent. 5. obs. 2. 5.* refert historiam
puellæ, cui Empyricus liquorem in au-
res instillavit, incredibili dolore postea,
febre, vigilia & dolore subsequen-
tibus. Et *Gent. 1. obs. 4.* memorat exem-
plum puellæ, cui in concavum auris
globulus vitreus instil pili illapsus est,
quo facto, mira symptomata successerunt,
tota pars illa capitis usque ad futu-
ram nocte dieque doluit, accesserunt et-
iam sinistro brachio stupores usque ad
digitos, pollicem & indicem, progre-
dientes ad lumbos usque, tibiæ & pe-
dem, tussicula sicca assidua affuit, men-
strua suppressa sunt, accesserunt epilep-
ticæ convulsiones & ipsum brachium
in atrophiam incidit, quæ cuncta acerb-
ia pathematibus, scilicet extracto glo-
bulo, simul & semel conquieverunt.
Hæ adductæ observationes satis abunde
que id confirmant, lesiones nervo-
sarum partium, quæcunque & ex qua-
cunque etiam causa exortæ fuerint,
propter communicationem, quam
nervorum propagines inter se habent,
mixtæ functiones partium etiam
dilitarum ledere, & conturbare
posse.

§. XIV.

Quod quidem quemadmodum in
lesionibus partium nervosarum ex-
ternarum in propatulo est; ita idem
gravius affectis internis exquisitè
sentientibus partibus contingit, ut
plane mirandum sit, quam horren-
da symptomata exinde subsequi so-
leant. Inique de hac de re exem-
plum

Allic-
que Je-
nibus
causis.

Et in
de an-
tu-
syste-
ma
passim.

Ensd
in solis
sunt in
terna
nervos
partes.

plum prodidit idem laudatus *Hildanus Cent. 1. obs. 34.* ubi aciculam grandiusculam forte quæpiam deglutivit, ex quo non ita multo post in fundo ventriculi & post pylorum exortus est tam intolerabilis dolor, ut dies noctesque exclamare & ululare coacta fuerit. Sexto die a morbo phrenitica facta est, cum ardentissima febre, lingua arida, vultu inflammato, ut neminem agnosceret, nec cibum nec potum expulseret. Convulsiones colli, brachiorum & eruzum maximæ, & horrendæ aderant. Aliquando sese ex una in alteram partem lecti tali impetu proiebat, ut tres viri, quantumvis robusti, vix illam tenere possent, mox tanquam semimortua jacebat, vultus tamen & repente priora symptomata revertebantur. Huic tamen graviter afflicto, *Hildanus*, optimo consilio, nihil nisi oleofo & juscula præcepit. Et quum aciculam tandem egresset, pristina sanitati paullo post restituta est.

§. XV.

Ut ut vero consensus & mutua motuum communicatio inter omnis generis partes, quæ nervosæ sunt texturæ ipsisque nervis dotantur, perpetua sit, ac in primis in acutis passionibus elucescat; attamen nulla pars in universo corpore est, quæ tam conspicuam ac intimam cum omnibus & singulis nervosis corporis locis & organis harmoniam ac sympathiam alat, quam ipse ventriculus, adeo, ut si ulla pars, quæ exquisitæ sensationis est, etiam longius distita præter naturam afficiatur ac moveatur, statim etiam stomachus inde luat & compatiatur. Inde etiam patet ratio, quare in omnibus fere morbis, actio ventriculi, quæ vera est systematica, videlicet appetentia, digestio, chylicatio, vacillet, ac attentæ observatio medico-practica doceat, quod ventriculo male habente, vel gravius læso, a quacunque etiam causa id fiat, protinus universum

nervosarum partium systema inde offendatur quo procul dubio permotus fuit acutissimus ille *Helmanthus*, ut animæ sensitivæ sedem in ventriculo collocaverit. Et profecto res est maximi momenti & subtilioris indaginis, quod nonnulli, percussio fortius pugno vel duro alio instrumento, exterius cordis scrobiculo, sub quo pylorus reconditur, citò ac imperato perierint, inventa post mortem nulla læsionis mortiferæ nota, sed ex macula tantum ex flavo rubra, circa extremitatem diaphragmatis & inferiorem ventriculi partem, quales casus, ambigentibus de lethali-tate Medici, aliquoties ordinis nostro ad decidendum oblati.

§. XVI.

Nihil verò clarius, & manifestius ventriculi eum omnibus corporis nervosis ac sensibilibus partibus conspirationem demonstrat, quam actio veneni, e vegetabilium, vel mineralium censu desumpti, spiculis acerrimis, causticis, tenuissimis ventriculi & intestinorum tunicas nerveas intime penetrantis, lancinantis ac arrodentis, cujus generis maxime sunt arsenicum, & quæ ex mercurio ac regulina antimoniæ substantia prodeunt corrosiva, eicuta aquarica, fungorum varia genera, ipsa quoque purgantia, quæ non alio modo necant, quam per fortissimas spasticas universi generis nervosi contractiones. Inde enim cardialgia, inanis vomendi conatus, singultus, præcordiorum anxietas, spirandi angustia, restrictio diaphragmatis, linguæ ac faucium ariditas, sitis inexhausta, alvi suppressio, flatuum retentio, diarrhæa torminosa, perpetuus ad urinam emittendam stimulus, extremorum refrigeratio, sudor frigidus, facies sic dicta Hippocratica, artuum tremor, pulsus intermittens & suppressus, delirium, animi deliquium, epilepsia, convulsio, iniqua corporis agitatio, quæ ordinata sunt veneni assumti symptomata, atque ab actione tunicarum ventriculi sunt. Er

In primis
motus
nervosus
quæpiam
deglutivit
ex quo non
ita multo
post in
fundo
ventriculi
& post
pylorum
exortus
est tam
intolerabilis
dolor

Quod
est
manifestius
ventriculi
eum omnibus
corporis
nervosis
ac sensibilibus
partibus
conspirationem
demonstrat

Et tamen in iis, qui veneno corrosivo necantur, ventriculi & intestinorum inflammatio ac sphacelatio semper post mortem conspicitur, hæc tamen neuiquam tantorum symptomatum, & tam celeris mortis causa est, sed potius horrendi illi per totum genus nervosum propagati spasmi, quorum consequens in intestinis & ventriculo consistens inflammatio est, feralem vitæ catastropham inferunt. Nam spasmus veluti forti vinculo contractis ventriculis venis & arteriis, sanguis immotus hæret, regredi nescit inque corruptionem transit. Ex quo jam facile intelligi potest, quare non præsentius & certius adversus corrosiva venenafit præsidium, quam in copioso lactis, oleosorum atque emollientium usu, quæ non modo ob id mortem avertunt quod tenuissima veneni spicula abundant, atque contextu suo oleoso viscoso involvant, sed & quia ad constrictas nervosas partes relaxandas, vix ul-
lus melius quam in hisce est auxilium. De quibus autem omnibus meretur certe evolvi *Vesperis*, Medicorum, & Anatomicorum peritissimi, doctissimus libellus de *cicuta aquatica*, qui varia experimenta cum venenis, emeticis, & purgantibus, animantibus eadem ingerendo, instituit, & quæ eassequeuta sunt symptomata, nec non internas quæ post mortemprehendit læsiones, curate notavit & consignavit.

§. XVII.

Ipse mercurialis, sicuti dextre præparata & prudenter adhibita, usus sunt longe præstantissimi; ita vicissim minus recte parata & præposita exigua etiam dosi propinata, universum corpus gravissimo damno afficiunt. Memini præ aliis, Chymicum quendam Empiricum ante aliquot annos jactitasse, se incompa-
rabilem adversus podagram possidere medicinam, tam præstantem virtutis, ut tribus tantum granis, ter-
tia quavis hora assumtis omnes om-

nino dolores, intra 24. horas, ad miraculum usque abigeret. Permotus hac gloriatione generosissimus quidam vir, exquisitissime sentientis naturæ, & jam a triginta annis dolore podagrico ex hæreditaria dispositione afflictus, Lipsiæ periculum fecit, ac per diem sex pulveres deglutivit, quibus usurpatis, omnis quidem dolor simul & semel conquievit, sed subsequenti nocte inquietus erat, anxietate summa cum vertigine premebatur, ut caput vix erigere posset, extrema frigecebant, & mane quum e lecto surgere volebat, apoplexia tactus misere interii. Oblati postmodum a cognato mihi sunt ad examen efficacissimi hi pulveres, quo, institutis nonnullis experimentis, eisdem mercurialis esse prosapix deprehendi, tam corrosivos, ut gustatæ fauces & linguam instar mercurii sublimati afficerent atque constringerent; quod autem dolor inde evanuerit, procul dubio ratio est, quod fuscitato in exterioribus spasmus, materia acris ad interiora repulsa est.

§. XVIII.

Porro *Forelius lib. 18. de Stomach. aff. obs. 14.* ex lacte in stomacho concreto symptomata veneno similia annotavit, quippe ægra nausea sine vomitione afficiebatur, cum ingenti ventriculi dolore, adeo ut syncope subsequeretur & anhelitus præloatio, adstantesque illam morituram putarent, omnia tamen pathemata, rejecto per vomitum lacte, evanuerunt. Et *Galenus* memorix prodidit, adolescentem ab humore æruginoso, os ventriculi mordente, sæpius universali convulsione fuisse tentatum, eamque ipsum non deseruisse, donec ærugo ejecta. Dum aliquid, inquit, os stomachi vellicat, mordendo ac æstuando, sunt fastidia, jactitationes, cardiognus, atque jam vomiturientibus os ipso plenum esse videtur & labrum inferius concutitur, ventris bre-
ad vomitum excitato.

*Alla
nausea
in ven-
triculo
destitit.*

*Mercurialis
dextre
præparata
dextre
dextre*

§. XIX.

Eandem ventriculi cum universo nervorum systemate sympathiam confirmant porro symptomata truculentiora, quae subinde hypochondriacos exercere solent, quandoquidem radix mali est dicti hypochondriaci omniumque in eodem solentium symptomatum in ventriculo male affecto fixa est, in quo spasmi incipiunt, postea per propagines nervorum successive serpunt & consueta illa symptomata ingenerant. Nam si ventriculus, quod saepissime fit, flatibus prorsus distentus est, ejus orificiis simul spasmo contractis: tunc nervorum conjugationes, quae ex pari ostavo, item ex intercostali, ad ipsum feruntur, modesta tractione, tensione in partibus diversis; quas simul transeunt, varia & gravia invehunt pathemata. Ita nervi pneumonici & qui ad praecordia abeunt retracti summas & contractivas anxietates, cordis tremores, palpitationes, pulsus frequentem, durum & contractum fuscitant; sique ita tenduntur, qui ad fauces, ad oesophagum ac cervicem tendunt, faucium contractio cum deglutitione difficili, tractio molesta in cervice, dolor contractivus in humeris, regurgitatio ciborum, & flatuum ad os; in capite vero vertigo, oculorum caligo, cataracta spuria, capitis dolor, frigoris in eo accerimus sensus, anxia & tristis cogitatio, hemicrania, animi perpetua anxietas & desperatio maxima, ad timorem ac terrorem proclivitas, nullius rei voluptas, somnus parvus & inquietus, cum virium languore & vitata in sensoris perceptione, oriuntur. Et quia simul plexus mesenterici & nervi intercostales in consensum trahuntur, dolores ad sunt dorsum, tormina ventris, mensium & haemorrhoidum inordinatus fluxus, dolor artuum, urinae tenuis & aquosae mistio, alvi strictura, quandoque etiam nimia ejus dejectio, extremorum quoque refrigeratio. Quorum omnium & singulorum symptomatum ingens fit

allevatio, discussis ex ventriculo & intestinis ructibus aut flatibus, spasmoticis contractionibus per clysteres, per balnea & antispasmodica sedatis, & viscida acida ac biliosa, colluvie per benigna laxantia, cum amaris balsamicis juncta, educta.

§. XX.

Communicationem quoque ventriculi cum partibus nervosis universi corporis, paroxysmi febrium intermittentium non obscure declarant. Procul enim omni dubio harum febrium minera primis in viis delitescit, & ex universo corpore, per glandulas, ductus biliosos & pancreaticos, in hac descendit, & ex mora, dum firmius tenuium intestinorum valvulis ac tunicis inhaeret, corrumpitur ac pessimam indolem contrahit: & nonnisi spasmis, qui in prima regione incipiunt, omnia illa, quae febribus solent associari symptomata, absolvit. Nam extremorum frigus, tremor, & horror partium, praecordiorum anxietas, pulsus in principio parvus & compressus, postea celerior, nausea, vomitus, faucium & linguae ariditas, sitis, dolor dorsi & capitis, tensio abdominis, contractio alvi, urinae tenuis & flammæ sine sedimento secessio, pandiculatio, oscitatio, dolor ossa quasi contundens: profecto nullam aliam nanciscuntur originem, quam quod plexus stomachicus & mesentericus, qui ex intercostali & ostavo pari concresecunt, vehementi spastica tractione & constrictione laborant. Quare etiam non tertio & praesentior intermittentibus medendi est methodus, quam convenienti medicina mineram febrilem temperandi, expellendi & vehementes spasmos compefendi, postea afflicta & debilitatas partes roborandi. In eo tantum unice latitat intermittentes curandi arcanum, ut pro diversitate causarum, individuum ac temporum, haec remedia debito ordine, tempore ac dosi offerantur.

§. XXI.

Sigillatim vero maximus observatur inter

Nec ad
inter-
mitten-
tium
para-
nisi.

Confer-
rit ven-
trici-
tus ad
capit.

inter consensus caput ejus membranas, ipsumque ventriculum. Rectissime hinc scribit *Baglivus pag. 365. qui laborant animi pathemate*, potissimum corripit solent morbis ventriculi, ut inter cetera observavit in *merentibus*, qui congeriuntur primo de sanguore ventriculi, mox inappetentia; oris amaritie, siti circa horas matutinas, cruditatibus, flatibus & tensionibus hypochondriacum. Eamque obrem monet Medicos, ut in morbis ab animi pathematibus præ ceteris ventriculo prospiciant. Ego non semel, sed sæpius a diuturno animi angore & mœstitia, in hominibus antea sanis, hilaris animi & sanguineæ complexionis, affectum hypochondriacum, qui potissimum in ventriculo consistit, subortum fuisse, vidi, anxium scilicet dolorem circa præcordia, inappetentiam, languorem, inquietudinem, mœstitiam sine causa, alvi constrictionem, continuam eructationem, & inflationem circa cordis scrobiculum.

§. XXII.

Ira quoque potissimum operationem suam exerit in ventriculum & duodeno complexos ductus nervoso bilarios, unde frequentissime ii, qui ira excanduerunt, cardialgiam, contractionem circa scrobiculum cordis, cum ardore, propensione ad vomitum, oris amaritie & alvi obstipatione experiuntur. Ex tunc nihil deterius est quam frigidum potum ingerere, quo affectum perfecte hypochondriacum optime antea valentibus inductum, sæpe observavi. Longe autem perniciosius est, sub tali spastica stomachi ex ira constitutione, drasticum aut emeticum corrigere, quandoquidem ex facili inflammatio ipsaq; mors accedit, quod pluribus in *dissertatione de medicina emetica & purgante post iram venere* asserui ac demonstravi. Quam grave damnum ex ardentiori desiderio ventriculus experiat, peculiari ille Helvetii maxime familiaris affectus, nostalgia dictus, testatur, quo apud exteros degentes, tam in-

penso patriæ desiderio tenentur, ut, si patrios lares non repetant, appetitus prostratur, digestio lædatur, status & ructus & cruditatibus gignantur, cardialgia accedat & cum languore ipsum corpus emaciatur.

§. XXIII.

Immoderata studia & nimia per speculationes animi fatigatio incredibili modo debilitant ventriculum. ejusque vim digestivam enervant tonumque & robur auferunt, unde acidæ cruditates gignantur, quæ ad supprimendam alvum, ad progignendas flatulentias malumque hypochondriacum, primum fere fundamentum ponunt. Quinimmo sunt inter exempla hypochondriaci malo obnoxii, qui simulac impensiore meditatione animi nervos nimis intenderunt, illico anxietates præcordiorum, ructus & stomachico & borborygmus in ventre, persenserunt. Vertiginem ex ipso ventriculo fieri, vel ex eo cognoscitur, quod, si quis jejunos sit, maxime affligat, sumto vero cibo, minuat, atque post ea, quæ primam regionem clementer expurgant & digestionem juvant, plane discedit. Meminit etiam *Lomius Lib. 2. observat.* suffusionis seu incipientis cataractæ, ex stomacho proficiscientis, & asserit, talem suffusionem intermittere & remittere, si curata coctione prospectum stomacho est, invalescere & reverti, si cruditate labefactetur. Ventriculo bene habente, totum corpus alacrius est, somnus sit placidus, si vero onustus ex alimentis incongruis, præsertim circa noctem sumtis, somnus deficit, vel insomnis terrificis interturbatur. Nihil frequentius, quam quod ventriculo vino non adeo bonæ notæ nimis obruto, ex retenta vappa, acolem corrosivum contrahente, poltridie atroces capitis dolores oboriantur.

§. XXIV.

Eandem ventriculi consensum cum capite adstruit; quod si caput gravius doleat, omnis ciborum appetentia

Animi
fatiga-
tio per
medi-
tatio-
nes.

Capitis
dolores,
quæ-
runt
itaque
phre-
nema.

Quæ
resus-
citatio
an-
imi pa-
themate
ta. ut
lib.

Et des-
iderium

pereat, multæ cruditates flatuum genitricrescunt, alvo strictiore reddita & stomacho ad vomitum inclinante. Graviore etiam cerebri morbi ventriculorum mox in consensum rapiunt, unde observamus, in iis, qui apoplexia tanguntur, ventriculorum ad subversionem stimulari. Ubi mens ægrotat & duram matrem spasmus corripit, cibi est fastidium, tormina & anxietates præcordia exercent & ructus cum impetu erumpunt, alvo stricta & magna in pulsibus facta mutatione. Nemini facile obscurum est, quod ii, qui graviter vulnerantur, vel læduntur in capite, vomitu & ciborum fastidio afficiantur; ac quod vicissim ventriculo laborante, ipsum caput gravius luat. Pariter scriptorum medicorum fide constat, a comesto folano, furioso dicto, atque in ventriculo adhuc hærente, maniam productam fuisse, & semen hyoscyami, & maxime daturæ, majori paulo quantitate exhibitum, promissime ingentem torporem, stuporem ac omnium sensuum internorum & externorum usum abolere & phantasiam corrumpere.

§. XXV.

Distictio
symptomata.

Ex quia nervi stomachici & intestinalis, ex intercostali & octavo pari coarctati, cum pari quinto, cujus ramus ad maxillas & dentes fertur, communicationem habent; hinc fit, ut in infantibus, ob gingivalis carnis ab erupturoden. relacinationem, non modo in capite convulsionones, vigilæ & epilepsiæ, in pectore asthma, in corde febres, sed & in inferiori ventre tormina cum alvi adstrictione, vel nimia ejus fluxione, contingant, & quod notabile est, feces virides & corrosivæ partium sub dolore contractione, ingesta non alvo exclusæ, sed diu retentæ, acescant & corrosivam indolem accipiant. Ex quo judicare promptum est, quam imprudenter & temerarie ii faciant, qui in dentitionis difficultate, ubi spasmi genus nervosum vehementer torquent & feces virides sunt, purgantia acia

& cum mercurialibus mixta, iterum iterumque propinant, tristi eventu præpostero ejusmodi consilium satis confirmante. Atque ob eandem communionem, quam nervi stomachici & intestinales cum pari quinto foveant, accidit in gravioribus stomachi spasmis, qui sunt a veneno vel validiori purgante aut emetico sumto, faciem fieri Hippocraticam, tempora colliabi, vultum pallefcere & nasum acuminari. Neq; semel, sed iterum iterumq; notavimus, in parhamatibus hysterici vultus deformitatem & aspectu horribiles oris, labiorum & oculorum distorsiones.

§. XXVI.

Proxima vero stomachi est societas atq; connexio cum œsophago, propter tunicarum communionem; hinc fit, ut a pluma vel digito, tantum faucibus intruso, principium œsophagi irritante, protinus ventriculus, præsertim humorem copia onulus subvertatur. & vomitio fiat. Fumus quoq; tabaci, ori susceptus stimulat alvum, nullam, mea ex sententia, aliam ob causam, quam quod hic fumus sale suo volatili acri tunicas oris & faucium irriter, e quibus propagato ad ventriculum motu, ea contenta citatius protrudat ad intestina & anum. Et quando in ventriculo acris residet humor, vel inflammatio est, œsophagus cum faucibus moleste contrahitur, ita, ut non raro copiosa aqua in os effundatur, quod unum ex pessimis indicibus est. Infantibus quorum ventriculus saburra causticæ bilis infarsctus est, convulsionis certa species molesta & fatalis est, dum in spasmo gulæ affecti, continuo deglutire coguntur & certum sonum cum quodam singultu edunt, quæ symptomata identidem ab irritatione ventriculi, œsophago, faucibus & diaphragmate in consensum raptis, oriuntur. Fovet quoque ventriculus consensum cum intestinis: unde sub atrocissimo intestini alci vel etiam coli dolore, vomitus tam vehementes fiunt, ut non modo in intestinis contenti humores, sed & ipsa stercora haud raro fursum terantur.

§. XXVII.

§. XXVII.

Cum du-
deni
billa-
ria.

Deinceps magna est consensus ventriculi & annexi duodeni cum ipsis biliaris ductibus, eam maxime ob causam, partim quod ductus choleodochus per duodeni membranas feratur, partim, quod dexter nervi intercostalis & parvis octavi ramus, qui ventriculum adit, ramum quoque ad hepar, ejusque biliferos canales mittat. Propter hunc itaque consensum fit, ut spasmo ventriculi & duodeni, qui in febre tertiana observatur, item a vehementi vomitorio, vel purgante, aut veneno assumpto, nec non ab atroci dolore colico, icterus oboriatur. Infantes tertio vel quarto a partu saepius die ictero corripitur, ex retentione mæconii in intestinis, auctor est *Baglivus oper. pag. 38.* Iracundiæ vehementiori icterum supervenire non novum est; siquidem ab hoc affectu patitur maxime fibrosior & robustior pars ventriculi, quæ pyloro adjacet, dum constringitur: unde ordinario in dextro circa scrobiculum cordis latere, ab ira, dolor compressior cum ascensu bilis ad os observatur. Quod si vero vel calculo, vel bilioso alio concreto tartareo humore, in vesicula fellea, aut ductibus biliaris contento, horum tunicæ nerveo-musculosæ, violenter tenduntur, in consensum quoque abripitur ventriculus, & hinc immanis cardialgia, nausea, vomitus, cibi-que fastidium coarctatur. Memorabilis & lectu dignissima est observatio, quam *Misnat. curios. A. VI. Dec. 1. obs. 20.* referunt, ubi mulier immanem dolorem & laciniationem ventris per triginta fere annos passa est, cujus originem & causam sagacissimi etiam Medicorum vix hariolari poterant; post mortem autem inventus est ingentis magnitudinis calculus, qui totam fere vesiculæ felleæ cavitatem implevit. Eandem quoque in *rem obs. 61. Sculteri in armamentario*, conferri meretur.

§. XXVIII.

Posse exquirat ventriculus cum

diaphragmate & pulmonibus foveat communicationem. Quid enim familiarius est, quam in infantibus stomacho refrigerato, vel materia acris ejus tunicis inhærente, singultum concitari, qui thoracis est convulsio? Quid solennius est? quam a cruditate ventriculi obidente, vel sero acris intra ejus membranas detento, tussim nasci convulsivam, in infantibus non raro suffocatoriam, quæ pectoralibus & dulcibus assumtis plus exacerbat, acrimoniam vero corrigentibus, emollientibus atque discutientibus, neque minus lenioribus laxativis, expugnatur. Quid porro crebrius occurrit in praxi, quam quod a violenta tussi, vitio hærente in bronchiis, vomitus concitetur? Nihil quoque frequentius est, quam quod ab inflatione ventriculi summa fiat spirandi angustia cum suffocationis periculo, quod symptoma in infantibus, quorum ventriculus lacte corrupto fartus est, sæpius visitur, ubi leni emetico, vel quæ leniter alvum ducit medicina, omne punctum curationis absolvitur. Quin in convulsiva tussi ex stomacho, tantam pectoris vidi concussionem, ut sternutatio impetuosa & reiterata, cum ingenti sanguinis vel lymphæ profusione e naribus, facta fuerit.

§. XXIX.

Præterea magnæ considerationis est sympathia, quam renes cum ventriculo & intestinis, propter communionem nervorum, alunt. Nimirum nihil familiarius est, quam quod dolores ex calculo perpetuo fere nausea & vomitus comitetur, & calculosos tormenta intestinorum torquant. Nam quando ren calculo laborat, abdomen semper multis flatibus turget, qui majores faciunt molestias, quo gravior dolor est, immo ipsæ flatulentia sæpissime dolorem renem provocant & calculum in ureteres urgent. Providendum itaque est calculo obnoxio, ne abdomen frigori exponant, alias facile dolor renum irritatur. Si quis dolore ex calculo premittur,

Cum
dia-
phrag-
mate
& pul-
monibus.Cum re-
nibus.

tur, digestio turbatur, stagnant ingesta in ventriculo, accescunt & bilis viridis evomitur. Et faciunt tunc egregium officium clysteres. carminativi & emollientes oleosi, nec non omnia ea, quæ citra calorem status dispellunt & dolorem lumborum mitigante facultate pollent. In spasmodicis flatulentis ventriculi, qui affectione hypochondriaca vel hysterica detentos detorquent, molestia crispatura identidem ad renes pertingit, ita prorsus, ut eorum tubulis constrictis, urina alba mingatur, quæ certum fere paroxysmi hysterici vel hypochondriaci imminuentis indicium præbet.

§. XXX.

Neque exiguus ventriculi consensus est cum pedibus, qui innumeris tendinibus & nervis atque membranis constant. Quum enim nervus intercostalis ad crura etiam pertingat, & nervum cruralem anticum & posticum constituat, mutua hinc intercaput, ventriculum & pedes consensio nascitur. Ex quo jam facile patet, quare digitorum in pedibus immanem dolorem, quod aliquoties vidimus, spasmus cynicus sublequatur, & quare ex pedis pollice epilepsia non raro originem capiat, dum spasmus ibi incipiens, succcessive ascendit, & primo ad abdomen, postea ad cor & diaphragma, tandem ad caput delatus, abdominis tensiones, præcordiorum constrictiones, pectoris oppressiones, aphoniam, denique convulsiones & epilepsias producit. Aegroti expriment, sensum quasi venti a pollice ad caput sursum ascendere ac elevari, quæ tamen in sensu est fallacia: siquidem nullus datur statibus locus ita per solidam substantiam ascendendi, sed spasmi sunt, qui oscillatorio quodam motu successive per nervorum propagines ad superiora serpunt. Notum quoque est, ex infleu nudis pedum plantis in pavementum frigidum, nec non improvida pedum refrigeratione, cutim per omnem corporis ambitum stringi & tormina ventris,

nonnunquam cum alvi fluxu, arcesse.

§. XXXI.

Tandem nec silentio prætermittere oportet sympathiam, quæ est inter ventriculum & ipsam cutem. Videmus exanthemata, quæ in cute efflorescunt, cujuscumque etiam fuerint generis, repulsa, non sine ingenti periculo ad ventriculi & intestinorum tunicas migrare, ubi ferale spasmos, tormina, anxietates, constrictiones alvi & inflammationes efficiunt. Quare etiam omnia, quæ spasmus in ventriculo concitant, ut sunt purgantia & animi pathemata, in exanthematicis morbis admodum perniciosa esse observantur; quandoquidem constricta ex consensu simul ipsa cute, acris illa exitialis materia ad interiora, ipsasque nerveas ventriculi & intestinorum membranas, revocatur. Et sæpius quoque observavimus, ab induriorum, præsertim si frigida & humida fuerint, mutatione, in sanis etiam, ventris inflationes & inquietas noctes redditas fuisse. Quo patet, quam gravem noxam ejusmodi improvidus ausus in morbis, quorum materia per summam cutim expelli debet, causser. Quandocunque dolor ventriculum vel intestina torquet, pori cutis clauduntur & nihil sudoris effluit, extrema refrigerantur, meatibus vero cutis rursus adaperitis, certum indicium est doloris, aut alvi fluxus finem adesse. Si variolarum materia subtilis causica intestinorum membranarum insidet, ægri sunt inquieti, jactabundi, loco stare nesciunt & ne minima pustula prodit in cute, neque sudoris guttula prosiliit, alvo contracta & convulsa, adeo ut universum cutis systema conerashatur, quod proba notavit *Baptemus*.

§. XXXII.

Neque tantum ventriculo, verum etiam intestinis, quæ ejusdem cum illo naturæ & structuræ sunt, ex tunice nempe pariter musculosæ & nerveis contexta, cum universi corporis tunicis membranacis societas est atque

Cum ipsa est.

Cum pr. distat.

Consensum inter intestina sunt inter se pariter sociati & sociati.

que consensus, ob plexus maxime mesentericum, intercostalem & paris vagi, quem præter alia truculenta univerſi generis nervoſi pathemata, quæ a vermibus, teneras tenuium tunicas arrodentibus, fuſcitantur, teſtatur reddunt. Neminem enim, qui leviter in artis exercitio verſatus eſt, fugit, inde pullulare in capite epileſiam, deliria, vertiginem, ſternutationes, guttam ſerenam temporariam, aphoniam, ſurditatem & tinnitum aurium tranſitorium; in ſpinali medulla, aſpectu horribiles motus convulſivos & artuum agitationes; in corde & ſyſtemate vaſorum, febres, cordis tremores ac palpitationes, in pectore, taſſes, dolores, qui pleuritidem mentiuntur; in ventriculo, inappetentiam, inclinationem ad vomitum pyaliſmum & lymphæ ex ore fluxum; in inteſtinorum volumine, atrocia tortuina; in urinaris viis, ad urinam ſtimulum; in extremis, horripilationes & refrigerationes manuum pedumque contracturas; quæ cuncta ſymptomata, primo aſpectu admodum ſuaveſta; exturbata a ſpecifico anthelmintico, pilulis nempe ex aſa foetida, myrrha, croco & mercurio dulci paratis, verminoſa progenie protinus ſedantur & conſeſcunt.

§. XXXIII.

Colica ſic dicta convulſiva & paſſio iliaca, quibus inteſtina ileon, vel colon, vehementi ſpſmo conſtringuntur, quot non atrocia, & nonnunquam lethiſera, ſymptomata iudicant? febres, deliria, convulſiones, inquietudinem, ſummas anxietates, animi deliquia, artuum contractiones, extremorum frigora, cum ſudore frigido & pulſu duro & contracto, vomitus, alvi tam inſolentem conſtipationem, ut nec clyſterem admittat, vel ſtatim tranſmittat. Ejuldem indolis ſunt acerbiffima pathemata in colica ſpſmodica metallurgis ſolenni obvia, quæ ſigillatim evolvi & ad rationes revocavi, in diſſertatione

de metallurgia morbiſera. In cholera quoque, quando bilis cauſtica nervoſas inteſtinorum parietes rodit atque gravius irritat, omne nervorum genus compatitur, ac cædem plane, quam ſi venenum aſſumptum fuiſſet, prodeunt paſſiones, mortem celeriter arceſſentes, quæ non aliis, quam quibus venenorum noxæ, demulcentibus nempe oleoſis, laſticiniis, terreis & antiſpſmodicis, diſcuriuntur; id quod etiam pari modo de dyſenteria, ab eadem cauſa prognata, notum eſt.

§. XXXIV.

Accedunt phænomena poſt purgatis aſſumptum conspicua. Quamvis enim omnis generis cathartica operationem ſuam nonniſi in inteſtinis exſequantur, iſdem tamen oblaris, diſſiſtæ etiam partes annuunt. Eleaterium quando hydropicis exhibetur, virtutem ſuam tam late diſfundit, ut ſtriſtis in extremis quoque partibus fibrillis, ſtagnans humor ex univerſo corporis ambitu ad inteſtina agatur, ac per anum effuſe exturbetur, ſubſidente poſtea notabiliter in exterioribus tumore. Similiter in tuſſi humida, qua magna humorum colluvies ſcreare e pulmonibus ejicitur, nullum certius atque efficacius præſidium eſt, lenioribus & balſamicis laxantibus, quibus ſuperfluum, ſerum e pectore ad inteſtinales glandulas alligitur & per alvum educitur. Inprimis autem imprudens purgantium uſus, inteſtinorum cum reliquis nervoſis partibus, ac præſertim ſpinali theſidula, conſpirationem prodiit. Præterquam enim quod Solenander in conſiliis, & A. N. C. Dec. 2. A. 7. obſ. 162. fidem faciant, quod grave damnum inde in univerſum corpus redundarit, ipſe quoque aliquoties notavi, propinata in pulvere vel pilulis reſina jalappæ, non ſolum enormes cum acerbis torminibus ſuſceſſiſſe dejectiones, ſed etiam in quibaldam convulſiones, epilepticas commotiones, quin in aliis paralyſin dextri & ſiniſtri lateris

Cholera & dyſenteria.

ris accidisse, hanc procul dubio ob rationem, quod resina jalappæ, quæ facile in liquido aqueo conglobatur & difficillime liquefit, firmiter partium cavidam nervæ intestinorum tunicæ adhæsit, eandemque jugiter lancinando, convulsivas ejusmodi in dissitis etiam locis spasticas tractiones suscitavit.

§. XXXV.

Viscera sanguinea non cum nervis consensum habent.
Viget itaque consensus inter partes nervoso-membranaceas mutuus, qui an etiam his, cum visceribus sic dictis sanguineis, quorum structura & compages ferme tota vasculosa, ut sunt hepar & lien, nec non uterus, intercedat? jam paucis dispiciendum. Plurimi quidem ex Practicis, quos inter maxime eminet *Villius*, consensionem uteri cum nervo totius corporis systemate constanter asserunt, inprimis quum experientia fere quotidiana doceat, quod affectio hysterica, quæ ex vitio uteri & sanguinis irregulari motu in feminis æque ac in puerperis cooritur, pathematibus spasticis, convulsivis, epilepticis, quæ præternaturales generis nervosi læsi affectus sunt, absolvatur. At vero ipse uterus minime partibus nervosis & exquisitæ sensationis annumerari potest, utut motu tonico suo & interio non destituatur. Nam si talis esset, neutiquam summas illas sæpius a gemellis distensiones in gravidis, item a tumoribus & excrescentiis intra ejus cavitatem ipsamque substantiam prognatis, sine summa molestia & vitæ periculo, ferre posset.

§. XXXVI.

Mali hysterici et causæ quidem in utero.
Quare recte distinguendum potius esse censeo, inter sedem morbi, sive spasmodum, quæ nullo modo est in utero, ac inter sedem causæ morbi, sive pathematum spasmodicorum in genere nervoso existentium, quorum causam ipse uterus male affectus subministrat. Neque quidem inficiandum est, quod si ob defectum uteri & ejus vasorum tonum ac robur, sive a puerperio, sive ab aliis causis exter-

nis & internis, sanguinis superflui menstrualua periodo non sufficiens sit diminutio, sed fluxus suppressitur & cohibetur, gravissima inde sæpius in universo corpore, inque primis ejus partibus nervoso-membranaceis, oboriantur symptomata; horum tamen ratio non a nervis, quos sensibiles hæ partes cum utero communes habent, sed potius a sanguine, ad interiora ac sentientes nobiles partes restagnante, petenda est ac derivanda. Et hanc etiam *Hippocratis* fuisse sententiam, auctor nuclei *Hippocratis Cent. III. aph. 44.* clarius exponit, *refluens*, inquit, *sanguis ab utero & premeus septum transversum, retrahit utero, praefocationem, in caput irruens, insaniam, epilepsiam, catochos, apoplexias, occupans thoracem, suffocantes affectus, irruens in cor, palpitaciones & tremores; nonnunquam syncopes, in nervis de nique facit stuporem, immobilitatem & resolutionem.*

§. XXXVII.

Ego proinde re paullo curatius expectata, præcipuam pathematum hysteriæ sedem in ventriculo & canali intestinorum collocandam esse arbitror. Nam anxie illæ constrictiones & angustie circa præcordia, dolores cardiaci, qui ad dorsum, ubi sinistrum ventriculi orificium, porriguntur, palpabilis stomachi circa ætobiculum cordis inflatio, continuæ eructationes, nausea & ad vomendum proclivitas, alvus firmiter obse-rata, cum flatuum retentione & regurgitatione ad superiora, borborygmi, tormina, convolutiones intestinorum instar globi, molesti dolores in hypochondrio sinistro, dolor circa vertebrae lumbares, creber ad urinam stimulus, extremorum frigus, inquietudo, pulsus celerior, contractus, vel plane intermittens, animi defectio, cordis palpitatio, quæ perpetua fere passiois hysterice sunt symptomata, nihil certe aliud subindicant, quam nobilissimam & ex præcipuis sensibilem maxime partem, ven-

Sedem vero in ventriculo & intestinis.

ven-

ventriculum nempe , esse affectam . Quare etiam omnia ea , quæ spasticas stricturas efficaciter leniunt & laxant remedia , ut sunt forus calidus præcordiis applicatus , interne liquor noster sic dictus anodynus mineralis , seu summum & tutissimum antispasmodicum , vel solus , vel cum essentia carminativa , aut castorei , remixtus , & clyster oleosus emolliens , præsentissimæ & fere miraculosæ sunt efficaciz . Horum quippe atrocium ventriculi spasmodum proxima causa , non sunt acres , biliosi , vel visceri , crudi succi in stomacho contenti , sed solus sanguis copiose irruens in vasa ventriculi , quæ quum tunicis ejus nervosis intertexta sint , nimia distensione has fortiter premunt , & hac ratione jam memoratas passiones gignunt . Hinc etiam raro patescit , quare femine , quibus menses post quinquagesimum annum deficiunt , si non sanguinem , vel per scarificationem , vel per incisionem venarum , emittunt , aut etiam consuetas has artificiales evacuationes omittunt , hysterici ejusmodi spasticis affectionibus , præ omnibus aliis excruciantur , & quare vicissim institutz opportune ejusmodi sanguinis subtractiones , paroxysmos hystericos certis periodis redeuntes , vel minuant , vel penitus tollant .

§. XXXVIII.

Idem de hepatis & lienis viscere sentiendum . Nam licet nonnulli inter hæc & nervosas partes consensum adstruant , & potissimum ad pathemata in malo hypochondriaco , sub quo labe & vitium plerumque in sanguine hisce visceribus consistit , conspicua provocent ; ambo tamen , hepar & lien , præsertim humanus , partes , ut luculenter injectionibus suis cl. *Ruyfchius* demonstravit , sunt fere totæ vasculosæ , ex innumeris quippe vasis majoribus , minoribus & minimis contextæ , sensus plane expetites , ut hinc sæpe sine acuti doloris perceptione intumescere ac etiam in ma-

gnam molem augeri possint . Interim tamen , si ipsarum compages , & maxime quidem vasa , quæ sanguinem ad hepar , ut est venæ portæ , adducunt , convenienti tono ac robore ac vi sufficientes motrice impellente destituuntur , promptam spasmodum in nervosis locis causam subministrant . Nam quando sanguis a ventriculo , toto volumine intestinorum , mesenterio , liene , omento & pancreate refluus , per truncum venæ portæ , qui manifesta systole sive pulsu caret , per minimos copiosissimos hujus venæ in hepatis parenchymate propagines , non satis expedite trajicitur , necesse est , ut regurgitans ad viscera unde advectus , in iisdem non modo stagnet & canales fariat atque distendat , sed & ulterius , ut appulsus per arteriam coeliacam & mesentericam a tergo ad has partes sanguis , præcluso in venas repletas transitu , ad vasa minima & lateralia cogatur , & sic undique obhærescens in vasis nervosæ maxime ventriculi & intestinorum tunicz instratis cruor , molesta pressione stricturas & truculentos spasmos cieat . Et hac utique ratione omnia illa pathemata , quæ hypochondriacos per certos insultus vexant , affectiones & laciones generis nervosi sunt , ac ut probe primus *VVillifius* & *Hobockenius* notarunt , exquisitam convenientiam eandem quoque sedem cum hysterici pathematibus obrinent . Minus recte secundum Veteres , ac ut nonnullorum recentiorum adhuc opinio fert , dolores & passiones in latere sinistro , lien adscribuntur , quum potius stomacho , cujus tres partes in hoc latere conduntur , nec non subjectis coli flexuris , ut inter alios primus cum *Conringio* docuit *Estmullerus* , debentur . Ipse quoque ante aliquot annos peculiari dissertatione monstravi atque defendi , quod præcipua sedes spasmodum hypochondriacorum in ventriculo sit constituenda .

§. XXXIX.

Hinc arudi- 8. 1779
no sunt
causa
modi by.
pocho-
diact.
 Neque etiam ut plurimum recentiorum est sententia, cruditates vitiosæ primis in visis flabulantes acidæ & viscidæ biliosæ, primam, originalem & veram causam pathematum hypochondricorum suppeditant, sed sequuntur demum spasmos & eorum productum sunt, licet ad eorum recursum & exacerbationem multum conferant, & ipse potius sanguis copiose circa hæc viscera stagnans, sive harum partium plethora particularis, acculanda. Teitatur hoc inter alia cura affectus hypochondriaci, in qua quidem ea, quæ spasmis placandis, stricturis partium fibrosarum relaxandis dicata, insigne levamen afferunt; nisi tamen redundanti sanguini exitus pareretur, ac is vel per sanguinis missionem in partibus inferioribus, vel fluxum hæmorrhoidum, si natura ad eum inclinat valde salutarem, exsolvatur, aut ejusdem progressus aquarum mineralium, balneorum & medicamentorum roborantium tonicorum usu, vel etiam per motum & exercitium corporis, liberior reddatur, ac per vasa venosa melsaraica, ipsumque hepatis & lienis viscus reitruatur, certum & constans vix, aut plane non, sperare licet auxilium.

§. XL.

const-
sum to-
flor
medic.
perito-
rum o-
perati-
Liquo-
ris an-
dys.
 Is autem a nobis assertus nervosarum partium consensus, quemadmodum tam eximius est, atque conspicuus, ut venenum, vel etiam alia infesta materia, nervoso, ubicumque sit loco, insidens, vel in ventriculo contenta, illico vires suas perniciales cum universo nervorum systemate communicet: ita simili ratione pharmacum efficax ac penetrantis indolis, accisa etiam dosi exhibitum, immo adhuc in stomacho versans, mediante eadem nervorum conspiratione, protinus vim suam in universum corpus diffundere potest. Liceat in confirmationem producere liquorem a nobis inventum & ex sulphure mineralium concinnatum, jure dictum

anodynum mineralem, gratissima & penetrantissima indolis, qui certe, si ullum aliud medicamentum, promte, sine noxa tamen, dolores & spasmos in universo corpore levat atque sedat, & in pathematibus hypochondriacis, hysterici, gravi cardialgia, enormi vomitione, commotionibus etiam epilepticis & convulsivis, singultu, diarrheæ, ad guttas tantummodo 30. vel 40. semel aut bis, oblatum, præsentaneum & mirabile plane præstat auxilium. Massam pilularum ita dictarum de ityrace ad aliquot tantum grana deglutitam, in tussi serena, quæ universum corpus affligebat & concutiebat, omnibus aliis frustra exhibitis, singularem plane effectum sedativum exiitisse, sæpius observavi, subsequuto simul blando cutis, quæ antea frigida horrida & exsucca erat, madore.

§. XLI.

Allo- 8
fidati-
orum
or an-
si pas-
medico-
rum.
 Pauxillum laudani liquidi, si vel solum, vel cum liquore volatili Bulsui, aut cornu cervi succinato remixtum, in enormi, etiam cruenta, alvi dejectione, porrigitur, protinus, quando adhuc in ventriculo hæret, atroces cruciatus in abdomine, borborygmi & motus conquiescere incipiunt, somno blando obrepente. Idem medicamentum si in pathematibus hysterici, quæ universum corpus exagitant spasticis, datur, mox mirabile sequitur levamen. Pariter in enormibus sanguinis profusionibus, hæmoptysi nempe, narium hæmorrhagia, ab assumptis aliquot granis massæ pilularum de cynoglossa, vel aliquot guttulis liquoris martialis, sæpe extemporaneam vidi fluxus adstrictionem. Oleum amygdalinum bene præparatum, & cum jusculo ad aliquot cochlearia ingestum, præbet medicinam in omnibus doloribus & spasmis, etiam distitas partes quatientibus, efficacissimam; eaque propter in tussi convulsiva clamorosa, asthma spasmodico, dolore ex calculo, stranguria, colica, non sine insigni fructu ulur.

usurpatur. Nitrum saltem vulgare, probe depuratum, ad aliquot grana datum, protinus fervorem præternaturalem extinguit, vel ad sensum refrigerat, sitim sedat, commotiones sanguinis hæmorrhagicas sistit, cum tum ad madorem disponit & alvum lubricam reddit.

§. XLII.

Corticem Peruvianum, pulverem florum chamomillæ, crocum martis subtilissimum, quem fontes Lauchstadienses eructant, ad sitientes febiles in intermittentibus motus summa pollere efficacia, res est nec leviter in praxi versatis ignota. Longe etiam præstantissimus certe est effectus, quem pilulæ balsamicæ, leniter aloeticæ, in omnibus fere æteri affectibus, atque etiam in hypochondriaca passionibus, exsequuntur, dum ad serum, secundinas, molas, inimo lochia expellendæ in puerperio, præ omnibus aliis purgantibus & uterinis eximie conferunt, non aliam ob causam, quam quod peculiari ratione, non modo intestina, sed & confines partes atque vasa uterina solentur & afficiant. Has tamen cum plerisque reliquis non facile primarum viarum limites operatione sua transcendere, veri videtur simillimum. Ad vires æ-

senio vel morbo collapsas restaurandas, nec non animo deficientes refocillandos, balsamum nostrum liquidum spirituofum, exterius & interius usurpant, singularem præstat opem; contra vero suaveolentia ex moscho, ambra, zibetho, si naribus tantummodo offeruntur hysterici vel hypochondriaci, totum genus nervolum in consensum trahendo, fixissima symptomata, ut syncopen, cordis palpitationes, anxietates summas, nauseam, vomitum, immo convulsiones quandoque, arcessunt. Clysteres oleosi demulcentes in colica convulsiva & paroxysmis hysterici & hypochondriaci levamen afferunt exoptatissimum, eo quod non tantum in intestina, verum etiam alias nervo-

sas partes suam maxime distribuunt facultatem.

§. XLIII.

Neque dissimilis mihi specificorum sic dictorum videtur ratio, ut castorei & asæ foetidæ in pathematibus hysterici placandis, pulveris secundinæ humanæ, cranii & corii humani, in epilepticis insultibus sedandis; hæc enim dum ventriculi & intestinorum tunicas nerveas ^{term} ^{specifi-} ^{co um} sua mulcent ac imbuunt, ex his ad distitas etiam atque remotas partes virtus propagatur. Fuit nobis a multis abhinc annis in usu singularis quidam mercurius diaphoreticus fixioris naturæ, qui ad pauca grana adhibitus, in lue venerea & morbis a summa lymphæ impuritate nascentibus, ludorem per multas hebdomades eliciendo, mirabilem præstitit opem. Sic quoque sulphur antimonii, si rite preparatum fuerit, quo etiam referenda panacea sic dicta Glauberiana, nec non regulas antimonii medicinales, duorum vel trium granorum pondere oblata, acres & salias diu durantes in oculis, faucibus quoque ac pedibus defluxiones resiccant, simulque perspirationem ac respirationem liberio-rem reddunt.

§. XLIV.

Et hæc tam singularis & late patens ^{Exerc-} ^{corum} ^{quæque} internorum quorundam medicaminum virtus, in externis quoque, ob eandem partium sympathiam deprehenditur, ut miro plane modo in extremis, sæpius interiora levantur. Exemplo sit vesicatorium, vel emplastrum Strobelbergeri, quod carpis applicatum, paroxysmos intermittentium experientia teste compefecit. Pariter vesicatorium nuchæ appositum lippitudinem discutit, & in apoplexia tactis sustinaminatum sensum sanguinisque motum reducit. Oleum terebinthinæ umbilico tantum illitum, in urina suppressione efficacissimum est remedium. Unguentum, de arthânita dictum, umbilico inunctum, alvum non solum efficaciter mover, sed

Corticem
Peruvianum.

Pilularum
balsamicarum.

Carbasinum

Et clysterum.

sed etiam vermes in intestinis necat. Emplastrum anodynum temporibus appositum, non modo capitis dolores placat, sed & vomitiones sæpe enormes sistit. Linimentum spirituosum ex oleis aromaticis paratum & præcordiis admotum, tam ventriculo, quam toti corpori vigorem præstat. Fricitio quoque artuum & maxime præcordiorum asperior, suspensum in lyncpoticis cordis pulsuum revocat.

§. XLV.

*Inprimis per
dibus
appli-
catur.*

Egregia porro huc trahenda est observatio: quod in morbis capitis, quæ ex atonia & imbecillitate nascuntur, ut memoriæ ac sensuum debilitate, paralysis, quæ sæpe post apoplexiam relinquitur, item somnolentia, vesicatoria & rubefaciencia pedibus applicata, efficacissimo sint præsidio. In hisdem morbis capitis ex resolutione ac remissione nervorum subortis, capiti admota spirituosæ cephalicæ aromatica, omnes non æque ferre quidem possunt, ut potius sæpe magis inde lædantur: si vero pedes hisdem perfricantur, ut aqua Anhalidina cum oleo majoranæ & lavendulæ, caput inde allevamentum percipit præsentaneum; & vidi aliquando, hac ratione in affectu soporoso largiorem pituitæ ex naribus & faucibus effluxum suscitatum, summo subsequente levamine. Rubefaciencia quoque plantis pedum applicata, sanguinis e naribus stillicidium comprimunt. Qui difficulter sudant, appposito plantis latere calefacto, sudore perfunduntur, si vero manus & pedes sub sudore nudantur, perspiratio illico sistitur. Et pediluvia temperate calida, quid in capitis morbis & omnibus passionibus spasmodicis efficiant, tam notum est, quam quod notissimum.

§. XLVI.

*Conclu-
so.*

Sed ne latius evagemur, mittimus alia, ac interim ex allatis insignem consensionem & magnam conspirationem partium in corpore sensibiliorum liquido patere arbitramur. Quo magis mirandum censemus, esse ad-

huc inter Medicos, qui hunc nervorum consensum plane negare, immo pro fabula venditare, haud verentur. Sed videant, rogo, novaturientes hi doctores, qui sapientiam medicam in obscuris, metaphysicis, noviter quoque confictis terminis quarunt; & universam pathologiam ex moliminibus naturæ ad hæmorrhagicas excretiones consarcinant, quo pacto cum connexionem ac demonstrationem, ex spirituali sua natura, hæc vera & per experientiam confirmata phænomena, deducere atque explicare possint. Ego certe, si ullam in rebus medicis doctrinam scitu per quam necessariam & utilem, hanc ipsam de consensu, fructuosam judico, & his egregio *Hippocratis lib. ad alimem. §. 4.* effato finem impono: *confluxio una, conspiratio una & consentientia omnia.*

CAPUT VI.

De Fluidorum vitiiis ex vitiosa solidorum dispositione.

§. I.

Perlustravimus in superiori capite mutuam illam conspirationem & harmonicum consensum, quem partes corporis nervosæ exquisitoris sensationis & motus inter se fovent, ac pluribus argumentis asseruimus, quam utilis & scitu necessaria in rebus medicis explicandis hæc sit doctrina, nunc porro sequitur, ut solidorum, si vitio laborant, in fluida corporis nostri actionem & ad pervertendam naturalem eorum constitutionem operationem monstremus ac eruamus: quod certe argumentum, non minus eximie in pathologicis erit utilitatis. Jam nemo quidem facile negabit, machinam animale ex solidis & fluidis esse constructam, & corporis vitam maxime in eo consistere, ut solida agent in fluida ipsaque moveant, & fluida rursus in solida eademque animant: ideoque hisce suppositis, nostra

*Fluida
a soli-
dis
partium
inter.*

inpraesentiarum meditatio in statu tantum praeternaturali & morbido erit defixa clarius ostendendo, quid patiantur fluida a solidis laesis & praeter naturam constitutis.

§. II.

Initium autem merito facimus a celeriter aucta reciproca systole & diastole cordis & arteriarum, ac univerti generis vasculosi ac fibrosi, quae pulsu duro & celeri, velociori quoque sanguinis tam progressivo quam intestino motu, stipatur, in quo formalis febris ratio continetur. Sub auctiori hoc adeo accelerato motu, in omni febre, cujuscunque sit generis vel speciei, sanguinis & humorum crasin, temperiem ac mixtionem incredibili fere modo immutari ac perverti experientia docet. Sanguis qui antea erat temperatus & sensu medico dulcis, bonae consistentiae, diuturniori intenso solidorum motu quassatus, a blanda sua temperie plane desciscit, salsus, sulphureus ac biliosus redditur, ut demum in excrementa poene fatiscat. Hinc sudor febricitantium salso-acidus ac foetidus, urina materia viscida, tartarea, sulphurea admodum saturata & tincta, & feces alvinæ, valde pituitosæ, biliosæ, coloratæ & scridæ secedunt. Deinde validiori illa intestina sanguinis motione, partes subtiliores spirituosæ, quæ vires & motum materialiter constituunt, aufugiant, materia sanguinis ysaepyri, dulcis, roseida, qua nutriuntur solida & quæ placidum somnum conciliat, consumitur, idque eo magis, quo vehementior ac diuturnior est febris. Quin trebrior observata constat commotionibus febrilibus demum vappidam sanguinis & humorum fieri massam, ut corpus ætius chronicis passionibus, cachexiæ, tumoribus œdematosis, exulcerationibus, abscessibus, viscerum scirrhis & infarctui facillime pateat, & profecto res non mediocris prudentiæ sit, febre intermitteente vel acuta diu afflictum corpus sanitati & viribus brevi reddere, & commoda me-

- Tom. III.

dicina atque dixta ab aliis morbis defendere.

§. III.

Sed hæc omnia longe deteriora sunt & cum majori periculo eveniunt, si febris apprehendit corpus, cujus vasa sanguine & humoribus impuris, sive particulis falsis, sulphureis, excrementitiis, sive diathesi scorbutica, jam antea imbutis, facta sunt, quippe tum major adhuc parrium, quæ mixturam sanguinis constituunt, disolutio corruptiva metuenda est, quam exanthemata varii generis, purpura miliaris, maculæ purpuratæ & pustulæ acri humore turgidæ arguunt, non sine summo virium & vitæ discrimine. Vidi sæpius in scorbuticis suborto levi tantum febrili a catarrhis motu, præsertim vere vel autumno, materiam arthriticam vel purpuraceam in sanguine delitescentem, commotione illa excitatam & ad exteriora pulsam fuisse, sub atrocium dolorum & gravium symptomatum choragio.

§. IV.

Affectus animi, quorum operatio in solidas & nervosas partes impetiosa ac vehemens est, crasin ac temperiem humorum mirifice immutant. A diuturna tristitia & animi angore, succi corporis spissescunt & cruditates viscidæ acetosæ ventriculo ingignuntur, quin si diutius durat, a sanguinis spissitudine sunt viscerum infarctus & chronicæ multæ passionnes. Ira, quæ vasa potissimum biliaria stringit eaque accelerata systole a bile nimis vacuat, simul quoque ventriculum & duodenum stricturis exagitat, efficit, ut humores biliosi in his coacerventur, corruptantur & ad vomitus, febres biliosas cholericas, & cardialgias, viam sternant. Quumque animi pathemata, maxime operentur in ventriculum, ejus motum invertant, digestionem & chylicationem lædant, multasque hinc cruditates, secundas morborum matrices, ingignant, nihil etiam perniciosius est, quam post omnes animi patheticas commotiones esculenta a ut

E potu-

Et quædam febri-
mole.

Sæpi
corrupti
postea.

Et ut
vires
materia
diffusa-
tur.

Lepti-
mole si
corpus
jam cu-
te im-
parum.

Ascoli
affectu.
am esse.
flor in
solidis.

potulenta capere, vel etiam inter cibum & potum, vel post eum, animo gravius atinci.

§. V.

*Dolorum
et
præter
in
fati-
dis in
fluidis.*

Vehemens membranarum capitis in atroci dolore spasmus detinet etiam cibos in stomacho, concoctionem turbat, inappetentiam conciliat & cruditates excludit, quod etiam valet in dolore dentium. In dentitione infantum difficiliore, nihil occurrit frequentius, quam quod in paroxysmo feces antea naturales & bene coloratæ, virides & corrosivæ, cum acerbis torminibus & flatuum impetu, non sine convulsionum metu, secedant, dubio procul, quod a spasms per dolorem in gingivam excitatis, ipse stringatur ventriculus cum tenui intestino, & lac diutius contentum, ingentem corrosivum acorem contrahat, & a bile admixta viridis emergat color.

§. VI.

In omnibus porro doloribus & spasms, cutis poros & spiracula claudi, subinde observamus. Non mirum itaque est, ab excrementis subtilioribus salio-sulphureis, quæ in naturali statu exhalant, intus retentis, valde impuram sanguinis & lymphæ massam reddi, & inde vel morbum augeri, vel ad novos paroxysmos pabulum suppeditari. Alvus quoque ubi dolores & spasms urgent, ut videmus in hypochondriacis & hysteris, semper fere clauditur. Quare a retentis sordibus & fecibus illis putridis salino-biliosis, & ad sanguinis massam vergentibus, hanc inde valde inquinari & conspurcari extra dubium est. Præterea in omnibus spasmodicis morbis urinam aquosam & tenuem reddi, ob stricturam tubulorum urinariorum, perpetuè fere observationis est, neque dubium, quin vasa in hepate biliaria, quæ ex tuniciis valde pervosis & musculosis contexta, hisce in morbis eandem experiantur crispaturam, ut hac ratione, plures crassiores excrementitiæ, biliolæ & salæ tartareæ urinolæ sordes in sanguine remaneant, eumque non leviter de-

turbent. Et hæc fubeft causa, quare malo tam hypochondriaco, quam hysterico, ingens simul cacochymia, sive impuritas humorum scorbutica, succellive ingeneretur, quam ipse sanguis e vena missus, coloris ob alcalium excrementitiorum salium mixturam, intense rubicundi, luculentior arguit. Ex hoc autem succorum vitio, plures postea passionis, cachexia, icteritia, dolores, inflammationes, rheumatismi, indurationes atque exulcerationes sequendo germine pullulant. Sed omnium pessimam eni illud vitium, quando sub vehementi spastica strictura, ut fit a veneno, inflammationibus & doloribus, sanguis firmiter incarcerationis in sphacelolam putridam corruptionem abiat.

§. VII.

Nihil frequentius in artis exercitio obivum, quam quod ab asthma spasmotico, quod validiori diaphragmatico spasma potissimum abolvitur: diaphragma affligente, hepar tandem obstruatur, induretur, ac tumores œdematosi pedum ipseque digitus hydrops, ascites maxime, sequatur. Quod quidem nullam profecto aliam ob rationem evenire arbitror, quam quod vehementi strictura portionis diaphragmatis nervosa, cui adhæret hepar & emergens inde vas venosum cava, sanguinis recursus ad cor valde retardetur, & cruor præcluso transitu, ad inferiora relabatur, ibique & maxime in portæ vena & hepatis viscere stagnans, tam truculentos morbos cieat.

§. VIII.

Quæ quum ita sint, liquido patet, spasticas in morbis, quæ urget affectiones, majorem obtinere succos corrumpendi iisdemque impuritatem conciliandi potentiam, quam ipsa incongrua & intemperata alimenta, paullo largius etiam sumta, modo excretiones, maxime per alvum & sudorem, vigeant. Hæ enim quamdiu salvæ sunt & integræ, ac omne quod superfluum, alienum & mixturæ humorum vitium minus congruum est, secedit, nuli-

*Ex spa-
smotico
phrege-
matis
hydrops*

*Et si
spasmi
succos
corrumpunt.*

nullum ab eo metuendum erit detrimentum. Porro etiam ex dietis pro-
na fluit consequentia, quod sub ejus-
modi morbis saepe modicis, & maxime
eorum paroxysmis, oppidatutur &
consultum sit a copia alimentorum,
& praesertim heterogeneae indolis, ab-
stinere, eo quod his ingestis, ob re-
tentas sordes excrementitias, major
adhuc humorum vitalium inquinatio
contingat necesse est.

§. IX.

Ingens vero etiam illa est dyscrasia
atque imporitas, quam humores &
fluida ex atonia, tam solidorum in ge-
nere, quam speciatim viscerum, con-
trahunt. Sic nimiam sanguinis & hu-
morum redundantiam, quae plethora
vocat, & tonum ac robur validam-
que systolen cordis, arteriarum om-
niumque vasorum, retitientia sua im-
minuit & frangit, cacochymiam in-
ducere nemo nescit. Nam sicut ipsa
plethora ab immutatis & suppressis
excretionibus ortum trahit; ita tardi-
or sub eadem sanguinis cursus & mi-
nus expeditus ad excretoria impulsus,
non parum sordium, secretionem, &
secessum, tum per varia organa, tum
maxime per universale illud omnium
praecipuum emunctorium, cutem, mi-
nuit atque sufflaminat. Hinc etiam est,
quod sanguis corpore plethorico emis-
sus, crassam gelatinosam & variega-
tam exhibeat, & frequentius ad mini-
ma & lateralia, vasa coactus in iisq;
incaeratus, inflammationes suscitet
agre discutendas.

§. X.

Si hepatis vel lienis viscera, mere
fere valculosa, ex atonia nimium san-
guine infarciuntur, vel demum occa-
lescent, aut indurantur, non modo
intercipitur biliofi humoris secretio ac
sanguineus latex bilioso sulphureo ex-
cremento inquinatur, sed & sanguinis
ac lymphae motus plane aliter & prae-
ter naturam dirigitur. Sanguis emi-
at vasa & viscera, vicina regurgitans,
& appulso arterioso, transitum in-
vemas impediendo, obicem ponens,

ellicat, ut nimiae ac perniciose cruoris
fiant profusiones, in ventriculo qui-
dem per vasa brevia deficientea, vo-
mitiones cruentae, ex disruptis uterinis
vasis, menses copiosi & uteri haemor-
rhagiae, ex venis animum apertis,
enorme haemorrhoidum profluvium
& in renibus, mictio cruenta. Lym-
phae autem itinere per vasa lymphati-
ca, quae his in visceribus discurrunt co-
piosissima, intercepto, humor resta-
gnat, & copiosus in vasis abdominis
collectus hydatides format, quibus tan-
dem disruptis, feralis lymphae extrava-
satio & partium corruptio inducitur.
Hinc attenta observatione patet, &
cachexiam, & seorbium, & hydro-
pem ex solo hepatis vitio, obstructione
& infarctu, incunabula trahere.

§. XI.

Insuper grave est vitium, quod san-
guis tam in crasi, quam temperie, a
tono uteri admodum dejecto patitur.
Videlicet quando perquam salutaris
illa per uteri vasa sanguinis mensuris
periodis succedens sanguinis evacua-
tio, quacunque etiam ex causa id fiat
imminuitur, supprimitur, vel ob atatis
rationem plane cessat; omnis humo-
rum massa protinus inde vitium capit,
& totius corporis malus habitus, sive
cachexia, sequitur, languor univer-
sum corpus occupat, appetitus pro-
sternitur, facies fit livida & luridi co-
loris, pedes intumescunt, lassitudo
omnes artus infestat, ac demum variae
exulcerationes, item erysipelata, dolo-
res rheumatici, lentae quoque febres
proveniunt. Quin sanguis ipse in tali
statu exantlatus, morbidus & prae-
vum exhibet colorem, valde serosus
est, quandoque prae lacteus.

§. XII.

In affectibus soporosis, item para-
lyticis & hemiplegicis, progressus san-
guinis & humorum languidior, lan-
guidam sepe secretionem seri superflui
impuri arcescit; unde fit, ut seri summa
subnascat impuritas. Proinde
saepius vidi, post hoc cerebri & me-
dullae spinalis affectus diuturniores,

De vi-
tis sol-
idorum
ex atonia.

En atonia
uteri.

En atonia
hepatis
& lienis.

En dei-
lilitate
capitis.

eryſipelata, exulcerationes, tumores
artuum, purpuræ morbum, ipſam-
que cachexiam ſcorbuticam, accelliſ-
ſe. A longiori morbo tonum & robur
Ex vitioſa
rituſi. ventriculi valde exſolvi, ut cibi aſ-
ſumti in eꝝ cavo hæreant, dolore
procreent gravativum, acſcant, cor-
rumpantur & materiam tandem ad
febrem lentam, niſi medicamento di-
geſtivo, emetico, aut roborante ſtomachico,
id avertatur, ſubminiſtrent,
certæ & conſtantis eſt obſervationis.

§. XIII.

Ex imo
hectili-
tate poſt
paroxyſ-
mi ſe.
briliſ. Intermittentium paroxyſmos, qui
universum genus vaſorum & fibra-
rum graviter exagitant, ſequenti in-
tercalari die ingentem excipere ato-
niam atque debilitatem, pulſum lan-
guidum, cutem humidam ac frigi-
dam, a paucis quidem attenditur, li-
cet res ad oculum pateat. Hanc au-
tem partium ſolidarum laxitatem, &
inde retardatum excretionis ſalutaris
impurarum partium negotium, ego
quidem merito pro præcipua cauſa
habeo, quod nova materia ad inſul-
tum febrilem denuo ciendum ſuccre-
ſcat. Sub ipſo enim paroxyſmo, &
a motu auctiori ſolidorum & nimio ſui-
dorum attritu, temperata ſuccorum
ſcheſis deſtruitur plurimaque gigan-
tur recrementis, quæ ſi prudens Me-
dicus, remittente febrilium motuum
impetu, die vacuo, commoda va-
cuante medicina, per omnis generis
emunctoria opportune educit, tomes
ſubtrahitur & levior incurrit paroxyſ-
mus, ſin minus, non modo gravior
imminet, ſed & collectis nimium
fordibus, deteriora alia mala ſunt
metuenda.

§. XIV.

Per me-
diorem
vitioſas
ex ſolli-
dit in
fluida
ex cauſis.
Ut ana-
lyſi pe-
torum. Quemadmodum itaque ex vitio &
prava ſolidorum corporis noſtri ha-
bitudine, in fluida labes & vitium tranſi-
it; ita viciffim illis ad meliorem ra-
tionem redeuntibus atque erectis, ob
communione inter utroſque mu-
tuam, hæ quoque meliorem ſcheſin,
indolem atque efficaciam recipiunt.
Sic quando vires naturæ ita collapsæ

ſunt, ut cordis motus languidior, pe-
riculoſam in morbis omnium mo-
tum, tam ſecretoriorum, quam
excretoriorum, intermiſſionem ac-
ceſſationem mineetur, efficax analep-
ticum ex cinnamomo, vel aliquot
guttulæ baſami noſtri liquidi, aut
potus vini generoſi, mox fluidorum
progreſſum & circulum reſcillat atq;
intendit, & omne abigit periculum.

§. XV.

Quando remiſſa viſtonica & elatiſſima.
ca cordis & arteriarum in corpore ple-
thorico, in quo pulſus contractus &
compreſſus eſt & excretiones imminu-
tæ, ſubtractione ſuperflui ſanguinis
per venæ incifionem, augetur & re-
vocatur, protinus cordis & vaſorum
lyſitole intenditur, excretiones ſup-
preſſæ ſordium reſtituuntur, interdum
etiam conſuetæ ſanguinis evacuatione-
nes repetunt. Sanguis nimis ſpiſſus &
glutinoſus, qualis eſt vitæ ſedentariæ
nimium addictis, ad graves morbos
diſponit, ſed motu & exercitatione
corporis, aut partium friktione, te-
nuis, fluidus & ad progreſſivum mo-
tum aptus redditur. Id quod etiam,
ſi occaſio vel vires ad corpus motu ex-
ercendum deſiciunt, clara voce, &
intento ſermone perſici poteſt, utpo-
te ex diuturna elata voce oratione,
universum corpus calore & ſudore
perlundi, perſpirationem augeri, pul-
ſum celeriore fieri, non ignotum
eſt iis maxime, qui brumali tempore
ſermones ex ſuggeſtu in templo perorant.
Dum enim ſub loquela vox in-
tenditur, citatior quoque fit respira-
tio, & pulmonum expansio cum re-
ciproco collapſu acceleratur, unde
ſanguis celerius per pulmonum com-
pagem trajicitur ad cordis ventricu-
lum ſiniſtrum, ex hoc incitatus ad
canales appenſos per univerſum cor-
poſtruditur, tandemque auctiori fa-
cto ubique circulo, velocius ad dex-
trum ventriculū agit, priſtinumque iter relegit.

§. XVI.

Neque id tantum ſuccedit in pat-
tibus

CAPUT VII.

De causis morborum, & quidem latentibus, recte cognoscendis.

§. I.

SI ulla in universa arte nostra doctrina insigni utilitate ac fructu sese commendet, atque etiam ad tutam & auspiciatam medicationem expeditam viam pandat, profecto ea est, quæ morborum genuinas causas perspicue tractat, & quomodo recte eas cognoscendæ sint, clarius exponit. Quod si enim Medici officium potissimum hoc est, ut morbos, vel inuentes arceat, vel præsentés abigat, simulque verum de eorum eventu iudicium promat, quomodo ad hunc finem obtinendum certiori ratione pervenire possit, ac si morborum causas exacte scrutetur ac feliciter quoque inveniat, equidem non video. Sane corpus a morbis ingruentibus defendere, quid aliud est, quam eorum primordia & origines scire, & iis salubri consilio & medicina depulsandis studium operamque conferre? Neque aliud sanare est, quam causas, veluti fontes graviorum symptomatum, prudenti medicatione removere. Multo minus vero quis rectum de morbi cursu & certum de eventu formare poterit iudicium, nisi ejus causæ veræ & proximæ planius & plenius perspectæ fuerint. Sapienter itaque proditum est ab Hippocrate ejusque hîs sectatoribus: *medicum ad sanandum sufficere, si ad cognoscendum iussuerit*, ut ait Lib. de arte §. 20. Id quod clarius exprimit Lib. de flatibus §. 2. *Si quis causas corporis affecti probe cognoverit, potens est valde ea corporibus adferre, quæ corpori commode, nimirum contraria, morborum natura perspecta*. Atque etiam pulchre more suo Celsus scribit: *causæ morbi investigatio ejusque primordia & occasio in affectionis & remedium cognitionem deducunt amplissimam*.

causarum morborum, fructum ejusque utilitatem, etiam.

tibus externis, sed idem quoque contingit, si partes internæ vehementiori motu agitentur. Nimirum videmus in iis, qui fortè & repetita manuum motitatione tympana pulsant, vel globis conos proruunt, universum corpus cum pulsu & respiratione impensiori incallescere, eo quod aucto inde tonico musculorum partium motu, sanguis vegetius circumagitur. Sola pedum paullo longior & fortior frictio tantum valet, ut universam sanguinis & humorum massam in celeriore motum, cum intensiori calore ut & perspiratione, adducat; quæ quidem sanguinem commovendi ratio eorum valetudini tuendæ convenientissima est, qui ob senium vel infirmitatem alio motus genere corpus exercere nequeunt. Contra vero si spasmodicæ constrictiones in febris vel affectibus chronicis vehementer urgeant, & sanguinem gravius exagitando æstum atque dolorem inferant, medicamentum nitrosum, vel nostrum minerale, naturæ amicissimum, universum sanguineum laticem æstuantem placat, fervorem extinguit, & cutis poros relaxando, liberiorē efficit perspirationem.

§. XVII.

Quando cortice Peruviano febriles paroxysmi, qui totam massam sanguinis fervidam & salino-sulphuream reddunt, sistuntur, protinus id ipsum in urina & fecibus alvi animadvertitur. Nam urina, quæ antea, remittente impetu febrili emissâ, erat saturate colorata & crassum deponebat sedimentum, jam tenuior & limpidior redditur, feces autem valde biliosæ & obscuro colore tinctæ, nunc naturalem rursus colorem acquirunt. Longe vero major & excellentior virtus fluidis valde impuris & deturbatis in hypochondriacis & scorbuticis insinuat, quando viscerum infarctus congruo aquarum mineralium potu tollitur & obstructions expediuntur. Et sic quoque solidorum ad immutandam fluidorum schein facultas patefecit.

Tom. III.

E 3

§. II.

Frictio.

Nitrosum.

Cortice Peruviano.

Aquarum mineralium.

*A mo-
dici ta.
man pla.
rumque
ignora-
tur.*

§. II.

Verum enim vero, quo majori & plane mirifica utilitate hæc de morborum, quiniuno mortis natalibus recte cognoscendis doctrina, eminet: eo negligentius & incuriosius fere in Medicorum scholis & monumentis, vel minimum non satis exquisitæ & solide agitur, vel plane silentio transmittitur. Plurimos, qui quotidianis in artis operibus versantur, id tantummodo querere, ut nomen morbi, quo æger laborat, noscant, neque multum ulterius de corporis ægrotantis natura, de causæ morbificæ indole ac vehementia, de sede affecta, & deque mali prima origine sollicitos esse, vulgari & ubivis obvia curandi ratione perspectissimum est. Perquam paucos profecto Practicorum invenies, qui non prius curam morborum aggrediuntur, quam completam & integram morbi historiam hauserint; sed plurimi auditore tantum morbi nomine, mox ad medicamenta præscribenda se accingunt, sique unum remedium genus non juvat, confestim aliud in promptu habent, ac demum inopes consilii ad practica scripta confugiunt. Quin oppido rari sunt, qui ex historici & morborum observationibus, cum cura etiam consignatis, veras causas elicere, vel quod ad praxin tutam conferat, cum certa & fundata ratione eruere possunt, vera theoria & philosophia corporis humani rerumque, quæ de salutis vel damno sunt, destituti.

§. III.

*Quod
essan-
tur quo-
rumdam
indita-
tiones.*

Morborum causas certa auxiliorum genera indicare, & ex causis bene perspectis, aptam curandi methodum sibi formare debere Medicum, constans quidem omnium merito tulit sententia; sed ineptæ in scriptis obvia indicationes, eosdem nec unquam de genuinis morborum causis verum & utilem habere & habuisse conceptum, luculenter produunt. Videas, qui magno conatu perhibent, turibundum archeum esse sedandum, & de-

pressum ac emortuum excitandum, naturam in opere suo deficientem adjuvandam, ejus errorem corrigendum, naturam vel archeum alibi & minus recte occupatum, vel aberrantem, sui officii admonendum, discursivum spirituum motum sistendum, morborum fermenta peregrina ejicienda, viscerum fermenta debiliora, & acido exuberante deturbata reparanda, & acidum certis morbis ingerendis aptum invertendum, lympham fermentificam acido-volatilem tollendam, humorum qualitatem malignam temperandam & expellendam, calidum innatum restaurandum esse, & id genus innumera alia, quorum meminisse piget, immo pudet. Quid vero aliud obscuræ hæc, ineptæ, nullius conceptus & nihil reale significantes, neque ad vitæ, sanitatis, vel morborum rationem explicandam, vel ad remedium inventionem idoneæ, medendi indicationes, quæ proxime ex natura perspecta causarum morbificarum depromendæ erant, manifestant, quam genuinas morborum & symptomatum, immo mortis causas, ejusmodi speculatoribus minus esse perspectas planeque incognitas. Quare an quicquam certi vel tuti ab eorum medicatione polliceri sibi quispiam possit, æquus & perspicax quisque dijudicet.

§. IV.

Hæc autem tam utilis tamque necessaria veras morborum origines investigandi doctrina, quod adeo incognita sit, præter alias hæc quoque subest causa, quod morbis defunctorum dissectiones rariores sint, & quod pauci ex illis utile quippiam & quod ad morbi mortisque historiam explicandam pertineat, apta ratione elicere queant. Non enim certius & melius ad naturam morbificæ causæ & sedem affectam pernoscendam datur subsidium, diligentiori cadaverum morbis enectorum inspectione. Plurima certe in promptu sunt exempla eorum, qui mirificas speculationes de morbi causa in hoc vel illo casu habuerunt, dum

*Causa
ignoran-
tissime
ficta.
nam ra-
tione.*

dum alii liegis, alii glandularum mesenterii & hepatis vitta, alii cursus naturam in motibus suis aberrantem, quidam humorum excessivam acredinem accusarunt; ubi dissecto cadavere, apoitemata in mesenterio, aut empyemata in pectore, aut polypi in valis majoribus, vel scirrhostates viscerum, aut extravasationes humorum in conspectum venerunt. Et licet accuratior causæ morbi cognitio non semper satis sit ad eam tollendam, si nempe remedium efficaciam vincat; id tamen efficit, ut Medicus, an morbus sanationem admittat, nec ne? & quamnam medicamenta in imminenti malo avertendo idonea sint, quæ non? dijudicare possit.

§. V.

Interim non diffidendum, arduum & minus firmis conjecturis esse plerumque stipatum causarum morbi scrutinium, ut in præstantissimis Medicis jure meritoque is haberi debeat, qui in eo excellit. Hoc enim revera est, quod Medico nominis famam ac celebritatem quam maxime conciliat, si veraci augurio, quæ impervia corporis penetralia recondunt, assequi & feliciter cum successu ad eadem medicationem suam dirigere, vel si majus arte malum, ipso sub sectione aspectu, ratiocinii veritatem confirmare novit. Et iusta certe de causa *Johannes Langius Lib. 1. Ep. 1.* conquestus est: quod minus celebre nomen sit Medicorum Germaniæ apud externos, quia nempe præcipua Medicinæ pars diagnostica, quæ ex suis signis morbi naturam, causas & substantiam docet cognoscere, vel ignoratur, aut ob desidia negligitur.

§. VI.

Posteaquam igitur in superioribus formalem omnium morborum rationem, in turbato æquabili & moderato solidorum imprimis cordis & omni generis valorum, motu contractorio & expansivo reciproco, contineri demonstravimus, simulque vitia, quæ inde in fluida redundant exposuimus:

transendum nunc etiam est ad causarum disquisitionem. Quum vero in *secundo medicina rationalis systematica* tomo omnes omnino causarum series, quæ proxime, mediate & remote ad morbos producendos conferunt, cunctas quoque res quæ sanitati & vitæ infestæ, accurate sitis & copiose excussimus: licebit ibi dicta hic tantisper supponere, & meditationi potius subjicere eas tantum morborum causas, quæ latentes & paullo abstrusioris sunt indaginis, graves tamen ac difficiles morbos, quin ipsam mortem, ingignunt, simulque dispicere, quo pacto Medicus probabiliter, rationali tamen conjectura, easdem possit investigare atque cognoscere.

§. VII.

Placet autem tractationis exordium ab evolutione malignitatis, quæ communis Medicorum consensu compluribus morbis summum adjicit periculum, capere. Jam vero nihil certius est, quam plurimos inter mortales morbis extingui, quibus malignitas assignatur, causa summi periculi & mortis, & quæ prudentiam medentis & virtutem medicamenti facile superat, quod testantur potissimum febres acutæ & præcipue epidemice grassantes malignæ, purpuratæ, petechiales, catarrhales, pleuritides, dysentericæ, anginæ, variolæ atque morbilli. Malignitatis itaque in morbis acutis nota est subita & plenaria omnium virium prostratio atque defectio, quæ hisce indicibus se prodit: omnis animi ac corporis vigor dejectus est, artus robur & præstinam ad motum potentiam amiserunt, pulsus arteriarum ob systolen cordis contractiorem & languidam exilior & debiliior fit, nullus placidus & qui reficiat est somnus, sed somnolentia quædam magis magisque debilitans, vel assidua vigilia premit, ægri jacent plerumque sine dolore & sine singulari sensu, neque calor in exterioribus partibus adeo intensus est, sunt anxii &

Causarum præstantissimum diffidit

diffusio natio.

inquieta, mutant sæpius situm, inque eo erecto perquam facile in animi defectionem incidunt, alvus minus recte respondet, urina plerumque tenuis, licet crebrius emittitur, respiratio est difficilior, male coherrentia loquuntur & sine singulari convulsione valida frequentius intra paucos dies extinguuntur.

§. VIII.

*Que
ut
ma
le* Ex hisce liquido apparet, malignitatem viribus, quæ vitam absolvent & teneant, insensissimam esse. Quid vero sit malignitas, & cur tam pernicialis sit? non alienum erit, hic exponere. In quo quidem evolvendo, si quis defectionis virium & malignitatis causam per calidum nativum debile vel extinctum, aut per cessationem naturæ vel archæi a motu suo & directione corporis, aut per spirituum vitalium oppressionem, explicare velit: is certe nihil, quod concipi possit, quod vere existat & quod in applicatione & in connexionem usui sit, afferet. Missis potius ejusmodi fictis terminis, ita sentiendum esse censemus: vires quæ corpori nostro insunt, non alias esse, nisi motrices, & quæ a convenienti boni sanguinis in partes influxu, salvæ tamen & integris nervis, proficiuntur; atque adeo eos præ aliis esse robustiores, qui ampliora habent vasa, qui fibras compactiores & laudabilem sanguinis apparatus obtinent; imbecilliores vero, quibus fibræ sunt laxæ, vasa angustiora & quibus parcius sanguis inest. Præterea corporis nostri vires a convenienti victu, a liquido subtili & spirituosio, ab aere puro & temperato egregie foveri & depressas mox reficiri, & vicissim a victu incongruo, omnis spiritus & virtutis experte, ab odore vel medicina vaporosa & graveolenti, ingentem induci virium jacturam. Denique omnibus iis affectibus, qui a conferta crudorum & impurorum humorum, vel sanguinis copia, originem trahunt, notabilem languorem viriumque lapsum perpe-

tuo fere jungi. Manifestæ igitur sunt virium, quæ vitæ & omnium actionum vitalium præsidēs sunt, causæ, præsentē quippe sanguine temperato, subtilibus elasticis & volatilibus partibus referto, & sufficiente facto ad quævis organa affluxu, omnes partes solidæ & motrices, earumque princeps cor, debitum suum tonum, robur motumque contractionis & dilatationis, qui universam œconomiam animalem gubernat, accipiunt.

§. IX.

*Ob pa-
tridam
in in-
teriori-
bus cor-
ruptionem.* Has itaque vires prosternit malignitas, cujus indoles atque origo quam optime ex interiorum perlustratione in his, qui ex acutis & malignis morbis decellerunt, erui potest. Nimirum si observationes & dissectiones eorum, qui peste, petechiis & aliis malignis febribus mortui consulimus, & quæ a nobis ipsis hac in re visa sunt recordamur, nunquam non notabilis, vel in ventriculo, vel intestinorum volumine consistens putrida, fetida corruptio, sive sphacelatio, se obtulit; ut inducamur credere, nunquam veram malignitatem periculi plenam adesse, ubi non quædam ex solidis partibus interioribus sphacelo & putredine infectæ fuerint. Jam nihil in universa rerum natura exsistit, quod magis animantibus adversum sit, quam ipsa putredo. Hæc enim intestinus & celerrime vires fumens destructivus motus est, qui non modo partium fluidarum texturam ac mixturem, sed & solidarum structuram invertit, dissolvit & subtiliores fluidas, impetum ac motum facientes partes, hostili vapore contaminat. Videmus certe sphacelum exterioribus partibus incumbentem subito & omnes vires exhaurire & vitam brevi extinguere; multo magis interior ejusmodi partium corruptio exitum creabit præsentissimum. Et quemadmodum, qui ex cancro maligno, cui telerima putredo semper jungitur, vel ex sphacelo moriuntur, haud dissimilibus symptomatibus, ac illi qui peste & mali-

malignis febribus decedunt, divexantur, ita horum unam eandemque esse causam, nempe putredinem, merito concludimus.

§. X.

Quæ in
acutis
et feb.
notis
manifeste
adeff.

Neque vero tantum putredo, & sphacelatio internarum partium in acutis & malignis febribus reperitur, sed hæc ipsa etiam funellorum morborum aliorum frequentior causa est, ac plerumque fert opinio. Proinde nostrum de morbis plurimis feralibus & periculosis iudicium hoc est: plerique pro causa putridam corruptionem internam agnoscunt, & raro homo ex morbis moritur, ubi non putris quædam corruptio in causa fuerit. Sicuti autem ipsa putredo gradu majori, vel minori, differt, & alia in fero, alia in sanguine est, ipsæ etiam partes, quibus insidet, ratione structuræ & usus valde dissidentes sunt; ita effectus quoque & vis putredinis diversa est, quum quædam vehementius agat, & celeriter interficiat, alia mitiori modo incedat magisque chronica sit. Patet hoc febrium hæcticarum exemplo, quæ nunquam non a corruptione viscerum soventur, & phthisi, hydropi, cachexiæ scorbuticæ, in sine ordinario fere accedere solent, similibus quoque ferme symptomatibus progrediuntur, tantum quod lentiori gradu ad mortem grassentur. Nemo enim non novit, hæcticis & quædem hydropicis, scorbuticis & cachecticis complicantur febribus, ingentem corporis languorem viriumque iacturam, cum plenaria ad motum & labores impotentia, appetitus identidem totalem prostrationem, nec non somni quieti & reficentis assiduum defectum & calorem consumentem, cum sudore colliquativo & marcore incredibili pulsusque continua celeritate ac debilitate, perpetuo conjungi; donec tandem alvi profluvium, pedum intumescencia, crebrior animi defectio finem vitæ claudant. Quo facto sub interiorum lustratione, hepatis, lienem, pancreas, maxime omnium vero o-

mentum, interdum etiam uterum, in thorace pulmones corruptos ac putridos, cum extravasato ibi putrido sero, plerumque reperimus.

§. XI.

De sphacelo
visceris
cui.

Quamvis autem morbi a putredine & sphacelo interno orti plurimam signa cõmunia habeant: nihilo tamen secius pro differentia viscerum quæ occupant, & pro natura etiam putredinis, celerius vel tardius serpentis, peculiaribus quibusdam notis, quas breviter strictimque recensebimus, distinguuntur. Primo vero notandum est, deterrimæ indolis esse eam sphacelationem, quæ partes ventriculi & intestinorum nerveas membraceas occupat, eo quod celerrime interficit & morbos etiam peracutos, immo acutissimos progignit. Videlicet, si putrida corruptio in ventriculo consistit, præter summam illam virium prostrationem & signa malignitatis communia, singularis nausæ & quædam eructationis lymphæ in os species, ad vomitum inclinatio, itemque singultus, cum sensu quodam frigoris circa præcordia interno, sese exerunt: præcedit summa anxietas corporisque jactatio, & fixus in regione præcordiorum ardor, qui tamen cum dolore subito cessat. Ab hac non differt, quæ a veneno vel maligno pharmaco in robustis & sanis antea corporibus producit, quippe quæ brevi pariter necat, & delirium ac convulsio cum plenaria pulsuum per aliquot horas intermissione, mortem antecedit.

§. XII.

De dædæ
ali.

Neque duodeni inflammatio eiq; succedens sphacelatio infrequens est. Nam morbis acutis, cholerae & febribus cholericis ex facili supervenit, & gravissima quoque iræ soboles est. Hic vero notis distinguitur: ingens & valde anxius viresque proflernens cum sudore frigido circa dextrum regionis præcordialis latus constans est ardor, cui facies lurida, & flavo colore tincta jungitur; quia spastica strictura liber bilis ad intestina descensus præcluditur, eademque per vasa lymphatica

Es reli-
gionem
interfi-
cipium
ignis.

ca ad sanguinem regurgitat: comitem quoque duodeni inflammatio plerumque habet singultum, incredibiles anxietates & inquietudines, ob nervosas partes tam graviter laceratas. Intestina tenuiora ubi sphacelosa inflammatio adoritur, prater assiduam febrem, dolor cum interno incendio circa umbilicalem regionem percipitur, alvi nimia strictura est, succedit tandem summa virium defectio cum sudore frigido, pulsus debili & inaequali, sensus doloris simul & semel perit & excrementa foetida, interdum sanguinea, sponte feruntur. Quae signa priora inflammationem, posteriora vero sphacelum designant: ubi iterum notandum hoc est, quod, si a causa violenta externa, ut ab intestino in hernia incarcerato, ab assumpto veneno, vel pharmaco virulentiae non experte, aut ab animi graviore affectu, producta fuerint, delirium & convulsio mortem celeriter efficiunt.

Munio-
la dys-
teria.

§. XIII.

Intestina in deterioris notae dysenteria, inflammatione acuta, & sphacelo quoque corripitur, procul ab omni dubio est. Illam atrociam, cum febre, siti, interno ventris ardore, tormina, penitus manifestant: hujus vero subita indolentia, quando confestim simul & semel dolor, qui antea erat intolerabilis, & ardor desinit, haud fallax indicium est; majori simul reddito excrementorum pudore, & virium decremento adaucto. Rectum etiam intestinum ex acutissimo & immani, ob profundiorum haemorrhoidum internarum tumorem, dolore, foetidissima sphacelationi obnoxium esse, non semel, sed saepius experti sumus. Haec mox latius serpit, & tam intestina, quam partes exteriores, nates & scrotum, tetra putrilagine cum nigrore ac tumore ipsicit. Faeces, quae sponte plerumque secedunt, intolerabilis, ob iis admixtum putredinis fermentum, sunt foetoris, tandem febris continua, sed mitior, cum totali vi-

rium lapsu juncta, cujus naturae solet esse putrida, & vere maligna, vitam extinguit.

§. XIV.

Quando porro putrida corruptio abdomen inque eo contenta viscera, hepatis, lienem, omentum, invaserit, tum non tam cito tragediam suam conficit. In hydropicis, scorbuticis & cachecticis eandem prodit totale ciborum fastidium, pulsus celer, debilis & inaequalis somnusque laboriosus. Certum vero ac plane infallibile viscerum in abdomine sphacelatorum signum est, si plenaria appetitus prostratio indefinenter per aliquot hebdomades laborantem premit, & hanc nunquam in ejusmodi morbis fausta ominis esse plurimis experimentis confirmatum habeo. Putredo enim adjacentibus visceribus insidens, non potest non ventriculi robur enervare & liquoris gastrici menstrua vim atque activitatem penitus infectione contaminare atque infringere. Neque uterus ab ejusmodi foetida perniciali corruptione plane immunis est. Haec in puerperis, vel in alijs, maxime nimio sanguinis profusio debilitatis, sexus sequioris corporibus, facile contingit. Visitur ab initio inflammatio & febris acuta inflammatoria, ex suppressione lochiorum frequentissima, qua sedata, circa partem frigidus sensus est, ad alvum maximeque urinam stimulus, & fluxus lochiorum, antea pertinaciter cohibitus, brevi ante mortem sponte sua demum procedit.

§. XV.

Phthisicis & qui ex pulmonum diuturno vitio laborarunt, tandem putredo cum febre putrida sic dicta hectica, quae vires paulatim opprimit, supervenit, cujus indicia sunt, praeter foetidam ex ore exhalationem, scilicet in situ erecto animi defectio, expectoratio cessans, pectorisque oppressio cum spiritus difficultate. Aetate confecta tandem in similem viscerum corruptionem incidunt, omnis perit

De
sphace-
lo ut-
erum
abdo-
minis.

Uteri
gangra.

De cor-
ruptione
pul-
monum.

Es fa-
lbus
fanti-
lior.

maras-
mo. appetitus, assiduus adest calor, unde vires paulatim consumuntur, ut tandem penitus deficient, qui affectus communiter marasmus appellatur. Ceterum internis viscerum corruptionibus individuus comes est febris continua, cum calore quidem non adeo acri & externo, qui tamen vires & succos sensim absorbit: ita quidem, ut certis intervallis remittat, non vero intermittat; postea exacerbetur, donec tandem plenario virium lapsu penitus opprimat.

§. XVI.

De
sphac.
de mem-
bran a-
rum co-
rubri. Corripit denique sphacelus ipsas membranas cerebri, ejusque substantiam, qui tamen non nisi procedente inflammatione oboritur, & hisce indicibus sese manifestat. Primum arteriarum temporum, & interiores cerebri vehementius pulsant, facies est rubicunda, oculi seroces, totus nullus urinatuus, omnia furoris plena, quæ notæ phrenitidis sunt. Postea subito compositus sit animus & ad intelligentiam redit, nihil vero nisi de summa virium defectione ægri conqueruntur, facies ante rubicunda in luridam mutatur, pulsus inæqualis ac debilis est, & sponte sæpe sanguis e naribus, paucus tamen; prodit, & hæc omnia inflammationem in sphacelum transisse & mortem adesse significant. Lethalem ejusmodi phrenidem aliquoties vidi in puerperis, quæ subsistente lochiorum fluxu, accedente febre acuta, nono interierunt die.

§. XVII.

De pu-
ulenta
adguis
corru-
pione. Præter putridam quæ in sanguinem cadit corruptionem, alia adhuc non adeo tamen exitiosa, ejus species est, quæ illa extra vasa consistens, ex inflammatione procedente, in purulentam substantiam fatiscit, & apostema, quod nihil nisi ingens purulenta materix in quadam parte collectio est, efformat. Prout vero ejusmodi abscessus variat, easque vel internas, vel externas, prehendit partes, ita differentibus etiam & pecu-

liaribus signis cognoscitur. Et quum subinde apostema longo artis usu exercitatos Medicos fallat, non incongruum erit, hoc loco exponere, quibus indicibus in universum & speciatim etiam sese prodit. Igitur in genere sciendum est: omnibus abscessibus, ubicunque etiam lateant, febrem continuam, lentam quotidianam, cum remissione & exacerbatione, pulsû debili & celeri, quæ tandem vires & succos depascit, nec non sudorem continuum, præsertim nocturnum, conjungi, adeo, ut corporis partium marcor nunquam non sequatur.

§. XVIII.

Primum vero apostema non raro *De ab-*
dominis
in ab-
domi-
ni te-
signa-
mentis abdominis regionem obidet, atque inter peritoneum ejusque mulculos sedem fixam habet. Cognoscitur, si vel supra, vel infra umbilicum, aut ad latera, circa costas spurias, versus dorsum, fixus cum tumore duro dolor per longius tempus persistit. Præterea inappetentia, calor leptus cum insigni marcore, pulsusque celeri adsunt, urina sedimentum ponit, & vires in dies decrescunt. Quæ symptomata, valde dissidentes Medicorum conjecturas subinde peperisse meminimus, quum alii malum pro inflatione intestini coli, alii pro glandulæ omentalis tumore & scirrho, nonnulli pro dolore calculi habuerunt: adhibitis vero externis mollientibus cataplasmatibus, tumor durus tactui renitens, mox pure repletus valde increvit, & apertus copiosum cum foetore pus effudit.

§. XIX.

In tho-
race. Si quando abscessus thoracem occupat, quod sæpius ex male curata pleuritide, & vera & spuria, aut ob graviores casum, vel etiam ex morbillorum aut variolarum reliquiis accidit, tunc identidem continua lenta adest febris, sed tamen specialibus indicibus ejusmodi abscessus se prodit. In dextro vel sinistro thoracis latere dolor est obtusus & pressorius, cum anxietate inexplicabili, tussis nocturna, spirandi difficul-

scilicet, pulsus est celer & languidus, partes marcore confectæ, & inter has maxime pectus emaciatur, quin sano lateri vix incumbere possunt. Si vero ingens puris quantitas ad plures sæpius libras in thoracis cavo fluctuat, tumor in latere affecto circa dorsum satis manifestus, a scapulis usque ad illa, sæpe prominet.

§. XX.

Turi effusa.

Quando pus extra vasa effusum fuerit, id diuturniori mora acie factum, diaphragmatis nerveos processus vehementius lancia, & dolor intolerabilis non procul a lumbis oritur, qui sæpe sagacioribus Medicis imponit. Redir præ ceteris in memoriam exemplum serenissimi Principis juvenutis, qui post variolas lenta febre, spiratione difficili, cum virium languore & macie afficiebatur, quibus demum accedebat atrox circa regionem lumbarem sinistri lateris dolor, appetentia prostrata, somnum cum viribus penitus consumens, ægro post aliquod tempus occumbente. Medicus coræ præfectus dolorem naturæ esse errorem quidem volebat, sed aperto post mortem abdomine, ex diaphragmate, acie cultri læso, sanies copiosa stillabat, & dissecto demum thorace, ingens puris quantitas in conspectum prodibat, totusque sinister pulmo ad vasa usque consumtus, & tabo diffusus, deprehendebatur. Ubi vero purulenta sanies conceptaculo adhuc includitur, vomica appellatur, quam fixus diuturnus ac comprimens in pectore dolor prodit, qui nec per sputa, nec per sanguinis detractionem, neque per infusa calida resolventia placatur, sed cum pulsu celeri, tussis sicca, anhelitus foetore, marcore, virium languore, inappetentia & largo debilitante sudore, continuatur. Ipsa magnitudo vomicae ex majori spiritus angustia, ingenti anxietate, pulsu duro, quandoque erecto collo intermittente, dipudicatur. Ubi demum pus perrumpit & vomica aperitur, tussis foetida quippiam puris ejicitur.

Et vomica inclusa.

§. XXI.

Evenit quoque non raro, ut variis *Abfcessus inter costas* ex causis, præsertim vehementiori in terram lapsu ac contusione, intra mensentarii membranas abfcessus colligatur, cujus notæ non semper cognitæ adeo faciles sunt. Sentitur in medio abdominis quædam gravitas, sine manifesto dolore vel tumore, febris est lenta, virium languor & animi crebrior defectio cum sudore frigido urget, quandoque vires melius constant, interdum sanies cum excrementis per alvum secedit, inhorrescit sæpius æger, & hæc symptomata diutius detinent. Si ex disrupto abfcessu sanies in abdominis cavum ipsamque pelvim descendit, dolor acutus cum crebriori ad urinam stimulo affligit, sed parum redditur, quandoque etiam puris acrimonia, intestinorum tunicas rodendo, iammanem dolorem cum febre ac tumore procreat.

§. XXII.

Ubi vero in dorso, intra peritoneæ membranæ, & musculos psoas usque ad os sacrum, tabi copia colligitur, præter alia consueta abfcessuum symptomata, dolor cum tumore ardens in lumbis continuus & satis gravis ac fixus, qui situ in dorso exacerbatur, percipitur, & tunc urina, pauca tamen, variis fibrillis repleta, cum stranguria emingitur. Observatum quoque a nobis est apostema in utero post abortum ab assumto vehementi emetico productum, ita quidem, ut postquam diutius laborantem dolor circa os sacrum & pubem cum febre, alvo adstricta, urinae difficultate, exercuisset, facta sectione, pus foetidissimum circa uterum ad libram & ultra fluctuans, totus uterus pure scatens, erosa passim per cuniculos perforatos ejus substantia, deprehenderetur.

Ex utero.

§. XXIII.

Renes porro paucis pariter abfcessibus, qui totam eorum substantiam *in renibus* non adeo raro ita consumunt, ut teste ana-

anatome, nihil præter membranofum concrementum, facculi in modum contractum, relinquitur. Tali in casu mingitur urina mox cruenta; mox ob poris micellam lactescens; interdum glutinosa, crassa, tenaci materia mali odoris referta, quæ in fundo hæret, neque ad vitri agitationem dissolvitur. Nonnunquam fanies ex rene putri in pelvim stillat, subsequente vix tolerando in regione pubis dolore, ob rosionem, quam in vesica & adjacentibus partibus efficit. Ejusmodi abscessus in plethoricis & scorbuticis seminis, cessante circa quinquagesimum annum mênstrui fluxu, item in viris, quibus hæmorrhoidum fluxus subsistit, vel consueta sanguinis missio omiffa, notavi, imprimis si Medici diureticis calidioribus, vel etiam imprudenter thermis Carolinis ad calculum dissolvendum & ejiciendum, usi fuerunt.

§. XXIV.

*In inf.
pne.* Neque caput ab abscessibus penitus immune est, quandoquidem intra parotides, præsertim apud infantes, si pus detinetur, intolerabilis circa aures cum tumore fit dolor, vigilias cum febre ad delirium usque producens. Intra cavitates ossis frontis abscessus quoque delitescit, qui intensissimum in fronte & circa radicem nasi dolorem, totum caput in consensum trahentem, excitare solet, sed pure tenui, flavo, fetido, successive ad aliquot cochlearia per nares sive sponte prodeunte, sive ab applicato convenienti errhino subducto, tandem conquiescit.

§. XXV.

*Tumor
in ferre
folym
phaticis
in tho.
racc.* Accedit aliud genus abscessuum, sive potius tumorum, qui non purulentum, sed lymphaticum & serosum humorem continent, neque ex præcedente inflammatione, sed potius ex lymphæ cursu impedito originem trahunt, quorum sedes minime in visceribus vel in partibus sanguinis plenæ est, sed intra membranarum tunicas consiliat, neque humor, quem

condunt, erodentis, ut pus est naturæ, inde etiam non partium, quibus inest, substantiam depascit. Hi tumores non raro prægrandes fiunt, ut vel plures libras feri puri, quod calore in ossam, ut albomen ovi, abit, complectantur, ac sepiissime hærent intra duplicaturam pleuræ, & cavitatem thoracis replent; quibus disrumpitis, ingens pectoris fit inundatio, quæ pulmonum expansionem & motum diaphragmatis impediendo, ægrum suffocatione tollit, opprimitque. Vidimus talem casum ante aliquot annos in generoso militiæ Præfecto, qui de dolore in pectore continuo, fixo & compressorio sinistri lateris conquerebatur, paullo difficilis cum tussi sicca perpetuo aderat respiratio, quæ intervallis, præsertim noctu ab incongruo maxime situ, ita ingravescerebat, ut summa anxietas cum suffocationibus metu per aliquot horas adesset pulsus continuo frequens, mollis tamen, sine siti vel notabili calore, neque appetitus, neque somnus plane deficiebant; pedes frigidi & una cum seroto tumore cedematoso laborabant, exterius in thoracis regione nihil tumoris, nihil ruboris animadvertebatur. Accidit deinde, ut a paulo fortiori thoracis commotione a cachinno confestim in maximam & continuam spirandi angustiam atque anxietatem, quæ ad quindecim horas durabat, incideret, qua etiam infelicitè misereque suffocatus periit. Aperta thoracis cavitate, latus sinistrum totum feri minimum 8. libræ inundabant, quod largius, levi saltem incisione facta, effluebat, eodemque penitus effuso, membranaceum receptaculum disci majoris magnitudine, tenue tamen, ad latus sinistrum in conspectum venit, quod sine omnidubio ex membrana pleuræ productum erat, & collecta intra duplicaturam, ex valis lymphaticis disrumpitis lymphæ, talem capsulam sibi efformaverat. Reliqua viscera satis erant integra, nisi alio, nisi quod ex mor-

bi diuturnitate contraxerant, vitio laborabant. Causam vero & ortum hujus affectus eger in acre ac intensum frigus, quod in expeditione Rugiensis passus, rejecit.

§. XXVI.

In abdomine.

Neque dubium est, quin ejusmodi serosi abcessus & tumores in abdominis cavitate sæpe occulti lateant, & vel in mesenterio, aut in dorso, intra duplicaturam peritonei, vel intra uteri membranas, quandoque etiam intra ipsum ovarium, contineantur, qui desiccantes, facto semper affluxu majori, feri copiam in abdominis cavitatem ingentem fundunt, quod corruptione dum inficit viscera, fatali diem accendit. Non quidem sine difficultate ejusmodi tumores cognoscuntur, & a posteriori magis & noxio eventu atque effectu demum se produnt, si videlicet in mali habitus corporibus & diutius infirmis subito hydrops gignitur, abdomen intumescit, & ductuantes aquæ vario in latera decubitu percipiuntur; id quod etiam concludendum est, si quis diuturno pectoris dolore, & respirandi angustia affectus, confestim in suffocationem spirandi angustiam non superabilem incidit, ubi certe subiti ejusmodi hydropis generatio non aliam causam, quam rupturam ingentis aquali tumoris & effusionem copiosam feri in cavitates agnoscit. Quod, vero, intra membranas tumores, quibus extra vasa positus humor insidet, gigni possint, evidenti testimonio est ille tumor, qui salvis internis visceribus intra duplicaturam peritonei hospitatur & mole sua abdomen ejusque musculos mire distendit, adeo, ut verum hydropem mentitur. Quo in casu *Nuckius* alique paraceuthesin, quæ in anasarca nunquam non plus exitii quam salutis affert, summæ proficuum observarunt.

§. XXVIII.

Exulcerationes internæ.

Ab abscessibus ad partium exulcerationes transimus, quæ ab illis non

parum differunt, tum quod abscessus copiam materie, & purum, album, coctum pus, ulcera vero partium ichoris & ferisæcidi fundant, illi magis partes sanguineas succulentas, hæc vero membranaceas, frigidas & liccas adorian-
 tur, ibique sedem fixiorem habeant. In ven. arteria
 Ipse ventriculus, qui partium membranacearum facile princeps est, ab his nonnunquam attentatur. Meminimus olim civem Mindenlem, ob nimiam spiritus vini ingurgitationem & frequentiore iram, acerbissimo dolore ac tumore circa præcordia correptum fuisse, qui sumto cibo, increcebat, utut vomitu non ita multo post rejiceretur. Accedebat universi corporis marcor, frequens erat lipothymia, alvi excrementa nigricante colore interdum tincta erant, quumque per dimidium fere anni misere decubisset, tandem fato concessit. Aperto cadavere ventriculus parvus & valde contractus, crassus tamen & albicans. Inventus fuit, rugis, & etiam punctulis intus obstitis, quibus incisus, materia saniosa sœtida exstillavit, & in corde ac omnibus vasibus parum sanguinis repertum.

§. XXVIII.

Vescicam quoque non raro chronicum & molestim ulcus, sive ex luis In Pess. ca. Gallicæ contagio, sive ex calculi grandioris attritu, aut ex cessante consuetudine hæmorrhoidalæ fluxu, fovere, non novum est. Id, vero, magnus urinam emittendi stimulus, cum ardore & difficultate manifestat. Urina mingitur crassa, quæ subinde, inilar albuminis ovi coherens, simul ex vase effunditur, inque ea non modo pellucida & tursuracea quedam partem, sed & sæpim viscidum ac purulentum in fundum dejectur. Color etiam valde gravis pubis ac perinei regioni incumbit, cujus tanta sæpius levitia, ut partes extremæ inde inhorrescant, qui tamen remittit, si largiorem quotidie ac tenuem potum agri assumunt, quippe tunc, urina facilius prodit, cum copioso mucido sedimento. Ab ejusmodi

modi ulcere vesica densatur & cor-
rugatur, exterius albescat, fibræ
contractæ, nigricantes ac sphace-
late apparent; & pus in ea cuniculos
format. Quin, si materia foetida acris
in pelvim descendit, vicinæ etiam par-
tes putredine inficiuntur, qualem ob-
servationem *Miscell. Natur. curios.*
Déc. 2. Ann. 6. observ. 100. comme-
morant. Sicalculus in vesica ejus e-
xulcerationis causa est, tenesmus,
cujus vehementia non raro rectum
propellitur, perpetuo urget, urina
est purulenta & arenosa, inque pelvi
pruritus percipitur, & sub situ erecto
dolor auctur.

§. XXIX.

In pro-
statu.

Si vero prostratus & glandulosæ u-
rethræ multis lacunis præditæ tunicæ,
quod sæpius a male curata gonorrhœa,
nec non in lue venereæ infectis accidit,
exulceratio insidet, ut plurimum in
consensum collum vesicæ trahitur,
crebrius ad urinam est stimulus; sed
cum intenso ardore & dolore mingi-
tur, & difficulter, ob urethræ spas-
mo contractam redditur. Ex glande
etiam membri subinde liquor, qui
consistentia, colore & strimonia dif-
fert, sistit, vel manu exprimitur,
atque in urinâ sedimentum albicans,
cum filamentis natantibus, quæ ver-
miculorum figuram referunt, conspi-
citur.

§. XXX.

Fæstis
morbo-
rum cas-
sis an-
nume-
da effu-
sione
sanguis
ali, in
capitis.

Ad causam quæ valde difficilis
& plerumque lethales affectus indu-
cunt classem referendæ porro sunt san-
guinis, vel etiam feri, extra vasa ta-
cta effusiones & stagnationes. Inter
has ea, quæ intra cerebri ventriculos,
ob plexum choroideum disruptum,
contingit sanguinis extravasatio, pe-
riculosissima est, & apoplexiam for-
tem, brevi enecantem, efficit. At
vero quum alia etiam sit apoplexiæ
non infrequens species, quæ agri-
vo pulsu & respiratione, facie florida
& rubicunda, diu sine sensu & motu
jacent, & tamen fervantur, non im-
merito indicia, quibus utraque distin-

guatur, desiderantur. Fortis quum
in sanguinis effusione immedicabili
fiat, has habet notas: jungitur illi
ut plurimum vel paralytis, vel convul-
sio. Illa visitur, si unum latus frigidum
& quasi mortuum torpet, alvique
sponte fertur: hæc vero vehementi
thoracis motu & elevatione cum stertore,
roncho & sonitu, neque minus
artuum distractione, elevatione, aut
ventriculi per vomitum subversione,
manifestatur, & sanguis interdum e
naribus profluit. In mitiori vero, secus
res habet, quæ in hystericiis, hypochon-
driasis, plethoricis, a vasorum cerebri,
ob copiosius per spasmos eo conge-
stum sanguinem, distensione fit: quo
casu maxima spes in sanguinis mittio-
ne reponenda est, ne perniciosis cana-
lium ruptura accedat.

§. XXXI.

In ab-
domine
& qui-
dem in
vario.

Rarius in thoracis cavitate, nisi a
violenta vasorum dilaceratione, san-
guinis effusio contingit; in abdomine
vero id eventisse recordeor. Ante vigin-
ti circiter annos nobilis in hac urbe fe-
mina triginta annorum, elegantis for-
mæ, quartum mensem gravida, præ-
ter omnium opinionem de subito vi-
rium languore conqueritur, facies con-
trahitur, livida & frigida fit, ad vo-
mitum adest inclinatio, erecto capite
animi defectio invadit, quæ crebrius
repetens, intra decem horas cum ma-
gno dolore mariti uxorem & vivis a-
bripit. Dissecto abdomine, in ejus ca-
vitate ingens sanguinis congruati ad
libras atque copia reperiebatur, qui
ex disruptis ovarii multum tunc facti
& gravis sanguinis adhuc obfessi, vas-
is effusus erat.

§. XXXII.

Ex va-
sis b-
vibus
venari-
bus.

Nullibi tamen canales sanguiferi
facilius dissiliunt, quam in sinistra
ventriculi parte vasa hic dicta breviora,
quæ tenui membrana obducta, ab ir-
ruente copiosius cruento, non solum
ex facili adducuntur, sed etiam de-
mum perforantur, hanc potissimum
ob causam, quod intercepto sangui-
nis per lienis vasculosam, ac rari mor-
lilique

lisque textura compagem progressu isper brevium emulsaria exitum sibi parat. Hoc autem si evenit, vomitus sequitur sæpe effrenis sanguinis nigri foetidi atque grumosi, qualis etiam per alvum secedit & clysteribus educitur. Et licet rejecta stomachum aggravante sanguinis mole symptomata tantisper levare videantur; repetit tamen utplurimum vomitus & ægri intra paucas horas inter lipothymias placide obdormiscunt. Cognoscitur hic morbus ex inappetentia, animi defectione, magna circa præcordia anxietate, vomituritione ad animi usque deliquium, ardore ac æstu in regionis epigastricæ sinistro maxime latere, & familiaris est feminis post quinquagesimum annum, diuturno mœnore confectis. Dicitur enim vix potest, quam gravem labem lienis viscus ex longa contrahat tristitia, quæ uti ira hepar & ductus biliaris potissimum afficit, lienis noxam affricat, ita quidem, ut præter imbecillitatem, quæ inde in universum corpus redundat, huic potissimum robur & vim resistentem adimat, illudque ad concipiendum infarctum disponat. Ut adeo Veterum sententia, quæ hepar iræ & lien melancholicæ sedem esse volunt, ratione & experientia non destituatur, modo melior & rationalis accedat explicatio.

§. XXXIII.

En rhi-
gru-
strae
hemor-
roides.

Pariter quandoque lethalis rupturæ valvorum interiorum hæmorrhoidalium accedit. Novimus primipilum quendam, natione Gallum, qui liberalius utens vino adstringente Francicò, quod vocant Pontack, subsistente consueto hæmorrhoidum fluxu, in atrocem dolorem dorsû, & cruciatus infra umbilicum incidit, cum febre lenta, purpuracea etiam, largo sudore & alvi tam firma contipatione, ut clystere injecto nihil redderet, sed tormenta potius aufercerent. Secta fuit venas propinata, nitrosa, oleosa, demulcentia, mannata aliaque plura, demum simul & semel aliquot mensu-

ras sanguinis foetidi & grumosi per anum ejecit, ipseque lipothymia correptus diem obiit. Neque alia hujus affectus & eventus fuit causa, quam quod farta nimium & disenta coli ac recti vasa, dolorem, & rupta, funestum profluvium intulerit.

§. XXXIV.

His frequentiores sunt seri intra cavitates effusiones, ac inter has ea, quæ fit in capite, & ætati infantili infesta, immani magnitudine ac tumore, quem hydrocephalum dicunt, & aliarum partium marcore, in conspectum venit. Eadem seri intra cavum thoracis collectio & stagnatio, quæ hydrops thoracis audit, iis, qui polypum grandiore in corde & majoribus ejus vasibus gerunt; & asthma convulsivo laborant, satis frequens est, & nunquam fere non, ubi magna spirandi difficultas jungitur, extravasati seri copia in thorace, instituta anatome, visitur. Hæc ipsa vero sic dijudicanda est respiratio antea difficilis si longe difficilior reddatur, & paroxysmus quasi suffocatorius diutissime assigit, parumque remittit, non fallax seri in thorace copiosus collecti indicium præbet, præsertim, si, quod exspuitur, sanguineis stris distinctum, eo quod ob nimiam pulmonum compressionem & diaphragmatis motum suffraginatum, sanguinis liber cursus ex uno cordis ventriculo in alterum intercipitur, & is ex arteria pulmonali vehementius contracta, in arteriam asperam exprimitur, quod signum in funestis præcipuum est. In abdominis cavo serum vasorum alveis elapsum tum ex murmore, fluctuatione, tum etiam ex majori virium prostratione & lenta febre, quum viscera corrumpi incipiunt, in hydropicis dignoscitur, quæ corruptio per paracenthesin, aeris atmopharici liberiori accessu lacto, magis magisque promovetur, & mors acceleratur. De purulenta materia ex abscessibus disruptis in cavitates exiliante, quibus nimirum effectibus se prodat, jam in superioribus mentio tacta est.

Entra-
vis-
thoracis
seri.

Quid?

§. XXXV.

Ruptura
partium
inter-
narum.

Quid? quod quandoque plane pars quædam interna disrumpatur & subitum insperatam mortem afferat, id quod potissimum de liene utero annotavimus. Erat quondam Hemipoli femina 20. & quod excurrit annorum, sanguineæ constitutionis, & floridæ faciei. Hæc venæsectionem nunquam passa & sexto jam mense uterum gerens, non solum ob matris obitum gravi afficiebatur morore; sed etiam incendio suborto terrore percellabatur, eoque excita, præcipiti lapsu e scala cadebat, post quadrihorium expirans. Inquirentibus autem in tam subitæ mortis causam, facta sectione, aliquot libræ sanguinis corrupti, ex disrupto in convexa parte tumido & friabili liene, effusæ, in abdominis cavo sese obtulerunt, licet exterius ne vestigium quidem fugillationis compareret. Oblatus etiam haud ita pridem ordini nostro ad ferendum iudicium est casus, de viro, qui inverso rastro forte percussus, paulo post obiit, inventa sub sectione nulla externa macula aut læsionis mortisferæ nota, sed abdomen cruore ex liene, ad costas usque spurias infimas elongato, discisso, plenum. Uterum vero per rumpi, sæpius quam quidem putatur accidit. Videlicet quando semine per aliquot dies graviter ex partu laborarunt, & retento fetu, subito occumbunt, post mortem plerumque uterus ex ruptura perforatus deprehenditur, propendentibus ex hiatu infantis pariter extincti pedibus.

§. XXXVI.

Di fibr-
ribi ut-
serum
& glan-
dulae.

Dantur adhuc aliz chronicorum & rebellium affectuum causæ, quæ licet aliquanto rarius occurrant, eo plus tamen habent in sanando & cognoscendo difficultatis. Sunt autem hæ ipsæ partium scirrhorum indurationes, quæ tum viscera ex innumeris tenuissimis vasis conflata tum etiam glandulas, quarum structura identidem mere vasculosa & nervoso-membranacea est, potissimum invadunt. Quam enim ex

obturatione tubulorum trahant incunabula, facile colligitur, eas partes, quæ fere penitus ex minimis & capillaribus vasculis constructæ sunt, ejusmodi malis ex facili parere. Sicut autem in abdomine copia glandularum & varia viscera continentur, ita etiam hæc vitia crebrius ibi conspiciuntur. Inprimis pancreas, quod totum mere glandulosum est, immo corporis glandula maxima, crebrius quam ullam aliam partem, scirrholis indurationibus expositum invenimus. Profecto diuturniora illa mala ac vitia, quæ circa digestionem, & prænas vias in hypochondriacis & hysterics frequenter occurrunt, ut plurimum pro causa pancreatis inexpugnabilem obstructionem, teste anatome, agnoscunt; unde fit, ut ejus succus deficiens, vel heterogeneo acore imbutus, non solum digestionem & dissolutionem ciborum minus recte inservire possit, sed etiam perpetuus sit acidi corrosivi proventus, qui famem caninam efficit. Denique pancreas etiam penitus induratum in iis, quæ quartana diuturna laborarunt, sæpius vidi.

§. XXXVII.

Tylosi
& duode-
dum.

Quumq; pylorus eiq; annexum duodenum copiosis & eximiis glandulis obsideantur, accidit quandoq; ut scirrholus tumor etiam in iis deprehendatur, qualis tumor, si aliquanto major fuerit, circa dextrum epigastrii latus renitentia se manifestat, & ad tactum digitis comprimentibus, utrum non sine dolore, cedit. Pylorum & duodeni principium dum ambit idque angustat & fere occludit, alimentorum in ventriculo digesta massa nequitum ad intestina descendere, inque corpus distribui potest, unde fit, ut hoc marcorum consumatur. Diutius vero alimentorum massa ibi subsistens & acidior reddita, ventriculorum ad vomitum sollicitat. Præterea ejusmodi duodeni exquirite sentientibus membranis inhærescens tumor, distensione acerbissimum, & indefinentem dolorem circa ventriculi regionem per aliquot

F

men-

Tom. III.

menes concitat, cuius sævitia somnus impeditur & vires consumuntur.

§. XXXVIII.

In vesica.

Vix ulla vero in abdomine contenta pars facilius scirrhis infestatur, quam vesicæ corpus membranaceum & ex parte glandulosum, cui, præsertim circa cervicem, neque tantum externe, sed & interne, accrescunt. Ita *Miscell. Nat. Curios. Cent. 1. & 2. Obs. 186.* memoravit scirrhosum tumorem exterioris vesicæ tam insignem adnatum fuisse, ut totam pelvim impleverit. Produunt ejusmodi tumorem, præter dolorem in pube gravitativum, dysuria cum tenesmo, alvi difficultas; in feminis fluor albus sanguini permixtus. Neque novum est vesicæ ostio interioris tumorem scirrhosum appendi, vel interiorum ambitum orificii in magnam crassitiem excrescere. Hæc difficiliter producit missionem, sique incrementum capit, pæne supprimit, ut urina retenta & vesicam & ureteres sarcinibus in modum cum exquisito dolore distendat, abdominis sequatur inflatio & febris, quale exemplum notavimus in illustrissimo Comite de Harrach, in Carolinis mortuo. Occlusi vero orificii scirrhoso tumore indicium est, catheteris plane negata admissio. Interdum etiam exterior circa ipsum vesicæ colum atque ejus ostium glandulosa surgit excrescentia, quæ urinæ effluxum & catheteris in vesicam ingressum plane impedit, inde abdomen attollitur, de quo videatur *Riedlinus obs. 2. An. 1607. mense Feb.*

§. XXXIX.

In prostratis.

Quandoque scirrhis tumor non vesicæ cervici adheret, sed in prostratis consistit. Hic plerumque ex gonorrhœa male curata oritur, & non modo in urina emittenda difficultatem parit, sed & magnitudine increfcens, collū vesicæ ita comprimit, ut in totum urina supprimatur, quo casu neque catheter, neque remedia interna & externa, urinam prolificare possunt, sed vomitus & convulsiones supervenientes, fatalem diem arcessunt. Quod vero tumor in prostra-

tis consistat, ex eo judicandū: si gonorrhœa præcesserit, ac ad radicem penis renitentia quædam obseivetur. Frequentissime enim accidit, a coitu impuro & fluxu seminis maligno, inter initia præpostera medicatione excepto, pessimum prostratas contrahere vitium, ac induratas in scirrhum densari, qui demum sæpe longe post exulceratur inque fistulam abit, partes vicinas exedentem, eoque facto gonorrhœa redditur inveterata ac rebellis, quæ Chirurgos eque ac Medicos, ipsoque potissimum ægros, miserrime exercet.

§. XL.

Porro mesenterium, in cuius centro copiosæ extant glandulæ, generandis ingentis magnitudinis tumoribus quæ maxime opportunum est. Qui atrophia affliguntur, præter abdomen inflatum, quod subinde in pueris conspicimus, obstructas & valde tumidas in mesenterio, restantibus id anatomicorum observationibus, delitescentes glandulas gerunt, quæ liberum iter ac transitum chyli impediendo, tabem & marcorem corpori inserunt, intestina humoribus replent, qui fluxuum, & frequentium dejectionum causæ sunt. Nonnunquam accidit, ut ingentis magnitudinis scirrhus, vel plures etiam, mesenterii membranis inhereant, quibus venter in molem attollitur, ut vel in gravitationem, vel molam, vel hydrope mentiat; reliquis vero partes corporis tanta sæpius absorbuit macies, ut ossa atque pellis videantur cuncta, qualia exempla passim in observationum medicarū scriptoribus leguntur. Tali in casu id tantum vitandum est Medico, ne in prognosi imprudenter delinquat suamque existimationem lædat. Differt enim ejusmodi tumor ventris, a scirrhosa glandularum mesenterii intumescencia productus, a graviditate magnitudine ingenti, & magis magisque increfcens, reliquarum partium contabescencia, & quod tumida moles non tam ad ilia & versus dorsum, quam potius ad medium abdominis se extendat, nec non quod

In mesenterio.

quod in prægnantibus motus infantis vividus persentiscatur. Ab hydropo autem distinguitur, dum huic tumores pedum oedematosi cum facie plumbea & lurida, urina pauca & rubicunda complicantur, aqua quoque in scrotum descendit, & in abdomine impressi digiti vestigia relinquuntur, quæ in tumidis mesenterii glandulis non conspicua sunt. Sed multo difficilius est, a mola, quæ ab auctoribus vocatur nutritionis, & quæ potius ex crescentia fungosa utero adnata est, hunc tumorem in feminis discernere, nisi quod in ejusmodi carnosissimis magnus pondus in regione pubis percipitur, alvi & urinæ fiat difficultas & humor peregrinus cum sanguine interdum ex poris & glandulis uteri exprimitur, quod mesenterio affecto non facile accidit.

§. XLI.

In he-
pate.

Præterea scirrhusi tumores frequentius etiam duo illa in hypochondriis magna viscera sita, hepar & lienem, adoriuntur, quia ob singularem venæ portæ structuram, dum vas adveniens & arteriosi munere fungitur, infarctibus, obstructionibus, & ex his promascentibus scirrhis, quammaxime sunt exposita, quibus generandis adhuc eorum structura vasculosa plurimum velificatur. In hepate si consistit & magnam ejus partem occupat, gravativus in dextro hypochondrio percipitur dolor, sæpius etiam prædurus ac renitens tumor exterius conspicitur ac sub costis spuriis & scrobiculo cordis tangi potest, præsertim si quis ventri incumbat. Ceterum color faciei flavus & luridus est, eademque cum oculis tumida, pedes quoque intumescunt, respiratio est difficilior, & compressione ventriculi post cibum, præsertim flatulentum, anxietas circa præcordia augetur.

§. XLII.

Lien.

Quandocunque lien intumuerit, vel etiam in scirrhum abierit, in latere sinistro versus dorsum sub costis spuriis, gravativus & pressorius est dolor, qui

usque ad præcordialem regionem sese extendit, cachexia quoque in facie conspicua, & ructus ac flatūs molestant, languet appetentia & spiritus difficulter trahitur. Accedētibz doloribus & stricturis, ex animi graviore affectu, vel aliis de causis, spasticis, vomitus cruentus nigricans, vel solus, vel ejusdem coloris dejectionibus conjunctus, quem morbum Hippocrates nigrum appellat, ut plurimum funestus nascitur id quod sæpius vidi in feminis adultioribus, sanguineæ complexionis diu merori indulgentibus, immo etiam post paralytin soluti lateris, postquam & atonia & infarctus lienis incesit. Scirrhum quandoque etiam uterum invadere, ita ut fere totus in illum mutetur, observationum fide constat, & de ejusmodi casu vid. *Misc. Nat. Curios. Cent. 1. Obs. 120.* Hæc vero adsunt symptomata, premitur vesica & intestinum rectum, hinc urinæ ardor, stranguria, alvi evacuatio, atque eximius dolor fixus & stabilis circa pubem & circa lumborum regionē, vomitus, cibi fastidium, & præcordiorum anxietates exsuscitat.

§. XLIII.

Si transeamus jam ad morborum *Diagn.* alias causas, non ita quidem obvias *Sympt.* misere tamen, & variis modis ægros torquentes, quin ipsum lethum inferentes. Hæ sunt massæ ex variis pelliculis & fibris concretæ solidiores, cordis & valorum cavitatibus præcipue majoribus inherentes, quæ Medicis polyporum nomine veniunt. Morbos, quibus sese jungunt, sive acuti sive chronici fuerint, perpetuo fere, immedicabiles reddunt, & diligentior cadaverū morte sublatorum anatome, nos facit certiores, vix tria cadavera occurrere, ubi non infesti hi hospites conspectui sese offerant. Domicilium vero suum maxime omnium cordis thalamis, inq; principio arteriæ pulmonalis & arteriæ aortæ, rarissime in vena pulmonali habent. Observatur adhuc animo serenissimi Hoffatæ Principis, anno ab hinc & vivis sublato exemplum. Hic quô

de dolore comprimente fixo in sinistro thoracis latere supra papillam conquereretur, cum anxietate & angustia spirandi, pulsus inequali cordisque palpitazione, quibus cedematosa pedum accedebat intumescencia, ego per litteras in consilium anno. ante obitum ascitus, polypum adesse prædixi & difficilem fore medicationem, quod prælagium sectio cadaveris confirmavit, dum quatuor polypi, duo in dextro, unus in sinistro cordis ventriculo, & quartus in arteria magna, inventi. Sinus cerebri quando a polypo. so concremento oblidetur, atrocissimi affligunt capitis dolores, & ad hemiplegiam, quin apoplexiam, via panditur. Præterea polypi non modo subitæ mortis, ubi canalium alveos, præsertim dextro ventriculo appositorum, claudunt, sed si pulmonalibus valis inhærent, gravissimæ & sæpe funestæ hæmoptyleos, catarrhi suffocativi, asthmatis convulsivi, nec non hydropis thoracis causa sunt.

§. XLIV.

Signa
polyp.

Plurimum itaque interest, ut Medicus hos occultos insensibilissimos motuum vitalium hostes exploret, ac detegat. In quo quidem scrutinio tenendum est: temperamentum sanguineum, & habitum corporis angustioribus vasis, fibrisque mollioribus donatum, vitæ genus laboris & motus expers, parciolem potum & usum eorum alimentorum, quæ glutinosum succum præbent facilesque sunt ad coagulum subeundum, liberaliorem ulum vini acidi & spirituosorum, cœnam quoque largiorem ad generationem ingratorum horum hospitem symbolum conferre. Proximiora vero & manifesta indicia, e quibus ipsorum præsentia conjici, & judicari debet, hæc redeunt. Polypi initium arguit compressio pectoris & fixus circa cor dolor, si vero jam incrementum cepit, præter hæc frequentius, vel levi de causa, recurrit cordis palpitatio, pulsus miris modis inæqualis & varius est, sæpiusque notabilibus intervallis intermittit. Tunc a motu

corporis fortiori, vel medicamento sanguinem exagitante sumto, aut ab affectu animi vehementiori, dispnoea & incredibilis cordis anxietas urget. Postremo, lypothymia frequentia, sine causa evidente, vel quæ a certo corpore decubitu provenit, est in signis polypi præcipuis commemoranda, quibus accedit quod sanguis emissus in aquam calidam, mox instar gelatinæ concrecat & in filamenta alba mucilaginosâ fâscicat.

§. XLV.

Nonnunquam ejusmodi carnosæ & membranosæ involutæ concreciones vasa uterina opplent, & hinc varia circa uterum & mensium negotium insolita pathemata occurrunt. Notum ex pathologicis est, certa hydropis speciem, quæ maxime inferiorem abdominis regionem petit, utero veluti causæ adscribi, neque male. Etenim si libera, sanguinis per ejus vasa progressio impeditur, quod promptissime in canalium alveis a polyposis massis obstructis, non potest non fieri, quia ingens feri copia secedens, aut in utero, aut in abdominis cavitate, descendat. Cl. Payerus in *Hist. Anat.* p. 127. feminam humore hydropico demortuam dissecut, ubi uteri vasa copiosis molis carneis intus obfessa invenit. Ante aliquot annos femina generosa Berolini peculiari laboravit affectu: per aliquot nempe menses ex utero limpidissima aqua, quæ intra viginti. quatuor horas interdum libram æquabat, stillavit, ægra tandem marcore & febre confecta. Post sectionem, uterus magna ex parte scirrholus, ex parte etiam, polypis quoad vasa obfessus, inventus fuit. Accidit etiam, ut serum in hydatides five magnas vesicas concedat, quæ si fuerint intra uterum ruptæ, aqua ex orificio uteri exillat, si vero exteriorum uteri substantiam oblidetur, humor in cavum abdominis funditur. Referenda hæc est historia, quam *Vesalius Lib. 5. de corporis humani fabrica cap. 9.* de quadam muliere Augustana refert: se in ejus uteri.

A polypis uteri hydropis uteri.

uteri cavitate serosæ materiæ supra 60. mensuras Augustanas reperisse, reliquis visceribus ab inundatione plane immunibus . Et *Mauritius Cordus Comment. in Lib. I. Hippocr. de morb. mulier.* notabilem affert historiam mulieris hydropæ uteri laborantis, in cuius utero & reliquis corporis partibus plurimæ vesiculæ aqua citrina plenz, inventæ fuerunt .

§. XLVI.

*Remo-
vagie
nieri &
abortus* Neque dubium est, quin polypi uterini causa profusissimæ sæpius sint hæmorrhagiæ, non secus, ac qui vasa pulmonum obdissent, incoercibilem hæmoptysin proferunt . Quæ frequenter abortiunt feminæ sanguine redundantes, iis solenne admodum est, ut paullo ante abortum cum ingenti lumborum dolore primo sanguine, deinde massas carneas ovi gallinacæ magnitudine, numero plures, excludant . Has enormis non raro cum animi defectione sanguinis effusio sequitur, & paullo post embryo . Perperam autem hæ massæ habentur pro molis, quæ nihil aliud sunt, quam polyporæ ejusmodi a mucido stagnante intra venas uterinas sanguine concretiones, quibus ejectis, ob vasorum nimiam distensionem, & apertionem, largissima sanguinis effusio sequi necessario debet . Id tamen interdum accidit, ut aliquot placentulæ abortivæ, in uteri cavitate maneant, ibique auctæ ac induratæ, varia symptomata producant, quorum causa mola a Medicis communiter dicitur & adstruitur, cuius indicia sunt, si intumescit abdomen; tumor vero magis ponderosus & durus est in ventre, nec versus umbilicum extenditur, sed in inguine subsistit, nullus se exserit motus infantis, nec verus, nec calcitrativus, neque circa umbilici regionem, nec exterius percipitur, sed interius debilis & tremolus est, cui multæ præcordiorum anxietates cum rēnsivis doloribus junguntur . Quandoque cum sevisissimis partus doloribus ejusmodi molæ, quæ nonnisi

Tom. III.

membranacea concreta sunt, excluduntur, unde venter mox in totum subdidit .

§. XLVII.

A polyphis ad alias res fere leves & ludieras, nihilominus sævissimorum, quin lethaliū, affectuum causas, nos convertimus, inter quas jure meritoque calculus ex materia tartarea, terrea, mucida concretus, si infelicitissime canales vel cavitates eximias & notabiles obstruat, refertur . De renū calculo illud perquam notatu dignum est, eum, quamdiu renū incolit substantiam, nihil molesti sensus creare, simulac vero incipit e sede sua moveri & uretherem ingredi, tunc protinus incredibilis se primo in lumbis postea in lateribus circa ilia, secundum uretherum ductum se exserit dolor, quem ordinario fere nausea, vomitus, summa anxietas, extremorum frigus, stupor partis affectæ, ardor urinae, calor præternaturalis, alvus contracta, contractio testiculī & vigilia, comitantur . Quandoque etiam atroces in ventre cruciatus complicantur, qui, si calculus subito per uretheres transit, atrocissimi sunt, ut medentum imperitiores, & qui prima vice cum hoc malo consistantur, morbum potius pro convulsiva & funesta colica, quam pro calculo habeant . Neq; inficiandum est, dolores ex calculo plura habere cum colica spasmodica communia; in eo tamen differentiam esse experientia docet, quod calculus subito & cum atrociam invadat, principium in lumbis habeat, ventriculum ad nauseam & vomitionem sollicitet & in urina crassius sabulum conspicitur . Tandem nec hic prætereundum est, quod si ren male affectus & prægnantibus calculis obsessus fuerit, status in intestino colo ejusdem lateris stagnantes, dolorem ibi satis molestum procreent, vel quod eum e sede sua dimoveant, vel quod mutuo contactu & attritione intestini flatibus distenti, & renis calculis expansi; dolor ille suscitetur .

*De calculo
testis
in renibus*

§. XLVIII.

In ure-
theribus At vero longe majores molestiæ sunt, quas calculus uretheribus firmius ac diutius impactus efficit. Dum enim urinx liberum in vesicam fluxum intercipit, pettinax fit dysuria & feralis urinx suppressio, quæ etiam pro diverso situ calculi certis suis notis ac indicis dijudicanda est, quas hoc loco exponere non erit incongruum. Ubi urina supprimitur & calculus uretheris cavitatem obstruit, vesica est vacua, catheter potest immitti, sed parum humoris elicit, tantaque est doloris circilia atrocitas, ut spastica contractio etiam alterum uretherem in consensum rapiat. Si vero calculus, vel etiam sanguinis grumus circa orificium uretheris, ubi oblique ductu per vesicæ membranas transit, hæret, vesica etiam ab urina vacua est & immanis cruciatus in inguine sentitur.

§. XLIX.

In ves-
fica Deinceps sicut calculus in renibus, ita etiam qui in vesica delitescit, & urinx egressum impedit, certis dignoscitur indicibus. Videlicet agri de tumore & dolore in pube conqueruntur, urina guttatim stillat, quandoque cum horrendo cruciatu, & sæpius crassum ac puriforme sedimentum deponit, permixtis moleculis, nunc carptam lannam, nunc vermiculos, referentibus. Interdum accidit, ut urina copiosissima reddatur, quandoque alvus & urina supprimitur, & abdomen ad lapidis duritiem, cum dolore circa pubem acutissimo & horrore molesto distendatur. Nonnunquam alvus subducitur cum flatu & larga lotii emissionem. Si atrox dolor adest, anorexia, febris & contractio alvi urget, & urina pauca, pallida tamen cum magno nilu & molestia excernitur. Hæc symptomata potissimum affligunt, si quando lapis scaber, non adeo magnus & figura complanata ac ovalis, orificium tegit obstruitque, & ab asperitate & attritione dolorificus spasmus fit, qui tam atrocitas gignit symptomata. Per intervalla vesicæ calculo la-

borantes, præsertim sub boreali aeris flatu, item flatibus retentis, & alvo obstrueta, graviore cruciatu & pondere laborant, mixtio fit sæpius purulenta, in senibus jungitur tenesmus, membri pruritus & alvi cum urina suppressio est, quandoque etiam ipse anus procidit: pro situ vero corporis variante levamen accipiunt.

§. L.

Quod attinet ad vesiculam felleam, *De cal-*
cultu
vesicæ
felleæ neq; hæc a calculosis concretionibus libera deprehenditur, sed sæpiusculæ calculi ingentis magnitudinis ejus cavitatem totam replent, interdum numero plures, varix figuræ ac magnitudinis in ea delitescunt, & gravibus symptomatibus corpora affligunt, quæ tamen non eadem, sed diversimode comparata, prout vel ingens calculus vesicam ipsam male afficit, vel plures per ductum cholodochum transitum moliantur. Quodcumque fellis vesica tota fere lapillis turget ac repleta est, pertinax cum gravativo, & continuo dolore dextri hypochondrii & sterus, omnium remedium efficaciam eludens, corpus flavedine tingit, cui si diuturnior fuerit, morbus arquatus adjungi solet. Quibusdam continua nausea vel etiam ciborum vomitio, in aliis atrocissimus ischiadicus dolor, & asthma diuturnum conjunguntur. Præterea quibus ingens in fellis vesicula calculus est, ab iracundia insolentia symptomata patiuntur. Nam quando a vehementiori iracundiæ affectu spastica, ut ordinario solet, ductuum biliariorum contractio fit, liber bilis in duodenum effluxus impeditur, ipsaque regurgitat ad vasa biliaria, felleamque cylindrem, inde efficitur, ut, quum calculus cystis jam repleta sit, a bilis copia ductus valde sensibilis distendantur, hinc ob consensum non modo acutissimus abdominis dolor, præcipue in dextro hypochondrio oritur, sed & tanta respirandi fiat angustia & difficultas, ut suffocationis periculum appareat, alvo simul adstricta, & extremis refrigeratis.

Si

Ex per-
dyfue
bilis
vlos re-
dentis
hps.

§. LI.

Si vero ipse calculus transitum per ductum cysticum & chododochum, qui intra membranas duodenii fertur, affe- ctat, fixus & intolerabilis circa eam regionem, qua ductus chododochus duodeno inferitur, in dextro hypo- chondrio est dolor, cum molestissimo vomendi conatu, nausea, appetitus de- jectione, colore cutis intenso flavo, membrorum lassitudine, alvi duritie: quæ symptomata una cum flavescente cutis colore, repente & ex toto solent remittere, excretis per anum calculis pondere levissimis, & tunc ipsa cutis nitorem suum recuperat. Confirma- tum hoc habemus notabili exemplo. Erat quippe honoratior quidam vir, sexagenario jam major, qui post diu- turnum in dextro hypochondrio com- primentem ac obtusum dolorem, in spiritus difficultatem incidens, paullo post cædematos pedum primum ac postea hydropico erurum, scroti, & abdominis tumore afficiebatur & ali- quandiu affligebatur. Huic præscri- bebant Medici infusum purgans, cu- jus basis cortex medius sambuci, a quo efficaciter purgabatur, & plures lapillos, planz & acuminatz sexan- gularis figuræ, nigricantes ac leves, plus quam viginti numero, per alvi secessum excernebat, quo facto, asth- ma disparuit, tumor subsedit & cum valetudine in gratiam redire visus est, quæ ramen, sive ob ætatem, vel priore longum morbum attri- tis nimium viribus, minus cons- tans erat, sed hydropi paullo post iterum implicitus, naturæ debitum solvit.

§. LII.

De ver-
mibus

A calculis progredimur jam ad al- ias ludricas res, quæ ramen potentissi- mæ sunt ad corpora humana, tam mi- sere affligenda, ut non majora prope- modum tormenta possint excogitari. Et hæ sunt variz ratione figuræ, & magnitudinis insecta, sive vermes, qui maxime ventriculorum & alimentor- um magnum illum canalem inhabi-

tant, ibique nidos & hospitia sua ha- bent. Non eadem vero sed diversa, pro locis, quibus insident, & prout variz eorum sunt species, pathemata observantur. Si rotundi proboscide & pedunculis quasi totidem uncis instru- cti fuerint, graviter rodunt, lancinant, & interdum membranas perforant. Hi quando ventriculorum obsident, in- credibilis ejus morbus cum inexplica- bili dolore, anxietate, inquietudine nausea, salivæ fluxu, infestat; sceti- dus ex ore vapor halat, vultus mox pallet, mox rubet, narium adest pruritus, vomendi cupiditas, sicca ac molesta tussis per intervalla affligit, animique defectio, frequentius jun- gitur.

§. LIII.

Si in intestinalis, præsertim ileo, cui lubentissime insident, eo quod amaro- rem bilis minus ferre possunt, nidum suum habent, hæc sunt indicio sympto- mata, venter mirifice, præsertim in infantibus, distenditur, ut tympaniti- de laborare videantur, alvi subinde nimia, jungitur dejectio, qua feces scetidæ coloris cinerei, stercori bubulo similes, secedunt, partes superiores tabescunt, ita prorsus, ut non nisi os- sa coherentia conspiciantur, licet mul- tum apperant. Facies plerumque pal- let & tumida est, & cum excrementis ramenta quædam, seminibus cucu- meris vel cucurbitarum similia eji- ciuntur. Lumbrici dicuntur hujus in- testini incolæ, qui plerumque lati sunt & longi & mirifice se convolvunt, ne- que tam alacres sunt, quam rotundi, sæpius quoque ob rillum, febrem & la- teris dolorem, pleuritidem, mentiuntur, quæ ramen a vermium symptomati- bus, dolore sub costis spuris, febre acuta & rulli sanguinolenta, distin- guenda.

§. LIV.

Quod attinet ad ascarides, neque hæc obscuris indicis se produnt. Ho- spitium suum quam maxime in in- testinis, crassis quaerunt, & frequen- tius ac copiosissime recto insident, F 4, simi-

In veni-
teculo.

In ilia,
distendit.

In cras-
sa, siccis
videt.

simileque teneis sunt, & manipulatim sæpe alvo ejiciuntur, quin ex ano non raro proropere & muliebribus pudendiste insinuare solent, ut cum urina in matulam descendant, sæpiusque incautiorebus Medicis imponant, ac si ex vesica prodissent. Ut vero multa cum reliquis infectis commuia habeant, si inflationem abdominis, si maciem, si nauseam respiciamus; in eo tamen quædam est differentia, quod multas ac gravis pruritus in ano percipitur, & alvus ad deponendum frequentius sollicitetur odoremque identidem fetidum excrementa exhalent. Hæ verum species natu etiam majores, præsertim feminas luxui & otio indulgentes, diuexare solent.

§. LV.

De illis
inde
symptom-
mata

Præter memorata hætenus e vermis gravia symptomata illud adhuc notandum est, quod febres subinde eos invadere soleant, qui vermibus exercentur, quæ ex lentarum & putridarum sunt numero & similes quotidianis, nullumque servant typum, sed sunt erraticæ, cum pulsu inæquali, frequenti & obscuro. Neque dubium est, quin ex vermibus in putredinem fetidam colliquecentibus exsurgant. Porro etiam non prætereundum, quod vermes præsertim minuti, quos sex pedibus cum nigro capite instructos vidimus, si nerveas tunicas intestinorum graviter lancinant, arrodunt, mirabilia atque insolita, quæ ab imprudentiori vulgo incantationibus solent adscribi, symptomata producant. Videlicet sunt inter exempla verminantes, quos convulsivæ artuum ad stuporem usque tractiones, distensiones & incredibiles circumgyrationes, miro torquent modo, mox aphonia tentantur, mox aliena & male coherencia eum mentis turbatione loquuntur, strident dentibus, in furorem agitantur, daemonia se videre asseverant; remittit tamen sæpius hæc symptomatum sævitia, si nimium vermes a rosione desistunt. Tam

valde gravis vero symptomatum violentia non aliunde repetenda videtur, quam quod universum genus nervosum, a vehementi rosione tunicarum intestinalium, mutua consensione & communicatione in exorbitantes hos motus rapiatur.

§. LVI.

Neque in hac latentium causarum morbosicarum consideratione silentio transmittendi flatus, qui ut res levislimi momenti videantur, tantas tamen anxietates, cruciatus & insolentia in distitis etiam partibus symptomata concitant, ut vitam in summo discrimine positam credas. Causa horum ut plurimum est tenax & viscida copioso aere plena materia, quæ a calore in halitus, quibus inest magna expansiva vis, resolvitur; accedit tamen etiam atonia, si ve paralytica quædam resolutio, tunicarum ventriculi & intestinalium, quæ fit, ut nimium a contentis vaporibus expandantur tunice, & fibrille nervæ distorquantur, præter naturam huc illuc trahantur, demumque per consensum atroces passiones accedant. Discrepant tamen symptomata a flatibus p.o differentia locorum quæ patiuntur. Ventriculus quidem ab iis inflatus & per omnem ambitum fortiter expansus, summas præcordiorum anxietates & spirandi ad suffocationem usque angustiam, cum faucium constrictione efficit, atque inferior ejus pars sub cordis scrobiculo versus latus dextrum, insit vesicæ turgidæ, ovi gallinacæ magnitudine, sensibus & tactui sese offert, demum ructus superveniunt, in quibus flatus exitus conceditur & anxietatum fit allevatio. Et hæc ventriculi inflatio frequentissima est hypochondriacis, nec non hysteris, in quibus sæpe tanta, ut ea affectæ, ob interceptum diaphragmatis descensum, sine omni sensu & motu jaceant & respirationis successus vix observetur.

§. LVII.

Sæpius quoque intestina torquet

De flatibus.

In ventriculo.

In intestinis.

De
infla-

statuum proventus. Si quando acci-
dit, ut tota intestinorum moles flati-
bus mirifice distenta, ingentem abdomi-
nis tumorem efficiat, dolores atro-
ces cum alvi adstrictione exsurgunt,
qui affectus colica flatulenta vocari
solet. Quæ distensio ubi est diuturna,
ob intestinorum quandam paralyfin,
& viscidæ materiæ copiam intus hæ-
rentem, abdomen instar tympani ex-
panditur; tandem jungitur cachexia
& tabes, ac morbus vocatur tympa-
nitis. Frequentius vero contingit, ut
tantummodo partes quædam intesti-
ni, præsertim coli, flatu dolorifice
diducantur, quod circa hypochondria
utraq; sæpissime obivum, quia co-
lon ibi in flexuras curvatur, quæ im-
pediunt, quo minus & flatus & alia
contenta promte transeant, sed sta-
gant. Familiarissime id in hypochon-
driacis evenit, & perperam dolor
ille tensivus sinistri lateris, pro tu-
more & inflatione lienis a Medicis
anatomes ignaris habetur, eo quod
lien in homine non in hypochondrio,
sed in dorso, sub diaphragmate situm
obtinet. Testatum etiam faciunt ob-
servaciones, quod in osse ilei dextri
ingens & dolorificus tumor quando-
que diutius per intervalla affligat & a
cibis flatulentis sumtis exacerbetur,
hanc ob causam, quia principium coli
satis capax & membranæ robustis mo-
tricibus instructum, ut sursum excre-
menta propellere possit, hic constitu-
tum, quod adeo ampliatur, ut cum
exquisito dolore ipsa integumenta ex-
trorsum urgeat, & periculum ruptio-
nis sit, quod etiam quandoque factum
observaciones practicæ & anatomice
confirmant. Ejusmodi vero flatulen-
tostumores exinde licet cognoscere,
si ad emissionem flatuum vel ejectionem
materiæ tenacis copiosæ, per
vomitum aut lecesum, tumores cum
dolorum alleviatione minuuntur.
Dolores lumborum, pulsuum inter-
missio, dolores in osse coxendicis,
tumores pedum œdematosi; sæpe so-
listatibus intestina distenditibus &

vafa vel nervos comprimentibus de-
bentur, & datis carminativis ac cly-
steribus, conquiescunt.

§. LVIII.

Restat demum alia causâ abstrusa De iræ
bona
vires
culi &
intesti-
norum.
memoranda, quæ in ventriculo ne-
que minus in intestinis consistit, ra-
riusque animadvertitur, mortis ta-
men & gravissimorum morborum ge-
nitrix est. Est hæc ventriculi vel etiam
intestinalium tunicarum erosio, quæ
vel ab erodentium acidorum succo-
rum copia in hypochondriacis, vel ab
iracundia vehementi & frequenti, vel
a sumto veneno, emetico vel purgan-
te acriore accidit, vel etiam post cho-
leræ, dysentericæ aut diarrhææ mor-
bum relinquitur, & affectus est chro-
nicus ab inflammatione, quæ cele-
rum passionum præcipua, distinguen-
dus. Ventriculus & duodenum, quan-
do erosa, continuus & fixus dolor est
circa præcordia, tensivus, trasto-
rius, interdum cum ardoris sensu,
qui usque ad dorsum porrigitur, &
summas anxietates circa præcordia
parit, ipsum quoque jugulum petit,
mirumque vires atterit atque nau-
seam & inclinationem ad vomitum
suscitat. Post omnem medicinam aut
cibum aliquanto intemperatorem,
qui falsæ, calidæ, acidæ, spirituo-
sæ, acris est naturæ, exacerbatur, ac
inprimis a purgantibus atrocissimus
redditur: demulcentia vero, hume-
ctantia atque emollientia, & optime
medicamenta ex chamomilla & mil-
lesolio ferre potest, pulsu demum ac-
cedente celeri hecticò, res est conela-
mata. Quod si in intestino quodam
ejusmodi erosio fuerit, identidem
dolores in abdomine ac dorso cru-
diant, qui semper assumptis calidis,
salsis, acidis mirum exacerbantur,
dejectiones alvi sunt creberrimæ &
varia caloris & frigoris est in corpore
vicissitudo, urina mox tenuis & aquo-
sa, mox rubicunda & crassa mingi-
tor, malum etiam admodum diutur-
num est, vires depascit, corpus confu-
mit, longum certe tempus & accuratam

nam ac demulcentem diatram, plus quam medicamenta, præsertim acti-
viora, desiderat. Et affectus senibus
cessantibus hæmorrhoidibus non adeo
rarus est.

C A P U T VIII.

De damnis ex cohibita cuticulari
excretionē.

§. I.

*Q*uicunque artificiosissimam cor-
poris nostri machinam par-
tiumque in ea admirandam
configurationem paullo curatius per-
lustrat, eandem ex numerosa organo-
rum secretiorum & excretiorum
congerie maxima ex parte coagmen-
tatam esse animadvertit. Tanta enim
secretionum & excretionum ad vitam
cum sanitate tuendam utilitas est at-
que necessitas, ut sine iis corpus nec
vivum, nec sanum, nec robustum,
nec ad exsequendas animæ actiones
idoneum esse, neque etiam augescere
& ad legitimum incrementum pertin-
gere possit. Videlicet corruptibile est
corpus humanum, nec a pufredine
immune durare potest, nisi perennis
sanguinis omnique generis fluidor-
um, mediante vigore systoles atque
diastoles in solidis, progressivus mo-
tus libere succedat, cum quo simul
intestinalia partium sanguinem consti-
tuentium calida agitatio augetur.
Sub hoc autem progressu maximeque
intestinali mutuo attritu sanguinis, mo-
lecule aliam figuram, texturam ac
magnitudinem nanciscuntur, & a
blanda temperata schesi descendentēs,
salino-sulphuream, vel etiam visci-
dam, utramque vitæ adversam natu-
ram induunt. Quare opus est, ut
succus intemperati, nutritioni & mo-
tibus vitalibus continuandis inutiles
facti, a purorum connubio segregati
proscribantur, ac in eorum locum
temperati, blandi satisque fluidi per
congrua solida & liquida alimenta,

denuo substituuntur. Quod quidem
quum per saluberrimas secretiones at-
que excretiones perficiatur, earun-
dem utique necessitas, neminemque
diu sine cibo & potu vivere posse, lu-
culenter patet.

§. II.

Deinceps hæ ingestiones atque ege-
stiones reciproce certa proportionē
sibi respondere, in iis autem, qui le-
gitimam corporis firmitatem jam ad-
epti sunt, æquales esse debent. Hinc
est, quod adultum corpus lance libra-
tum, elapsis octo diebus eandem gra-
vitatem exhibeat, licet interea a ro-
busto & laboribus operosis occupato,
vel centum alimentorum libris inges-
ta sint: quin si pondus increvit, nec
omne quod ingestum iterum egestum,
resibile in vitio est ac morbus certo
præstolatur. Etenim universa œconomi-
a animalis non solum certo nume-
ro, pondere & mensura, sed etiam
debita proportionē, ac moderaamine,
tam ratione materiæ, quam motuum,
maxime gaudet, ab omni autem ex-
cessiva qualitate & quantitate, mo-
tuum æque ac materiæ, sive humo-
rum, læditur atque offenditur.

§. III.

Quapropter ad sanitatem ipsamque
vitam tuendam, plurimum utique
refert, ut Medicus & ingestorum &
egestorum curam habeat rationem.
Nam profecto optimum corpus a præ-
matura morte & morbois varii gene-
ris afflictionibus defendendi modum,
in eo quam maxime versari cum Hip-
pocr. lib. de diata, censeo, ut mensura
ingestorum ad vires, immo ad mo-
tum & exercitationem corporis, ex-
acte accomodetur, tenendo, cor-
pus, quo robustius, quo magis viri-
bus pollet, majora vasa firmioresque
fibras obtinet, eo plus ferre posse at-
que subigere. Ex ingestis autem quæ
facilius solvantur & vasa atque excre-
toria prompte subeunt, aliis salubritate
præstant; vicissim, quæ ægrius
digeruntur, minulque expedite emun-
ctoria pervadunt, sed passim resistant,
vale.

*Q*uod &
inven-
tione
non
cessat
ip.

*Acce-
ssu
spen-
dunt
de
bus
gita*

*Quod a
Medico
obser-
vandum*

valetudini infensa, hæc interdicenda, illa suadenda. Quin is demum, qui ex ingestorum & egestorum natura, indole ac mole, morborum causas & primordia derivare novit, prudens Medicus dicendus est atque peritus.

§. IV.

Excretionis
natura
bona &
fœva
sunt
varia.

Quum vero ea, quæ in pabulum assumuntur, non unus sint ejusdemque, sed admodum dissidentis naturæ & facultatis, alimenta quippe viscida, falsa, æria, acida, sulphurea, spirituosæ, texturæ quoque compactioris, excessivæ omnia indolis; sapientissima certe summi opificis providentia factum est, ut varia emunctoria in corpore fabrefacta sint, quæ singulorum genio cunctisque heterogeneis evehendis, apprimè respondeant. Nimirum residuæ ex alimentis feculentia per alvum secedunt, ac cum his non solum scoræ biliosæ, plurimis salino-sulphureis recrementis refertæ, sed etiam mucus in glandulosa crassior tunica secretus. Sero recrementitio, crassioribus & terrestribus sulphureis moleculis onusto, urina dicto, renale dicatum est colatorium. Et copiosa aquæ portio, tenuibus salino-sulphureis particulis imbuta, ex cutis spiraculis sub perspiratione, quæ sensibili & insensibili modo jugiter in corpore succedit, exhalat atque diffatur. Tacemus mucida illa purgamenta, quæ in narium, palati & bronchiorum glandulosa substantia secreta & collecta, secreta & munitione rejiciuntur.

§. V.

Perspiratio
suppressam
ma-
nente
anala

Per omnia hæc organorum excrementum emissaria recrementa jugiter & corpore eliminantur. Quod quemadmodum si debito tempore & sufficienti copia perficitur, integritatem corporis & functionum in eo fulcit atque tuetur; ita vicissim si segnitè minisque sufficienter succedit, plures & gravissimas, præsertim chronicas passionēs, pullulare atque excludi prona eluefcit consequentia. Quam grave autem detrimentum & saluber-

rimarum excretionum defectu in valetudinem redundet, speciatim & accurate in *tomo secundo Medicina rationalis systematica*, & quidem *Part. III. cap. 4.* de excretionum defectu præcipuo morborum fundamento, *cap. 6.* de perniciali eorum quæ excretionēs cohibent indole, *cap. 7.* de epidemicorum morborum origine ex transpiratione impedita, exposui. Quapropter ibi dicta heic lubens mitto, & potius id maxime jam excutere ac demonstrare allaborabo: ex omnibus evacuationibus suppressis, vel deficientibus, nullam esse, quæ majorem noxam ac periculum corpori minetur & causa sit innumerarum passionum, quam perspiratio & insensibilis illa subtilissimarum sordium, per universi corporis corticem porulis pervium succedens emissio, si impediatur, cohibeatur, materiaque excernenda in corpore remaneat, vel ad exteriora jam appulsa, ad interiora relabatur.

§. VI.

Enimvero depuratur in universali corporis emunctorio, cute, universa sanguinis & humorum massa, & tam copiosi per istud contingit excretio, ut ex *Sanctorii* calculo omnes reliquas quantitate superet. Hac itaque suppressa maxima recrementorum pars restitat, omnes corporis succi forditiem contrahunt, corrumpuntur, ad putredinem disponuntur, ut valetudo inde gravissime luat. Quod vero maximum est, ipsæ sordes quæ sub perspiratione exhalant, valde tenuis salinæ sulphuræ & æreo-athereæ activæ indolis sunt. Hæc enim in corporis penetralibus retentæ, vel ex cutis tubulis retrocedentes, haud secus ac mortiferum venenum, quod exigua mole & summa partium tenuitate acri caustica perneciale vim in nervosis maxime partibus exsequitur, ob penetrantem subtilitatem, promptè per universum corpus infesta semina spargunt, intimæ ad partes exquisitè sentientes sunt admissionis, easdemque atro-

Quæ
excre-
tionum
præci-
pua.

Et for-
des ma-
nente
peni-
trales
evehit.

atrocissime adoriuntur atque exagitant, ut vehementissimæ, immolethales, in nervosarum potissimum partium genere, oboriuntur affectiones.

§. VII.

Defectus
per sp.
rationis
causa
perissi-
mum
est.

Inter ea vero, quæ ad sufflammandam saluberrimam perspirationem faciunt, aer potissimum connumerandus. Hic enim sicuti purus ac temperatus sanitati egregie patrocinatur; ita vicissim excessiva qualitate præditus, hanc maxime ob causam, quod immediate corporis corticem ambiat ejusdemque tonum varie alterando, succedentem per substratos tubulos sordium excretionem dirigat ac moderetur, intendat, vel frequentius cohibeat. Nimirum si nimis frigidus, nervis inimicus est, succos coagulat & fibras rigidas reddit, unde non solum ad affectus spasmodicos disponit, sed etiam cutis poros & vasa nimium coarctans, ad interiora urget humores, stagnationem demum ac stasim concipientes. Nimis humidus tonum solidiorum laxat ac solvit, ut liquida languide circumagantur, & ad emunctoria ipsosque subcutaneos tubulos non vegete appulsa sordescant, morbi-que ex atonia & humorum impuritate oriundi pullulent. Nimis calidus rarefacit & dissolvit corporis succos, ac intestinum motum augendo, acres & biliosos reddit, licet perspirationis successui non officiat, nisi simul humidus sit, & sic ad morbos malignos viam iterat. Potissimum autem cuticulari excretioni obest frigidus-humidus, quippe qui humores in crassando & fibrarum elaterem minuendo, efficit, quo minus succi spisselcentes per minimos canales ad corporis corticem trudi, & remisso nimis colatorio, sordium steretio atque excretio rite perfici possit.

§. VIII.

Unde
morbi
aut
tempo-
ribus
famili-
ares.

Insuper æris tempestatumque insalubris constitutio ac inde pendens in perspirationis successu mutatio, plurimum morborum causa est, qui certis

anni temporibus, quandoque etiam epidemice grassantur. Sapi-nter hinc ab Hippocrate lib. de humor. §. 7. proditum est: *qualia sunt tempora, tales etiam sunt morbi & constitutiones ex ipsis. Si tempora tempestive & ordinate se habuerint, morbi judicate faciles fiunt. Vernaculi autem temporum morbi indicant mutationes, & prout evaserit tempus, similes aut dissimiles erunt morbi, qui in hoc tempore oriuntur.* Qui vero enascuntur, ita sunt comparati, ut ob atmosphæram inæqualem & mutabilem, elater fibrarum & maxime tonus cutis mirifice labefactetur, & retardato sanguinis circulo, exclusionem quoque sordium per halitus diminuta, & plethora & impuritas, proximæ morborum causæ ingignantur. Æstatis morbi non tam calori, quam potius acri frigidiori & humidiori, qualis tunc solet esse nocturnus & matutinus, poros occludenti, debentur. Autumnus omnium morbosissimus est nullam aliam ob causam, quum quod ob crebriorem cœli ex frigido in calidum, humido in siccum, & viceversa, mutationem, æqualis sanguinis progressus & libera sordium exhalatio intercipiatur. Et hiems ob frigus, tam siccum, quam humidum, transpirationem impedit, eaque propter variis morbis inducendis favet, quos una cum vernalibus, æstivis & autumnalibus sigillatim recenset Hippocrates Sect. 3. aph. 20. seqq. nec non Celsus lib. 2. cap. 1.

§. VII.

Inprimis autem nocent aeris tempestatumque vicissitudines, ac si diu durant sæpiusque repetunt, morbos, qui populares habent circuitus excludunt eo quod æquabili cutis tono, sub quo maxime viget libera perspiratio, nihil magis adversum est eumque destruit, quam repentina mutatio aeris calidi in frigidum, vel humidum in nimis calidum. Hinc certa & constanti experientia in comperto est, quod si calefacto per fervidum vernum vel æsti-

Morbi
quique
epide-
miæ.

æstivum æstum corpore, & resoluta sub calore intestino motu intenso in excrementicias sordes humorum massa, tempeſtas poſtea ſubito aquilonaris frigida ſuccedat, qua conſtrictis ſpiraculis ſordes reprimuntur, accumuluntur, motuo quali confermentantur, iſſidemque nervoſis ac membranosis partibus inhaereſcentibus, febriles, ſpaſtici & convulſivi motus, varii generis febres, ſæpius exanthematicæ, variolæ, morbillolæ, purpuracæ, alvi quoque fluxiones plus vel minus cruentæ, oboriantur ac plures corripiant. Etenim id ceu perpetuum in genere eſt obſervandum: quo major materiæ impuræ ſalinoſulphureæ tenuis, perſpiratione eliminandæ, in corpore proventus eſt ac copia, eo magis infeſtum & periculolum eſt, ſi ejusdem excretio impeditur, intercipitur vel cohibetur.

§. X.

Ex eodem porro fonte morborum, qui certis locis familiares ſunt atque vernaculi origo acceſſenda. Teſtantur quippe Medicorum commentaria, Hungariam & Italiam proterre febris peſſimæ indolis acutas, cum vehementi cephalalgia & delirio junctas. Jam vero identidem conſtat, eam Hungarici cœli eſſe qualitatem, ut æſtus diurnus ſit ferventiſſimus, eundemque frigus excipiat nocturnum ſatis horridum. Huic itaque ſi corpus prius æſtuans incautius, maxime ab iis qui in caſtris excubias agunt & ſub diu morantur, committitur, perquam facile febris illa Hungarica dicta acuta accedit, quam perperam vulgo liberaliori vini Hungarici, quod ſtipendia merentes vix degunt, potui, tribuunt. In Italia autem & maxime Romæ, idem febrium acutarum & malignarum genus ſæpius ſtragem edit, nullam pariter aliam ob cauſam, quam quod interdum æſtus vehementiſſimus, & noctu algor regnet, cui ſi improvide ſeſe exponunt incolæ, vel fenestras aperiant, ut aer nocturnus, qui ob copiam inſectorum atmophæram incolentium, idemti-

dem valde inſalubris, corpori allabatur, illico poſtero die mutatio in corporis functionibus & inclinatio ad febrem præito eſt, quæ niſi præcinditur, vires ſumit, & non raro funeſtum ſortitur eventum.

§. XI.

Neque vero tantum acutas, verum etiam chronicas endemias paſſiones, interceptus cuticularis excretionis ſucceſſus, aſſert. Certe geneſis ſcorbutici mali, quod nonniſi maximus impuritatæ gradus eſt, non aliunde quam ex hac origine repetenda. Quo magis enim in humoribus vitalibus creſcit impuritas, ex incongruis & minus temperatis aſſumtis, eo plus vigere debet excretionum, inque primus perſpirationis negotium, eoque ſuſſaminato, eo gravior metuenda eſt noxa. Jam vero in conſeſſo eſt, in regionibus maritimis & borealibus incolæ craſſiori victu uti, copioſius carnis ac piſcium ſaliſ, inſumatis ac induratis veſci & denſa, frigida ac humida atmophæra frui. Sub hæc itaque cœli victuſque ratione, non modo crudi & multi male cocti ſucci ingignuntur, ſed & ob perſpirationem ſegniorem, quamplurimæ excrementitiæ ſalinæ viſcidæ ſordes in corpore remanent, quæ ſimul alia emunctoria obſtipant, & occludunt, præſertim ſi vita ſedentaria motus expers, animi crebrior perturbatio & mæſtitia accedit, quo demu n fit, ut humores benigni, ſerum, & lymphæ, a miſcela particularum varii generis ſalinarum inquinentur, putridiſſiant, corrumpantur, & pro diverſa torporum & temperamentorum conditione, vel vappellant ac lente putreſcant, vel etiam ſummam fixam & volatilem acredinem contrahant. Ex hac ex ſentia, omnia pathemata ſcorbuticis ſolennia manant, oris ſector, maculæ lividæ, gingivæ putridæ, ulcera foetida ichoroſa, inclinatio ad ſphacelum, artuum dolores fixi & vagi, ſpaſmi & convulſiones, tormina ventris, tremores & contracturæ artuum aliaque id genus plura.

§. XII.

Nec non
audimil

N. s. non
ſcorbuti-
ci.

Febres
defun-
ctiones
catarr-
hales

§. XII.

Quæ omnia sicuti vitam in grave discrimen adducunt; ita quid subitanea aeris ac inde facta excretionis per cutis poros mutatio, ad sanitatem labefactandam valeat, quotidianis adhuc experientis confirmatum habemus. Nimirum quando ex conclavi valde calefacto, vel ex lecto calido, in auram frigidiorē subito concedimus, horrore corpus e vestigio corripitur, & suppressa perspiratione, materia acris excrementitia in interiora maximeque glandulosas tunicas faucium, oris, narium & bronchiorum vergens, tussim, coryzam, defluxiones & febres catarrhales conciliat. Pariter frequenti experientia edocemur, nihil ad ingenerandas acutas passiones & febres magis conferre & aptius esse, quam si quis graviori iræ affectu, vel liberiori spiritus vini potu, aut fortiori corporis exercitio æstuans, in auram humidam & frigidiorē, præsertim vespertinam, delatus, paulo diutius in ea versatur; quandoquidem hoc facto, facilis admodum in febres & intermittentes, & acutas inflammatorias, est lapsus.

§. XIII.

In Ca-
vullate
fibres
ab ac-
censione
per se gl.
genuer

Nil vero est, quod subitam febrium generationem ex perspiratione cohibita clarius demonstrare & illustrare potest, ac intempestivus & imprudens thermarum Carolinarum usus externus in balneo. Nam si quis corpore paulo pleniori & impuriore, ante sanguinis missionem vel debitam aliam præparationem, descendit in balneum nimis calidum, & aliquandiu in eo commoratur, non tantum inde experitur insignes cordis tremores, languorem & cephalalgiam, verum etiam febrem intermittentem, pleurumque nonnunquam continuam, cum præcedente horrore, dolore dorsi & anxietate summa. Quod vero hoc balneum præ aliis id singulare habeat, quod tam facile, atque ex tempore quasi suscitetur febres, hæc vera mihi videtur subesse ratio: tum quod nulla

alia tam fervidi caloris thermalis aqua reperitur, tum etiam quod largiorem, quam ulla alia terræ martialis ochræ & calcaris adtingentis, in lapidosas concrectiones prouexit, copiam in sinu foveat, quo fit, ut usu externo subito tumores oedematosos intro repellat & abigat, diuturna ulcera consolidet, pustulosos & ulcerosos cutis defecationes & erosiones siccet, & sic efficacem poros & tubulos subcutaneos constrictivam facultatem luculenter prodant. Si quis itaque in balneum hoc nimis calidum corpus immittit, ab externo calore sanguinis exafluatur & in magnam intestinam agitationem, præsertim si jam copiosus & impurus, abripitur, exterius vero ob constrictos poros particulæ aereo-sulphureæ non exhalare possunt, sed eadem insistentes in partes nervosas, arterias, ipsumque cor systoles & diastoles motum valide intendunt, & ita febrem accendunt.

§. XIV.

Præterea excretionis per cutis poros rite succedentis utilitatem, & suppressæ noxam luculenter testatur, quod qui impura habent corpora, sive humores excrementitios partibus repleti, ut sunt podagrici, arthritici, æstivo tempore, quo liberius & copiosius fordes per subcutanea spiracula diffantur, a paroxysmis & symptomatibus immunes degant; brumali autem & autumnali, gravius affligantur, quia aere circumfluo denso, perspiratio imminuitur, fordesque excrementitias magis retinentur, gravius detrimentum corpori certo allaturæ. Eadem ratio subest, quare senes quibus ob cutis poros & vasa minora strictiora, non tam liberam & copiosam per cutis poros experiantur evacuationem, quam viri & juvenes, ab impuritatibus resistentibus morbos ætati senili infestos incurrant, ut sunt maxime scorbutus, calculus, ulcera vesicæ, scabies, tormina intestinorum, diarrhææ stranguriz, oculorum & aurium vitia.

§. XV.

§. XV.

At vero licet magni & graves morbi a prohibita perspiratione & remanentibus intus fordibus originem ducant: longe faviora tamen & quæ plus periculi habent pathemata pullulant, si quando materia excrementia a conubio sanguinis jam tum separata & ad cutis peripheriam tubulosque subcutaneos salutariter propulsa, foras non ejicitur, sed ibi subsistens ac ad interiora recedens, cum succis vitalibus denuo nupta fuerit. Hæc enim certe materia veneni vim & naturam obtinet, ac licet mole valde exigua, dum tamen sub penetranti & adversa subtilitate partium valde heterogenearum, in partes nervosas sensibiliores agit, truculenta instar veneni symptomata excitat. Id quod ut jam ulterius excutiamus & luculentis fide dignis exemplis ac observationibus confirmemus, operæ certe erit pretiam; quo rerum medicarum cultores perspiciant, plures & sævissimum affectuum causas, non tam in mole & quantitate nimia vel intemperie crassa sanguinis & humorum, quam sæpius, in parva & exilis molis materia, nervolis tamen partibus summopere infesta, esse quærendas.

§. XVI.

Ut itaque ab ipso capite ordiamur, sæpius observavi, eos qui capillamentum gestare sueverunt, demto improvide operculo, exquisitum capitis dolorem, cum tinnitu aurium, nec non vertiginem incurrisse; alios vero his malis afflictos, tecto falsa coma capite, ab iisdem liberatos. Nihil porro frequentius in infantibus visitur, quam a crusta lactea, solo frigore repulsa, febrem continuam excitari, qua desinente illa revertitur, quæ quoties repulsa fuit, toties de novo febrem accensam annotavimus. Nihil quoque periculosius est, quam in tinea capitis improvide exterius unguenta vel lavamenta applicare. Repulsa enim materia corrupta acri ad cerebrum ejusque membranas ac

nervorum principia, epilepsiz, præsertim in infantibus, aliique graves capitis morbi, accidunt. *Amatus Lusitanus Cent. 1. obs. 36.* in puella undecim annorum, obesa & sanguinea, a capitis lotionē apoplexiam, elapsa nondum hora, supervenisse, memoriæ prodidit. Ex capitis ulceribus obsessi lotionē, surditatem concitavit, *Misc. nat. cur. Dec. 3. An. 3. obs. 9.* commemorant. Et nos a linimento tinea capitis præposere adhibito, in infante decem annorum oculi dextri inflammationem observavimus, quæ in suppurationem & perfectam demum cecitatem transiit. Vidi quoque ab achoribus & favis linimento inconulto siccatis, asthma convulsivum subortum, ad quod abigendum, vesicatorium in nucha insigni cum levamine applicatum.

§. XVII.

Singulare etiam salutaris & critica in capite excretionis genus est, plica sic dicta Polonica, qua serum excrementitium viscidum cum sanguine ac caput copiose delatum, ex poris capitis excludens ac per crinium tubulos descendens, capillos in cirros conglutinat inexplicabiles, per quos tanquam peculiare organon excretorium vitiosum serum eliminatur non sine summo levamine & sanitatis emolumento. Quod si vero plica molesta absconditur, graves, immo mortiferi morbi, corpus impetunt. Hoc enim factu, atroces capitis dolores, insultus epileptici, convulsivi, item phrenitis, mania, melancholia, vertigines, oculorum lippitudines & gutta serena, consequi solent. Interdum ad alias inferiores partes serum excrementitium retentum defertur, & dolores arthriticos aliaque symptomata suis veneræ naturam æmulantia excludit. Quin nonnunquam pleuritis, peripneumonia, hæmoptysis ac pathisis inducitur.

§. XVIII.

Scabies frædum quidem est atque molestum malum; corpus tamen a

Ex ob-
falsa
plica
Polo-
nica.

Ex seu-
bile stu-
cora
graves
capitis
morbi.

salso, acri & corrupto humore liberat, & præpostera medicatione repulsa, vel quo minus efflorescat impedita, gravi damno maculat, quod differt, prout maligna interiora repetens materia, diversas impetit partes in iisdemque sedem figit. Quod si enim ad caput refertur, periculosissimi morbi ibi fuscitantur, apoplexiæ, epilepsiæ, vertigines, sopores sen suumque vitia. Sic *Misc. nat. cur. Dec. 1. An. 1. obs. 58.* ex scabie imprudenter abacta, lethalem apoplexiam annotarunt, quod etiam *Mabius instit. pag. 65.* testatur. Excitatem exinde profectam identidem *Misc. nat. curios. D. 2. A. 8. pag. 255.* & *Sennertus prax. part. 3. f. 2. c. 44.* fidem faciunt. Et *Riedlinus in lin. med. ann. 1696. mens. Maj. obs. 1.* narrat de ancilla, quæ sordidissima scabie laborans, post inunctionem bis factam, in epilepsiam incidit, cui assurgit quoque *Sennertus l. c.* Potissimum in infantibus perniciosum est conamen scabiem abolere, quandoquidem hoc facto, præter suffocationem aliosque gravissimos morbos sæpius epilepsiam succrevisse, auctor est *Hildanus Cent. 3. obs. 10.*

§. XIX.

Asthma Quando scabiola materia relabitur ad pectus, periculosum asthma oboritur, quod in juvene viginti annorum a scabie intempestive & empirice externis inunctionibus deleta, vidit *Hildanus Cent. 3. obs. 39.* ubi ægrotus tanta pectoris angustia affectus est, ut vix spiritum trahere posset & pulsus vix appareret, tandemque catarrho suffocativo extingueretur. Frequentissime vero a retrocedente scabie febris continua in corde & genere vasculoso accenditur, cum magna virium prostratione. Vidimus, hac cessante, septimo die scabiem rursus ad habitum corporis salutariter fuisse propulsam. Senes scabies, maxime sicca, infestat, quæ si reprimitur, quartana fieri potest & porrigine rursus apparente, hæc cedit. Hinc *Langius in Epist. 16. Lib. 1.* inquit:

ego scabiem & erum edemata, cum post aliarum febrium, tum præcipue quartana febris crisi abortiam, sponte exolescere, citra omne medicamento- rum subsidium plus centies vidi.

§. XX.

Sæpius virulenta scabiei materia e cortice corporis ad interiora retrusa, tumores oedematosos, hydropicos & tympaniticos, in pueris præsertim cum tumore scroti, quod aliquoties observavi, affert. Notavit etiam idem jam *Hippocrates in epidemicis*, idque luculento exemplo confirmat. *Erat, inquit, Athenis homo quidam sædissima scabie laborans, atque ut sanaretur accessit Milos, ubi calida sunt thermæ, quarum usu convalescit a scabie, sed paullo post incidit in hydropem & exinde mortuus est.* In intestinorum membranas si recumbit, gravia ventris tormina vel etiam dysentericæ fieri possunt. Notabile hac de re exemplum exstat in *Riverio Cent. 3. Obs. 85.* ubi arthriticus, ab usu aquarum medicatarum, magnam stomachi refrigerationem passus est, ac deinceps scabies pruriginosa, admodum molesta, totum corpus invasit, quæ confestim curata est unguento quodam mercuriali, carpis manuum & plantis pedum admoto, quam inunctionem mox secuta est ingens diarrhæa per viginti dies perseverans, cum gravissimis ventris tormentis, ita ut ab iisdem alvi fluxus dysentericus apparuerit.

§. XXI.

Quemadmodum igitur scabiolaæ cutis desedationes præpostere topicorum usu deletæ, ob acrem causticam materiam, internas nobiles partes repentem, plures perniciosos morbos adducunt; ita pariter ulcera antiqua subito consolidata eandem ob causam detrimentum sunt & quandoque exitio. Nam *Misc. nat. curios. Dec. 3. An. 2. obs. 29.* ulcus in crure sanatum epilepsiam induxisse perhibent. Et *Tulpius obs. lib. 1. cap. 8.* binos infantes per manantia capitis ulcera ab epilepsia liberatos,

*Hydro-
pici im-
mores.*

*Tormi-
na &
dys-
entericæ*

*Eu con-
solidan-
tis an-
tiquæ
ulceri-
bus.*

*Epilep-
sia.*

ratos, iisdemque improvide siccatis, diris iterum nervorum tractionibus correptos esse testatur. Neque minus ex ulcere in crure consolidato, epilepsiam accessisse, eodemque rursus aperto cessasse, consignatum legimus ab *Amato Lusitano Cent. 2. hist. 6. Bartholino Cent. 3. hist. 20. Hildano Cent. 2. obs. 10. Misc. nat. curios. Dec. 3. An. 2. obs. 29. Lentilio miscell. Part. 1. pag. 3.* Pedes quoque ulcerosos præsentatos guttam ferenam adduxisse, auctor est *Timaeus in oper. posth. item Forestus l. 1. obs. Et Hildanus Cent. 3. obs. 39.* vetus purulentum apostema coactum, atrocem capitis dolorem & cecitatem induxisse, putrida materia tussi rejecta, prodidit.

§. XXII.

Idem porro auctor l. c. præter alia adhuc exempla memorat: quod vir sexagenarius, quum ulcus quod per plures annos gestarat, ab Empirico ad consolidationem perductum fuisset, post aliquot menses in sinistro latere pleuritide, cum maximis doloribus & punctionibus correptus sit, talemque saniem sputo rejecerit, qualis ex ulcere antea manarat. Nec non *Cent. 5. obs. 91.* historiam narrat, quod quispian curato per thermarum usum veteri ulcere, in maximam virium prostrationem non modo, sed & nauseam & frequentem eructationem inciderit ac iisdem pathematibus, quam si venenum sumisset, attentatus sit. Nobis inter exempla inprimis est vir generosus, Principi a consiliis, qui quum singulis fere annis, verno maxime tempore, salis acrem defuxionem cum excoriatione circa malleolum dextri pedis experiretur, molestia pertæsus, ex Chirurgi consilio, ut applicato camphorato vini spiritu reprimeretur, permisit, sed non ita multo post ingentia tormina & dolores in hypochondrio sinistro, cum lenta febre, inquietudine, anxietate & alvo pertinacissime obstipata, eundem invaserunt, quæ tamen tandem pulverem cinnabarino-nitrosorum & insuli usu

Tom. III.

cessarunt. Et quum fonticuli sunt quasi ulcera artificialia, quæ ad impuram noxiam materiam nervosis maxime partibus subtrahendam in capitis morbis egregii usus: hinc quoque iisdem oclusis, priores morbos rediisse, vel novos accessisse, multarum observationum fide constat, quæ evolvi possunt in *Misc. natur. curios. Dec. 2. An. 3. obs. 213. An. 6. obs. 201.* nec non apud *Pechlinum lib. 2. obs. 30.*

§. XXIII.

Dum etiam adhuc de noxa, quæ post efflorescentias & exulcerationes in corporis cortice præpostera per topica medicatione exceptas, in corpus redundat, sermo est: adjungenda iisdem etiam sunt exanthemata, quæ in acutis morbis comparent, quippe quæ, si ad interiora retrocedunt, eo deteriora magisque funesta mala invehunt quo magis materia repulsa virulenta est ac putrida. Sicuti enim vigorem naturæ indicat promta ad partes externas variolarum, morbillorum, petechiarum, purpuræ & bubonum, sive carbunculorum, in peste secessio, ita res periculi plenissima est, si deficiente hoc robore, vel non prodeunt, vel relicta in cortice stagnatione redeunt. Contingit id facillime a refrigeratione, a potu frigido, terrore, animi affectu, vel erecto corporis situ, in corporibus præsertim, quæ viribus destituta, & ubi pulsus ac renifus cordis, arteriarum & motus a centro ad peripheriam languescit. Et plerumque hanc fatalem repulsionem funesta consequitur mors: eo quod maligna materia ad meninges cerebri, vel ventriculi & intestinorum membranas, aut præcordiales nervos si transfertur, harum partium inflammationes, spasmi, vel convulsiones, imbecillia jam a morbo corpora adoriuntur. Quod vero materia exanthematica repulsa majorem quam antea virulentiam exferat, hæc videtur subesse causa: quod quamdiu humor, sive puredine, sive caustica natura alienus, succis & sanguini immixtus

Ex fonticulis coactis

Exanthematum res, quæ deficiente robore

Oris-
vum el-
ata,

Pleur-
iti.

Virul
sympto-
mata,

Tormi-
na & vi-
ri et c.

G

est

est, involutus & quasi coercitus ingenti noxa vacet, quando autem sui juris factus & ab involucri sanguinis liber, tunc naturam suam perniciosam prodat & veneni similem in corpus edat effectum. Accedit etiam quod hæc materia, dum in glandulis cutis diu hæret, sub mora, ob perpetuam & intestinam fluidi ætherei agitationem & transfusum, subtilior & malignior reddatur, ut postea repulsa, penitus respuat illud, quod ante habuit cum lymphæ & sanguine connubium, & potius instar veneni subtilis, nervolis sese partibus insinuet ibique spasticas atroces stricture efficiat.

§. XXIV.

Quam Jam si experientiam consulimus, nihil certe frequentius, quam quod post inconsultam lintheaminum frigidorum & loturam adhuc redolentium, corpore sudore diffuente mutationem, nec non ægris in alium perfrigerarum lectum translatis, exanthemata, variolæ, morbilli, petechiæ ac purpura dispareant, & rebus exemplo conversis, in pejus abeant symptomata, anxietates, inquietudines, deliria, tremores & convulsionem accedant, quin ipsa paulo post mors subsequatur. In primis etiam crebrioris observationis est, ægros, acutis exanthematicis morbis laborantes, post diuturniorem erectum in lecto, vel etiam extra illud situm, mox in virium languorem, animi deliquium, extremorum refrigerationem & cutis horrorem cum pulsu debili incidere, ac evanescentibus in cortice efflorescentiis, delirio, convulsione vel epilepsia correptos, interire. Rarius quidem, quod mirandum, hoc phenomenon a Præcticis annotatum, ratio tamen effectus in proclivi: quandoquidem dejecto in ejusmodi morbis robore, cordis etiam systole minuitur, & sanguis corpore erecto difficulter ad superiora maxime & caput expulsi cor obruit, segnius quoque per cerebrum ejusque membranas fertur, & hinc tam truculentorum sym-

ptomatum origo. Huc quoque referenda memorabilis observatio, quam *Alpinus de Medic. Aegypt. pag. 76.* consignavit, memorans, feminam in peste tumore inguinis laborasse, quo minuto, delirium accesserit, & per cucurbitulas iterum revocato, cessarit.

§. XXV.

Idem periculum, eademque, si non major, noxa est metuenda, quando in affectu arthritico, in podagra vel etiam erysipelate, materia, quæ in vitio est, corrupta vel acris, ex habitus corporis, vel ex artubus, ad interiora repellitur. Ac de erysipelate quidem sapienter *Hippocrates Lib. 6. aph. 25.* pronunciat: quod malum sit foris introverti. Novimus senem fere septuagenarium, qui erysipelate totam tibiæ & femur occupante correptus, applicatis exterius saturninis & camphoratis epithematibus, in lethargicum affectum incidit, quem quum Medicus calidioribus cephalicis & balsamicis interius & exterius adhibitis exciperet, febris accensa est, cum magnis maculis purpureis, accessit delirium ipsaque mors. Vidi quoque accessionem erysipelatis, quæ cum horrore & sublequenti intenso æstu contingere solet, in viro erysipelaceis inflammationibus crebrius obnoxio, Medico imposuisse, ut paroxysmum intermittens esse putaret, & ad eandem præscindendam postera die vomitorium porrigeret, quo oblato, æger quidem strenue vomuit, sed sequuta est inflammatio ventriculi, quinto die lethalis.

§. XXVI.

Frequentioris observationis est damnum, quod imprudens medicatio per topica in morbis articularum & arthritidis speciebus, accessit. Quam gravia autem quamque multiplicia pathemata morbosa inde resultant, compendiose, graphicè tamen, arthritidis vagæ scorbuticæ exemplo tradit *Dravouizius* in vernacula lingua ante C. jam annos de scorbutico, conscripto libello, verbis pag. 62. seqq.

Ex erysipelate repulso

Lethargi

Propter inflammationem

Ex arthritide, podagra, scorbutico, &c. repulso

Figg. latine redditus sic habentibus : maxima cautione opus est, ne dum dolores leniuntur atque sedantur, gravius & magis perniciosum malum ingruat : quod quidem inprimis facile contingit, quando volatile scorbuticum sal in corruptione sua eo processit, ut virulentam indolem contraxerit. Hoc enim si factum fuerit, arthritis scorbutica maximam cum erysipellate induit convenientiam, & haud secus quam in erysipellate, levi tantum percussione, virulentum volatile sal ad interiora corporis recedit, ibique longe periculiosum statum, quam in externis artubus inducit. Nimirum quando hoc sal intestina adoriunt, exquisita ventris tormina, quoniam ipsa passio iliaca, non facile decunt. Si ad cerebrum scandit, ager vertiginem, epilepsiam, apoplexiam aliosque truculentos capitis morbos incurrit. Ubi cor opprimit, illico lipostymia adest, vel subita plane mors sequitur. Ad diaphragma & pleuram quum vergit, periculosus pleuriticus sese exerit morbus. Ad pulmones delatum, spirandi angustiam, anxietates precordiorum, serenas & suffocatorias tusses, hamoptyses &c. affert. Verbo : quaecumque perniciem in genere alias venenum in internis corporis partibus suscitare valet, eandem etiam pessimum hoc & virulentum sal creare aptum est. Novi etiam, si sponte recessit, aut incongruis medicamentis exterius exceptum fuit, quod totum corpus brevi horarum spatio cum omnibus partibus sub magno cordis angore intumuerit, eodem modo ac in Hungarica febre aliisque ex corruptis succis oriundis morbis nonnunquam contingere solet.

§. XXVII.

Malum itaque, quæ metastasin materię arthriticę consequuntur, sunt plura, & tantum pro natura corporum ægotantium, & partium, quas illa invadit, & periculo & indole valde differunt. Quando enim ad supremam capitis regionem vergit materia retropulsa, perquam facile susci-

tatur epilepsia, sicuti hac de re egregium exemplum prodidit *Riverius Cent. 3. obs. 85.* ubi quidam, doloribus arthriticis cessantibus, correptus fuit insultibus epilepticis, qui per stata intervalla redibant, & post exactum biennium, prorsus deliverant : cum eodem tempore dolores arthritici reverterentur, qui per totum illud tempus, quo insultus epileptici sæviebant, omnino delituerant. Ex podagra emanante apoplexiam fieri, auctor est *Vesperus in Lib. de apoplexia pag. 2.* & 3. Et *Simon Pauli in Quadrip. Botanico p. 215.* refert historiam, ubi quidam in levicula podagra, spretis medicamentis internis, repellentibus usus est, ubi mox de dyspnœa conqueustus & cordis palpitacione ac lipostymis correptus est, insequente epilepsia, quæ tandem in apoplexiam lethalem abiit.

§. XXVIII.

Ubi arthritica materia intempestive retroagitur & pectus invadit, convulsivum asthma excitatur, quod a linimento alias egregio, ex camphora, opio, spiritu vini rectificato composito, vel solo etiam camphoræ pulvere exterius applicato, in casibuscis non semel observavimus ; accessit quippe precordiorum anxietas & summa spirandi difficultas atque angustia, ut strangulari sibi ægri viderentur, quibus postea tumor pedum successit : & hydrops. *Crato in Consiliis pag. 1015. Consil. 367.* ex abusu narcoticorum & stupescientium, podagram transiisse in asthma refert. Et *Trincavellius de rat. cur. part. hum. corp. Lib. 13. cap. 1.* scribit : nihil gravius est, quam usu adstringentium & repellentium præcavere in podagra contractam fluxionem, inde asthma gravissimo cum febre continua duo nobiles Veneti affecti, cum tremore totius corporis & omnium sensuum stupore. Id quod etiam pluribus exemplis docui in dissertatione de podagra retrocedente in corpus pag. 12.

§. XXIX.

Cardialg.
g'a flon-
gultus
floma-
ebi la-
flomma-
flonca.

Eadem vitiosa materia ineumbente ventriculi membranis, singultus, cardialgiæ, lipothymix & lethalis ventriculi inflammatio sæpissime sequuntur. Ita *Cramerus Diss. de podagra* memorat: quendam podagricum nudos pedes ventis frigidis exponentem, continuo & lethali affectum esse singultu. *Manichen in obs. 8. pag. 245.* prodidit, dolore arthritico per frigida repulso, cardialgiæ & lipothymiam accidisse, & post frictions & velicantia genibus applicata, cessasse. Et in *Misc. nat. cur. D. 3. A. 7. obs. 147.* casus affertur de quodam, qui frigida aqua pro potu dolores arthriticos suppressens, emetico assumpto, integro mense enormes vomitus expertus est, intercurrente singultu, appetitu abolito, siti aucta, febre continua, urina suppressa, post mortem ventriculus inflammatus repertus. Anno abhinc & quod excurrit accidit, ut femina generosa quinquagenaria podagrica, ipso in paroxysmo ad levandam dolorum atrociam, pulverem ex camphora & minio dolenti parti applicans, discusso dolore, illico incideret in maximam virium jacturam, cum æstu febrili, appetitu prostrato, ingenti anxietate circa præcordia, vomituritione & inquietudine, quam tamen propinata emulsione ex semine papaveris & amygdalis dulcibus, oblato quoque pulvere nitroso cinnabarino, adjuvante Deo ex ancipiti levavi, repetente simul pedes podagra. Sic quoque novi malum ischiadicum balneis adstringentibus repulsum, ventriculum & pectus invaluisse, & cardialgias, febrem lentam, hæticam & tussim siccam, tandem lethalem, suscitasse.

§. XXX.

Neque minus multiplici compertum est experientia, materiam arthriticam tartaream, in senibus præsertim, sæpius ad renes & urinarias vias transire, & sic arthritidem in calculum mutari: Unde *Solenander Sect. 1. conf. 20. perite, qui uno*, inquit, la-

Calculus.

borat ex iis, alterum vix effugere potest, & pauci arthritidis affecti sunt, qui non in renibus calculum ingenerant. Et *Stisserus in Tr. de podagra* testis est, podagricos dolores in nephriticos, colicos æmulantes, hos vero, vice versa, in arthriticos & podagricos, non semel abississe. Facilis quoque arthritidis vel podagræ retroulsæ in acerbum colicam dolorem est transmutatio. Non materia arthritica propter affinitatem texturæ & ad stricturas dispositionis, quam ligamenta articularum nerveo-tendinosa ac glandulosa, cum membranis intestinorum invicem alunt, expedit ex articulis ad intestina, & ex his rursus ad articulos, promptissime transferitur. Meminit hujus metastaseos jam *Hippocrates Lib. 6. epid. Part. 4. sect. 30.* scribens. qui articulus morbo detentus intestini dolore vexabatur, quietior erat; hoc autem curato, magis dolebat. Quod etiam *Solenander in Consil. pag. 77.* confirmat, dum inquit, femina arthritide semper laborabat, quando a doloribus coli libera erat, & cessantibus coli doloribus, misere ex juncturis afficiebatur. Et *Raygerus in Misc. nat. curios. D. I. A. 6. & 7. obs. 208.* scribit: notus est mihi quidam, qui colica immanè torquebatur, superveniente autem podagra, nihil penitus sentiebat. Ex quæ plura adhuc exempla memorix prodita sunt in *Miscell. nat. curios. Dec. 2. A. 4. obs. 42.* item a *Dravutzo in Tr. de scorbuto pag. 214.*

Colica.

§. XXXI.

Quandoque etiam accidit, ut podagricum recrementum, in senibus, vel tracto per varias animi afflictiones aliisque de causis corporis robore, ad exteriora salutari motu propelli nequeat, sed resistit ac partibus nervosis insidens, capitis dolores, ingenii ac memoriæ debilitatem, virium & appetitus prostrationem, anxietates, spasmos ac dolores varios, stranguariam & crebriorem ad urinam stimulum cieat. Ejusmodi exemplum notavimus in primario hujus civitatis viro

Damp-
pod-
gra ob-
imbeci-
litem.

viro quinquagenario, qui tamen externo & interno Carolinarum usu, relegata ad pedes iterum podagrica materia, perfecte curatus fuit. Hinc ex vero *Hoffmannus insit. lib. 3. pag. 107.* scribit: *videmus podagricos moritum, si humores influentes repellantur ad viscera, aut si viscera tam sint debilia, ut humores ad superficiem pellere non possint.*

§. XXXII.

Pariter a sanguinis missione in corpore minus plethorico intempestive administrata, podagram repellam novi, & res certe magnæ prudentiæ medicæ est, venæsectione recte uti posse, in morbis quos salutaris quædam & critica ad eum excretio itipat. Nam uti nimia sanguinis redundantia quoque vires naturæ opprimere & expulsionem materiæ ad corporis corticem impedire potest; ita etiam, si sanguis non reducens præpoltere exantlat, pariter naturæ robur infirmatur, ut excrementa fordes ad minima vascula cutique poros pelli nequeant, sed retentæ gravillima ciant pathemata. Quare perite *Jo. Langius Lib. 1. epist. 16.* inculcat: ne, quando natura per habitum corporis materiam peccantem ut propellere velit, intenta est, phlebotomiam administremus, aut pharmaca exhibeamus, ne ingens inde periculum enascatur, nec per eas venas, per quas materia morbi expulsa fuit, rursum ad interna viscera retrahatur. Quod quidem monitum inprimis nostro hoc ævo probe observandum, ab iis, qui tam prompti & liberales in sanguine mittendo, quasi vero tantum non omnes morbi a plethora, & hæmorrhoidum vel mensium fluxu imminuto, aut deficiente, ortum traherent.

§. XXXIII.

Præterea si saluberrima in quibusdam sudoris lætidi in pedibus & sub axillis succedit excretio: qua quum corpus pudore teste ab exitiali & putrido humore liberatur; patet utique

Tom. III.

sanitati maxime obesse, si imprudenter consilio eadem supprimatur; licet id frequentius limatura terri, aurichalci & terris calcareis ulti inspersis, perficiatur. Novimus enim inde vertiginem aut capitis gravitatem, aurium tinnitum, difficilem respirationem, ventris tormina atque vagos artuum dolores subortos, nulla arte, nulloque consilio expugnabiles. Id quod etiam *Simon Pauli quadripart. botan. pag. 215.* memorabili exemplo confirmat, narrans: quendam deletum pedum scitido sudore, in gravem primum cordis palpitationem, ac postea atrocem & uodofam podagram incidisse. Eadem ratio est critici quorundam nocturni sudoris, quem per multos annos largiter cum singulari valetudinis commodo mansisse, postea vero vel ob naturæ debilitatem retentum, vel præpostero consilio siccatum, atrocia pathemata, affectus soporosos maxime cum sensuum & memoriæ debilitate, rheumaticos affectus, erysipelata, asthmata, febres lentas & languores, inexistisse, experientia compertum habeo, neque symptomata prius cessarunt, quam saluberrima hac excretionē integre restituta. Eundem adhuc in consensu referendi diuturni pedum tumores, variis artificii compressi & ad interiora coacti. Hoc quippe facto, asthma & catarrhum suffocativum, diabetem & febrem lentam, summa cum virium prostratione accidisse, aliquot exemplis confirmatum habemus.

§. XXXIV.

Accedunt pathemata, post conceptum inquinamentum venereum, præpostera medicatione tractatum & intro coactum, conspicua. Nimirum bubones venerei, ubi glandularum ductus tenaci caustica lymphæ interstiti sunt, quando imprudenter a Chirurgis vel Medicis adtrigentibus & repellentibus excipiuntur, humor ex mora & stagnatione violentior redditus, & cum lymphâ ad vasa lymphatica translatus, universam ejus mas-

G 3 sam

Per la
campa
stom
bradef
stom
cistum

Sudor
axill
um &
axill
um

Nec non
tum
um re
pulso
um na;
no.

Bubo
nes re
pulsi

fam inquinat, ut hinc non modo ulcera & pustulæ in facie efflorescant, sed & atrocissimi dolores in periostio aliisque sensu exquisito præditis partibus suscitentur. Idem fit, quando gonorrhea impuri coitus soboles, nimis cito adstringentibus cohibetur. Adstringentibus enim miasma venereum corpore expellendum reprimitur; acrioribus autem, calidis sudoriferis & balsamicis intestina agitatio suscitatur, & fibrillæ stringuntur, quo fit, ut virulenta materia agilior reddatur, non tamen eliminetur, & sic utroque modo universus lymphaticus latex inquinatur, corrumpitur atque maximus hujus luis gradus inducitur. Hinc sæpius certe vidimus, gonorrhææ malignæ, nimio balsami Peruviani, vel de Copaiva usu cohibita, pustulas in facie, ossium dolores & in inguine bubones successisse.

§. XXXV.

Denique non prætereundum est damnum, quod ex turbata & intercepta seri vitiosi per glandulosa emunctoria, præsertim in naribus & faucibus existentia, in coryza & catarrhis, in feminis vero sub flore albo per uteri & vaginæ glandulas evacuatione, in sanitatem redundat. Quod si enim coryza a frigore incautus admissio reprimatur, serosa materia in capite obhærescit & dolores acutos ac vehementes circa radicem nasi in ossibus frontis parit cum vertigine & aurium tinnitu, ac lassitudinem totius corporis, torporem & febrem lentam adducit. Vel si etiam per assumpta purgantia successus turbatur & ad intestina acre serum allicitur, dolores & anxietates ventriculi, cum inappetentia, abdominis tormina & incompehensibiles diarrhææ sublequantur. Pariter a fluore muliebri per suffragia mercurialia sublato, parthematæ hypochondriaco hysterica, asthmatica observavi, vidi quoque febrem cum purpura, repetente, hac sanata, albo fluore. Et *Misc. nat. curios. Dec. 1. An. 8. obs. 331.* a fluxu albo per balnea vitriolacea

suppressio, phthisis insanabilem sequutam referunt. Quæ certe omnia, quam grave damnum excretionum, & maxime cuticularis suppressio injungat, conspectus testantur.

CAPUT IX.

De vitiiis ex turbatis sanguinibus aliisque evacuationibus.

§. I.

ITa comparatam esse artificiosissimam corporis nostri structuram, ut boni laudabiles & alimentares succi per varia organa ad usum secernantur, inutiles vero, efferti atque corrupti per tot vasorum excrementium emissaria, in vitæ sanitatisque tutelam juxta eliminentur, antecedenti capite pluribus est assertum. Potissimum tamen & rationibus & exemplis evictum dedimus, eam sordium excretionem, quæ per corporis corticem succedit, esse omnium saluberrimam; sufflaminatam vero plurimum & gravissimorum morborum causam. Quam autem non solum perversa qualitas, sed etiam quantitas, naturæ microcosmicæ adversa sit, sæpius contingit, ut ipsi benigni, temperati & utiles succi, ut lymphæ & sanguis, nimia copia delinquentes & solidorum tono, motui ac systole ipsique progressui fluidorum mole sua obstitentes, perniciem intentent, & cacochymiam ingignendo, vasa & viscera obstruendo, ac spasmos in nervosis partibus suscitando, sanitatem gravius labefactent. Quod ne eveniat, providentissimo identidem consilio, in machina animali ejusmodi organa ac viscera fabricata sunt, quæ redundanti maxime cruori diverticulum præbeant, donec nimis demum in iisdem accumulatus, per aperta arteriolarum oscula, sufficiens & quæ redundabat copia exsolvatur.

§. II.

In sexu quidem sequiori, a decimo quarto ad quinquagesimum usque æta-

Nimiam succorum copiam sanantibus.

Et gonorrhæa suppressa quid notant

Mala ex coarctatione preffa.

Et fluore albo nobilitate

Quod fit per menses non fluxum

eis annum, ordinaria ejusmodi superflui sanguinis evacuatio singulis mensium periodicis succedit per uterum. Hujus enim ea fabrica est atque textura, ut ex fibris mira expansili & contractili virtute præditis, numerosissimis quoque tortuoso ac serpentino ductu excurrentibus vasis, penitus coagmentatus sit, eamque ob causam eximiam cruoris copiam recipere & recondere possit. Increfcente autem successive nimis mole sanguis in curvatis venarum alveis tarde progreditur, moram dectens latera extrorsum in varices quasi uget, donec demum appulsus semper per arteriolas, præcluso in venas transitu, distentos canales perumpit, & sola mechanica ratione, sine concursu principii interni dirigentis cruor. superfluius ex apertis oculis manat.

§. III.

Hæc critica atque solennis sanguinis excretio, si sufficienter & rite succedit, nimium quæ in vitio est molem evahenda, sanitati egregie patrocina-
tur: contra vero quando vitium capit, & vel excedit, vel deficit, vel etiam perperam cohibetur, damno, ma-
festat gravissimo, quod ut testatius pateat, luculentas nonnullas adducemus ob-
servations. Et primo quidem multi-
plici experientia constat, menstruum sanguinis profluvium, quacunque ex
caussa suppressum, insolitas quærere
vias & facile in alias inuetas hæmor-
rhagias transire. Nam Horstius in
praefat. ad Part. 2. obs. Schenckii lib. 4.
pag. 698. sanguinem a mensium regur-
gitatione ex auribus, & Hollerius
Comment. in lib. 2. Sect. 2. Coac. §. 18.
nec non Jo. Rhodius Cent. 3. obs. 51. ex
gingivis & dentis alveo, critice excre-
tum testantur. In primis frequentio-
ris observationis est, sanguinem, qui
per uterum eliminari debebat, per vo-
mitum, ruptis ventriculi venosis vasibus,
brevibus diebus, rejectum fuisse, quod
Hippocr. lib. 1. de morb. §. 32. Forestus
lib. 16. obs. 25. Panarolus Pentecost. 1.
obs. 6. Rodericus a Castro de morb. mu-

lier. lib. 1. cap. 3. Hæchsteternus obs. Dec. 3. cas. 7. Stalpart van der VViel Cent. 2. obs. 17. aliique plures passim exemplis confirmant. Neque adeo. rarum est, sanguinem præcluso per uteri vasa ex-
itu, majori vehementia ad pulmones
delatum, perruptis ibi vasibus tussi reji-
ci, sicuti ejusmodi casus Hollerius lib. 1. de
morb. intern. cap. 29. Rhodius Cent. 3.
obs. 30. Salmuthus Cent. 2. obs. 18. nar-
rant. In feminis quoque annosiori-
bus, quando menstrua cessat purga-
tio, cruenta non raro oboritur mictio,
ita prorsus, ut exempla proflent, ubi
singulis mensium periodicis cum urina,
sanguis partim fluidus, partim gru-
molus, redditus fuit.

§. IV.

Quisque vero peritior Medicorum
redundantis sanguinis per hæc minus
congrua loca exclusionem, non adeo
tutam, sed ancipitem & baud levi dis-
criminari expositam esse facile judica-
bit. Quo enim pars corporis nobilior
& vitæ tuendæ aptior magisque neces-
saria, eo perniciolior est ejus lesio eoq;
plus periculi alit. Quare si pulmonum
vitale viscus a sanguine stagnante la-
bem accipit ac laceratur, facile ulce-
rosa pulmonum affectio phthisica na-
scitur. Exstat de hac noxa dignus me-
moratu locus in Alpini medic. method.
pag. 273. dum ait: ob immoderatam
sanguinis evacuationem, vel diutur-
num morbum menses supprimuntur,
quod si diu durat, mulieres in graves
morbos incidunt, alique in sanguinis
sputum, ex quo deinceps phthisi inter-
eunt, quod proximo anno Emilia nobili
virgini accidit, cui quum menstrua
purgationes ex matore assiduo defecis-
sent cum sputo sanguinis. & assidua
tussis orta est febricula, qua paucos post
menses interit. Et Hippocrates lib. 1.
de morb. mul. §. 6. eandem in rem egre-
gie scribit: quibusdam mulieribus
menses bi-menses in utero existentes ad
pulmonem recedunt, & ubi recepti suc-
cunt, omnia patiuntur, quæ in tibe-
dica sunt. Si vero in ventriculi ex-
quisitissimi sensus membranas forte

Quo-
ro. po-
rionest.

Quo-
ro. po-
rionest.

sublatis crure & ibi corrumpitur aut coagulatur, periculosa ejus inflammatio, vel hectica febris emergit. Aut si etiam erumpit, vasa tamen brevia nimium ante distenta, tam enormi laceratione, inprimis si lien male affectus, debiscunt, ut iterum coalescere nequeant, & vomitus copiosus sæpiusque repetens mortem inferat.

§. V.

*Alia damna ex sup-
pressis menses*
*In ca-
pit.* His non minora, sed longe graviora ac plura sunt mala, quæ si sanguis neque per uterum, neque alia loca exsolvitur, pullulant; quæ tamen non tantum pro diversâ corporum natura, verum etiam partium, quibus restagnans cruor incumbit, discrepant. Nam quodcumque ad caput sanguinis impetus vergit, atroces, quin funesti in eo morbi subsequuntur, hemicrania, vertigo, cephalalgia, melancholia, mania & apoplexia. Ipse Hippocrates mentis turbas inde fieri testis est, & lib. de virgin. morb. §. 120. quando, ait, sanguis in utero consuit & esculum exiit non fuit apertum, tunc non habens effluxum, pro multitudine resistit ad cor & ad septum transversum, & quum hac repleta fuerint, cor satium fit, dein ex satietate torpedit, ex torpedine delirium. Epilepsiam quoque ex retentis mensibus describunt Misc. nat. cur. Dec. 1. An. 1. obs. 85. Et oblitinam inde inducunt oblivionem. *Acta Hassniensis* Vol. 2. obs. 78. memorant. Quando porro ad thoracem regurgitans sanguis cor & pulmones opprimit, syncope, cordis palpitatio, polypi, asthma, pectoris angustia ejusque hydrops producuntur. Ubi in visceribus abdominis viscidus sanguinis copia restagnat, inde fit malus habitus, icteritia, tumores pedum cedematosi ipsique dirus hydrops, prout maxime auctor est Hildanus Cent. 5. obs. 41.

§. VI.

Aliaque corporis partibus Quod si autem ad ventriculum & intestinorum canalem sanguis congeritur, exsurgunt inde anxii & mole-

ste ventriculi inflationes, cardialgie & spasticum ac flatulentum gravissimum malum, quod totum genus nervosum exagitat, & hysterica passio nominem innoxium. De hac luculenta sunt Hippocratis verba lib. 1. de morb. mulier. §. 5. quum uteri, (per quos menses intelligit) ad stomachum qui nervosus est allapsi fuerint, & ad ventrem intruerint, dolet spina & totum dorsum, & lingua ipsius resrenatur & hanc non claram habet, & animi deliquium adest, aliquibus etiam vocis privatio, & stomachus mordet, & flava bilis urget & amara est, & jactat se & atdet. Ipse quoque uterus a cohibitis mensibus subinde gravem patitur labem. Sic eundem hæc de causa hydropis inundatum in Misc. nat. cur. Dec. 2. An. 1. obs. 79. relatum legimus, pariterque ingentes uteri tumores, eoque scirrhosos, cum exulcerationibus succrescere, experientia edocemur. In scrofioribus etiam & phlegmaticis retentis mensium fluxus, crebrius in copiosum albi stillicidium transit. Neque denique sufflaminata saluberrima uterina purgatione, externæ partes vitis immunes manent, sed easdem sæpius scabie, elephantiasi, furunculis, erysipelaceis affectibus, vel scirrhis tumoribus infestari, experientia testimonio constat.

§. VII.

Quæ omnia truculenta pathemata, sicut suppressam in junioribus menstruam evacuationem pressu subsequuntur pede: ita pariter nihil frequentius in artis exercitio obvium, quam quod subsistente penitus ob ætatis rationem critico hoc fluxu in annosioribus, eadem afflictiones ingruant. Ego certe multiplici experientia compertum habeo, post annum quinquagesimum, feminas, præsertim quæ sanguineæ & largius alias profluviū expertæ sunt, vitam præterea sedentariam, otium & unctius vivendi genus sectantur, a sanguinis tamen missionibus abstinent, dolet cardialgicos, cum summo eis,

*En emul-
nente
mensis
Anno.*

ta præcordia ad dorsum usque & scapulas excurrente æstu ac dolore, noctu præsertim, incurrisse. Alias phlogosi doloribus artuum & erysipelaceis febribus correptas, alias nephritidi cum lumborum tormentis, in calculosas concrectiones desinenti, implicitas vidi. Nonnullas post sexagesimum annum mictio cruenta, vel incompeccibilis mensium fluxus, quidem in hecticam calorem concessit, infestavit. Qualdam, inprimis diuturno more contectas, incessit dolor sinistri hypochondrii, cum anxietate & æstu præcordiorum, qui postea in vomitum eruentum enormem, sive morbum sic dictum nigrum Hippocratis funestum erupit, ubi lien, dissecto post mortem cadavere, magnus & putridus, vasa brevia ventriculi mirum diducta & late hiantia, sanguis quoque vasis elapsus in ileo comparuerunt. Nonnunquam & haud ita pridem in serenissima persona, a cessante quinquagesimo tertio anno menstrua purgatione, continuas anxias vomitiones annotavimus, per dimidium anni affligentes, quibus successit tumor pedum & manuum; quæ tamen sanguinis missione aliisq; congruis præidiis fortunante Deo egregie levata.

§. VIII.

Est vero præter menstruum sanguinis fluxum, alia adhuc sanguinea evacuatio feminis propria atq; solennis, quæ sub partu & post eum succedit, lochialis nempe. Hæc quum pariter sanguis, sub graviditate in uteri vasis mirum distentis collectus, & impurus factus, utilissime exsolvatur, non potest non ejus suppressio maximum inferre damnum, ita proflus, ut plures inde occumbant. Etenim quo major in puerperis, ob graves partus labores superatos, totius corporis, maximeque generis nervosi debilitas: eo gravius periculum a stagnante lochiali sanguine & metuendum est & expectandum: licet symptomata, prout regurgitans cruor varia loca variasq; partes occupat, vel ipsa corporis natura differt,

diversimode incendant. Videlicet quando impurus ab utero sanguis ad caput ruit, vertigo, paralysis & apoplexia præsto est, uti præ aliis Fontanus in Respons. lib. 1. pag. 25. confirmat. Quando ad pectus concedit, anxietas, spiritus difficultas, lipothymia accedunt, vel tussis, phthisis & totalis pulmonum exulceratio inducitur.

§. IX.

Nihil tamen frequentius accidit, quam quod gravia pathemata hysterica, febre stipata, lochiorum suppressionem consequantur, quando nempe congestus in abdominis visceribus & melaëraicis vasis sanguis, nervosus ibi plexus moleste afficit & ad spasmos sollicitat. Notabilis inprimis hanc in rem est observatio Binningeri Cent. 2. obs. 45. de puerpera, quæ paucis a partu diebus, mediocriter a lochiis purgata, lectum deseruit & rigido se commisit cælo, ex quo penitus suppressis uteri purgamentis, diversa pro differentia partium accesserunt symptomata: in capite ejus gravitas & ad somnum propensio, in thorace sputum sanguineum, subflavum, pituitosum, noctu maxime longis intervallis cum levi tussi ægram exercens. In collo quasi suffocantis globi sensus fuit. In corde & universo vasorum genere febris continua, cum pulsu debili & celeri ac siti inexhausta nec non animi deliquio, excitata. In abdomine alvus dura & laboriosa facta. In partibus externis dolor lateris dextri & scapularum pungitivus ac vagus concitatus. Post sanguinis vero missionem alvi solutionem & assumpta antihysterica, omnia hæc pathemata conquieverunt. In nostris quoque regionibus nihil frequentius accidit, quam quod lochiis non rite fluentibus, sub alvo præsertim duriori, febres continuæ, cum purpura rubra & alba mali moris, accendantur, magna certe circumspeditione tractandæ; quandoquidem si retrocedit purpureum exanthema, vires penitus dejicit non modo, sed & in dispolitis sæpe hecticam

*Capitulum
& per
horis
morbi.*

*Melancholia
& per
horis
morbi.*

*Ex lo-
chiali
morbo.*

*Febres
& per
horas.*

febrem ciet & univerfum sanguinem in excrementa pituitofa & falſa, quæ copioſo ſputo, urina craſſa, ſudore multo & alvo laxiori ejiciuntur, ſenſim convertit. §. X.

Verum enim vero quum non ſolum in ſexu feminino, ſed etiam virili & nobiliſſiſſe eveniat, ut ſanguis & benigni laudabiles ſucci nimium copia increſcentes, vitæ ac ſanitati perniciem intentent; admirando pariter divinæ providentiæ beneficio in acceptis ferendum, quod in viris etiam via pateat, qua cum egregio valetudinis emolumento, ſuperfluus & noxam minitans ſanguis ejici queat. Videlicet dicatum eſt huic ſaluberriſimo negotio vas peculiare abdominis venoſum, portæ vena dictum, quod venæ pariterque arteriæ munus explet, & ſanguinem a plurimis abdominis viſceribus, non modo revehit, ſed & poſtea in hepatis viſcus adducit. Quia enim hæc vena manifeſta, ſyſtole, & diſtole, ſive pulſu, deſtituitur, earumque ob cauſam ſanguis trajectus per hepær, ejuſdemque reſſus ex liene, pancreate, meſenterio & inteſtiniſ admodum tardus ac difficilis eſt: non poteſt non fieri, quam ut ex mechanica & hydraulica neceſſitate, obreſtagnantem in alveis ramorum hujus venæ cruorem, & maxime in vena ſplenica ejuſdemque propagine hæmorrhoidali, in qua ob ſitum perpendicularem & a corde longius remotum difficilior adhuc redditur reſſus, major appuſſio ad minimas, arteriolas earumque extrema fiat, ac demum accedente ſub alvi egeſtione niſu, in tunicis, inteſtini, recti canales dehifcant & cruorem effundant.

§. XI.

Dici ſolet hic fluxus hæmorrhoidalis, & ordinariæ non, per externas, ſed internas venas hæmorrhoidales ſuccedit, ſicque non eſt nimius, vel ſymptomaticus, a multis morbis ex plethora oriundis defendit, ac ſalutaris eſt; unde etiam non ſine ratione germanico idiomate, vocatur *die guldent*. A-

der, quali auro æquiparandus, vel non redimendus fluxus. Interim licet hæc ſanguinis evacuatio a natura per ſenſibiles quodam præcedentes motus in abdomine, offe ſacro & cruribus perficiatur: tamen non ſecundum, ſed præter naturæ rationem, & ordinem contingit, & ut plurimum tantum in iis viris obviuſ eſt, qui ſpongioſioris, laxioris, & plurimis exilibus vaſculis donati, adeoque muliebris corporis habitus ſunt, qui motu, labore ac ſudore ſecundum univerſale & primum præceptum nimium ſanguinem non conſumunt, ſed deſidioſam in luxu agunt vitam, ſanguinemque copioſum gignunt, qui præterea in puerili ætate largas per nares experti proſuſiones & in adoleſcentiâ hæmoptica molimina paſſi. In his inquam ætate demum virili per ſedis venas, idque frequentiffime, redundans ſanguis exſolvitur ſalutari modo.

§. XII.

Neque etiam ipſe ſexus, quæ eandem vaſorum abdominis, & venæ portæ conformationem habent, ab hoc ſanguinis per ſedales venas proſluvio ſunt plane immunes, ſed frequenti experientia compertum eſt, naturam, inprimis in ſuppreſſis menſibus, ſæpe per hæmorrhoidalia loca abundantem ſanguinem emittere. Obſervavit id ipſum Hippocrates in Coac. & lib. 4. epid. cap. 20. exemplo confirmat: *ſilia*, inquit, *Aedilis menſibus non prodeuntibus per duos annos hieme habuit hæmorrhoides*. Et Heurnius comment. in aphor. 10. lib. 6. diſertis verbis, ſcribit: *novi mulieres, quæ menſium vice hæmorrhoides fundebant*. Pariter in gravidis ſanguineis, ubi menſes reſiſtant, ſæpius, vidimus hæmorrhoides, ſalutariter, vel fluxiſſe, vel protuberariſſe in ano, quin in puerperis quandoque cum ipſis lochiis manariſſe. Commemorabilis hanc iuram eſt Hollerii de morb. intern. lib. 1. cap. 35. obſervatio, ubi mentionem facit duarum ſeminarum gravidarum, quibus ſalutariter ſtillarunt hæ-

Exterius
naturæ
lis tamē
nes uni-
verſali

Find-
ale etia
qua
depreſ-
ejali.

hemorrhoides, partu consequuto saluberrimo, & quod mirum, si sanguinis per ani venas fluxus tempore graviditatis substituit, pessime habuerunt, eodemque erumpente, mirifice allevatæ sunt. Mihi quoque plurimi suppetunt casus, quod semine sanguinæ, & menstruo, & hemorrhoidali fluxu, obnoxie fuerunt, quæ subsistente per hemorrhoides profluvio, symptomatibus hypochondriaciis, & hystericiis afflictæ sunt, licet sanguis per menses largiter exsolveretur.

§ XIII.

Quamvis vero hic hemorrhoidum fluxus non omnibus naturis, sed sanguineis potissimum, & vitæ sedentariæ addictis solennis, quin secundum Hippocratem de aer. & locis cap. 4. §. 7. meridionalibus magis locis familiaris, in borealibus autem rarior sit; nostris tamen temporibus in hisce aquilonariis etiam regionibus, longe familiarior est & frequentior, quam olim, ut ipse testari possim, perpaucos, quoniam ante quadraginta annos medicinæ exercendæ manum primum admovebam, sanguinis per ani venas stillicidio, vel moliminibus ad istud, fuisse affectos. Si in causam inquirimus: mea quidem sententia culpa potissimum rejicienda in vitæ genus, ex operoso ac laborioso, ob perditos hominum mores, in desidiosum ac otiosum mutatum, quo non solum major quam par est sanguinis copia ingignitur, sed etiam ipsum corporis robur languescit, ut non mirum sit, effeminato corpori semineum quoque accidere sanguinis fluxum. Deinceps hemorrhoidum profluvium, teste experientia, hæreditarium & hinc certis familiis solenne est, quumque sic hemorrhoidibus obnoxius hemorrhoidarium gignat hilem, propagatur latius dispersio & plures fluxum experiuntur. Accedit & hoc, quod nostro tempore Medici in omnibus fere morbis hemorrhoidum anomalias subesse perperam putent, & crebriori pilularum, præsertim aloeticarum, usu,

sanguineum fluxum proritare, etiam si natura ad eundem plane non inclinet, nitantur. Recte enim jam Fossæ tom. 1. conf. 57. censet: quod & tumor lienis, qui Italici familiaris, & multiplex purgantium & aloeticorum usus, sit frequentissima fluxus hemorrhoidalis causa, & adjicit: caveat quisque omnino a pilulis de aloë, aloë enim aperit ora venarum, & hemorrhoides adeo inducit, ut ex centenis his pilulis utentibus, nonaginta hemorrhoidibus laborent.

§ XIV.

Quemadmodum itaque in iis, qui dispositi sunt ad hemorrhoides, nihil salubrius est eorum fluxu, si rite succedit, ita vicissim nihil perniciosius, quam si deficiunt, vel plane perperam cohibentur; quod argumentum jam paulo uberius excutere placeat. Memoratu certe dignus hanc in rem est Celsi lib. 6. cap. 18. locus, in quibusdam, inquietis, hemorrhoidum fluxus parum tuto supprimitur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non sunt, habens enim purgationem hanc non morbum, ideoque curati quidam, cum sanguis exitum non haberet, inclinata in præcordia materia, subitis & gravissimis morbis correpti sunt. Nam quando sanguis superfluit, & qui vitalibus conservatoris motibus, nempe circulari & liberiore secretorio & excretorio, remoram injicit, per solennes has vias minus excluditur, ejus regurgitatio vel metastasis fit in varias alias corporis partes cum summo vitæ ac valetudinis discrimine. Quandoque concedit ad caput, & maniam, melancholiam vel etiam apoplexiam parit. Nonnunquam in pectus dilabitur, & pleuritidem, peripneumoniam, phthisin vel asthma inducit. Sæpius hepaticum incurrit, & scirrhum ac hydropem dirum producit. Sæpius quoque in valis melaracis & intestinorum membranis, sanguis crassior & impurius congeritur, ibique spastica & hypochondriaca flatulenta symptomata & atroces dolores colicos ciet. Si porro ad rem

Hæmorrhoidum
fluxus
causæ
distinguitur
in
sa

Cor hy-
mo-
rboideis
jam au-
cto sa-
milla-
re.

num viscus sanguis hemorrhoidalis suppressus regurgitat, nephritis & calculus, miclus quandoque cruentum nascuntur. Et quando deniq; in habitum corporis impetuose protruditur, ibique subsistit phagedena & mali moris ulcera exoriuntur.

§. XV.

Quod Quæ quod ita sint, passim auctores luculentis testimoniis ac observationibus confirmant. Et quidem Hippocrates hæmorrhoidum in melancholia & mania salubritatem disertis verbis asserit, *lib. 4. aphor. 26.* inquit, *melancholicis*, id est, si qui sine febre insaniant, si varices aut hæmorrhoides superveniunt, insaniam solvunt. Et *aph. 4. com. 25.* hæmorrhoidum moderatum fluxum maniam prohibere dicit. Porro etiam ad curandam nephritidem hæmorrhoides, seu summam medicinam commendat, dum *lib. 6. aphor. 2.* ait: *nephriticis hæmorrhoides supervenientes magnam opem ferunt.* Præterea & *lib. de humoribus* earum fluxum ad præservationem pleuritidis & morborum, qui cutim descenderent solent, dilaudat; potissimum *epid. lib. 6. Sect. 3. text. 37.* scribit: *mariscis laborantes, neque morbo laterali, neque pulmonario, neque phagedena, neque furunculis, neque thymitis sortasse, neque alphis laborant.* Utilem quoque ad sublevandam molestissimam illam hypochondriorum tensionem idem gravissimus autor in *Coacis* dijudicat: quibus, inquit, dolores hypochondriorum, oris ventriculi, hepatis & partium circa ventriculum sunt, hi sanguine per inferiora excreto, sanantur. Et quæ plura ejus huc referri possent efflata.

§. XVI.

Aliaq; Neque deficiunt aliorum gravissimorum Medicorum auctoritates, quæ idem adtribuunt. Sic *Galenus l. 6. can. 29.* qui clausis hæmorrhoidibus in insaniam inciderunt, sæpe reteratis his venis, ab eisdem evasisse perhibet. Et *lib. 3. de humor. com. 26.* melancholiam ex suppressis hæmorrhoidibus or-

tam, annua evacuatione curatam, refert. *Hildanus Cent. 6. obs. 28. pag. 531.* ita differt: *ego sincere scribere possum: experientia me comprobasse, eos rarisime apoplexia, epilepsia, aut vertigine, aut oculorum inflammatione, correptos fuisse, quibus hæmorrhoides fluebant; immo apertione hæmorrhoidum gravissimos sublatos esse morbos, & in aliis & in me ipso sum expertus.* Porro *Ronsæus de scorbuto pag. 72.* non paucos, ait, novimus, quos profusa sanguinis ex hæmorrhoidibus a scorbuto præservavit. *Petrus Monavius* de se ipso ad *Cratonem Epist. 236.* conqueritur: se a suppressis hæmorrhoidibus, quæ antea fluxerant, arthritidem incurrisse. *Forestus lib. 23. obs. 4.* ab arthritico dolore quandam erumpentibus hæmorrhoidibus liberatum; & alii cardialgia laboranti cum commodo easdem apertas esse, testatur. *Amatus Lusitanus Cent. 5. cons. 3.* hæmoptysin reteratis his venis curatam, memorat. Et *Alpinus in medicin. method. lib. 2. pag. 371.* hæc præclara de hæmorrhoidibus habet: *in melancholia incipiente sæpius hæmorrhoidis profuisse visa est, & perfectam quoque sanavisse: contra, si cohibeatur, homines in gravissimos morbos labuntur.* Solet in hepate ac liene fieri scirrhostas & refrigeratio caloris nativi, unde aqua intercurs, præterea vertiginosi ac melancholici fiunt, quibus dicta vena cohibetur. Illustrissimus *Senator Venetus*, proximo anno a suppressis hæmorrhoidibus, quas multos annos habuit, in affectum scorbuticum incidit.

§. XVII.

Quandoque etiam suppressa vel deficiens in senibus hæmorrhoidis in nephritidem vel miclum cruentum concedit. Quare non sine ratione *Mercurialis in Praxi lib. 3. cap. 31.* & *Senertus instit. lib. 3. P. I. S. 3. c. 5.* miclum cruentum renum hæmorrhoides appellarunt. Et certe præstant exempla, ubi in senibus sanguis singulis mensium intervallis cum urina partim grumulosus redditus fuit, qui equitatione vel

Et 65
ferua-
tum.

vel vini generosi potu facile proleſtus eſt. Ejusmodi ſanguinolentam multionem *Hildanus* in ſene *Cenſ. 2. obſ. 11.* obſervavit. Idem confirmat *Hæurnius comment. in aph. 46. vidit*, inquit, *qui, cum hæmorrhoidibus tentari ſolebant, cum urina ſanguinem effundebant certis ſpatiis ſine noxa.* Interdum fit, ut loco ſanguinis liquor albus viſcoſus & albumini ovi ſimilis per anum prodeat, non ſecus ac menſtruus fluxus quandoque in fluorem album concedit, ut hinc recte *Platerus* albas hæmorrhoides com menſtruus albis mulierum comparaverit, de quibus pluribus videatur *Fernelius lib. 6. paſſol. cap. 10. & Sennertus in praxi lib. 3. Part. 2. Sect. 2. cap. 12.* nec non *Miſc. nat. curioſ. Dec. 1. An. 1. obſ. 75.* Et mihi nota complura ſunt exempla, quodam tubercula in ano geſſiſſe, quæ ob exquiſitum dolorem totum corpus in conſenſum pertraxerunt, ſponte autem rupta, aliquot cochlearia ſeri acris corroſivi fuderunt, quo evacuato, pathemata conquieverunt.

§. XVIII.

Nec eſt notabile quædam. Nobis quoque in proclivi foret, plura de noxa ſuppreſſarum hæmorrhoidum in confirmationem adducere exempla, ſed inſtar omnium eſſe poteſt illud, quod ante aliquot annos notavimus. Nimirum generoſus quidam vir ſere quinquagenarius, ex ſuppreſſis per potum aquarum ſalubrium frigidum & balnea hæmorrhoidibus, podagram & malum hypochondriacum ſpalticum ſibi contraxerat, & huc cum familia concedens, me in conſilium aſcito, fortunante Deo multum levabatur, ut etiam hæmorrhoides, quæ diu ſubſiſtenterant, ſedirent. Quam vero paulo largius fluerent, enixe a me petiit, ut profluviū compellerem, quod tamen conſtanter renui, ac potius ut ſibi gratularetur & in ſinu gauderet de redeunte fluxu, regeſſi. Sed æger inde magnum periculum ac debilitatem metuens, mox immemor, ab extraneo Medico,

me inconſulto, medicinas fluxum ſupprimentes, quibus opiata & martialia immixta, impetravit iſdemque crebro uſus eſt. Jam pulcherrime omnia ſuccedere videbantur, fluxus quippe tertio die ſubſiſtebat, æger obambulabat ſanus nihilque damni metuebat, ac reſidua pharmaca per quatuor adhuc dies ingerebat; ſed nocte cōcubia lethaliſus opprimebatur ſymptomatibus, ac incredibiles primum præcordiorum anxietates, iniquitudinem & atrociffimos ventris dolores perſentiebat, cum archiſſima alvi conſtrictione, quæ nec clyſteres admittebat, tantaque erat vis morbi, ut omnia antiſpaſmodica, cinnabarina & clyſteres oleoſos eluderet, ac tertio die, poſteaquam æger adhuc ira correptus eſſet, aſtonia, delirio & convulſionibus funeſtum fortitetur eventum. Facta poſtridie ſectiōne, vidimus cum ſtupore, non modo inteſtinum rectum, ſed & totum coli tractum in ſiniſtro latere ita contriſtum, ut digiti craſſitiem vix ſuperaret, ventriculum inflatum & in quibuſdam locis inflammatum, ejuſque cavitati ſerum ſanguinis putridum innatans, reliqua omnia viſcera optime conſtituta. Neque dubium eſt, quin, ſi capitis fuiſſet apertio conceſſa, celeris mortis cauſa ibi detecta fuiſſet, videlicet ſanguinis extravafatio, aut inflammatoria ſtaſis, quia fortiſſima inteſtinorum, & nervoſarum partium ſtrictura, ſanguis ad membranas ventriculi & cerebri delatus, hanc funeſtam cataſtrophē procul omni dubio induxit.

§. XIX.

Quare ſicuti nunquam hæmorrhagia, licet fuerit enormis, quando a causa interna proficiſcitur, fortiori medicina ſtyptica reprimenda eſt: ita multo magis id in hæmorrhoidibus nimium fluentibus obſervandum, ſiquidem non modo ſecundum allegatum *Hippocratis* teſtimonium, inde hydropis vel tabis metus, ſed & aliorum graviſſimum affectuum, de quibus ſupra tacta mentio, periculum

*Hinc
naque
valde
compr.
munda
hæmorrhoides.*

lum nascitur, idque eo magis in iis accidit, qui jam per ipsum copiosum fluxum, vel aliis ex causis imbecilliores facti sunt. Etenim hanc regulam practicam quique Medicorum, ut curæ cordique habeat, vehementer optarem, videlicet, nihil ad perniciem magis perducere, quam valde debilitatis corporibus adstringentia, opiata vel alia fortiora remedia adhibere. Neque corporis humani natura a validiori sanguinis effusione unquam tantum patitur, quantum damni ab importuna sistente medicina accipit. Deinceps & illud utile monitum prudens Practicus inde capere debet, quod in ejusmodi affectibus, qui retentis hæmorrhoidibus supervire solent; nihil prius antiquiusq; habeat Medicus, quam ut iis aperiendis, sive per interna, sive per externa, ut hirudines, invigilet. Præclara sunt quæ hæc de re prodidit *Baglivus in praxi Lib. 1. pag. 124. plurima, ait, adducere possem exempla, quam utilitatem, non obstante sanguinis circulatione, apertio venarum hæmorrhoidalium, præ aliarum venarum apertione, asserere solet iis, qui hypochondriorum morbis, doloribus scilicet, caloribus, lumborum gravitate, flatibus, sensibus, borborygmis laboras. Quandocunque vero harum venarum apertio non succedit, aut difficulter perficitur, tum naturæ institutum in ejusmodi morbis Medicis imitandum, & sanguini in inferioribus, pertusis pedum venis, exitus parandus. Ita novimus ischiadicum dolorem, ex hæmorrhoidibus suppressis, aperta in pede vena, protinus ex toto sublatum, fuisse, neque minus recordamur, in atrocibus, totum abdomen, ob male fluentes hæmorrhoides, affligentibus doloribus, venæsectionem in pede institutam, pariter & nitrofa arque emollientes clysteres, omnem curationis punctum tulisse.*

§. XX.

Hæmorrhoides constanter.

Jam itaque non quidem negandum, sed constanti experientia, in-

de a primis artis medicæ initiis confirmatum habemus, sanguinis & menstrui, & hæmorrhoidalis fluxum saluberrimum, tam valetudini conservandæ, quam avertendis plurimis morbis prodesse, eumque in assuetis turbatum, vel imprudenter cohibitum, multas & graves ægritudines pro diversitate corporum & locorum, quæ a sanguine redundante & refluyente occupantur, progignere, quæ ad debitum successum deducto sanguinis stillicidio, si non ex toto tolluntur, tamen multum minuantur ac levantur. Neque etiam inficiandum, *Cl. Stallum*, collegam meum honorandum, non mediocrem laudem mereri, quod in scriptis suis, ut Medicus maxime omnium in pathologicis instructui & hæmorrhoidalis fluxus rationem habeat, serio ac crebro inculcarit, & sic vetustissimum hoc ac verissimum dogma, a recentiorum tepentissimi chymici salino-sulphureis penitus ferme obscuratum, viximino quasi revocare & pristino nitore reddere connixus sit. Interim, tamen neutiquam celeberrimi hujus viri, vel potius affectatorum ipsius placitis assensum præbere possum, qui hanc doctrinam nimium & abusive extendunt, ac universam fere morborum genealogiam primario ex plethora, & inde enata sanguinis spissitudine, ac prohibita ejus per uterum vel sedis venas excretionem, arcescere, ac operosa quidem, sed frustranea contentione, vel spissis voluminibus conquerere, sibi sumunt. Neque injuriam fecero, si hanc hypothelin, modo ita eam dicere liceat, ex insufficienti minusque attenta experientia, sive observationum circa morbos, præsertim chronicos, delectu, enatam esse dixerim.

§. XXI.

Quod ne gratis vel gravius dictum videatur, exemplo sit frequentissimum illud nostro tempore malum sic dictum hypochondriacum. De hoc multus quidem, ubique apud eos sermo,

cujus-

*accidit
ita quod
dem.*

*Non tam
ad.
omnes
morbos
curandos.*

*N. 42
malum.
hypo
chondriacum
dicitur
sæpe
fieri.*

*Sed im-
becilli-
tati no-
n est tri-
butum*

ejusque natales unice ex stagnatione sanguinis; hæmorrhoidalis in ramis venæ portæ petendas esse, acriter contendunt. At vero si curatius paulo in primam hujus morbi originem inquirimus, ejusque genefim ubi numerosa confluit misera hypochondriorum cohors, ad fontes nempe fœtiores, rimamur, clarissime patet: pertinacem hunc affectum esse non plethoræ, sed imbecillis naturæ prolem, solennem ac proprium iis, qui naturam corporis sui & systema nervosarum partium, inprimis ventriculi vim digestivam, tonum ac robur, variis de causis graviter labefactarunt. Videlicet inituto coram a me scrutinio, alii vitam sedentariam, diuturnum mœrorem, terrors, & vehementem iram, ingestis, paulo post desuper cibis aut potu frigido, inculcarunt; alii in nimias mentis per intempestivam stusis & lucubrationes, fatigationem, potionem largam vel frigidam, sudanti corpori ingestam, abusum purgantium, opiatorum nec non acidorum & vinorum, culpam rejecerunt. Quidam neglectum sub usu fontium mineralium, vel post purgantia aut emetica, regimen, febris intermittens, diarrhææ aut dysentericæ perperam institutam medicationem, aut præposteram sudoris fœtidi resicationem, primam morbo occasionem dedisse confessi sunt. Quæ certe omnia ita sunt comparata, ut robur naturæ atterat, in nervosisque partibus maximam inducant debilitatem, tantum abest, ut sanguinis, virium custodis, abundantiam arguant.

§. XXII.

*Unde
sæpe flu-
oribus
hæmor-
rholdi-
bus af-
figitur.*

Et licet tantisper largiamur, deficientem vel suppressum per animi pathemata, frigus & improdeas medicationes menstruum aut hæmorrhoidalem fluxum, quandoque causam arque originem hypochondriaco malo posse suppeditare, eandem tamen non semper subesse causam ex eo luculenter patescit, quod crebrius inter exempla sint, qui largiter & sufficien-

ter etiam fluentibus hæmorrhoidibus, hypochondriacis tamen excruciantur pathematibus, utut interdum eorum vehementia inde decreseat. Notabilis profecto hanc in rem est observatio, quam habet *Sennerius in praxi lib. 3. Sect. 2. cap. 23. novi*, inquit, *feminam nobilem, constitutione sanguineam, affectioni hypochondriacæ obnoxiam, quæ singulis mensibus ordinario, & quidem die post menstruum fluxum decimo quarto, hæmorrhoides patiebatur.*

§. XXIII.

Accedit & hoc, quod firma & irrefragabili experientia in comperto sit, adolescentes, juvenes ac viros, qui nunquam antea vel levissimum fluxus hæmorrhoidalis indicium observarunt, subito malum hoc incurrere spastico-flatulentum, & demum sidiutius eodem detinentur, dolorem dorsii, in abdomine circa hypochondria & stagnationes experiri sanguinis, qui intercepto per spasmos liberò per viscera abdominis motu, per aui venas exitum molitur, eodemque denegato, atrociora fuscitat pathemata; ut adeo pateat, tam fluxum hæmorrhoidalem, quam molimina ad eum, effectum & productum esse, mali hypochondriaci. Quin innumera memoria teneo exempla, quod affectio illa ventriculi & generis nervosi spasmotico-flatulenta, quæ malum hypochondriacum audit, in homine perfecte sano nunquam antea hæmorrhoidibus vel moliminibus ad eas obnoxio ex animi affectu, & maxime ab ira, cui mox subijuncta medicamenta sudorifera calida, aut cibis vel potus super ingestus, equata sit, quam demum copioso, ut fieri afolet multiplicium purgantium & pilularum polychrestarum, quæ aloem recipiunt, usu, a Medicis tractatam, ejusmodi motus, sive sic dicta molimina ad hæmorrhoides, dolores nempe in lumbis & olse sacro exceperunt. Quumque Medici fluxum importunum iisdem medicamentis, & vengfectionibus in

*Et hæ-
mor-
rholdis
spasmos
hypochon-
driacæ.*

*Vel hæ-
mor-
rholdis
medicam-
entorum
frigidum.*

pe-

pede proritare niterentur, factum quidem, ut nonnunquam aliquot guttæ sanguinis stillarent, crebrius vero humores viscosi albi, instar albuminis ovi, sæpe us magna copia, excernerentur, sed sine ullo parihematum lavamento. Et in his quidem crebriori purgantium usus merito tribuendum esse censeo, quod propter spasmodum ab iis sub operatione inductum, & relictam postea in intestinis atoniam, libera impedita sit circulatio, & in melsaricis ac hæmorrhoidalibus vasis stagnationes atque decubitus contracti.

§. XXIV.

*Calculi
in quibus
& podagra
hæmorrhoides
anomalie non
debentur*

Deinceps novæ & raræ, ut prohibent, verè pathologiæ conditores, id volunt & urgent, & calculum, & podagram, ex hæmorrhoidali fluxu deficiente, vel minus rite succedente, exclusa omni atri, salsa, tartarea intemperie ac humorum dyscrasia, pululare. Ut ut autem non negandum sit, quod quandoque hi affectus chronici a retento hæmorrhoidum, vel in mulieribus mensium fluxu, primam petant originem, eaque propter observante etiam Hippocrate, prodeunte sanguinis profluvio mitigentur: ex eo tamen minime sequitur, ergo semper ab hac causa dependent; quandoquidem a particulari causa ad universalem nullam plane valere consequentiam, notissimum est philosophicum axioma. Ego certe sæpius vidi, succedente etiam, quin sub ipso hæmorrhoidum stillicidio, & calculum, & podagram, tyrannidem suam exercuisse, de quo quidem omni dubitatione majus est exemplum Cl. B. Dolzi, qui sæpius per litteras apud me conquestus est, quod per 20. annos, licet hæmorrhoides fluxerint, mire calculi & podagræ doloribus divexatus sit, a quibus tamen diætæ lactea utens, per biennium liber egit, sed ad pristinum vitium & potum postea concedens, incidit in dysuriam, demum funestam.

*N. quæ
in calculo*

Tacemus plerumque podagram, & calculum esse morbos hæreditarios, ac

illam maxime ab immodica venere, bacho & ira, & generari, & foveri. Neque semper insanæ a plethora vel hæmorrhoidum fluxu suppresso incubacula trahunt, sed pariter affectibus hæreditariis accensendi sunt, & uti mania plerumque a continua præsertim cohibita ira ac impensis desideriis veneris accedit, ita melancholia a terrore & diuturno mœrore excluditur, vel etiam ab usu narcoticorum & stupescivorum contrahitur, sine plethoræ concursu. Et sic etiam de aliis morbis, quorum ortum ad plethoram & retentas sanguineas evacuationes hujus theoriæ assertores unice referunt, sentiendum.

§. XXV.

Denique quo magis hi tam magui hæmorrhoidum patroni earundem successum urgent & eodem sanitatem & conservari, & amissam revocari, confidenter asserunt; eo magis certe mirandum, ipsi obijci potest, quod nulla adhuc idonea, congrua remedia excogitarint ac norint, quibuscum potissimum hoc therapie sue momentum consicere, ac menium, vel hæmorrhoidum fluxum, cum certa ratione procurare, promovere, vel moderari queant. Nam intuta profecto, fallax & sæpe frustranea est hirudinum appositio, neque ab omnibus admittitur. Elixirium quoque proprietatis, cum, vel sine acido, & pilulæ quæ aloen capiunt, vel balsamicæ ad mentem Becheri concinnatæ, licet certo commoveant, non tamen eadem ratione sanguinem emoveant ac intentioni respondent. Et suppositoria, pediluvia & venarum sectiones, pariter spem atque expectationem destituunt, vel dubiam saltem ostendunt. Quid quod magis mirandum, vel potius dolendum est, dum impensis frustraneo plerumque labore hæmorrhoidum fluxum proritare nituntur, ea remedium genera, quæ interceptum liberum sanguinis per abdominis viscera progressum restituant, & afflictas nervosas partes solantur, thermas vide-

*Nulla
etiam
dantur
hæmorrhoides
conferre
moven-
tia me-
dica-
menta;*

videlicet, acidulas omnesque soterios fontes, salia volatilia oleosa, martialia bene præparata, lactis quoque asiniui, vel feri lactis, & insulorum theiformium usum, balnea aquæ dulcis cum mutatione aeris, vel plane negligunt, vel oscitanter spernunt, vel non satis pro dignitate commendant.

§. XXVI.

Post mensem ac hæmorrhoidum saluberrimam evacuationem sunt adhuc alix criticæ, tam sanguinis redundantis, quam aliorum superfluum ac inutilium humorum insectæ sæpe atq; extraordinariæ excretionis, cum omnes in finem a natura institutæ, quo sub exquisita æquabilitate atque proportionem, corporis integritas illibata servetur. Videlicet in puerili ætate ante pubertatis annos, quin etiam adhuc adolescentiæ ætate, valde familiares & salutare per narium venas sanguinis profusiones succedunt, quæ interdum iatis crebræ & largæ sunt, solennes maxime iis, qui mollioris texturæ, succulenti, & spongiosi corporis habitus sunt, multumque sanguinis generant, quos sanguineæ vulgo dicunt complexionis. Hæc saluberrima redundantis sanguinis diminutio, ubi subsistit vel compescitur, protinus capitis gravativi dolore cum oculorum ardore, facie inflata & rubicunda, oris & narium siccitate atque æstu, vasorum circa tempora forti pulsatione accedunt, eo quod sanguis exitum moliens, in vasis capitis congeritur ac distensione & compressionem ejusmodi dolorificam sensationem excitat, sanguinis autem e naribus stillicidium vel sponte factum, vel arte prolectum, mox gravem istum dolorem solvit atque discutit; id quod conceptis verbis etiam Hippocrates Sect. 3. aphor. 10. testatur, eaque propter, quando non sponte procedit sanguinis fluxus, Sect. 5. aphor. 68. venam in fronte secandam jubet.

§. XXVII.

Quando porro sanguis segniter per caput cursum conficit, ac in venarum

alveis stagnat, neque per vasculorum in naribus oscula stillat, in pueris decem annorum graves, diuturnas ac valde acres dolorificas oculorum defluxiones, cum rubore & æstu, quæ lippitudinem & suffusiones inducebant, sæpius vidi, juncto interdum etiam aurium tinnitu, memoriæ stupore, quæ prius non evanuerunt, quam per largam hæmorrhagiam, aut alvi fluxum, sponte vel arte productum, aut etiam per vesicatorium, non capiti, sed dorso ad revulsionem applicatum, id quod in vitio erat discessit. Sæpius quoque a me observatum sanguineæ complexionis & floridi vultus, ante annos pubertatis non tantum capitis doloribus tentatas, sed & subito in terram collapsas & convulsionibus epilepticis, non raro sævissimis, esse correptas, quæ tamen omnibus aliis frustra tentatis, prolecto per intrusum in nares stilum largiter sanguine, mox conquieverunt, & utut rursus aliquot vicibus recurrerent, penitus tamen, erumpente circa annos pubertatis mensem profusivo, cessarunt.

§. XXVIII.

Simili ratione novi, virginem, quæ primis ætatis annis largas narium hæmorrhagias experta, crescente post pubertatis annos sanguinis copia, eademque non sufficienter per menses diminuta, non modo capitis dolorem, sed & cum sensum turbis & aphonia, levem quasi insultum apoplecticum incurrisse, quo discusso, mansit loquela suspensa, sanguinis autem in pede missio egregiam tulit opem. Neque infrequenter in adolescentibus summum capitis dolorem, cum somno phantasmatis pleno, auditus difficultate & perversa phantasia annotavi, nullam aliam ob causam, quam quod sanguis redundans & per nares non exsolutus, tardius per cerebri vasa trajiciatur eademque nimium oppleat, hinc secta postmodum circa æquinoctia vena in pede, adhibitis pediluvii & alvo laxiori redita, disparuerunt penitusque pathematata sublata fuerunt.

H

Novi

*Est sup-
pressio
narium
hæmor-
rhagias*

*Capitis
dolores*

*Epilep-
ticæ
motus*

*Levitio-
res apo-
plexia*

Menstrua

*Quoties
cum de-
finitio-
ne*

Tom. III.

§. XXIX.

Exempla Novi magni nominis Theologum, sanguineæ complexionis, qui non modo in juventute, sed & adulta ætate, maxime circa æquinoctia, largas passus est hæmorrhagias narium, eaque propter meo ex consilio bis per annum admisit venæsectionem. Hinc autem alio concedens, a Medico ut sanguinis missionem omitteret induci se passus est, quo facta, subsistente pariter narium stillicidio, in capitis dolores, vertiginem, tinnitum aurium & surditatem paulo post incidit, cum præsentaneo insultu apoplectici metu, ad quem præscindendum venam aperiri suasi, qua etiam, licet surditas non sublata, apoplexia tamen discussa est. Aliquot etiam elapsi anni, quum ab honestissimo viro, aliquot abhinc milliaribus degente, antea sano, vegeto ac robusto, 30. aliquot annorum, constitutionis sanguineæ, in consilium ascisceret. Hic quum currente puerili ac juvenili ætate, liberales sanguinis profusiones expertus esset, posteaque singulis annis semel vel bis sanguinem utiliter emitti curasset, verno tempore idem omittens, circa exitum Martii, post corporis refrigerationem, & ingestos largiter difficilioris solutionis cibos, præter omnem opinionem sensu, & motu privatus, nullius rei conscius concidit, emissio autem post aliquot horas e vena brachii per amplam aperturam sanguine, mox ad se rediit quidem & paulatim loquelam, sensum ac motum recepit, capitis tamen ingentem imbecillitatem, & memoriæ defectum ab hoc insultu passus est, adeo, ut ex moderato etiam vini usu valde offendatur.

§. XXX.

Apoplexia. Nonnunquam tamen a sanguine in alveis canalium cerebri nimium congesto, subtiliora plexus choroidei vascula disrumpuntur, & propter immedicabilem extravasationem, funesta consequitur apoplexia. Et certe plura in observatis Medicorum consignata sunt exempla, quod post hæmor-

rhagiâ suppressam apoplexiæ lethales obortæ, ubi post mortem sanguis e naribus largiter manavit, uti *Hildanus Cent. 3. obs. 2.* perhibet. Aliquot porro exemplis confirmatum habeo, circa annum vigesimum primum, qui etiam est climactericus, retento narium stillicidio, post stagnationem sanguinis in cerebri vas, qualis sub leviori apoplectico insultu esse suevit, phrenitidem accessisse, ad quam discutendam laudatissimum effectum præstitit larga sanguinis in brachio subtractio. Dignum est quod huc referatur a *Bobnio de offic. Med. dupl.* adductum exemplum de juvene, qui phrenitide laborans, forti insista alapa, & facta post eam largo sanguinis e naribus profusio, sanatur. Denique frequentioris etiam observationis est, cohibita narium hæmorrhagia, sanguinis impetum in asperam arteriam ruere illumque tussu rejici; quod vero, si paulo major est copia, non sine mortali periculo contingit, quale exemplum a *Gabelo Kovero Cent. 4. curat. 37.* annotatum.

§. XXXI.

Tam grave, varium & multiplex est damnum, quod ex suppressa sanguinis redundantis evacuatione in corporis integritatem reducat. Jam quum serum etiam, plus vel minus impurum, & maxime quidem in corporibus, quæ complexionibus phlegmaticæ, vel sanguineo phlegmaticæ, magis quam par est crescat & sanitatis insidias struat: pariter egregie pro sanitate est, si quando a natura, per quam nihil aliud quam admirandum istud corporis ejusque partium structuræ artificium, ad vitalem sanguinis circulum cum excretionibus perficiendum, a divina providentia destinatum, intelligo, a nimia ejus copia, etiam præter & extra ordinem per insuetas excretiones, corpus liberatur. Videlicet præter eam vitiosam diminutionem, quam in quibusdam per spontaneos largos nocturnos sudores, utiliter succedere, & cum præ-

Phrenitides

De fa-
luti
seri vi-
tiosi
excre-
tioneTer-
fau-
dosa

*Tussis
& co-
riza.*

præstanteo detrimento compesci, supra jam meminimus, in plurimis adhuc utriusque sexus hominibus obvium est, singulis fere annis, vere & autumnis, per tussim & coryzam, cum levi febricula serotum humorem rejici. Contingit hoc maxime a perspiratione tum sufflaminata sæpiusque ab aeris injuria interturbata, nec non pult ingestos multos incongruos cibos, ac tanta sæpe, in senibus potissimum, tussis est vehementia ac pertinacia, ut per aliquot menses corpus quatiat, & incredibilis ludoris viscidæ copia cum virum langore, inappetentia, inquietudine ac interno aestu eliminetur; quod tamen, si non imprudenter sistitur, sed leniter temperantibus & laxantibus tractatur, egregie cedit in sanitatem; quum contra adhibitis pectoralibus, dulcibus ac resolventibus, tussis exasperetur longiusque extrahatur. Quibuldam quoque mucidæ sordes in puerili ætate largiter per nares expurgantur cum valetudinis commodo, si autem incrementibus annis retinentur, oculi hebescent, defluxionibus acribus tentantur, dolor capitis gravativus cum vertigine adest, nec non torpor, quæ omnia restituto muci debito effluxu discutiantur.

§. XXXII.

*Cephal-
dura-
bia.*

Porro solenne est, ut serum acre biliosum redundans, sæpe salutariter admodum per ductus biliarios, glandulas intestinorum & tunicas glandulotas, sub crebris dejectionibus, quæ in senibus ob perspirationem imminuta & copiam feri excrementitii, interdum diutius durare solent, eliminetur. Quæ quando largius & paulo longius succedunt, infirmant quidem; egregium tamen postea commodum afferunt, præsertim si vitæ vitæque exquisita habeatur ratio. Vera enim Celsi de ventris fluxu l. 4. c. 19. est sententia, uno, inquam, die fluere alvum sæpe pro valetudine est, æque enim pluribus, dum febris absit, intra septimum diem id contingat.

Purgatur enim corpus, & quod intus lesurum erat utiliter effunditur. Quando vero hæc salubriter instituta evacuatio imprudenti consilio adstringentibus sistitur, vel nimis calidis balsamicis compescitur, magna excipit virium imbecillitas, inappetentia, & febricula quædam, ipsumque profluvium, licet aliquandiu subsistat, repetit tamen, cum tenebris, borborygmis ac torminibus. Interdum etiam, ut perite Sanctorius meminit, per urinae largius profluvium, quandoque linguæ mentibus, superfluum, & quod naturæ oneri erat eliminatur, dum Sect. 1. aph. 65. scribit: *corpora quoque virorum sana & moderatissimi vitiu mentia singulis mensibus sunt solito ponderosiora, unius scilicet duarumque librarum pondere, & redeunt ad consuetum pondus circa finem mensis ad instar mulierum; sed facta crisi per urinam paullo copiosorem, vel turbidiorum.* Ipse quoque compluries observavi, quod citra causam externam, quibusdam urina effusa prodeat, alvo segnior & perspiratione imminuta.

*Urina
largius
proflu-
vium.*

§. XXXIII.

*At pui.
per inq
solitas
vires.*

Quandoque evenit, ut excretiones succedant insolite & præternaturales feri falli acris per varia loca, ut per ulcera circa malleolum pedis, per glandulas axillares, per scrotum, vel oculorum glandulas, per herpetem & impetiginem in manibus ac pedibus, itatis anni temporibus redeuntem, vel etiam per fonticulos, cum egregio sanant emolumento, quæ si remanent, aut improvide medicamentis, præsertim externis cohibentur, non modo ingens lassitudo, anxietas & inquietudo corpus corripit, sed & sæpe dolores ac ipsi artus ipsasque internas partes, præsertim ista infestant, non sine periculo. Memorat Ricellinus l. med. an. 1696. pag. 133 Ex hæmorrhoidibus hituam animatam, & ultra septimum annum fluentem, postea vero delicatam, in quadam mercatore primam respirationem difficilem & pedum tumorem tum levi exulceratione.

ne, deinceps ardorem ventriculi dorsi-
que cum alvi obstructione & febri,
 tandem lethalem induxisse apople-
xiam. Eandem quoque in rem appri-
me facit exemplum nobilis ejus *Imaus*
 a *Gulden Klee* de aff. capit. cas. 28. me-
 minit. Hic enim quum ab ulcere, quod
 multis annos gellarat, paucos intra dies
 consilio vetulæ liberatus esset, elapso
 mense, incidit in tam vehementes ca-
 pitis dolores, ut de vita desperarent, ac
 paulo post occubatus esset. Horis autem
 matutinis a somno multum viscidæ ac
 flavescentis sordidæque materiæ fre-
 quenti exspuitione citra tussim reje-
 cit, ac conquestus est, se quamdiu je-
 junus esset, eundem fœtorem in ore
 percipere, quam qui ex ulcere pedis
 spirarat.

§. XXXIV.

*Com-
posit.* Quæ quum ita sint, quis jam dubi-
tabit, valetudinis integritatem excre-
tionum successu maxime niti atque
foveri, easdemque licet extraordinari-
æ ac insuetæ sint, si tamen diu cum
sanitatis emolumento successerunt,
non sine periculo suppressi. In quo
quidem maximopere cavendum non
solum ab omnibus animi affectibus,
præsertim terrore ac ira, medica-
mentis contrahentibus ac sopienti-
bus, sed etiam ab intempestivis eva-
cuationibus & sanguinis missionibus,
quibus ex facili evacuationes turbantur,
vel minimum cum discrimine alio
divertuntur. Quod si vero natura im-
perficiendis saluberrimis omnis gene-
ris excretionibus vacillare aut dencere
videatur, medentis est, eas quavis
ratione promovere earundemque suc-
cessum levare, quem in finem egre-
gia sunt utilitatis venæ sectiones, la-
xantia, lenia diaphoretica, curatio-
nes sic dictæ vernaes, & quæ reliquis
fere omnibus hac in re præcipiunt pal-
mam soteriæ aquæ, tam thermæ,
quam acidulæ, vernali & autumnali
tempore prudenter usurpatæ, quibus
non solum gravissimi morbi præcin-
duntur, sed etiam pertinaces atque re-
belles expugnantur ac abiguntur. Sin

autem subito interceptam aut cohibi-
tam esse excretionem quandam conti-
gerit, minime cunctandum est, sed
prompta ope annitendum, quo revoce-
tur, priusquam quod retentum in no-
bilioribus sedem figat, latius noxam
diffundat & difficillem ancipitemque
medicationem faciat.

CAPUT X.

De generatione morborum ex morbis.

§. I.

*Autem
illorum
en pro-
cipuis
morbo-
rum
causis.*
Quum vera & rationalis therapia,
sive medendi morbi scientia,
maxime omnium accurata mor-
borum diagnosi eorumque ex. causis
suis ortus ac incrementi cognitione ni-
tatur, atque etiam a nobis in prioribus
de earum ægritudinum generis actum
sit, quæ a mole & qualitate humorum
perverfa eorumque evacuatione defi-
ciente, vel cohibita, originem tra-
hunt: nunc porro ad earum contem-
plationem accedendum, quæ a solidorum
vitio, virtute ac robore dejecto, si-
ve imbecillitate, quam maxime præce-
dentes morbi relinquunt & ingignunt,
incunabula trahunt; quo sic manifesto
dilucescat, non modo fluidorum, sed &
solidorum vitiosam ac præternaturalem
constitutionem, ad gignendos morbos
magnæ virtutis, eaque propter a perito
Medico, maguopere esse consideran-
dam. Nam quodcumque plenas & ac-
curate consignatas morborum histo-
rias paulo accuratius lustramus, ani-
madvertimus, non robustos, firmos &
valentes, sed maxime eos, qui vel na-
tura imbecilliores sunt, vel ob adver-
sam præcedentem valetudinem tales
redditi, cum morbis consistari & me-
dicam opem poscere, difficulter tamen
sanationem recipere, atque etiam
lummam cum circumspectione pruden-
ter & lenissime esse curandos. Hioc
quanto minus sani & robusti, dicta
ad leges sanitatis-exquisitè compo-
sita, Medico aut medicina egent:
tanto magis certe debiles & imbecilles
eadem.

eadem desiderant: ut adeo verissimum sit sanctissimi Salvatoris edictum: non firmos, sed languidos Medico indigere; et quod, ut recte pridem observavit Celsus lib. 1. cap. 3. omnibus morbis obnoxia est infirmitas.

§. II.

Quæ quum ita sint, haud postremus Medici certe labor eo dirigendus, quo corpora valentia & firma, ab infirmis & minus valentibus, probe distinguere discat. In quo quidem recte perficiendo, tenendum, quod quemadmodum in universa rerum natura omnis vis, virtus & robur ad efficaciam motus referri debet: ita quoque robusta natura corpusque firmum haberi debet illud, ubi efficacia motus, tam in actionibus naturalibus, quam vitalibus & animalibus, vivida sese exserit. Vigent autem animales functiones in iis, qui mente & corpore duos etiam labores ac diuturnas fatigationes sine noxa sustinere possunt, ac vitales & naturales vigent in iis, qui pulsu gaudent magno, pleno ac robusto, bene appetunt, digerunt ac egerunt, & solida habent corporis membra, neque facile animo moventur, aut a causa quadam externa læduntur. Quæ omnia in languidis ac debilibus secus eveniunt, utpote qui, & facile fatigantur, & a levi animi affectu, intemperie aeris, aut vitio in diæta commisso, offenduntur, vel a quadam medicina purgante aut alterante facile moventur aut læduntur, verbo, qui sunt, ut ita loqui liceat, sensibilibus naturæ, perquam facile in morbos incidunt, diu cum iis consistantur ac tardius vigorem pristinum recipiunt.

§. III.

Deinde quoad ipsam naturalem partium solidarum dispositionem & structuram, robore & viribus præ aliis valent, morbisque minus obnoxii sunt, qui majora obtinent vasa, strictiores fibras carneas, robusta ligamenta, nervos & tendines magnos; imbecilliores vero & morbidum merito habentur, qui obesi, laxioris & spon-

Tom. III.

giosioris sunt carnis, tenuia & exigua gerunt sanguinis vasa, exiles nervos tenerasque membranas. Nam sub robore solidorum, quæ fluida impellunt, & canalium amplitudine, longe majori facilitate & promptitudine contenti humores circumaguntur, & secretiones utilissimum ad vitam succorum, & excretiones inutilium, longe melius vigent, quam sub copia ac exiguitate vasorum, fibrarum laxitate & nisu ac renisu languido; & hinc omne id, quod lædit ac morbos efficere aptum est, promptè removetur ac eliminatur, & illibata servatur corporis integritas. Neque male huc referri poterit Hippocratis aphorismus, Sect. 2. 44. quæ perhibet, spongiosos natura & obesos, magis cito mori quam graciles & strictioris habitus.

§. IV.

Jam quum sexus femininus ordinario jussu molli, laxo, tenero & succulento corporis habitu incedat: in proclivi est judicare, eundem longe imbecilliorum, morbis quoque magis afflictum esse, quam virilem nobiliorem, quin, si mentes, qui pro valetudine feminarum sunt, non rite manant, Hippocratis effato, omnem morbum bis pati. Deinde ratione ætatis infantes & senes maxime omnium imbecilles variisque morbis obnoxios esse, difficilius etiam convalescere ac facili succumbere, experientia constat. Nimia enim fibrarum in infantibus est laxitas, adeoque quam maxima ad itagnationes & decubitus humorum proclivitas: in senibus vero magna fibrarum rigiditas, pororum strictura & vasorum capillarum angustia, quo fit, ut utiles succi difficilius secernantur, & inutiles minus sufficienter ejiciantur. Pariter id crebrius observatu in comperto est, firmos & robustos corpore ac animo parentes, valentes ac sanos; imbecilles contra, valetudinarios, senes quoque, & ebrios, debiles, teneros ac morbosos genere infantes. Nam certe præcipue atque difficiles quæ homines affligunt

Et solido-
rum
disposi-
tione
dijudi-
canda.

Ad im-
becilli-
tatem
facile
senes.

Ætati

M 3 Me-

Medicisque plurimum negotii faciunt ægritudines, sunt hæreditariæ, & non tam a fluidorum, quam potius congenitis solidorum vitiis dependent. Inter capitis quidem affectus, maniam, melancholiam, apoplexiam & epilepsiam, inter pectoris morbos, hæmoptysin & phthisin, quoad partes in imo ventre contentas, affectum hypochondriacum spasmodico-flatulentum, renum & vesicæ calculum, anomalum fluxum hæmorrhoidalem, in feminis malum hystericum, & quoad partes externas, dolores rheumaticos & arthricos, in liberos per nativitatem transire, constantis semper & perpetuæ fuit experientia.

§. V.

In primis est illam me hi disturbi præcedenti. Præter hanc, quæ ob sexus, ætatis & nativitatis rationem accedit imbecillitas, sunt adhuc aliæ causæ, quæ corpus sanum antea ac robustum infirmare & solidarum partium virtutem, totum ac robur imminuere, frangere atque prostrernere, corpusque ad graves morbos ingenerandos disponere possunt. Horum in censum, præter diuturnos & graves animi affectus, immoderatas mentis in studiis fatigationes atque meditationes, abusum quoque veneris & bacchi, diætam pravam, assiduas vigilias, & duros labores, maxime omnium referendi morbi, præsertim, si ægrorum culpa longius extrahuntur, vel ob Medicorum errorem perperam tractantur. Ea enim est motuum morbosorum ac inprimis febrium indoles, ut non solum succos vitales absumant atque totam sanguinis & humorum massam vitient, & corruptam ac impuram reddant; sed etiam sulcidis partibus omne robur motusque potentiam subducant, quo ex facili denuo stagnationes, stases & corruptiones conciliantur, morbi que contrahuntur. Inprimis tamen ingens ventriculo & intestinis accidere solet imbecillitas, unde aucta post morbum ciborum appetentia, digestionem autem vacillantem, alvinæ sordes retinentur, cruditas sentina colli-

gitur, quæ si non repetita evacuatione, subjunctis ventriculi tonum roborantibus, tempestive submovetur, nova morborum niñera conflatur, quæ sensim sanitatem subruit, tandemque ipsa mora vel prima data quavis occasione, in graves morbosas afflictiones conspectus transit.

§. VI.

Hæc ut eo testatius pateant, per classes & varias causarum series eundo, morborum ex morbis generationem dilucide evolvam. Et primo quidem loco nihil frequentius evenit, quam quod post enormes, & tantum non incomptibiles hæmorrhagias, e. c. in abortu, puerperio, gravivulneratione, aut etiam post largius menstrui vel hæmorrhoidalis sanguinis profluvium, frigidi sic dicti morbi, ut cachexia, pedum oedemata, anasarca & aliæ funestæ hydropis species, vel etiam atrophia, summus virium languor, febris lenta & hæctica, enascantur aut præcedente morbi longe pertinaciores reddantur. Nimum enim exhausto virum, & fluidi, quod motum ac robur solidis scenerat, fonte, sanguine, ventriculi & canalis qui vitali machinæ alimentum conveniens parat, actio atque digestio non modo minuitur, sed robur, quo solidæ partes gaudent, & quo inutile ejicitur, utile vero intime permiscetur & ad usum servatur, admodum labefactatur, ut non possit non ingens, & creditatum in primis viis, & impurorum succorum in venis, fieri proventus, quem urinae copiosæ, plus minus turbidæ & albæ, luculenter manifestant. Accedit quod ob languidum humorum circuitum & interceptam fordium exclusionem, passim in visceribus stagnationes, obstructions & stases gignantur, & vitales corporis succi inquinentur, eoque pacto, tamen ad longas, quam acutas & periculi plenas afflictiones, via sternatur. Quæ omnia non solum & majora & deteriora fiunt, si animi perturbationes complicantur, vel in diætâ committitur vitium, aut im-

De damnis ex debilitate naturæ factis per hæmorrhagias

impensior corporis refrigeratio contingit, sed etiam eo certius lunellum fortiantur eventum, si medentēs ejusmodi infirmos, validiori & crebriori evacuatione adhuc exercent; aut nimis calidis exagitant.

§. VII.

Et post-
primum
inde fl.

Deinceps ex omnibus, quæ universi corporis firmitudinem atterunt, idque ad morbos suscipiendos præparant, vix quicquam efficacius est, quam puerperium; utpote quod multas varias, easque graves affectiones, non raro inducere observatur. Vidimus post illud spalticas hypochondriorum & diuturnas hystericas passionēs; vidimus multas in melancholiam, hemi-
craniam, abdominis perpetuam flatulentiam, tumorem, cachexiam, delapsas; annotavimus sterilitatem, fluorem album, corporis languorem, cum lento calore, & quæ plura alia sunt. Præterquam enim quod cum sanguine largius ex faucibus valis effluente multum virium effundatur, ipsi graviores partus labores corpus admodum exhauriunt, ejusque partes vigore ac robore privant, quibus accedit, quod ipse uterus perquam facile labem patiatur, ut excluso fœtu, post tam ingentem extensionem; naturali tono non redditus, sanguis per contorta ejus vasa minus expedite trajiciatur, sed passim sublestat universumque corpus inde graviter luet. Et hinc omnia illa, quæ memoravi mala subnascuntur, quæ mirum quantum gravior animi ex affectibus commotio accelerat, frigidus autem potus, improvida corporis refrigeratio, prava victus ratio & valentiora pharmaca pariter advocant, augment & exacerbant.

§. VIII.

En par-
ticulari
debilita-
te per a-
pople-
sia pa-
ralysa.

Neque vero tantum universalis corporis ex morbo debilitas, ad novas & alias concipiendas egritudines aptissima exitit; verum etiam sæpenumero a morbis quibusdam peculiaris & certæ cuiusdam partis imbecillitas, alium morbum invehens, remanet. Atque ut ordiamur a capite, multiplici idem

idem observatione constat, quod dis-
cussa apoplexia, dextri vel sinistri late-
ris paralyticis relinquitur, ubi brachium
& pes, relictante quidem debiliore sen-
su, motu privantur, conjuncta oris tor-
tura & linguæ balbutie. Ratio hujus
effectus & modus quo generatur tam
grave malum in expedito est. Scilicet
in apoplexia meningum vasa a sangui-
ne copiosius eo ruente, admodum ex-
pansa & distenta sunt, ut intercepto e-
jus libero itinere, serosa pars secedat,
in posticam cerebri partem & spinalem
medullæ principium descendat, unde
fluidi quod nervi vehunt influxus sus-
taminatur, & membra subiacentia
pristinam tensionem pristinumque ad-
motum & sensum necessarium vigorem
amittunt. Quinimo quia cerebri
& medullæ oblongatæ fibræ, exuberante
serosi humoris copia ita perfuse, ni-
mium flaccescunt, sit, ut intercidente
earundem debita tensione, apoplecti-
cum insultum ut plurimum stupiditas,
ingens memoriæ debilitas, somnolen-
tia & ad obeundas actiones summus
languor consequatur.

Et fl.
per a-
nim.

§. IX.

Tot e-
pilep-
siam
color
vita.

Epilepsiam cerebrum ac nervos præ-
sertim, opticos mire debilitare, vel
ex eo clarum atque perspicuum sit,
quod hanc ipsam in repentinam cœci-
tatem transtulisse *M. N. C. Dec. 1. An. 3. obs. 161. it. Cent. 1. An. 2. obs. 130.*
fidem faciant. In graviore enim epi-
leptia sanguis cum impetu, ob fortes
spalticas in abdomine stricaturas ad ca-
put urgetur, ubi tardius circumactus
& stagnans, serum dimittit, quod in
anteriora cerebri & nervorum: optico-
rum thalamos delillans, eas obstruendo,
gottam serenam producit. Et quia
in paroxysmis epilepticorum nervi,
qui oculis motum præstant, simul di-
torquentur, oculorum situs interdum
pervertitur, unde strabismus, quem *Se-
gerus in M. N. C. Dec. 1. An. 3. observ. 162.*
in infante ex paroxysmo epilepti-
co le observasse memorat.

§. X.

Manix in melancholiam, ac vicissim
H 4. me-

Post ma-
ad me-
lanchol-
ia q
et q
ur sa.

melancholiæ in maniam, facilem admodum fieri tranlitum, crebra testatur experientia; quandoquidem in utroque affectu meningum vasa viscida sanguinis copia infarcta sunt, cujus in melancholia tardior & difficillior, celerissimus vero in delirio maniaco est progressus, propter auctam meningum stricturâ, sanguinis citatiorem cursum efficien-tem. Quemadmodum vero fortio-rem spasmus semper fere ejusdem partis atonia & flaccidus languor excipit: ita etiam cessantem, quæ in paroxysmo maniaco præstus est, nimiam membranarum & vasorum cerebri coul-ractionem; eorundem relaxatio & debilitas subsequitur, qua postea sanguinis diffi- cillior & tarda per has partes fit pro- gressio; ex qua melancholicorum phan- tasmata sua trahunt incunabula.

§. XI.

Ex fe-
bre acu-
ta ju-
diciu.

Ex febre acuta, caput & nervosum genus occupante, cujus generis solet esse sic dicta Hungarica, quam delirium, vel stupor quidam, aut acerbissima cephalalgia comitatur, sæpenumero surditas, vel minimum difficultas auditus resultat, quæ per totam quandoq; vitam persillit. Non quidem malum alias indicium, sed salutaris criseos notam præbet, si in acutis febribus, circa critica tempora, hebetudo auditus accedit, neque sine ratione. Nam si crisis perfecta est, strictura solidorum, quæ tamdiu quam febris impetus durat, remittit, eoq; facto, pulsus celeritas & durities minuitur, sordium per urinam, alvum & cutistubulos redit evacuatio, & meatus jam magis patuli facti, non tantum tenuem serosum humorem, verum crassiores etiam seculentias dimittunt. Verumtamen quia in acutis capitum infestis febribus, laxato meningum spasmo, fibris remissioribus tactis, sanguis tardius iter conciens serum deponit, quod ad principium nervorum aculicorum descendens, difficilem auditum producit; is neglectus ex facili in perpetuam & immedicabilem surditatem transit. Quippe si caput tum improvide frigori exponitur, vel medentes discuf-

sioni stagnantis humoris per convenientia cephalica & sudorifera minus invigilant, partium cerebri, quæ ad auditus organum pertinent, a subsistente sero fit compressio, corruptio aut magna læsio.

§. XII.

T. 1
hæmo-
pyem-
phim-
li.

A capite, seu suprema corporis regione, ad mediam nempe thoracem, progressum facturi, deprehendimus multos esse pectoris morbos, qui magnam imbecillitatem vastissimo pulmonum visceri inferendo, illud ad varios affectus morbosos disponunt. Nil enim frequentius in praxi observatur, quam ad hæmophthysin, præsertim perperam curatam, pressio pede phthisis insequatur, idque eo magis, quando nimis celeriter exitum affectus sanguis, adstringentibus vel narcoticis vi quali cohibitus fuit. Videlicet quemadmodum veræ omnium hæmorrhagiarum causæ non aliæ sunt, quam sortes spastica vasa simul comprimentes in abdomine aut remotis aliis partibus stricturæ, quibus liber sanguinis circuitus interceptur, ita ut in coarctatis alibi meatibus, in alias partes cum impetu ruat, ibique perumpat: ita pari ratione si ad pulmones ejus appulsus urgetur, eorum vascula, quæ hiant in tracheam, mirum distenduntur & ingens ejus in hanc fit effusio. Quod si igitur neque spasmorum, neque inequalis circuitus ratione habita, adstringenti præpropere dantur, sanguis tenuis ac floridus crassescit, in coagulum abit & effluere nescius, vel putredinem concipit, vel sedens serosus humor tubercula ingenerat, ut vomica vel ingens exulceratio oboritur. Etenim quando ob humoris acrimoniam, vel distendentem nimis ejus copiam minutissimæ pulmonum vesiculæ distrumpuntur, ex pluribus una, vel plures amplæ cavitates resultant, extrema vero valorum capillamenta exesa magis patula redduntur, ut multum succi chylosi in cavernulas influat, qui ob hiantia capillaria, & lymphatica vasa non resorptus, sed stagnans,

gnans, lentorem contrahit, spissescit & turbidus ac glutinosus fieri, ac si longius moram nescit, fetere incipit.

§. XIII.

In pleuritide abscessus Pleuritidem in abscessum vel empyema transire; dudum gravissimum auctor Hippocrates, passim in monumentis suis tradidit, imprimis aph. 8. & 15. Sect. 5. perhibet: pleuritidem in empyema, (quo nomine, ut auctor est Galenus, quamlibet in pus mutationem intignit) degenerare, si purulenta non intra quatuordecim dies excludatur materia, & quando hæc in empiemate non desinit, intra quadraginta dies fluere, phthisin fieri; id quod etiam experientia confirmatur atque expedita ratione nititur. Nam in pleuritide vera haud absimili ratione ac in peripneumonia, ipsius pulmonis exterior substantia, non vero quæ tantum costas succingit membrana, inflammatorio & dolorifico ex sanguinis stasi tumore est affecta. Hæc itaque inflammatio si penitus dissipatur, morbus perfecte sanatur; ac si discuti renuit, in purulentam abit materiam e pectore rejiciendam. Quod si vero intra quatuordecim dierum intervallum nec febris decedit, nec puris excretio sequitur, tunc iusta est suspicio, materiam inbærentem formare vomitum, qua demum rupta, si puris screatu intra quadraginta dies non cessat, phthisis præstolatur; certum quippe tunc est indicium, vomitum ulterius serpere & acre pus totam pulmonum substantiam in exulcerationem trahere, unde, tabes & phthisis.

§. XIV.

Quod æssime Et certe pleuritis longe facilius in empyema cedit, quam quidem peripneumonia, quia recte monente Cassio Auteliano p. m. 420. peripneumonia est tumor in tuto pulmonum corpore, pleuritidis vero tantummodo in ejus parte, vel potius pleuritidis est inflammatio magis superficialis, peripneumonia vero altior & profundior: in hac sanguis magis serosus, in illa cruor

crassus stagnet. Quare sicuti sanguinis chylosi & gelatinosi facilis est in purulentam materiam transitus, ita cruor crassus difficilis in pus mutatur, sed magis in corruptionem vel sphacelum abit, aut vasa obturat: & hinc peripneumonia est morbus valde acutus, qui nisi intra paucos dies discutitur, funesta sphacelatione vel suffocatione perimit. Dignum videtur quod hic interferatur exemplum Mindæ Westphalorum olim a nobis observatum, de viro, qui superata pleuritide incidit in tussim, maciem, febrem, inquietudinem & spirandi angustiam, exactis autem sic duobus mensibus, præter omnem expectationem, pus album & congelatum, sed, minime sortens, ad aliquot libras, trium circiter hebdomadam spatio rejecit, eodemque evacuato, pectoralis balsami & lactis usu, perfecte sanitati redditus est. Neque minus memorabilis est casus in dissertatione de rarissimo succi nutritii ex thorace stillicidio, expositus, ubi pleuritidis tandem in empyema, sinistrum totum pulmonis lobum, teste sectione, consumens, degeneravit, erosus simul & apertis ductus thoracici ramulis, quia succus chylosus, sapore dulcis, aspectu lacteus, odore spirituosus, cujus ego locuples autis testis sum, per multos annos ad aliquot uncias quotidie, ex thoracis apertura, quæ ad empyematis exclusionem acuta fuerat, stillavit.

§. XV.

Causa sæpe Quod vero tam sinistre pleuritidis curatio nonnunquam succedat, in culpa sæpissime est imprudens & præpositio illa medentum methodus, qui in sanguine detrahendo vel nimis parci sunt, vel interdum nimis liberales & effusi. Utrumque malum. Recte enim Verzascha obs. 8. confirmat, ex neglecta venæsectione empyema facillime subsequi, præsertim in spongiosi habitus corporibus. In cujus confirmationem Heurnius comment. super aph. 8. Sect. 5. sequentem affert histo-

Causa pleuritidis si non

Causa sæpe

qui ut

hifloriam: vidi, ait, juvenem triginta annorum succi sanguinisque plenum, qui, cum ruri efferet, humidorum ac in pleuritidem incidit. Tarde huic a Medico parumque sanguinis detractum fuit, dolor perseverabat, decimo quarto in empyema verfum fuit malum, dein ex puratum, tandem cum fada multa expectoraffet ac extabuffet, obiit. Idem tamen evenit & empyema gignitur, quando viciffim nimium sanguinis, per iteratas miffiones evocatur, eo quod his repetitis puris rejectio fupprimitur. Hinc perite *Baltonius lib. 1. epid. pag. 226.* prodidit: *revera graviter ab his peccatur, qui in pleuritide naturam multo detracto sanguine exanimantur.* Et hæc quoque dubio procul cauffa fuit, quare in juvene viginti annorum, in quo decies phlebotomia celebrata, pleuritis in empyema conceffit, telle *Riverio Cent. 1. obs. 79.*

§. XVI.

Porro ingens humorum decubitus ad pectus, in iis præfertim, qui pituita abundat & mali habitus font, diuturnam humidam tuffim cum fpirandi anguftia fufcitatur, qua demum ita læditur pulmonum fubftantia, ut copiofiffima materię purulentę & chylofę contingat rejectio. Tono namque vafculorum & membranarum pulmonalium deffructo, humores ibi cum fanguine congeffi hærent, & acriores redditi, diffendendo & erodendo ingentes cavitates efformant, ad quas perpetuus fuccorum eft affluxus, ftagnatio & extravafatio. Quam vero difficile fit hunc humorum motum, a pectore ad alia loca divertere, pulmonumque deperditum tonum refituere, ii norunt, qui in artis operibus cum folertia verfantur. Non vero folum Medici imprudenti medela, fed etiam ipfi ægrotantes, perverso victus regimine, fæpenumero multum conferunt, ut humida diuturna tuffis, tandem in phthifin, vel etiam afthma & hydropem, concedat. Peffimum enim Præficorum,

mos eft, ut in tuffi, cujuscunque generis, vel originis fuerit, dulcia, in-crassantia, emollientia liberali manu propinent, quibus tam pulmonum, quam ventriculi & inteftinorum robur amiffum plus adhuc deicitur, cui potius convenienti ftomachica & bal-famica medicina erigendo & fupertuis humoribus evacuandis, in curatione unice intenti effe debent.

§. XVII.

Ex fpirandi anguftia atque difficultate, quæ orthopneę, vel afthmatis nomine infignitur tumores oedematosos & hydropes, tam thoracis, quam abdominis, progigni, in praxi fæpe fæpius animadvertitur. Et quo magis afthma urget, ut eft fpafmodicum & convulfivum, eo facilius funeftum thoracis hydropem, vel etiam ipfum afcitern producit: ficut contra lentum & diuturnum afthma, paulatim cachexiam & oedemata pedum conciliat. Qua vero ratione horum affectuum generatio procedat, explicatur non adeo arduum eft, quandoquidem vel ob fpaticam vaforum pulmonalium anguftiam, vel ob meatuum non infrequenter a polypo obftructionem, fanguis ex uno cordis ventriculo ad alterum ægerrime per pulmones traducitur, fed ad cavitatem dextrarum & hinc ad univerfum venarum genus, propter obicem pofitum, regurgitat. Et quia tardiffimus inde fit fanguinis ex venis in arterias tranfgreffus, hinc feroli humores quam facile in venis repletis fece dunt inque porofam maxime inferiorum partium fubftantiam ingrediuntur. Longe vero celerior hæc feri a fanguine feciffio tam in pericardium, per auriculę dextrę poros, quam in thoracis cavum, per aperta vafa lymphatica peragitur, ubi vel polypo vafa pulmonalia infarcta funt; vel convulfivum, longiori temporis fpatio affligens afthma, liberum fanguinis iter per pulmones intercipit; quippe tunc feri per meatus patulos in cavitates expreffio urgetur ac promovetur.

§. XVIII.

Ex hoc
gignitur.

Ex a-
fthmate
tumores
ac hy-
dropes.

Ex hu-
morum
decubitu
ad
pectus
tuffis
dyfpnoea
& p-
thifis
gignitur.

M. l. m.
hypo-
stas-
dia-
um.

§. XVIII.

Nunc a media corporis regione ad infimam descendendum est, ubi eos morbos, qui ex visceribus abdominis a præcedenti morbo debilitatis, prodeunt, spectabimus. Ex iis vero, qui in ventriculo ac intestinis sedem suam atque domicilium habent, vix ullus frequentior est, quam spastico-flatulentus, multis & variis pathematibus conspicuus, quem nostro ævo mali hypochondriaci, vel hysterici, si feminas affligat, nomine efferre solent. Nam quando universus, a faucibus usque ad anum elongatus nervo-membranaceus exquisitissimæ sensationis canalis, a morbo præcedente læsus fuerit, adeo ut ejus tonus ac morus peristalticus destructus, vel crassa villosa, quæ colatorii munere fungitur, obstructa, aut glandulæ, quæ solventem & fermentalem succum præbent, obliptatæ fuerint, aut bilis quæ chymi correctorium & optima veluti medicina est, intemperata evaserit: nihil aliud efficitur, quam ut abolita digestionem & secum debita expulsionem, multi humores crudi, viscidum, corrosivi ibi consistentes, nervosas partes exagitando, spasmos, convulsiones & status proferant. Quæ cuncta ob consensum generis nervoli, anxietates, dolores, inquietudines maximasque molestias in capite, thorace, hypochondriis & abdomine creant. Jam vero diligenti & attenta observatione practica constat, hypochondriacum hunc morbum non frequentius ingenerari, quam ab intermittentibus, præsertim tertianis, male curatis. Nam si ante correctionem vel evacuationem materiæ, quæ febrilis commotionis causa est, paroxyismi variis artificiiis constrictorii nimis propere reprimuntur, ea in visceribus & ductibus excretoriis remanet, & ex mora deterior facta, alias periculosiores stricturas & meatuum obliptiones, cum offensione ventriculi & intestinorum efficit: idque eo magis, si diætæ vitium aut intempe-

si in-
termitt-
entibus
male cu-
ratis.

rantia affectuum, quibus in passionibus spasmodicis concitandis nihil potentius est, accedat. Intermittentes enim febres quum fomitem & minueram suam in ductibus biliariis, pancreaticis atque etiam ventriculi ac intestinorum valvulis, plicis atque flexuris habeant, in exquisitè sentiente hoc canali suam potentiam, quæ vix ullis aliis quam spasticis tensionibus absolvitur, exerunt.

§. XIX.

Simili ratione diarrhææ & dysenteria: neglectæ, vel perperam tractatæ, immedicabilem sæpe in intestinis erosionem ac læsionem relinquant. Nam quid frequentius est, quam quod ab intermptivè adstringentium in hisce morbis usu, vel ita periclitetur, vel diuturna fere insanabilis tabescentia, lenta febris, cachexia, vel spasticus hypochondriacus remaneat morbus, qui mala diætæ & inordinatis animi affectibus multo pertinacior fit & ingravescit. Laborabat ante annum honestissima femina post male curatam dysenteriam acerbè & graviter variis symptomatibus, inappetentia, macie, phlogosi, atroci dorsii, lumborum & abdominis rosione, cum ingenti anxietate & alvi segnitie, quam nonnunquam copiosissima dejectio sequatur, hisque malis ultra sex menses eadem cruciatur, tandem, divina aspirante gratia, antispasmodicis, roborantibus & leniter evacuantibus a me curata perfectæ sanitatè jam fruitor.

Ex alio
si in-
stas-
um.

§. XX.

Deinceps ex intermittentibus diuturnior quartana, plerumque infimi ventris viscera, ut hepar, lienem & pancreas, adeo lædere solet, ut funestus hydrops subsequatur: siquidem hæc febres altius ut plurimum fomitem suam in viscerum tono destructo, eorumque a sanguine crasso infarctu, repositam habent, unde etiam magnam prudentiam, & sufficiens quoque tempus ad sanandum, desiderant. Nisi enim obliptio illa viscerum expedia-

Ex quod
si in-
stas-
um.

pediatur & sanguini ac humoribus per vasa abdominis venosa liber circulus reilituatur, supervacanea, vel plane noxia, omnis febrilem impetum sistens medicina est. Tum quoque nihil est inconsultius, quam posthabita sanguinis missione, vel viscerum obstruclorum refectione, aut alvi subductione, specificis sic dictis, ex quorum numero sunt cortex chinæ, fraxini, radix tormentillæ, plantaginis, alumen & vitriolacea, motus febriles reprimere. Hæc enim incrassando & coagulando humores, infarctum & indurationem viscerum adaugent, quo fit, ut ibi, intercepto sanguinis cursu, serum in vasa lymphatica magna copia secedat, unde in hydatides abeunt, quæ postea disrumpunt, serum in abdominis cavum funesto effectû effundunt.

§. XXI.

*Quod testimo-
nium est
firmatum* Optime hunc generationis hydro-
pis modum, jam olim Galenus in e. 7.
aph. 55. & l. 4. aph. 11. tradidit dum in-
quit: si aliquando contingit, hydatides,
sive vesicæ hepatis aqua plenas dis-
rumpi, effunditur aqua ad locum
membranz abdominis interioris, epi-
gastrio respondentem, in quo etiam
hydropicorum aqua congregatur. Idem
gravissimus auctor Lib. 3. in loc. affecti.
Cap. 3. de hydrope, quartanis male
curatis succedente, conqueritur, dum
ait: quartana male curata hydropem
accedere crebro vidimus, præsertim si
ægroto in vitio aberraverit & intem-
pestivo frigido potu caloris levamen
quaesiverit, quo humores incrassantur,
obstructiones & scirrhus in hepate ac
liene pariuntur, & tum præcipue, si
dejecti in paroxysmo particulari, calo-
ris putridi exhalationem externo quesito
frigore cohibuerint: qui impulsus,
utrumque hypochondriorum viscus ad-
urit & indurât. Et Joh. Langius in
epist. 48. pag. 175. & epist. 39. pag. 142.
hunc in modum disserit: nisi in febris
putridi humoris copiam ademeris,
tum non modo tantam crudi humoris co-
piam calor naturalis concoquere non po-

terit, sed præcipue in statu & morbi
declinatione resoluta per calorem febrilem
& sudorem subtili humorum sub-
stantia, sæculentior pars (Germ. der
Fieber Kuche) derelicta fungosam ac
raram epatis ac lienis substantiam ita
infarciet & obstruet, ut tandem, utro-
que viscere, vel altero scirrhis obfesso
& indurato, hydrops aut crurum æde-
ma febrem excipiat. Quod tum maxi-
me accidet, si alterantibus frigidis
citra evacuationem lenitivam aut eva-
cuativam usus fueris, quæ materiam
plus ingrossant, quam resolvunt. Qua-
re, ne in febris interpalatis nimis
diu frigido potu utaris diligenter caveo.

§. XXII.

Præterea renes a præcedente morbo
debilitati, tono eorum destructo, non
modo facile inflammantur, exulce-
rantur, sed & ad calculorum genera-
tionem proni ac dispositi evadunt.
Evenit id maxime in plethoricis, vel
quibus redundans sanguis per uterum
aut ani venas non expurgatur, vel
vacuari cessat, hinc ipse, circa vasa
in lumbis stagnans, gravativum ibi
dolorem æstumque efficit, quem do-
lorem, si imprudenter Medici calculo
adscribunt & calidiora, quæ urinam
movent & calculos pellunt, propi-
nant, gravia dicta renum vitia pleno
securantur alveo. Nam renalium glandularum & vasculorum tono, ob
niam distensionem, destructo, tar-
dius procedit urinalis laticis secretio
& descensio ad vesicam, ut in syphun-
culis urinaris stagnans, tartarum;
qui calculi est materia, sponte depo-
nat. Deterior adhuc res est, si in flam-
matio, & ex hac apostema, aut ul-
cus, generetur. Quam optime au-
tem hi renum morbi arcentur matura
sanguinis missione, quam etiam Ri-
verius Cent. 2. Obs. 15. item Grudin-
gius in praxi Tr. de calculo p. 16. ad
hunc scopum obtinendum magni faci-
unt. Et hæc quoque est ratio, quare
hæmorrhoides supervenientes ne-
phriticis, ceu salutiliter remedium
summo opere Hippocrates aph. 2. Lib. 6.
dilatau-

Et re-
num de-
bilitate
inflam-
matio
calcu-
lus, ul-
cus &c.

dilatant. Hoc itaque naturæ consilium in avertendis his morbis Medici merito imitari debent, & vel hæmorrhoides ad fluxum perducere; vel pedum venas aperire.

§. XXIII.

At si calculus durius & firmitus principio uretheris impactus hæret, nec ex sede hac dimovetur: nervosas has partes perpetuo vellicando, ingentem in ventriculo nauseam & ad vomitionem suscitavit irrationem, adeo, ut si quando nec natura, nec ulla arte peregrinus hic hospes cedere velit, perpetua ventriculi subversio, cum anxietate, inappetentia, macie & tandem mors subsequantur: quale triste exemplum non ita pridem in præclaro hujus urbis Medico conspeximus. Nam magnum & arctius est renibus cum ventriculo consortium, hinc *Langius in Epist. 45. pag. 168.* scribit: *plures calculo renali affectos plusquam annuo ciborum fastidio tabescere vidi, nec unquam esurisse, in quorum cura alii Medici ventriculi imbecillitatem, alii venarum mesenterii & hepatis vel splenis obstructions inveniebant.* Spasmus quoque a calculo suscitatus, usque ad ventriculum, & sæpe etiam ad duodenum propagatus, molesta constrictione hujus peritælicum motum validissime invertit, unde patet etiam ratio, quare calculosi facile fiant icterici. Neque præterendum est, quod crebra ex calculo afflictio ita ventriculi atque intestinorum tonum ac robur imminuere ac labefactare possit, ut colica tormina & flatuum proventus calculi obnoxios levi data occasione vel causa graviter exerceant. Ex renali vero calculo, si quando in vesicam prolapsus, ob magnitudinem non foras ejicitur, continua tartari urinæ accretione, calculum vesicalem generari, extra dubitationem est. Igitur peritæ est Medici, calculum, qui ex renibus in vesicam descendit, quantum fieri potest comminui, ejusque exclusionem per urethram omni modo promovere.

re, cui scopo obtinendo diuretica utique proficiunt.

§. XXIV.

Ex utero quoque male antea affecto plures prodire novos morbos ac vitia, longa experientia ac usu compertum perspectumque est. Observamus id maxime post abortum vel partum, quem varia mala, quibus virgines non obnoxie sunt, insequi solent. Quid enim frequentius visitur, quam post puerperium, vel abortum, enormia sanguinis velleri visceri albi fieri profluvia, & abortus, nulla etiam comparente causa, de novo facile contingere, unde in mentem mihi redit aurea illa nunquam satis laudandi senis *Lib. 5. aph. 45.* sententia: *quæcumque, corpore bene constituto, bimestres atque etiam trimestres abortiunt, nulla incidente abortionis causa, his sane cotyledones, i. e. venarum ac arteriarum officina, plena mucoris sunt, & non possunt expandere satum, sed disrumpuntur.* Causa tam frequentis abortionis sine ulla externa occasione nulla alia est, quam intermissa sanguinis detractio, vel alvi ductio neglecta. Hinc ante gravidationem, vel etiam commodis mensibus, purgatio ex lenioribus, quæ veteres ob eximium usum benedicta vocarunt, vel temperate aloeticis ballamicis pilulis, instituat. *Mitron* inquit, *Heurnius in Comm. ad hunc aphorismum, quædam sapiens abortierat & pueritosa natura erat, cum vero medicamentum (puti) laxantissimum usum iniecit, feliciter gestationem perfecit.* Spadeo igitur cum *Platero in Obs. lib. 1. pag. 86.* ut puerperæ post partum bene purgentur, ne graves hiant morbi: Neque tantum purgandum est, sed etiam convenienti diæta vitæque regimine & aliis internis & externis roborantibus pristinus utero tonus reparandus: quo salvo ac vigente, & mensium fluxus recte & ordine procedit, quo destructo, inordinati sunt menses, & inde universa corporis & copiosa detrimentum patitur.

§. XXV.

Ex utero
vel quædam
abortus
abruptus
&c.

Et calculi
vel
muri.

Uterus.

Calculus.

Et vesicæ
calculi.

Ex go-
norria
molesta
vata in-
bona
C.

§. XXV.

Ad partes quod attinet genitales & hæc facile vitium contrahunt ab antecedente morbo, quod ad nova mala suscitanda idoneum est. Animadvertimus id frequentius in gonorrhea, cui, siue malignæ, siue benignæ, si nimis cito adstringentibus cohibetur, multa ac varia mala superveniunt. Ex intempestivo enim constringentium usu, tam lacunæ glandulosæ urethræ, quam glandulæ, quæ prostatæ appellantur, & genuinam gonorrhæam sedem constituunt, facile indurantur, exeduntur atque exulcerantur, hinc continuo lætida sanies profluit & insanabile laticis ex urethra fit profluvium. Et quia hæc subtilis acridinis materia conterminas partes vesicæ, nempe sphincterem, non raro simul afficit, unde successive ejus fit erosio, quæ agre consolidata, perpetuam sere ischuriam & dolorificam stranguriam evasatur.

§. XXVI.

Epilepsia
gravis
quædam

Neque postremo loco præmittendum est, quod dolores, si atrociores fuerint & diu perseveraverint, universum nervorum genus adeo debilitent & tono suo partes sensui & motui dicatas exuant, ut paralytici, vel alii nervorum affectus, etiam epilepsiæ, inde propullulent; cujus rei clarissimum documentum edit gravis intestinorum dolor, qui colica communiter convulsiva vocatur, cui non raro paresis succedit, quemadmodum id per experientiam uberius constat & multi auctores observationibus idem confirmant. Inprimis egregius hanc in rem exstat locus in Paulo Ægineta lib. 3. pag. 251. Colica, ait, affectio pestiferæ cujusdam luis modo est grassata, ex qua plerique in morbum comitalem, alii in artuum resolutionem, sensu incolumi, nonnulli in utrumque sunt prolapsi, ac eorum qui in comitalem morbum inciderunt, plures interiere, ex iis vero, qui in resolutionem, plures evaserunt. Sequitur autem gravem coli dolorem resolutio paralyti-

ca, quia ordinario post-natiuitatis partium spasticam contractionem, postea atonia & debilitas excipere solet, ad quam promovendam multum valent opiata, quæ ad infringendos dolores, larga & repetita sæpius dosi, Prædici propinare consueverunt, quum periti Medici horum usum serio & sedulo dissuadeant, & præsertim Baglivus in praxi med. lib. 1. §. 1. de colica appoluita ita scribat: nihil familiarius colica supervenit, quam paralysis, cave igitur ne opiata copiosius in ea exhibeas, solet enim post opiata magnus sudor supervenire, & exinde paralysis. Hanc ob causam quoque Raygerus Obs. 50. in crudeli intelligentium dolore pilulas Wildegansii rejicit, quia facile in somno sudor & paresis succedit. Epilepsiæ sunt, quando ob vehementem intestinorum spasmus & vasorum contractionem, sanguis urgetur ad caput, & spasmus quoque ad meninges penetrat, hinc Thonnerus Cent. 2. Obs. 3. idemdem post colicam notavit epilepsiam, & quod omnia, duplicata conspecta fuerint: humore crystallino quasi e sede sua dimoto. Colicis vero & calculosis, vel etiam tertianis, quod facile ictus superveniant, ratio est, quia spasmus in his morbis ad duodenum & vasa biliaria pertingens, ea valius constringit, ut bilis liber ad intestina descensus amplius fieri nequeat, sed ipsa per vasa lymphatica reorpta & sanguini insinuatæ, scdum calorem inducat.

Epilepsia

ictus

§. XXVII:

Vidimus hæcenus morborum alii supervenientium primordia atque origines, quæ potissimum destructo partium quibus insedit morbus tono, debentur. Jam propositum est breviter stricimque ea considerare vitia, quæ ex morborum reliquiis proveniunt. Primum vero placet hæc in rem divinum nostrum senem audire, qui aphor. 32. Sect. 4. hunc in modum scribit: quibus a morbo restitutus quippiam est infirmum, ibi abscessus fiunt. Quem

De mor-
bi cu-
prie
religio-
restitutio-
nis

Quem aphorismum *Hearnius* optime sic explicat: quando post morbum infirmitatis aliquid superest, quæ ex lassitudine & imperfecta crisi judicatur, ita ut supersint materia febrilis reliqua, aut, si liberalius se potu & cibo insurgent, quam immutata ventriculi actio, temperamentum & habitus perferre possunt: tunc in discrimen venit homo, quia partes internæ & externæ labefactæ sunt, hinc, si non accurata diæta accesserit, hepatis & lienis scirrhi, vel cephalæ, vel foras in artus, si ibi imbecillitas, abscessus effunduntur. Quare, ne quid eo accrevetur, dentur pilulæ aliophantigine, mastichina, vel Rusi, vel tale quid. Spectat huc quoque aphor. 12. Sect. 2. morborum reliqua, quæ a crisi supersunt, reciduos morbos parere consueverunt. Fit hoc maxime, quando ob fractam naturæ virtutem, sicut rursus bene id explicat *Hearnius*, materia morbifica non tota fuerit exclusa, neque in declinatione alvus purgante sollicitata. Notæ vero inquit, reliquiarum morbi sunt oris siccitas, inappetentia, ægrypnia, languor. Quare recte concludit idem auctor: plerumque jubemus, ne fiant recidivi, ut quinto vel sextodie, cum jam convalescunt, assumant tres vel quatuor pilulas de hiera cum agarico, vel mastichinas, vel Symplicium laxativum, aut pilulas Rusi, vel aliquid rhabarbati, aut passularum purgantium.

§. XXVIII.

Profecto cedro digna sunt hæc saluberrima monita, quæ inculcant, ut quiescent nunc morbo, omne, quod adhuc noxium & morbificum est, sive in ventriculo, sive in venis subliterit, excludatur, & corpus ab omni perniciali & excrementitio succo, eo quod hic facile pabulum ac fomentum recidivæ subministrare, vel novum morbum inducere potest. At vero in hoc & graviter & communiter Medici peccant, quod in fine morbi ægris convalescentibus ac morbo spasmo remittente, noxias reliquias, neque

evacuantibus, neque sudoriferis, educant, neque robori naturæ atque ventriculi per congruam diætam & proba stomachica debite succurrant. Nam, quo languidius medentis auxilium est in impetu & statu morbi, eo certius & efficacius in ejus principio atque in declinatione; & quidem ineunte morbo, ut natura adhuc valente obstacula removeat & materiam quæ in vitio est exturbet. Verum quippe est *Hippocratis* effatum; aph. 29. Sect. 2. ita differrentis: quum morbi inchoant; si quid videtur movendum, move; quum vero consistunt ac vigent, melius est quietem habere. Sub declinatione vero ejus opera necessaria est, quæ corpus debilitatum rursus confirmet, vires fractas erigat, quod restat adhuc noxium expellat & hac ratione novi morbi, plerumque deterioris generationem impediat.

§. XXIX.

Si vero ullo in morbo, certè in variolis & morbillis, reliquæ morborum ut expellantur necessarium est, quod si non perficitur, gravissima symptomata & morbi succrescunt. In primis etiam per experientiam conflat, lympham peccantem, acriorem, in variolis & morbillis, nervis pneumonicis maxime esse molestant, teste tussi, quæ indivulsus utrorumque plerumque est comes & morbillis sigillatim lubinde catarrhum excipere suffocativum: Relinquitur enim in hoc viscere, fracto morbi impetu, magna aronia, ob quam coarctati viscerum humores ibi hærent, & suffocationem, nisi cita ope succurramus, inferunt. Porro quemadmodum in his morbis lymphæ universi corporis, veluti fermento quodam maligno, inquinata, corrupta, vappescens & corrosiva redditur, ita multo magis id accidit, si dissipata per antecedentem æritum sulphurea & balsamica sanguinis portione, fermenti virulenti portio resistat, quæ tam acrem ac corrosivum reddere potest lymphaticum laticem, ut non modo in externis

De dematit ex variolæ & morbillis reliquis.

Quæ præterea sub morbo.

nisetiam ossis partibus, sed & in visceribus, præsertim pulmonibus, ingentes erosiones, exulcerationes, vel etiam apostema fiant. Recte hinc ac perite *Derebecque obs. 104.* perhibet: *quotquot variolis siccatis non purgati fuerunt infantes in graves morbos inciderunt, hydropem, tabem, scabiem, phthisin, cæcitatem, ossium cariem & alios innumeros.*

§. XXX.

Testi-
monia.

Uterius certe hanc ex variolarum maxime reliquiis noxam testantur Medicorum observationes, quarum ut nonnullas adducamus laud abs re erit. Sic *Hildanus Cent. 6. obs. 82.* post variolas non exacte curatas cornuæ erosionem, tubercula & apostemata circa juncturas vidit. Catarrhos suffocativos & aphoniam notavit *Albrecht in Misc. nat. curios. Dec. 3. A. 3. obs. 126.* memorans: quosdam post variolas, indolentibus tumoribus, qui postea in abscessus fistulosos ipsi ossium compagi haud parentes, mutati sunt, in tibiis & brachiis affectos esse, & scite addit: *hec sateri cogor, vix is, qui reliquias morbi purgantibus, præsertim mercurialibus, sedulo euerrebant, vel eorum virus aliis idoneis præsidii destruebant, tale quid obvisisse.* Paviter quanta corrosio lymphæ, post variolarum morbum non bene curatum, sit, variz observationes docent, de quibus *M. N. C. Dec. 3. A. 4. obs. 1.* consulantur. Vidi, scribit *Frankius, qui per variolas in usum feriam, in tabem hecticam & phthisin inciderunt, vidi qui in opthalmias, cæcitatem, varia ulcera, scabiem malignam & abscessus inciderunt.* In filio *Bregensi, post variolas, pydarthrocace in manibus, pedibus & spina dorsi actandem mors.* Et horrenda ulcera post variolas emergentia *Tulpius cap. 52. & 54.* quam optime describit. Ulcera mala, pus acerrimum fundentia, notata quoque sunt a *Collectoribus Actorum Uratistav. anno 1700. p. 6.* Phthisica quoque ulcera & apostemata, post variolas relicta,

& nos in praxi annotavimus, & tristissimo exemplo & casu *Serenissimi Saxonie Principis*, ante aliquot annos hic placide defuncti, id confirmatum habemus: ubi in thorace aperto integer pulmonis lobus, vasorum ramificationibus relictis, penitus corruptus & consumtus, lætidissimo & copiosissimo pure in thoracis cavitatem effuso, visus fuit. Quin in virgine nobili, quæ, sine evacuatione, post variolas nimis cito corpus frigidum aeri exposuerat, omnium partium contracturam, eamque insanabilem, confeximus.

§. XXXI.

Deinceps, vix unquam tam utiles ac necessariae primarum sic dictarum viarum evacuationes sunt, quam in puerperis. Nam non modo tempore gravidationis, sed & in ipso puerperio, magna colluvies impurorum humorum colligitur, quos nisi cito & clementer subtrahas, complura mala non sine periculo inde nascuntur. Pessima itaque & detestabilis nostris temporibus opinio invaluit, puerperas, præsertim primis septimanis, plane non esse purgandas, sed ab omni evacuatione abstinendum. Verum magna damna hinc subinde experiuntur, nam exanthema illud, quod purpura vocatur, & in nostris regionibus puerperis familiarissimum est, vix ulli alii causæ, quam neglectæ primarum viarum repurgationi & lochiorum defectui, adscribi debet. Nam impuri ex venis affluentes ad intestina humores biliosi & salivales diuturna mora putrescunt, qui rursus delati ad sanguinis massam, exanthemata purpurea hæc, vel quandoque erysipellacea, efficiunt. Ad quæ præcavenda, nihil consultius est, quam altero vel tertio a puerperio die, posteaquam omnia rursus sedata sunt, balsamicas pilulas singulis tribus diebus exhibere, qua methodo non modo lochiorum fluxus promovetur, sed & a purpura aliisque graviorebus damnis puerperas immunes persistere, indubitata & cre-

En non
lectio
pau-
perar-
purg-
tione
purpu-
ra.

creberrima experientia confirmati sumus.

§. XXXII.

Nix non
omissa
in ac-
tis par-
tibus.

Eiusdem exanthematis purpuracei malum, in nostris oris, compluribus acutis morbis, ut variolis & morbillis, febribus continuis, etiam malignis, in declinatione, non sine summo vitæ discrimine, sæpius supervenire solet. Rationem vero nullam aliam invenio, quam quod pessima opinio apud nonnullos Medicos usque eo regnavit, alvi subductionem dictis in morbis periculi esse plenissimam, unde per quinque vel sex dies & ultra, ægrotantes sine hac relinquunt, quod non potest non pessime cedere. Nam perpetuus quum sit succorum in morbo corpore ad intestina affluxus, non potest aliter fieri, quam ut, si non excludantur, more & æstu plane alienam & malignam naturam induant. Hinc aliorum morborum fomitem præbent, eoque magis, ubi sudorifera calida adhibentur, quæ exagitatione putredinem humorum auctam intimius corporis penetralibus insinuant. Quare saluberrimum consilium est, alvum nunquam diu adstrictam retinere, sed enematis vel blandis vacuantibus eam liberam servare. Recte enim *Riverius in praxi med. Lib. 17. Cap. 1. de variolis præcipit*: enemata, non solum in morbi principio, sed etiam toto morbi decursu usurpanda esse, si alvus sponte non fluat, idque singulis vel alternis diebus; & hoc præclarum præceptum merito in omni febrium curatione locum invenit ac servandum est.

§. XXXIII.

De re-
sistendi
morbis.

Quemadmodum itaque ex reliquis superati morbi & debilitate ab eodem solidis induita, novæ passim succrescunt morbose passionis: ita frequentius quoque accidit, ut morbus jam sanatus recidivet ac denuo repetat, quando videlicet prior pariter non perfecte a natura judicatus vel curatus fuit, neque materia morbifica, Medici aut ægrotantis culpa, pe-

Tom. III.

nitus educta, vel nova mox ingenerita. Nam quicumque morbus subito sine ratione & bonis signis discessit, is plerumque revertitur; ita tamen, ut quo citius redeat, vel quo vires debiliores sint, eo plus periculi alat, eo quod natura a primo morbo fatigata, secundum vix sustinere possit. Hæc autem morbi reversuri sunt indicia, si convalescens manet imbecillis, nec cibum appetit, nec rite concoquit, sed multa nausea & ructu nidoroso vel acido afficitur, si spiritus male olet, præcordia inflata sunt & facies livida, si interior cum siti percipitur æstus, quippe quæ depravatam ventriculi coctionem arguunt, quæ præterente morbus adhuc vel intus delitescit, vel nova ad eundem resuscitandum colligitur minera. Interim tamen minori discrimine stipatur recidiva, quæ ex mala victus ratione post morbum, quam quæ ex relicto vitio excluditur.

§. XXXIV.

Inprimis autem facillime febres intermittentes redeunt, tum maxime quando febriles motus, antequam materia quæ in vitio est, penitus correpta & educta, nimis cito adstringentibus supprimuntur, quandoquidem hoc factum, ex facili in disposito adhuc ad spasmodicas commotiones nervorum ac fibrarum genere, denuo stricturæ & motus pristini recrudescunt. Nihil vero ad inducendam febrem recidivam tam promptum paratumque esse observatur, quam si superata illa, quis ventis borealibus corpus obicit, aut in loca frigida humida, subterranea, aut templorum concamerationes concedit, quo illico horror, dolor dorsi, languor ipsaque febris contrahitur. Forte quoque purgans quam facile, si reliquæ febriles adhuc in penetralibus corporis latitant, febris reditum proritare potest, nullam aliam ob causam, quam quod subtile illud acre virus redolens eorum principium spasticas in genere nervoso provocet constrictiones. Acutæ etiam, præsertim

Febris
intermittens
etiam.

et alia
causæ.

I in.

inflammatorias febres, sæpius magnocum vitæ discrimine redire, experientia constat, id quod facile accidit, si convalescentes nimis cito ante primarum viarum repurgationem iusculis nutrientibus, ex carnibus & ovis, nimis se replent, aut liberalius vinum ingurgitant, vel gravioribus animi affectibus indulgent.

§. XXXV.

*Capitis
morbo-
rum.*

Vix quoque ullus tam facile repetit morbus quam gravior capitis, ut apoplexia, paralytis, epilepsia, hæmicrania & insania, eo quod hi morbi in parte affecta ingentem imbecillitatem & pravam dispositionem relinquunt, quæ accedente animi affectu, immoderata refrigeratione, admissa ebrietate, vel gravi alio in dicta vitio, eundem subito ciet ac de novo concipit morbum. Pariter observavi abscessus pulmonum, hydropem abdominis & pectoris, nec non colicam, eos, qui vix ab iisdem liberati, vitæ victulque ratione minus valetudinem curarunt, denuo corripuisse. Longe frequentius & crebrius renum calculus, podagra & arthritis resultant, ob maximam, quam partibus quibus incumbunt quosque dolorum atrociam desolant, inducunt laxitatem ac debilitatem, ita prorsus, ut qui semel iisdem affectibus, sæpius eorum insultus experiatur, ac rarius vel plane non, ab iisdem penitus liberetur. Haud postrema itaque Medici cura eo dirigenda, qua abactio morbo, ejusdem recidivam avertat, eumque in finem cum valetudine in gratiam redeuntibus exactas leges ac regulas dieteticas præscribat, has ut observent serio inculcet, & congruis laxantibus ac roborantibus, aut etiam decenti sanguinis missione, imminens periculum prudenter arceat atque præscindat.

*calicis
Gr.*

*caliculi
arthritis
stidit.*

CAPUT XI.

De rationali pulsuum explicatione & iudicio in morbis recte ex iisdem formando.

§. I.

IN superioribus potius fundamenta & capita veræ & rationalis pathologiæ, quæ resolvendis morborum historis apprimè inserviunt, conciscere quidem, sed satis solide ut arbitror, tradidi: nunc ad doctrinam a Veteribus maximi semper habitam & celebratam veniam, quæ ad penitiorem morborum diagnolin & ipsam quoque prognolin necessaria, ad certitudinem artis, exilimationem & famam apud doctos & vulgus Medico conciliandam, maximum utique confero momentum. Utur vero inter Veteres antiquissimum nostræ artis parens *Hippocrates*, in hac Medicinæ parte admodum diffusus & operosus fuerit, ut plures etiam de prædictionibus, prænotionibus & prognosticis libros conscripserit; nihilominus tamen permulta, ut ingenue fatear, in iis comprehenduntur, quæ in nostris præcipuæ regionibus, usu & applicatione carent. Nam regulæ istæ & aphorismi prognostici magna ex parte particulares sunt, ad certos casus & peculiare circumstantias, quæ tamen deficiunt & non adjectæ, restricti, tantum abest, ut perpetuæ sint observationis & applicationis. Quumque in diagnosticis & prognosticis vix ulla sit excellentior magisque necessaria doctrina de pulsibus; mirandum certe est, in *Hippocratis* monumentis nullam vel plane exiguam ejus reperiri mentionem, quum tamen in disquisitione de urinis, plus quam par sit, & usus exigar, diffusus sit, atque occupatus. Quam breviter vero & concise ipse *Hippocrates*, tam late & prolixè *Galenus* de pulsibus sermonem fecit, quippe qui innumerales fere pulsuum fixit differentias, quæ

*Petres
minus
rectis
pulsu
dicit. i.
nam
tradidit.*

quæ nec menti concipi possunt, nec re ipsa, ut recte animadvertit *Montanus*, observantur. Hunc postea, ceu ducem, cæco studio plures ejus affectus sequuti sunt, & fideliter tam numerosas, confusas, vix explicabiles & conceptibiles pulsuum species in scripta sua transulerunt, quæ nonnisi ad ingentem tironum Medicinæ confusionem facere possunt.

§. II.

Veteribus quidem facile condonandum, quod in pulsuum dignotione & evolventa eorundem natura atque origine, tot hallucinationes admiserint, eo quod sanguinis circuitum, veram & genuinam pulsuum causam ignorarunt; quo utique factum est, ut verum usum pulsuum, nec in diagnosi, nec prognosi, tam in statu sano, quam præternaturali, cognoscendo, recte intellexerint. Recentioribus vero, qui nobilissimum hoc inventum norunt, merito vitio vertendum, quod multi adhuc eadem chorda oberrent, & ex tanta a Veteribus conficta pulsuum multitudine & multifaria denominatione, veluti ex labyrintho, cum certa ratione sese extricare nequeant. Si causam quærimus, hæc præcipue subest: quod plerique hanc de pulsibus doctrinam non ad mechanicam scientiam, sive regulas motuum, ad quam tamen proprie spectat, examinauerint. In quo quidem doctrinæ genere *Bellino* melius versatus est nemo, quem si inspersissent, quibus mechanica foderent, perspicuum sane conceptum de arteriarum & sanguinis per eas motu adepti essent; sed qui præjudiciis occæcati sunt, nunquam volunt discere, quæ nunquam didicerunt.

§. III.

Quod vero magis adhuc mirandum adeo quidam in luce caligant, ut dubitent, num in arteriis systole, sive motus contractorius succedat, cujus beneficio sanguis ex ipsis in venas, & ex his versus cor refluxus propellatur?

Sed quis putarit, hos ipsos ignorare, motum tonicum, de quo tam frequens ipsis sermo est, in reciproco motu constrictionis & relaxationis consistere, & hunc non tantum musculis & fibris, sed maxime omnium canalibus, qui ex tunicis nervosis & fibrosis elasticis conflati sunt, omnibus esse proprium, adeo, ut nullum quod fluidum velit in corpore animali vas hoc ipso sit destitutum. Deinceps nostri utique scire debuissent, quod horum simplicissimorum motuum vere vitalium ea sit natura ac indoles, ut unus semper alterum sequatur, atque proritet ita quidem, ut systole fulcitet diastolen, & diastole rursus systolen, unde motus, exurgit perpetuus, & cor in machina animali recte dicitur perpetuum mobile, quod argumentum latius in tom. 1. *medicinæ rationalis systematicæ* deduximus & illustravimus. Tum apud omnes in confesso est, pulsus, qui tactu in arteriis percipitur, esse nonnisi expansionem & elevationem arteriarum a contractione cordis, qua sanguinis portio in alveos intruditur, producta; nisi itaque arteriæ post expansionem iterum in priorem statum & dimensionem se restituerent sub contractione, neque nova receptio sanguinis & iterata ampliatio, neque etiam progressus in vasa reducenda, posset contingere. Porro systolen sive activam laterum contractionem, licet tactu vix perceptibilem, in arteriis vigere apertius testatur, sanguinis per arterias vulneratas vel abscessas saliens effluxus, ita succedens, ut in diastole quiescat, in systole vero cum impetu elidatur. Taceamus, quod figura & structura valvularum seminalium idem luculenter arguat, quippe quæ orificiis arteriarum e corde egredientium admirabili artificio eum in finem appositæ sunt, ne sub systole arteriarum, quæ diastolen sequitur, sanguis ad cor refluxat ac reprimatur. Neque denique sublata arteriarum systole, sive

Quæ
stionem
quidam
perperam
siquam
tunc.

Quis
sistat
arteria
num, mo
tum ne
gent
maxime
arant.

potentia elastica, quæ dilatatione & reciproca contractione absolvitur, intelligi potest, quo modo tota non solum sanguinis, sed etiam humorum universi corporis massa, quæ exacte posito calculo, pro divexitate individuorum, in grandi corpore & robusto ad 70. vel 80. libras accedit, intra una vice a corde in principium arteriarum ad summum sanguinis uncia, possit dimoveri & in circulum agi. Et certe neutiquam sufficit dicere, arteriosa vasa cum venosis reducentibus non esse continua, sed arteriarum extrema in porosam partem substantiam sanguinem a corde advectum fundere, & effusum mediante motu tonici vi ac potentia in venas & per has ad cor trudi, sicque cruorem in motu progressivo resilio eximie adjuvari. Nam supposita illa humorum in poros & interstitia fibrarum extravasatio, commentum & haud levis error anatomicus est, cui partium & totius corporis mere vasculosa, exceptis filamentis fibrosis, compages uberrime illustrata, & confirmata, artificiosissimis *Ruysschii* injectionibus, quibus etiam docemur, nutritionem corporis non nisi insigni expansione substantiæ vasculosæ partium a contentis succis fieri, apertissime repugnans.

§. IV.

Eandem censuram meretur quorundam lententia, qua nostris temporibus, quæ a sagacioribus Medicis jam dudum istæ multiplices & inexplicabiles pulsuum Galeni species explosæ, antiquum recoquunt & tantum non omnes illas ad fastidium ulque inculcant. Videas nonnullorum scripta, in quibus pulsus fortis, vehemens, magnus, plenus, longus, brevis, durus, mollis, parvus, vacuus, debilis, humilis, frequens, rarus, celer, tardus, serpentinus, vermicularis, formicans, caprizans, tremulus, undulatorius, piyurus, ferratus, dicrotus, manifestus, obliquus, intermittens, in-

æqualis, seu vere & distincte evidentes supponuntur, ex variis mentis præfigurationibus explicantur, & ad prognosin formandam sterili plane molimine applicantur. Quo quidem nihil aliud faciunt, quam ut pulsuum disquisitioni tenebras inducant, & vel suo exemplo effatum, quod ipse *Galenus lib. 1. de pulsuum doctrina* pronunciare non veritus est, confirmant: tantam in pulsibus solis addiscendis esse difficultatem & obscuritatem, ut tota hominis vita illi cognitioni atque exercitationi tribuenda videatur.

§. V.

Ego potius hoc in loco pulsuum scientiam ac differentiam secundum mechanicas rationes & leges breviter proponam, quo liquido appareat, quam paucæ pulsuum sint & revera existant species, unde petant originem, & quam eximium usum eorum exactior notitia in praxi medica obtineat. Quemadmodum itaque in mechanicis nonnisi dux simplices & genericæ motuum species dantur, motus nempe magnus & celer, cui parvus & tardus opponitur; ita etiam duo tantum in genere pulsus, magnus scilicet & celer, hisque appositus tardus & parvus, præsto sunt. Magnitudo & parvitas in motu, de mole quæ movetur, magna vel parva dicitur: celeritas vero & tarditas, de spatio, quod mobile longiori, vel breviori tempore, emittitur. Pulsus igitur magnus appellandus, quando ab insigni copia sanguinis a contractione cordis in arterias intrusa, arteria amplius diducitur ac elevatur; parvus vicissum, ubi ad exigua portione immixti cruoris non adeo ampliatur. Si celer pulsus is dicendus, quando brevi temporis spatio arteriæ dilatio perficitur, tardus contra, si longior temporis intercapedo istius intercedit. Deinde ex binis his speciebus compositis alia emergit, vehementia nempe atque debilitas, ita quidem, ut celeritas cum magnitudine conjuncta, vehementiam, par-

Ad motus effectum, quoniam tantum species pulsuum, per se.

magna, & parva.

celer & tardus.

Et ex his compositas vehementiam & debilitatem.

De motu, qui motus, seu pulsuum species, nomen.

parvitas vero & tarditas, debilitatem constituat, quod motuum genus utique etiam in pulsibus locum habet.

§. VI.

Reliqui
vel una
an effen-
tiam me-
ris per-
tinent.

Frequentia vero & raritas, item aequalitas & inaequalitas, non sunt essentialiter affectiones motus, eo quod non de singulis motibus, sed tantummodo de successu & serio eorundem praedicari queunt, & frequentia quidem de numero, majori raritas de minori, aequalitas & inaequalitas, item intermissio, de ordine & successu motuum. Neque etiam durities & mollities de essentia motuum est, sed tantummodo dispositionem corporis, quod movet, vel movetur, denotat, Reliquae omnes pulsuum species sunt fictitiae, quae revera non dantur, neque mente concipi, neque explicari possunt; licet minime negandum, diversos magnitudinis & parvitat, item celeritatis & tarditatis, vehementiae quoque & debilitatis esse gradus. Proinde vehementer utique i errant, qui discrimen commiscunt inter pulsuum parvum, humilem, contractum, obscurum, latentem, vacuum, angustum, concisum profundum, quum nonnisi una species sit, & a parva elevatione arteriae proveniat, & si quidem distinctio facienda, parvus, minor & minimus, rectius dicitur. Eiusdem notae est discrimen, quod nonnulli inter magnum, plenum, amplum & manifestum pulsuum, nec non vehementem, impetuosum, robustum, fortem & valentem esse volunt, utpote priores denominationes omnes nonnisi magnam vel maiorem arteriae expansionem, & posteriores amplam cum celeritate factam dilatationem, produnt. Illi vero Galenicorum pulsus myurus, formicans, vermicularis, tremulus, caprizans, serratus, dicrotus, nonnisi species sunt pulsuum magis vel minus inaequalium, qui pro varia mixtione, ordine & successu variant, ita, ut mox parvus, mox magnus, postea celer & tardus ictus percipiatur.

Tom. III.

§. VII.

Majoris momenti quaestio est; num pulsus celer & frequens, tardus & rarus, inter se differant? an vero pro uno eodemque haberi possint? Nolo hoc loco repetere, quam acrem contra omnem expectationem mihi celeberrimus vir moverit olim controversiam, quum celerem & frequentem pulsuum in praxi medica pro uno pulsu haberi posse scripto assererem. Is enim hanc meam assertionem suae de febribus doctrinae directe adversari putans, quod ingens inter pulsuum celerem & frequentem intercedat discrimen, propugnare & integro scripto defendere sibi sumisit. Ego vero in *dissertatione de pulsuum natura & usu*, nec non in scholia ad apologetico clarius, & quod sciam primus detexi: celeritatem quidem & frequentiam in motibus mirum differre, dum illa de intentione & tempore motus, haec vero de numero motuum praedicatur, qui tamen proprie non spectat ad essentiam motuum. Quodcumque vero sermo est de motibus, ubi semper unus alterum una serie sequitur, ut sit in pulsibus: haec est quaestio: annon frequentia a celeritate singulorum motuum oriatur; & annon haec ipsa certus index sit celeritatis singulorum? quod ego quam maxime merito affirmavi. Etenim nulla certe alia suppetit ratio, singulorum ictuum celeritatem, vel tarditatem accurate, ratione temporis iudicandi ac determinandi, quam ex frequentia & repetita vibratione, ita quidem, ut si e. c. eo temporis spatio, quod vocant minutum, in uno centum pulsus numerentur, & in alio quinquaginta, priores duplo maiori celeritate quam posteriores contigisse, demum constet. Quapropter nec pulsus celer, nec frequens, mente, multo minus re ipsa, ullo in morbo ut distinctus demonstrari potest, nisi pulsuum, qui sit in arteria dura & contracta, celerem dicere velimus.

I 3 §. VIII.

Quod
stipulan-
tur an-
flora.

§. VIII.

Et hanc eandem de imaginaria pul-
sus celeris & frequentis differentia
sententiam, Medicorum celeberrimi
proficiuntur. Diserte sane verbis *Syl-
vius praxidib. 1. cap. 26. celeritas*, ait,
*pulsui adscripta, mente quidem conce-
pi potest, non item digitis tangi ac per-
cipi*. Id quod etiam confirmat acutif-
simus Medicus & Mathematicus *Bel-
linus in tr. de pulsibus pag. 75. celer*,
inquiens, pulsus, quia digito minimo
temporis persistit, in statu a naturali
*parum recedente, vel non datur, vel ta-
ctu distingui non potest, quum natura-*
lis motus extorsum arterie vix pun-
ctum temporis duret, multo minus in
statu præternaturali id sensibile erit.
Egregie quoque eandem in rem scribit
Schelhammerus de pulsibus p. 73. pul-
sus frequentem non citra celeritatem
observari. Et hinc etiam est, quod
nunquam in observationibus medicis,
pulsus tardus & frequens, celer & ra-
rus conjuncti deprehendantur. Non
sine ratione itaque in consideratione
medico-practica celeritas pulsum pro
frequentia, & frequentia pro celeritate
ponitur. Et quia unius ictus celeritas
tactu per se non potest dignosci atque
percipi, eo quod vix temporis pun-
ctum complet, consultius est, nume-
rum ictuum beneficio horologii quod
minuta secunda monstrat, metiri at-
que determinare, quali instrumento
insigni cum fructu in artis exercitio us-
que eo usus sum.

§. IX.

Pulsus
durus ac
mollis
dicitur
respektu
arteria

Longe aliter de pulsu duro ac molli
sentiendum. Hic enim licet ipsius mo-
tus essentiam non tangat, sed tantum
talis dicatur respectu arteriæ, prout
nempe ea plus minus tensa, renitens,
dura, vel flaccida, mollis & relaxata
est; nihilominus tamen multum sane
resert nosse, qualis sit constitutio &
dispositio instrumenti mobilis & mo-
ventis, ratione texturæ strictioris,
vel laxioris, adeoque num contractæ,
vel laxæ sint cordis fibræ & arteria-
rum tunicæ, utpote quo major solido-

rum tensio & contractio, eo major est
nisus, intensio, renisus ac renitentia in
motibus, & contra. Hæc vero tensio
& durities arteriarum & fibrarum
universi corporis nervearum & carno-
sarum, deprehenditur vel in statu na-
turali, a conformatione nativa in æ-
tate juvenili, cholericis, item senil-
ibus, ubi arteriarum pulsus valde ten-
sus ac durus est, mollior vero textura
in sanguineis, pleuræmaticis, item in
pueris, vel obvia etiam est in statu
præternaturali, & nil nisi spasmus quæ-
dam species est, quæ quam maxime
tangit tunicas arteriarum, ex fibris
nervæis & musculosis compositas. Et
quoniam sic ipsa dispositio arteriarum,
ceu instrumenti motus, plurimum
consert ad pulsum mutationem, in
proclivi est ratio, quare non semper
unus idemque pulsus teste *Ballonio*,
in utroque brachio observetur, id
quod etiam nos in hemiplexia aliquoties
observavimus. Et apprimè huc
facit luculenta observatio *Raygeri*
pag. 20. qui scribit: in quamplurimis
militibus sauciatis & male curatis,
notabilem differentiam inter pulsum
sani & lsi lateris observavi.

§. X.

Supereft adhuc in pulsum classe
is, qui maxime omnium memoratu
dignus, convulsivus meo quidem judi-
cio merito dicendus. Hic pariter non
a sanguine arteriosum alveum perla-
bente, sed potius ab ipsa nervoso-mu-
sculosa ac membranosa arteriæ sub-
stantia proficiscitur, & tractorio ac
tremulo subsultorio motu, quasi ar-
teria ad superiora raperetur, sese
prodit, atque in febribus acutis mor-
tis præfagium præbet; eaque propter
recte dici potest pulsus morientium,
cui plerumque inæqualis vel intermit-
tens jungitur. Nam sicuti circa mor-
tis confinia in toto systemate nervo-
rum & nervosarum partium, consusio
& irregularitas motuum cum convul-
sione percipitur; ita etiam id ip-
sum contingit in arteriarum tunicis
nervosis, & tactu sentitur.

§. XI.

Nervus
convulsi-
vus.

*Pulsuum
causae
cordis
motus
systolici
sunt.*

§. XI.

Constitutis sic pulsuum differentiis & generibus speciebus, evolvenda sunt eorumdem causae inquirende maxime, quomodo iidem pro diversitate corporum, atque etiam rerum non naturalium usu, differant. Ad pulsuum itaque causas quod attinet: originaliter idem a cordis motu systolico & diastolico deducendi sunt. Hic enim cordis motus maxime omnium dici debet vitalis, & cor primum movens ac ultimum moriens. Scilicet cordis structura ex fibris quamplurimis firmis tensis, expansibilibus & contractibilibus, sive elasticis, longe artificiosissime est contexta, & ex harum vi ac potentia, valida contractionem, seu motum activum, sortitur, quia a sanguinis aereo elastici valde spirituosius (qualis sit ex brevissimo illo circulo ex cordis substantia in pulmones, & ex his in hanc, dum portio sanguinis ex pulmonibus subtilior facti, per substantiam cordis musculosam transit, & mox rursus beneficio arteriarum pulmonalis ad pulmones fertur, tenuior reditur) per vasa coronaria transeuntis influxu animatur, & potentia ac virtute fluidi subtilissimi quod ex pari octavo & intercostali nervorum affertur, magis augetur.

§. XII.

Deinde quomodo cordis non uno illo contractorio, sed reciproco altero diastolico absolvatur, posterior quidem respectu cordis, quod patitur dilatationem, dici solet passivus, nihilominus tamen hic quoque motus dilatatorius, qui sit a contractione arteriarum & impulsu sanguinis in venas, necessarius est ad systolen sive vim elasticam contractoriam. Etenim quia corporum elasticorum ea natura est atque conditio, ut post dilatationem sese rursus contrahant, & post nimiam contractionem iterum amittant ac in pristinum statum restituant: in corde quoque tanquam parte mira elastica virtute instructa, post expansionem eius contractio de novo

suscitatur, ita, ut experimentis constet, quo major & quo crebrior diastole & expansio, eo maiorem fieri systolen & consequenter pulsum arteriarum. Confirmatur hoc luculenter ex eo, quod affluente copiosius & velocius sub motu laboriosiori, vel a sensu scalarum, intensiori & longiori sermone, ad cor sanguine, non modo ejus motus intendatur, sed & pulsus major & crebrior micet & corpus plus incalcescat; contra vero si debita sanguinis quantitas cordi vel per largiores hemorrhagias, vulnerationes, aut venarum incisiones subtrahitur, systoles ejus cum pulsu & sanguinis circulo vel valde imminuitur, vel penitus perit ac vita intercedit. Notavimus paucis abhinc diebus ejusmodi exemplum in femina, quae, cur nescio, subito enorme sanguinis experta est profluvium, ut animo primum deficeret, demum tamen resocillaretur. Sed quum e lecto cruore conspurcato levaretur & paulo diutius erecta sederet, subito exanimis concidit atque extincta est; nullam aliam ob causam, quam quod sanguine ob situm perpendicularem cordi detracto, systoles perit & sic totus sanguinis circulus subleat, qui forsitan prompto revocari potuisset auxilio.

§. XIII.

Sicut itaque aequalis & moderatus influxus sanguinis in vasa coronaria, & conveniens ejus quantitas in cordis thalamo effusa, motum cordis naturalem, aequabilem & moderatum efficit; ita pariter aequalis & temperata sanguinis in arteriis propulsio, & ipsi cordis motui respondens, a moderato sanguinis & fluidi elastici in arteriarum tunicis appulsu dependens arteriarum renisus ac systole, pulsum facit naturalem, vicissim prae naturalem, quando hoc temperamento recedit. Et pulsus quidem magnus, sive ampla arteriarum dilatatio, indicat copiosorem sanguinis ad cor affluxum & similem etiam in arteriarum effusionem. Parvus vicissim parcius

*Et dilatatio
est a
sanguine
opulso.*

*Hinc
cordis
motus
respondet
pul-
sui ac
sic.*

*magnus
est par-
vus.*

celer
vel tar-
dus.

vehe-
mens ac
debilis.

vel in-
equali
ac in-
inter-
mittens

rem sanguinis in cordis ventriculos confluum & exiguum ejusdem distolen, idemque in arteriis contingere denotat. Quando porro arterie celeriter micant, citatiorem sanguinis ex partibus ad cor succedere refluxum indicio est, si tarde, tardum. Vehemens pulsus adest, ubi celerius ingens sanguinis copia ad cor per venas appellitur: debilis contra, quum pauca quantitas tardo. Inaequalis vero arteriarum pulsatio, sive mox magna, mox parva, mox celer, mox debilis, intermittens quoque sit, quando liber sanguinis transitus per vasa coronaria, vel etiam ventriculos cordis, a quodam obstaculo impeditur, ac vel sanguis grumefactus crassus in vasis coronariis, vel fibrosum aut polyposum concretum in auriculis vel cavitatibus ventriculorum vel vasorum cordis haeret, vel etiam fit, quando sanguis crassus & copiosus celeriter ad cor truditur & systolen ejus ad tempus opprimit.

§. XIV.

Majorem
quam
vulgo
putatur
succurri
in cor-
pore est
quantitas.

Jam quum pulsus cordis & arteriarum vitalem illum sanguinis circulationis motum regat ac tueatur, ac is vicissim ab hoc sustentetur; quaesitio disquisitione haud certe indigna incidit; quoties una hora universa sanguinis & humorum massa mediantem illo perpetuo circulo per cor transeat. In hac autem decidenda, ingens inter Medicos est sententiarum divortium, dum non solum in determinanda sanguinis & humorum quantitate in universo corpore, sed etiam ea, quae uno ictu e corde ejicitur, mirum discrepant; ita quidem, ut omnem humorum in corpore sano, adulto ac robusto apparatus, alii ad 30, alii ad 24. 20. & 16. libras accedere autument; pondus autem cruoris, una systole e corde pulsus, quidam unam unciam, quidam dimidiam, pondere aequare, censcant. Verum mihi certe vehementer errare videntur ii, qui tam exiguum molem & portionem humorum per cor & vasa omnia ferri affirmant, &

in eo plerumque decipiuntur, quod tantummodo sanguinis rationem inveniunt, quasi ille solus circumagatur, quum tamen longe major sit quantitas lymphae, feri, chyli & succi alibilis, quos omnes humores innumera vascula & tot capilliculi, e quibus maxima ex parte compages corporis nostri ejusque partium coagmentata est, continent, & qui pariter non subsistunt, sed jugi etiam motu circumaguntur, id quod etiam de succo cerebri, medulla spinalis ac nervorum dicendum. Deinde illi quoque admodum falluntur, qui quantitatem omnem sanguinis ex ejus per vasa aperta effluxu metiuntur, eo quod hic tamdiu tantum, quam cordis & arteriarum motus, succedit, hoc autem post interceptum a subtrahe sanguine ad cor affluxum & sublata distolen, pereunte, subsistit, resistente adhuc in vasis minoribus & inferioribus magna cruoris copia.

§. XV.

Proinde alia potius via ac methodus excogitanda, qua proportio liquidum ad solidum in corpore humano clare & certius possit detegi: id quod mea quidem sententia commodius perfici nequit, quam si fluidarum &que ac solidatum partium nonnihil lance prius libratum calori exponitur, quo humidum aufugiat, & exsiccaturum postea rursus ponderatur, videndo, quantum perdiderit ponderis, & inde calculum subducendo. Varia hunc in finem instituta experimenta, & saepius quidem cum sanguine eveniente missa, ac deprehendi quatuor ejus uncias, facta exsiccatione, unam ut plurimum unciam solidae materiae reliquisse, ut adeo tres sint fluidae, & una tantum solida in cruore portio. Deinde frustum carnis bubulae recentis, duodecim unciarum pondere, in clibano non adeo acris & vehementi calore siccavi, & atridae substantiae uncias quatuor obtinui, reliquis octo uncis, partim sub vaporum forma distillatis, partim cum pin-

Et mea
est ratio
dorum
quam
solidum

guc-

guedine liquefactis & exstillatis. Ossa quoque, quæ sunt molestissimæ & maxime compactæ partes, decoxi ad aliquot horas cum aqua, exempta postea arefeci, & dimidium ponderi eorundem decessisse compertum habui. Licet autem pondus & quantitas tot membranarum, cartilaginum omniumque solidarum partium in corpore humano exacte determinari nequeat; illud tamen ex hac computatione recte elicitor, fluidam corporis substantiam in genere longe superare solidam.

§. XVI.

Ponamus itaque corporis molem attingere 160. libras, minimum 80. librarum humoris in eo erunt. Ponamus porro, quod etiam fere semper in sano homine evenit, quod uno in minuto 70. pulsus, adeoque in hora, quæ 60. minutis absolvitur, quater mille & ducenti pulsus numerentur, & quod ea sit arteriarum magnæ cordi concretæ amplitudo in robusto illoque diameter, ut quovis cordis ictu, unciam unam sanguinis quam commodè recipere possit, calculo subducto, patebit, minutum ter intra horæ, ac septuagies & bis intra 24. horarum spatium, humorum microcosmicorum pelagus cursum conficere, & cor in circulum abeundo perlabi. Et tam crebra liquorum eorporis per cor & omnia vasa circulationis, eam maxime ob causam necessariam est, quo succus ille, qui ex ingelisculentis & potulentis extrahitur, ac in medio crasso robusto & non valde agili vitæ genere, minimum ad sex libras accedit, cum sanguine intimè misceri, ad minima vascula per universam compagem pelli, iterumque per subcutaneos maxime & urinarios tubulos exire possit; quandoquidem observationibus staticis liquido constat, corporis aduki idem semper fere manere pondus, & egesta æqualiter respondere ingestis.

§. XVII.

Ut autem ad pulsus eorumque hæc causalem disquisitionem redeamus, probe tenendum est, pulsus tam quo-

ad celeritatem, quam magnitudinem, non in omnibus omnique tempore unum eundemque observari, sed ratione magnitudinis cordis & valorum, copiarum & temperiei sanguinis, nec non virtutis elasticæ canalium, multum differre, & hinc quoque pro ratione sexus, ætatis, temporum anni, aeris, motus, victus, somni, vigiliæ, animi pathematum admodum discrepare. Si sexum spectemus, viri plerumque mulieribus pulsus majorem & citatiorem, femine tardiores & debiliores obtinent, quippe viri, corde majori & ampliori, cui, ut ego in quamplurimis sectionibus observavi, semper valorem amplitudo respondet, firmioribus quoque fibris & sanguine magis calido turgescente, quam femine instructi sunt, quæ vasa habent exiliora, laxiora & copiosiora. Deinceps in choleris & sanguineo choleris, arteriæ validius & celerius micant; quam in iis, qui phlegmatici & melancholici sunt temperamenti. Nam cholicorum sanguis majori copia partium sulphurearum, quæ sors & matrix motus intestini calidi & organici sunt, scatet, hinc tenuior, auxiliior magisque coccinei coloris est, citatius rursus conficit, & excretionibus promptius facit. Quoad corporis habitum macilentiores & qui fibras strictiores, & ampliora vasa habent præ obesos, qui laxis fibris dotati, vasa gerunt angusta, majorem & validiorem arteriarum pulsationem experiuntur, unde etiam saniores, robustiores ac ad perferendos labores aptiores sunt illis.

§. XVIII.

Porro ætas multum ad modificandum arteriarum motum confert. Nimirum infantes insignem succorum copiam ad alimoniam, & incrementum necessariorum alunt; unde crebriores sunt diastoles, & pulsus, qui tamen ob fibrarum teneritudinem & laxitatem, molliter tangentis manum ferunt. In juvenibus ac viris maximus corporis vigor, sanguis calidus & fibræ strictiores, & hanc ob causam

immensitas

et quædam sunt

temporibus

corporis habitus

Ætatis

Iude utitur dum quædam sanguis circulator

Et causam probe tenendum est, pulsus tam quo-

sam in iisdem pulsus strictior, major & vehementior observatur. Senes vero fibras gerunt rigidiore, & sanguis ob cessantem nutritionem redundans, angustatis nimium minimis canaliculis, in majoribus vasis ipsoque corde majorem dilatationem, adeoque pulsum magnum & quodammodo durum facit, qui tamen ubi cruorem, deficientibus particulis calidis sulphureis, crassum ac spissum, tardior est. Labor,

Labor. motus & exercitatio corporis, & pulsum, & circulum sanguinis, & excretionem, præsertim perspirationem,

quies. augent; quies autem & otium & tardio- rem, & debiliorem, sanguinis progre- ssu, adeoque etiam arteria- rum motum, efficiunt. Eundem cum

Sermo laetum. motu præstat effectum respiratio, per sermonem excitatum, vel ascensum acclivium intensior facta, qua sanguis non solum velocius per pulmones, sed etiam universi corporis canales agitur, ac pulsus magnitudine & celeritate in- crescit. A vigilia evidentior arteria- rum percussus sentitur, in somno vero tardior, & languidior est. Post

Vigilia. potum sumtum calidum v. g. infusi Coffee & Thee, vel etiam aquarum thermalium, statim frequentiores vi- brant pulsus, nec non post ingestum cibum, adeo ut sæpius experimentum

Totus calidus. ceperim, & quem ante prandium in minuto arteriæ septuagies, in quibus- dam sexagies quinquies pulsarent, post illud, ad 75. vel 80. quin C. pulsus, a- scenderent. Nihil vero tam subito

animi affectus. pulsum cordis, & arteriarum mutare valet, quam animi affectus; & a terro- re quidem pulsus fit inæqualis, par-vus & contractus, a gaudio frequens & magnus, ab ira celer ac durus; a tristitia tardior, minor, profundior ac debilis, & post impensas meditatio- nes, languidus ac debiliior, neque du- bium est, quin in desideriis, & affp- etibus venereis, crebrius, pariter, tur- betur.

§. XIX.

det. Quam eximia, præterea aeris cir- cumflui ac tempestatum, sit efficacia

ad sanguinis per arterias motum ea- rundemque percussum conturbandum, quotidianis experimentis inclarescit. Inprimis experientia compertum ha- bemus, quod simulac post diu in atmo- sphæra regnantes, zephyros, vel au- stros, aquilo, vel eurus flare incipit, mox major tensio arteriarum fiat, ma- jor quoque vigor & magnitudo in pul- sibus, quod etiam observatur, quan- do argentum vivum in barometro si- tum suum humilem mutat & ad supe- riora scandit. Contra ea, si atmosphe- ra est densa, humida, pluviosa, & diuturna austerina ejus constitutio, sub vita præsertim sedentaria, longiori somno, & autumnali tempore, lan- guescit pulsus & minor redditur, si- mul quoque sanguinis circuitus cum excretionibus, inprimis perspiratione, impeditus succedit. Ex eodem fonte derivandum, quod pulsus in arteriis pro anni temporibus mirum variet. Videlicet vere medio, ut Majore me- se, maximus vigor corpori inest, & pul- sus magnus, interdum vehementer, per- cipitur. Æstate media arteriæ celeri- ter, sed debiliter percutiuntur, quoniam ob æstum major intestinus, & calidus partium sulphurearum fit motus, spi- rituosa autem elastica exhalant. Au- tumno pulsus tardi, molles & debiles percipiuntur; & hieme duriores ac majores micant.

§. XX.

Accedunt medicamenta, quibus identidem peculiaris vis atque virtus inest, motum cordis & arteriarum pulsum variis modis immutandi. Ex- enim quotidianæ observationis est, a drastico sumto purgante, quod spas- mis ventrem exercet & plures dejectiones movet, pulsum duriores, cita- tiores, & debiliorem, cum virium lan- guore reddi, qualis effectus etiam al- lumto sortiori emetico sequitur. Me- dicamenta ex marte parata id servare singulare, quod sulphure suo metalli- co egregie fibrarum & canalium ela- terem firmant atque intendunt, unde eorum usu pulsus major & robustior per-

Anni tempora.

Medi- camenta pur- gantia & emetica.

Marte- stilla.

percipitur, color faciei vividior conspicitur & calor corporis adaugetur, quæ si observantur phænomena, indicium sunt boni a medicamento dato effectus, ad expediendam maxime obstructions in corpore cachectico. Quumque Lauchstadiensis medicati fontes eximiam martialis elementi copiam in sinu foveant, exquisita utique ratione nititur, quod sæpius expertus sum, ab eorum potu pulsum languidum antea & minorem, in sexu potissimum sequiori, maiorem & frequentiore redditum fuisse. Idem quoque ab usu corticis Chinæ in intermittentibus adverti: quippe die vacuo, quo arteriarum percussus solet esse valde tardus, parvus & debilis, hoc propinatus, vegetius & robustius micare ceperunt, indicio, auspiciatim huius remediis ceteris paribus esse operationem.

§. XXI.

Pharmaca, quæ sale volatili acri & oleoso turgent, ut essentia & spiritus de zoardis, alexipharmaci, ordinario amplificant, & exaugent pulsum, atque cordis & arteriarum distolen, ob principium sulphureum volatile, expansivum organicum; & qui sanguinis circuitus inde promovetur, non modo perspiratio, sed & debito adhibito regimine, sudor largior subsequitur. In enormi virium defectu & imminente animi deliquio, arteriarum motus languidus, tardus & parvus, vix interdum perceptibilis observatur, adhibitis autem interius & exterius balsamicis & spirituosis aromaticis, mox immutatur, & augeatur, qualem effectum etiam vinum generosum præstat. Acida vicissim & nitrosa, peculiari ratione sulphur sanguinis, a quo intestinus ejus calidus motus dependet, figendo & refrigerando, corpus refrigerant, & simul semper reddunt arteriarum motum pacatiorem; quare etiam eorum usus, ubi pulsus ratione magnitudinis & celeritatis nimium est adaugetur, ut in æstu febrili, præsentissimæ est

efficaciæ: §. XXII.

Quæ sulphure quodam vaporoso naturæ adverso, ut sunt, quæ somnum inducunt, ex opio potissimum parata pharmaca, multo magis quæ narcotico & stuporem conciliant, quo nomine hyoscyamus maxime & ex eo concinnata celebrantur, imbuta sunt, pulsus percussus valde parvus & debilem efficiunt ac vires prosternunt. Et mirandum certum est, quam subito hæc ipsa medicamenta, exigua etiam doli oblata vires deiciant, elaterem solidorum & potentiam motricem minuunt, nullam aliam ob causam, quam quod principio suo subtili; sulphureo, valde expansivo, intima nervorum penetrent, & liquidum quod vehunt purissimum, magnæ ad movendum efficaciam, adverso suo vapore contaminant; eodem modo ac versa vice, quæ amico, fraganti sulphure scatent, motum cum viribus erigunt atque adaugent. Pariter experientia constat, ab assumptis aliis venenis corrosivis, quorum notissimum arsenicum, pulsum minorem, contractum, durum atque frequentem fieri, qui ante mortem aliquot horis desicere solet, ut percipi plane nequeat.

§. XXIII.

Si ob nimiam sanguinis redundantiam & ampliorem alveorum distensionem, cordis systoles non sufficienter respondet, & pulsus eapropter minor fit ac deprimitur; factio per sufficientem sanguinis missionem spatio, arteriæ vegetius & celerius saliant, ipseque sanguinis progressus promptior fit atque liberior. Et quia mensum vel hæmorrhoidum fluxus sæpe ob nimiam plethoram supprimitur, evenit, ut post sectam venam, ob celeriores sanguinis cursus, brevi tempore post insigni valetudinis cum emolumento restituatur. A balneis tam siccis & vaporosis, quam humidis, pulsum vehementer augeri certissimum est, adeo, ut si paullo calidius adhibeantur; febris evadat, quam universi corporis

cor. obia.

Volatilis.

Analeptica.

Acida & nitrosa.

Suppur. fera & nova.

Corrosivi.

Pleth. fæta.

Est bal. nova.

ris æstus, cordis palpitatio, & capitis dolor sequitur. Etenim in ejusmodi balneis a calore externo humido major sanguinis, & humorum proritaturs expansio, quæ, si nimius balnei æstus est, tantopere augeri potest, ut systolen cordis nimia resistentia suspendat, & lipothymia balneantibus, ut crebrioris observationis est, accidant. Quin pediluvia tantum, circa lecti introitum recte usurpata, & sanguinis & arteriarum motum intendere, multiplici constat experientia.

§. XXIV.

Magna
itaque
rerum
corpo-
reorum
vis.

Hæc itaque omnia uberius hæstenus exculsa, evidentissime confirmant: magnam ac præsentaneam rebus externis corporeis, quibus ad vitam tuendam quotidie utimur, inesse facultatem, cordis motum, & arteriarum pulsum, adeoque universam actionum vitalium, naturalium & animalium œconomiam in melius, vel deterius mutandi. Quibus certe effectibus, quasi totidem argumentis, apertissime erroris convincuntur, qui physicis hisce rebus omnem omnino in corpus agendi illudque movendi potentiam denegant, & principio cuidam rationaliter & moraliter agenti, motuum causam & directionem modo plane non intelligibili tribuunt.

At pul-
sum mo-
tandi.

Quumque adeo pulsus multis variisque causis mutari possit, periti omnino Medici est, ut easdem curate expendat omnes, ne in promendo ex iis judicio fallat ac fallatur. Nam pulsus quidem certum signum & index motus cordis & circuli sanguinis est, sed si solus is spectetur, & non aliarum simul circumstantiarum, vel causarum externarum, ratio habeatur, in judicando admodum decipere potest. Exemplo sit pulsus intermittens. Hic plerumque pro periculo pleno, quin lethali, habetur quidem; experientia tamen fide constat, eundem sæpe in sanis, frequentius in hysteriis nec non colica, sine exitio, observari: Rruerius Cent. 3. obs. 3. intermittentem pulsum notavit a

Hinc
causam
judicandi

lumbrico, quo excreto, arteriarum motus ad naturalem statum rediit. Idem auctor Cent. 2. obs. 77. pulsura diu & sæpe, ob polypum, superstitie longius vita, intermittentem, se retigisse, testis est. Et Kerkringius in spicilegio obs. 78. systolen cordis interceptam adeoque pulsum sufflammatum, sine funesto eventu, se vidisse confirmat. Flatus quoque pulsum suspendere, Pechlinus l. 2. obs. 8. confirmat exemplo ejusdem, cui statuum exurgentium copia mirifice cor constringebat, & intortuabat pulsus, statim vero ac copiosi ructus exirent, liberabatur cor & intermissionis pulsus imminutus sequebatur. Et lib. 2. obs. 7. pag. 214. discretis verbis testatur: se pulsum subinde intermittentem in scorbuticis, in feminis junioribus male menstruatis, sine ulla majori incommodo spectasse.

§. XXV.

Quare egregium Fernelii est monitum, quod l. 3. de pulsu pag. 160. inculcat, quotidiana, inquit, corporis affectiones pulsus immutant, sine quarum animadversione, non certo potest pulsus percipi, nec quantum per morbos a naturali distet. Eandem quoque in rem quam maxime commemorabilis Celsi locus l. 3. c. 6. & dignus, qui totus transcribatur, dum ait: *venis maxime credimus fallacissima rei, quia sæpe ista lentiores celerioresque sunt, & ætate & sexu, & corporum natura. Et plerumque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnumquam etiam incipiente febre, subeunt & quiescunt: ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo gravis instat accessio. Contra sæpe eas concitat & resolvit sol, & balneum & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus, adeo ut, cum primum medicus venis sollicitudo ægri dubitantis, quomodo illi, se habere videatur, eas moveat. Ob quam causam periti medici est, non proinus ut venis, apprehendere manu brachium: sed primum residere, bulari vul.*

T. 1. ff. de
morte.

vultu, percunctarique, quemadmodum se habeat; & si, quicquid metu est, eum probabili sermone lenire: sum deinde ejus corporis manum admove. Quis venas autem conspectu medici movet, quam facile mille res turbant.

§. XXVI.

Atque hæc sunt causæ, quæ articularum motum variare & multis modis in statu naturali mutari possunt: proximum nunc est, ut quomodo quibusque rationibus, pulsus præter naturam in variis morbis immutationem subeat exponamus; quo Medicus ex hac pulsuum dignatione, ad cognitionem causarum internarum & effectuum eo melius pervenire, & sic ex iisdem, & morborum, & causarum morbosicarum, signa atque indicia cum certa ratione petere possit. Quum vero ex omni morborum classe præcipuus,

immo quasi universalis sit febrilis, qui nulli ætati, sexui, & temperamento pareit, plurimis morbis sese complicit, multos etiam interimit ipsique Medicis plurimum negotii in curando, & observando facillit; maxime omnium e re fore arbitror, ut paulo accuratius disceptemus: an certo pulsa, & quoniam febris, cujusvisque sit generis, certo dignosci possit? live quoniam pulsus signum pathognomicum febris præbeat? Jam quidem non levem hac de re inter Medicos tam vetores, quam recentiores, vigere dissentium videmus, dum alii pulsuum celerem, alii frequentem; alii cum Galeno pulsuum celerem & frequentem simul, pro pulsu febrili, live febris genuino signo, venditant. Ego vero jam supra clarius ostendi controuersiam hanc nullius fere esse momenti & facile hac ratione dirimendam, si ex vero ponamus: frequentiam prope non esse de natura hæc moruorum, nec pulsuum, celeritatem autem singulorum pulsuum non posse dijudicari, & exequitate determinari, quam per ictuum numerum frequentiore, live læpius repetentem. Hinc quando quæstio est de pulsu febrili, celer quidem proprie is

est, qui febris jungitur easdemque indicat; quia tamen frequentia a crebrius repetita vibratione magis in lentius incurrat; & celeritatem comprehendit, rectius utique ii Medicorum sentiunt, qui pulsum frequentem pathognomicum febris signum esse alserunt.

§. XXVII.

Et sane quamplurimi ex recentioribus quoque non infirmi subfelli Medici, hoc alsertum calculo suo comprobant. Audiamus Sylvium, qui in *praxi* l. 2. pag. 460. ita disserit: *hoc unicum febris omni soli & semper competens signum est, adeoque pathognomicum, pulsus scilicet præter naturam frequentior quo præfenti, febrem adesse, absente autem, abesse, certo pronunciari queat. Nec enim aliud signum quod competat omni febre innotuit Practicis, reliqua enim signa omnia, non tam febrem, quam febris speciem, gradus & tempus indicant aut demonstrant.* Sylvius alsergit diligentissimus observator *Emmellerus*, in *tomo præcti* p. m. 248. *pulsus, inquit, naturaliter frequentior recte statuitur signum pathognomicum febris a Sylvio, tam in dissertatione de natura februm, quam in praxi, quicquid in contrarium scribat Deusingius, Erack. dissertatione Anti-Sylviana. Idem confirmat clarus Belgarum Practicus Dec Kerus, in notis ad Barbette* p. 102. *ubique, scribens, pulsus præter naturam frequentior observatur, ibi febris est.* Et *Schellhammerus* in *tr. de puls.* p. 47. *frequentem in omni febris genere nunquam non sese offerre scribit, & cum calore earum esse signum pathognomicum.*

§. XXVIII.

Monendum vero est, quod licet in omni febre pulsuum præstito sit frequentia, minimè tamen ex eo concludere liceat, ubi pulsus frequens, ibi febris. Nam superius jam in causarum evolutione ostensum est, in pueris & cholericæ temperaturæ viris esse, & a motu fortiori corporis in balneo, assumpto sudorifero, ab animi pa-

Quod testatur aut. Barthe.

Id. febr. quæque. ubi febr. pulsus durus.

De pulsus morbosicis in morbis.

De quodam febrili.

quod si febrilis.

pathematibus, poſt epileſiam & vinum potum, naturalem arteriarum motum fieri frequentiore; quum tamen febris abſit. Quapropter hæc cautio a Medico, ne decipiatur, adhibenda eſt, ut prius ſtudioſe exploret: an forſan a cauſa externa hæc pulſuum frequentia fuerit orta; ac deinceps, ut inquireat: num etiam alia febris eſſentialia ſigna, ut horror & refrigeratio extremorum, adſint. Porro etiam probe notandum id, quod a paucis notatum, quod ſcilicet in febribus omnibus frequens non modo ſit pulſus, ſed & ſimul ob tenſionem arteriæ, plus renitens & naturali durior. Nam certe pauciſſimæ ſunt febres, in quibus pulſus non ſolito durior obſervatur, exceptis modo quibuſdam vere malignis febribus ſudoriferis, & quarum numero maxime ſudor ſic dictus Anglicus & colliquativus, quæ potius undeco pulſu ac ſumma virium deſectione indicantur. Febris quippe, ſecundum noſtram rationalem demonſtrativam explicationem, eſt affectio ſyſtematis nervoſi & vaſculoſi, univerſali ſpaſmo quodammodo conſtricti, qui non modo nervoſas, & muſculoſas fibras, ſed & ipſa arterioſa vaſa eorumque tunicas, quæ ex fibris nervoſis & muſculoſis conſtat, ſunt, afficit. Et ab hac tenſione & conſtrictione partium, quæ ſic proprie de eſſentia febris eſt, dependet non modo tenſio & durities, ſed & frequentia pulſuum aliaque ſymptomata febris juncta; quandoquidem ſpaſtica hæc fibrearum ſtrictura, dum vaſa capillaria nimium anguſtat, anguſtia celeritate compenſatur, & ſanguis citatori mutuo attritu incaleſcit; a priori frequentia, a poſteriori, corporis æſtu.

§. XXIX.

Ut autem paulo ſpecialius innoteſcat, quomodo in variis febrium generibus pulſus ſit comparatus, primo tenendum eſt loco: eundem quoad tempora decurſus morbi febrilis, eximie diſſerre. Nimirum in principio con-

tinuæ, vel paroxyſmo intermittētis, plerumq; tenſus eſſe ſolet, parvus & frequens, deinde augetur & paulo major ſit, tum in ſtatu, ſive vigore æſtus, in magnitudine adhuc creſcit & vehementius ferit, & tandem circa declinationem & tenſio & celeritas remittit, ſimulque ſecretiones & excretiones in cute, perſpiratio nempe & ſudor ſuccedere incipiunt. Mulum contra indicium eſt, ſi febribus continuis, circa dies criticos, ſeptimum ſcilicet, nonum & undecimum, cum horrore & refrigerio extremorum, pulſus ſit parvus & celer, vel etiam celer & vehemens, cum urina aquoſa & tenui, eo quod ſpaſmos in extremos augeri & ſanguinem impetuoſe ad caput agi, ob tractum robur ibi exitialem phrenitidem inductum, nunciat. Peſſimi autem præſagii eſt, parvus, frequens & debilis, quippe qui, virium ſummam proſtrationem & internam inflammationem in ſphacelum concedere ſubindicat, cui ſi complicatur inæqualis, & intermittens, mortis periculum prodiit.

§. XXX.

Deinceps in principio quartanæ, pulſus parvus, durus, frequens & inæqualis eſſe ſuevit, & in ſtatu tertianæ, item ardentis, vehemens. In febre ſynocha magnus quoque & celer arteriarum percuffus, qualis maxime venæſectionem indicare ſolet. Ante eruptionem exanthematum in variolis & morbillis, arteriæ quoque frequenter pulſant, poſt eruptionem autem, & tenſio & frequentia exſpirat, tempore vero ſuppurationis rurſus pulſus frequens ſit ſub febre ſic dicta ſecundaria, & ſub declinatione iterum ſucceſſive redit ad ſtatum naturalem. In malignis & petechialibus frequens quidem parvus & debilis, ſed contractus micat pulſus, cum magna virium proſtratione, qui ſi in mollem & unduſum tranſit, cum multo ſudore & urina ſanorum ſimili, non remittentibus ſymptomatibus, mortem præſagit. In febribus inflama-

Parlan
homen
pro re-
preſen-
tati.

gel ma-
lus?

De pul-
ſu in
quarta
febre
tertiana

tonis, & ubi doctores juncti sunt, ut peripneumonia, ordinario durus, & frequens, quandoque etiam magnus percipitur. Et catarrhales denique febres ipsa quoque lentas, pulsus vespri ingravescentes & celerius succedens stipat & indicat.

§. XXXI.

Ad reliquos porro morbos quod attinet & ad pulsus in iis habitudinem, in his quidem, qui caput oblident, ut mania, phrenitide, melancholia, multum quoque variare solet, & modo celer, modo tardior, modo languidus, modo robustus, nonnunquam inæqualis, tangitur, plerumque vero in his morbis intra caput fortiter arteriæ pulsare solent, a sanguine copiosius ibi congesto, cum dolore tractorio & lancinatorio, luculento indicio, multum ad cordis & arteriarum ipsiusque sanguinis motum turbandum conferre cerebri membranarum & nervorum constitutionem. In aliis, ut epilepsia, apoplexia & hemiplexia, præsertim si major sanguinis copia præsto fuerit, durus plerumque & frequens quandoque etiam magnus, deprehenditur. Vicissim ubi resolutum genus nervosum viresque prostrata, in lethargo, sopore & dispositione ad syncopen, mollis, rarus & languidus tangitur, qui, si demum adeo gracilescit, ut vix percipi queat, corpus interea frigido sudore perfunditur, lethalem induere catastrophem per ipsam constat experientiam. Quando pectus & partes in eo contentæ vitales patiuntur, pulsus ut plurimum frequens, languidus & inæqualis esse solet, qualis potissimum deprehenditur in cordis palpitatione, nec non in asthma convulsivo, ubi tamen plerumque intermittens jungitur, præsertim si uterque morbus a polyposo concremento, intra cor vel ejus vasa, fovetur.

§. XXXII.

Quod si porro sanguis redundans exitum moliri incipit v. c. per menses aut hæmorrhoides, creber, parvus &

quodammodo durus arteriarum est motus, ob spasmos, quibus sanguis ad locum excretorium congeritur: quum vero perumpit, increbescit, & in magnitudine augetur, affectus spasmodici, hypochondriaci & hysterici pathemata, dolores coli & calculi, nec non qui caput aliasque externas quoque partes infestant sub pulsu crebriori ac duro affligunt, qui si mollescit & amplior fit, spasmos in systemate nervosum partium conquiescere & sanguinis motum ad naturalem ordinem redire portendit. In dysenterico alvi fluxu ut plurimum arteriarum pullatio frequens & parva: ubi vero febris complicatur, frequentius & magnitudo jungitur. Lues denique venerea, scorbutus, cachexia & hydrops, pulsu languente ac debili stipantur.

§. XXXIII.

Atque hæc sunt, quæ de pulsibus & iudicio recte ex iisdem formando, in amplissimum usum breviter dicta sunt. Interim tamen quia hæc doctrina ita comparata est, ut apprimè in eandem quadret, quod *Celsus* de Medicina generatim edixit, plura esse, quæ nec dici possint, nec scribi, monendi utique sunt artem exercituri, ut experientia doce eandem mature addiscere laborent, & exquisito studio in cognoscendis ac dijudicandis pulsibus versentur. Mirandum autem certe est, nostros Medicinæ practicos ad ægrorum lectos accedentes pro more tantum pulsum contrectare, tam levi brachio, ut vix duos ictus expectent, quum tamen sæpenumero post decem denum vibrationes, inæqualitas vel intermissio percipiat, maxime quando sanguis inæqualiter mixtis partibus refertus cordis penetralia pertransit. Neque etiam sufficit, pulsum in uno tantum carpo tangere, sed in utroque id faciendum, quin in collo quoque & temporibus; eo quod experientia testatur, discrepare sæpius pulsum in manuum carpis & in uno loco commodius quam in altero ex-

spasma.
dici. &
dolores.

Dysenteria.

Celsus
suo cum
monitis

In aliis
morbis
dici
plura.

periculis

Hæmorrhoides

plorari. Quumque non minus multum interlit, ut pulsuum numerus atque celeritas exacte distinguatur ac determinetur; apprimè ex ulu esse poterit ad normam horologio, quod minuta secunda indicat, singulos ictus accurate numerare ac definire.

CAPUT XII.

De iudicio ex sanguinis inspectione
& examine rectè eliciendo.

§. I.

In Me-
dicina
iudicio
opus.

maxime
in femi-
nula.

Vix ulla datur disciplina, quæ tanto iudicio opus habet, ac ipsa medica, ita prorsus, ut omne Medici officium in recto, & sano iudicio consistere videatur. Nam ad corporis ægrotantis naturam pernoscendam, ad morbi genium, causas ejus, progressum, successum, & eventum indagandum, ad congrua quoque remedia inveniendi eaq; certo ordine, & tempore applicanda, itemque si ad valetudinem tuendam, & morbofa varii generis pro differentii corporum natura arcendas afflictiones, consilium, quæ salubria, vel insalubria sint, promendum, exquisito semper maximo opus est iudicio. Hinc certe quo magis Medicus perspicaci iudicio excellit, eo melior merito habendus est. In nulla tamen Medicinæ parte, si famam & existimationem suam tueri velit artifex, tam caute & circumspicte se gerere debet, & attentiori animi circumstantiarum penitiatione ac perita deliberatione sua perficere, quam in ea, quæ semiotica dicitur, & in dignoscendis morbis eorumque successu atque eventu prædicando occupatur.

§. II.

Prognosis
opis
in
sanguinis
clinica
feminarum

Quemadmodum vero omnes prænotiones & prædictiones certis quibusdam signis atque indiciiis nituntur; ita prognosis pariter medica nec hisce est destituta. Certissima optima ad rectam ac fidam prognosin formandam ratio est, qua Medicus ex

eo suodamento, quo vita & integritas omnium actionum continetur, tanquam optimo criterio, judicandi rationes petit atque elicit. Jam vero omnium confessione progressivus ille & vitalis sanguinis & humorum, beneficio motus solidorum succedens circulus, uti universæ Medicinæ, ita etiam Semioticæ, principium est atque fundamentum. Ex quo quidem liquido primum patet, pulsuum exactiorem doctrinam & rationalem explicationem, quam antecedenti capite persequuti sumus, Medico scitu maximopere esse necessariam.

§. III.

Quumque adeo sanguis princeps ille humor sit, a quo vita, seu observatio corporis nostri vitalis, & omnium functionum integritas, item secundum Hippocratem prudentia ipsius mentis, dependet, & sine quo anima nihil efficere potest: post pulsuum, sive sanguinis per cor & arterias motus disquisitionem, in quæstionem merito cadit: an non ex ipso sanguine ejusque examine, & inspectione, de integro vel morbofo corporis statu indicia promi, & remedia quoque, quæ utilia, vel noxia, desumi queant? Vulgus quidem ea in opinione versatur, & a Medico æque ac Chirurgo quam maxime urget, ut ex sanguine e vena misso, de statu sanitatis vel morbi, iudicium proferat. Neque defunt Medici, qui multa & mira ex inspecto sanguine hariolantur, quo morbo nempe æger laboret, quæ causa morbis sit, & quibus remediis ad sanguinem emendandum utendum. At vero utut non penitus hanc doctrinam repudiare aut rejicere velimus; multis tamen eam difficultatibus laborare, & admodum infidam esse, non sine ratione profitemur.

§. IV.

Videlicet nondum res inter Medicos confecta est, quinam optimus habendus sit sanguis, dum alii tenuem, fluid-

Per
pulsu
& in
sp-
sion
sangu
nis.

qua
ta.
men
salam.

Qua
sanguis
est
bonus

fluidum & rubicundum, alii talem qui
mdx post emissionem in gelatinam ru-
bram concrefcit, quidam, qui coagu-
lum crassum in fundū deponit, & flui-
dam in superficie mediocrem feri quā-
ritatem monstrat, pro optimo agno-
scent. Quisquis vero optimus sit, illud
tamen certum, vitalem hunc purpu-
ream liquorem ratione ætatis, ratione
victus & vitæ generis, ratione regio-
num & anni temporum, etiam in sani-
tatis statu magnopere variare, adeoq;
universali normæ penitus non esse lo-
cum. Deinceps corpora quæ integro &
gelatinoso nitide rubicundo gaudent
sanguine, ut sunt sanguinæ comple-
xionis hominibus, multis & gravibus
sæpe morbis attentari, non facile quis-
piam peritus Medicus negabit, multo
minus iis, quibus sanguinis abundantiam
pro frequentissima morborum causa
æstimant, dubitabunt.

§. V.

Tum etiam hoc per experientiam
curiosiores obscure esse nequit, sub
sanguine, qui aspectu pravus videtur,
nihil tamen incommodi percipi; & vi-
cissim optimum quoad sensum sangui-
nem, ex ægro graviter decumbente
corpore extrahi. Notatu hanc in rem
digna sunt quæ prodidit *Bollonius obs.*
2. Ephemerid. pag. 91. dum ait: *pluri-*
mis impurus sanguis detractus, quibus
mortuis & seclis, partes integra depre-
hensa; aliis purus, quibus viscera &
pulmones puræ sunt inventi & formo-
ssimis mulieribus semper sepe impurus
detrabitur. Idem testatur *Mauritius*
Hoffmannus in insit. diss. 7. impurus,
inquiens, sanguis, sæpe præ puro vitam
diutius promovet, & in quibusdam cor-
poribus optimus ad sensum, pessimus est.
Ego quoque sæpius observavi in scor-
buticis, hæcticis, sanguinem eleganter
rubicundum ac fluidum emitti, in sanis
vero & robustis corporibus densum,
glutinosum, nigrum & facile conglu-
tilem. In primis VVestphali, qui duriori
& salso victu cum pane grossiori ut-
untur, citra incommodum quoddam,
multo minus morbum, sanguinem val-

Tom. III.

de densum alunt, & qui crebrius, si re-
frigeret, in superficie lerum instar glu-
tinis concrefcens & variegatum exhi-
bet. In apoplecticis pariter, paralyti-
cis, item morbis spasmodicis convulsivis,
sæpe optimum ratione coloris &
consistentiæ deprehendi sanguinem.
Quin vidi, ex arterioliis in virulento
carcinomate disruptis, sanguinem flui-
dum & nitide rubicundum stillasse,
qui exterius nihil plane vitii ha-
buit.

§. VI.

Fallax itaque atque infidum omne
judicium, quod ex sola sanguinis inspec-
tione arcessitur; uade etiam procul
dubio factum, quod antiquissimi artis
nostræ antistites, *Hippocrates & Gale-*
nus, qui omnes sanguinæ ceu vitæ the-
saurum agnoverunt, de judicio in mor-
bis ex ejus aspectu ferendo parum ad-
modum prodiderint. Sane sanguis, etiā
si vitiosus, quamdiu promte & expedite
per corporis meatus movetur, non
facile lædit; & optimus contra, si vel
stagnat, vel firmiter impactus hæret,
aut extra vasa effunditur, non modo
morbi, sed & ipsius interitus causa fit.
Nam qui morborum & symptomatum
genealogiam probe caller, is facile per-
spiciet, eorum originem, non tam a
crasi vitiosa fluidorum, quam potius a
vitio solidorum, vitio loci maxime &
motus, esse arcessendam. Optimæ cer-
tæ notæ sanguinis portio, quando va-
sis elabitur, putrescit & funesta exci-
tat symptomata, in cerebro apople-
xiam, lebrem, convulsionem epilepti-
cam & lege consensionis vomitum in
ventriculo: intra cavitatem thoracis,
vel abdominis paullo majori quantitate
effusus, in frædam & lethalem abit
putredinem. Si vasis adhuc contentus
cruor membranis cerebri firmis im-
pactus hæret, phrenitidem, in tuni-
cis ventriculi & intestinorum fun-
estam inflammationem, in sphacelum
abeuntem, ciet. In cordis thalamis
& vasis majoribus congrumius hæ-
ret, syncopen vel subitam mortem
producit. In substantia muscularum

K

quum

Stigmata
aspectu
sanguinis
males
in sanis
& vitæ
versæ.

Et tum
diminuit
notæ.

quæda
inter-
valla

aut sub-
sistit.

quum firmam concipit stalin & in motu progressivo sistitur, in sphacelum, sive mortiferam concedit putrilaginē.

§. VII.

*Malis-
que
morbis
sive vi-
tis san-
guinis
accidit*

Neque ullum amplius præterire poterit, viscerum a sanguine vel sero infarctum, obstructionem & indurationem, gravissimas chronicas passionēs, cachexiam, hydropem, hæticam ingignere, in quibus sæpe sanguis e vena missus vitio carere videtur. Et sicuti venenum datum exigua mole sanum & qui integrum sanguinem habet cito necare valet; ita etiam miasma in peste & aliis contagiosis morbis, vel materia in podagra, arthritide & scabie retropulsa, sævis spasmis, citra vitium in sanguine, homines perimit. Quin licet pluribus nostro tempore solenne sit, in affectibus chronicis spasmodicis, qui in viris mali hypochondriaci, in sequiori sexu hysterici nomine veniunt, sanguinis spissitudinem ac causam accusare; nihilominus tamen sanguinem hoc morbo affectis e vena consistentia & colore bonum ac laudabilem detrahi, crebriori experientia convincitur. Nam spasmi tam universales, uti sunt febriles, quam certarum partium, gravissimorum symptomatum auctores quidem sunt; rarius tamen a denso & crasso sanguine, sed potius ab ejus copia, nimia expansione, vel etiam subtili in eo latente acrimonia, exsuscitantur.

§. VIII.

*Drilli-
tamen
sanguis
aliis af-
fectibus
& un-
guis*

Quamvis autem ex sanguinis aspectu prælagium admodum fallax & plurimi morbi ex eodem plane non deduci queant: ejus tamen inspectio & paulo curatius examen non plane ulcicaret, qui vero plus ad præcindendos, quam ad sanandos morbos pertinet. Placuit mihi quam maxime hanc in rem insignis locus Celsi l. 2. c. 10. ita differentis: *e vena sanguis cum erumpit, colorem ejus habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est, ideoque inutiliter effunditur. Si rubet & pellucet, integer est, eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut ea*

noceat, proinusque est suppressendus.

Gravis hic auctor sanguinem tenuem & rubentem, integrum, crassum vero & nigrum, vitiosum pronunciat; quod licet non sit perpetuum, magni tamen hoc monitum in administranda venæsectione usus est. Nam quum ejusmodi crassus, niger & mox in coagulum abiens sanguis, ægre admodum per minima, & capillaria partium vascula cursum absolvat; facile ibi hæret, & obstructiones, quæ secunde chronicarum passionum matres sunt, excitat. Vel si quando ejusmodi sanguis, fortiori corporis aur animi commotione, aut intenso frigore, aut etiam propter dolorificas & spasmodicas internarum partium contractiones, vi & impetu quodam in minima vascula, quæ secundum naturam non sanguinem, sed tenuiorem lymphaticum humorem vehunt, truditur, ibi quam facile firmius impactus hæret, & graves ac tenestas inflammationes conciliat. Id quod etiam quotidiana fere docet experientia, dum in pleuritide vera, peripneumonia, semper fere sanguis, cui serum instat glutinis tenax innatar, e vena emittitur. Igitur quam maxime salutare est, talem sanguinem ubi offenditur, ad pessima mala avertenda detrahere, quo reliquus deinde cruor eo melius subigi, circulari & congruis eum in finem adhibitis alcalinis, volatilibus, diluentibus, aqueis, aquis salubribus attenuari & subtilisari possit.

§. IX.

Sanguis vero nimis tenuis, floridus, *floridus* coccinei coloris, non semper boni quippiam prælagit, præsertim si fere sit destitutus & in fundo nullum obscuri coloris coagulum ponat. Nam talis color vel a salibus largiter admixtis alcalinis, in arthriticis & scorbuticis gignitur, vel nimium intestinum calidum motum arguit, ut in lentis & hæticis febribus, vel etiam partium sulphurearum exuberantem copiam, a liberaliori vini & aromatum usu, præsertim in cholericæ constitutionis hominibus,

nibus, subindicat. Nonnunquam tam tenuis ac floridus sanguis observatur, quando viscera, inprimis sanguinea, crassiore cruore infarcta sunt, quandoque etiam a spasmodicis convulsivis partium internarum motionibus, qualem nos sæpius in ejusmodi spasticis & convulsivis motibus vidimus. Hac igitur consistentia & calore præditus sanguis pro diversitate causarum, quibus ortum debet, magis vitiosam qualitatem corrigitur, ut gelatinosa, mucilaginosa, nutrientia, acrimoniam tenuem salino-sulphuream contemperantia, vel etiam acidula, calorem extinguentia & sedativa, quam evacuationem & imminutionem desiderat. Digna est quæ hic inferatur *Paulini* observatio in *M.N.C. Dec. 2. An 6. obs. 64.* de juvene febre maligna correpto, cui sanguis e vena missus, valde roleus elegantissimi coloris, sed sero maxime destitutus, subsequente morte. Et nos sæpius annotavimus, motus & insultus epilepticos aliosque spasmodicos morbos, evacuato tali sanguine fuisse exacerbatos. Unde utique *Celsi* præceptum, quod raro, præsertim copiose, ejusmodi sanguis mittendus sit, exquisita nititur veritate.

§. X.

Porro vitiosus merito is censendus est sanguis, qui sero nimium redundat & exiguum massæ rubicundæ portionem in complexu sovet, eo quod læsam sanguificationem, & parciorem perspirationem, imminutum quoque urinæ fluxum prodit, ac utique cachexiam & tumores œdematosos hydro-picos minatur. Quando serum intenso flavo colore tinctum est, ut linteaminis inficiat, biliosa recrementa, aut minus a sanguinis connubio segregari, aut propter obstructos biliosos ductus a lymphaticis vasis refoverbi indicio est. In scorbutu, scabie, cachexia & mensium suppressione, serum plerumque variegatum, lividum atque cœruleum colore monstrat, plus minus turbidum vel albicans, vel tunica pissa, lactea candescente obductum est, & in

ipso coagulo subsidentis grumi & color niger cum bruno intermixto comparant. Si in lue venerea, & scorbutu consummato sanguis emittitur, serum ut plurimum supernat copiosum, limosum ac turbidum. In febribus ardentibus parum serum dimittit, ac ut sæpe spectavi, color est coccineus cum magna spuma. In variolis, morbillis, item acutis & continuis febribus, sanguis fluidissimus comparat, plane non in coagulum concrevens; eo quod vehementi illa intestinacalida morione omnis gelatinosa substantia absorbitur & salinum principium quasi in alcali convertitur, quod omne coagulum arcet. Confirmat hoc *Vesperus* in *hisor. apoplest. 16. in schol.* fidem faciens, se sanguinem in cordis ventriculis & vasis majoribus fluidum, nec post obitum grumescentem, in cadaveribus febre continua defunctorum reperisse.

§. XI.

Et hæc sunt potiora quæ ex sanguinis aspectu probabili conjectura præfigere licet; quæ tamen ita sunt comparatæ, ut ne utiquam universalis sint; sed pro circumstantiarum & individuum ratione discrepent. Jam etiam de diversis modis sanguinem humanum examinandi nonnulla adjicienda. Sunt hi varii, & primo quidem is, quo ejus gravitas specifica respectu aquæ simplicis exploratur. Perficitur hoc instrumento statico, quo ego etiam urinam, lac, salsos & medicatos fontes, ponderare soleo. Tum quidem immitta, sanguini oblongo vitro excepto, lance, pariet, ejus libram, tantundem aquæ pluvialis, unius & dimidiæ tantum uncie pondere, specifica superare gravitate. Alter sanguinem examini subjiciendi modus est, quo proportio solidi & fluidi indagatur, quando nimirum calori exponitur, quo liquecat & in pulverem farificat, quo, uti superius meminimus, constat, tres fluidæ substantiæ partes, & unam solidæ, in sanguine sani hominis contineri.

& H. meso-imbui-
tus.

et non
concord-
ferre.

De ed-
gelato
exami-
ne per
ponde-
rationem

Quid
inducit
ferosus
nitens

ferosus

Utile

§. XII.

*§. XII.
de quo
iudicio
dum in
patina*

Porro solenne mihi est, si iudicium de sanguine ferendum, ut jubeam, quo portio ejus, sive e vena brachii, sive pedis educatur, in patina m, & aliam in aquam immittatur. Is enim qui in patellam effusus, copiam & coagulum sanguinis ac seri exhibet, simulque affusis variis liquoribus chymicis tentari potest. Tum quippe conspiceret licet, quam promte a spiritu acido, salis nempe vel vitrioli, coagulum subeat, qualis consistentia admixto saturato corticis chinæ decocto, eidem inducatur; tum quoque jucundo comparet spectaculo, ab affusis liquoribus alcalinis, fixis & volatilibus, cruorem fluiditatem recipere & rubedinem ejus mirum intendi, quum contra instillata aqua forti, serum lactescente, & cruor gryseo colore, inficiatur. Pariter sæpius experimentum cepi, & nitri pulverem, vel potius ejus solutionem sanguini addidi, ac eundem inde semper fluidiorem redditum, & coccineo colore imbutum vidi, ut hinc satis mirari nequeam paradoxon assertum, quod in clarissimorum virosum scriptis, qui nitri virtutem in morbis summis concelebrant encomiis, me aliquoties legisse memini, sanguinem scilicet a nitro inspissari potius & coagulari.

§. XIII.

*§. XIII.
de quo
iudicio
dum in
patina*

Ex illa vero portione quæ in aquam profilit, variæ sanguinis & seri substantiæ optime cognoscuntur. Nimirum pars sulphurea, quæ matrix coloris est, aquam rubedine inficit, & hac ex tinctura, prout magis vel minus saturata est, copia sulphuris, aut tenuioris, aut crassioris, recte colligitur; ubi tamen notandum, quod quo diutius aqua sanguinolenta in libero aere stet, eo magis color austerus ac brunus reddatur. Deinde hac etiam ratione non solum in conspectum veniunt partes nutritibiles chylosæ, quæ instar flocculorum fundum petere solent, sed sæpius etiam ingens portio gelatinæ, ut manibus eximi possit, quod sæpius con-

spexi in plethoricis sanguineæ complexionis præsertim feminis spongiosi habitus, quibus labor, abstinencia a largiori & lauto cibo, potissimum in cæna, maximo est præsidio. Deniq; hoc modo commodò indagari potest, num sanguis sit fibrosus? hoc est, multis filamentis & quasi fibris carneis repletus, quæ mutuo coeunt & in superficie spatulæ hærent. Talem sæpe vidi in epilepsia, palpitatione cordis, & anxia pectoris oppressione laborantibus, & cer tum polypi, vel præsentis, vel futuri præbet indicium. Quæ ut corrigatur & nota arceatur, sæpe sæpius insigai cum emolumento crebriorem usum medicatorum fontium, præsertim Selteranorum, qui purum alcali vehunt, suasi, interdicendo penitus potum frigidum, spirituosum, crassum & acidum, & injungendo potum dilutum largum, cum motu & exercitio corporis.

§. XIV.

Ultimo loco dum de sanguine educto sermo est, subjungenda adhuc quedam sunt de vulgari usu, sed erronea sententia, ac si sanguis, sub scarificatione per cucurbitulas extractatus, longe tenuior, & fluxilior sit eo, qui e vena brachii vel pedis mittitur. Ego certe sæpius periculum feci, & sanguinem scarificando evocatum sicavi, ac doprehendi, tres pariter tantum fluidi partes aufugisse & quartam resistisse solidam, modo cautio adhucbeat, ne dum spongia madida sanguis abstergitur, & cucurbitulæ eluuntur, aqua cruori admisceatur. Et sane quum unus idemque sanguis per minima & magna vasa feratur, incisus quoque minoribus in cute, idem consistentia & indole, quam qui majoribus effluat, necesse est. Porro etiam non levis sed crassus error est, quem Chirurgi, ut imperitiam velent, de industria sæpe admittunt, dum, si vena minus rite pertusa, sanguis non effluit, cruorem crassum, qui incisionem obstruat, inculant, quum tamen is per exilissimos & capillares innumeros in corpore canales transire possit.

** Idem
§. XIV.
de quo
iudicio
dum in
patina*

*Nec
crassus
effluat
impeditur*

poſſit. Et licet non inſiciendum, a terrore quandoque, præſertim in pedibus, cutem conſtringi & fluxum quodammodo retineri poſſe; remittente tamen ſtriſtura, ſanguis poſtea liberaliter manat, operatione autem ſiniſtre adminiſtrata, plane non effluit.

§. XV.

Galeſi

Et hæc de judicio ex ſanguine brevibus dixiſſe ſufficiat; quæ tamen, quam non ex ſpecieſe inſtruſtatis ſiſtionibus, quas in arte noſtra quam maxime deſectur, ſed ætenta, ſincera atq; multiplici experientia ſcripta ſint: eximio uſui fore iis, qui in artis operibus dextre ac perite verſari nuntur, certiffime conſido. Sæpius autem cum tædio proſecto conſpicio, in libris ſic dictis præcticiſ & ſemioticiſ, citra experientiam, dogmata proferri, quæ veritati minus ſunt conſentanea, atque ex luxuriante imaginatione, vel minimum poſſibili ſpeculatione, ſuunt, quaſi vero omnes morbi ex ſanguinis inſpeſtione cognosci & curandi indicationes inde elici queant.

CAPUT XIII.

De judicio morbi ex urina aliſque excretis riſe ſerendo.

§. I.

Excreta quoque iudicia Medico Arabum

QUum vitalis corporis noſtri conſervatio & omnium ejus functionum integritas, non modo in perenni ſanguinis & humorum circuitu conſiſtat, ſed & maxima ex parte a debito excretionum ſucceſſu dependeat; Medicus utique non tantum ex pulſu, qui genuinus circulationis index eſt, atque etiam ex ipſius ſanguinis aſpectu & ſubtiliori indagine, verum etiam ex iis, quæ quotidie per varia emunctoria foras e corpore ſecedunt & evacuantur, ſtatutum ſani & ordinati, tam morboſi & præternaturalis, ſigna & indicia petere, atque ex iſtis iudicia ac prædictiones formare debet.

Tom. III.

§. II.

Utur autem multa & varia, e corpore ad tuendam valetudinem proſcribantur; nullum tamen eſt, quod magis ſenſibus manifeſtum, & commodius aſpici & tractari poſſit, quam urina. Quo etiam factum eſt, ut ab antiquiſſimis artis noſtræ autoribus, Hippocrate præſertim & Galieno, nulla in ſemioticiſ doctrina tam cumulate & diſuſe in relictis monumentis exeuſſa deprehendatur, ac ea, quæ de urina, & petendis ex ea ſignis, quibus ſanitas & periculum prædici poſſit, tractat. Quin non modo plebem, ſed & alios non indoctos, conſtans tenuit opinio, ex ſolius uring inſpeſtione univerſum corporis & ejus partium internum ſtatum ejusque integritatem, vel vitia, quam optime cognosci poſſe ac detegere qua erronea credulitate, plures ex idiotis & lucripetis Medicaliſtris, ad decipiendum miſerum & ad judicandum ineptum vulgus hodiernum peſſime aburi ſolent. Quia autem multa in Medicorum, tum antiquiorum, tum recentiorum, monumentis tradita proſtant, quæ veritati & experientie minus reſpondent, ratione & fundamento carent, neque intelligi aut explicari poſſunt, plura quoque ad urinam, tam ſani, quam ægroti hominis, penitus cognoscendam deficiunt: utiliſſimum fore duxi, ſi hoc argumentum, in praxi ſitu neceſſarium, paulo curioſiori indagine perquirerem, hanc de urina doctrinam in meliorem & rationalem ordinem redigerem, a conſuſione & obſcuritate liberarem, arque adeo eam magis intelligibilem & explicabilem efficere.

§. III.

Prius vero quam ad præternaturalem urinæ in morbo affectis conſtitutionem atque naturam indagandam accedamus; & reſore exiſtimo, ut urinam ſani hominis, quoad ſuam eſſentiam, elementa, originem & quantitatem, curatioſi examini ſubjiciam. Primo igitur ſciendum eſt, ejus originem & matricem ab aſumtis poſſe

*ſu præ-
miſi a-
rila.*

*Urina ſuper ob-
ſcuritate
ſuavitatis
ſonant.*

K 3 ſi.

simum liquidis esse repetendam, quæ quo majori copia hauriuntur, eo plus lotii reddi perpetuæ est experientia. Deinde & hoc observatum dignum, quantitatem urinæ, in nostris præsertim regionibus, reliquorum, quæ perspiratione, alvo aliisque egestionibus educuntur, quantitatem & pondus excedere. Nam licet secundum *Sanctorii* calculum & assertum, communis fere usque eo invaluerit opinio, materiam quæ distillatione perpetua e cute exit, reliqua omnia excrementa copia superare, atque etiam in Italia & locis præcalidis id fieri non negandum sit: accuratiori tamen, a me etiam instituto examine, in nostris his frigidioribus ad septentrionem magis vergentibus oris, hoc non ita contingere patet. Notavit idem quoque *Jacobus Keil in tentamin. physico med. pag. 173.* qui multa experimenta statica eum in finem adornavit, ac deprehendit: urinam unius diei, vel viginti quatuor horarum, esse duarum librarum & unciarum fere sex; perspirationis autem quotidianæ pondus tantum ad uncias triginta plus una assurgere, & quod per alvum excernitur in uno die, esse communiter ponderis unciarum 5.

§. IV.

Experim. in tentamin. physico med. pag. 173. Ego veritatis cupidus, quæ non ita pridem in proprio corpore eum in finem feci experimenta & quid observarem, fideliter communicabo, quæ certe non sine usu & fructu erunt. Per duas nempe hebdomadas diebus singulis certam potus & ciborum portionem assumpsi, & excurrentem postea urinam ponderavi. Videlicet cerevisiæ Loebejunensis tenuioris, cuius libra teste hydrometere drachmas 5. & dimidiam solidæ materiæ continet, duas quotidie mensuras, quæ minimum quatuor civilium librarum pondus æquant, bibi; deinde mane decocti coffeæ 5. pocula, quorum unumquodque duas capit uncias, adeoque decem uncias sorbillavi; jussulorum pondus in prandio & cœna, decem

ciriter & vini Hungarici in prandio quinque assumpsi uncias, quibus demum accedunt uncie ciriter sex liquidi cum solidis cibis apparatus ingestis: ut adeo subducto calculo, sex minimum liquorum libras corpus quotidie subiisse pateat. Solidorum autem, panis nempe, carniū & obsoniorum pondus, quotidie non facile libram excessit. His ita assumptis, urina interdum & noctu emissæ ad libras quatuor, interdum aliquot uncias plus, interdum minus accessit. Alvi excrementa, aspectu iudice, non facile octo unciarum pondus excesserunt. Adeoque quum ex septem ingestorum libris, per urinam & alvum ciriter libra quatuor & uncie duodecim secesserint, superest pondus librarum duarum cum quatuor uncis, quod corpore non graviore interea facto, per cutis spiracula, halitus oris, mucum narium, faucium & salivam, procul dubio rejectum.

§. V.

Hæc per aliquot hebdomadas capta *Observata tentamin. physico med. pag. 173.* tentamina & eadem quidem fere a me observata, quum in eodem vitæ genere & corporis agilitate mense Decembri domi me continerem: neque tamen dubium est, quin in aliis, pro diversitate temperamentorum, motus & exercitationis, anni etiam temporum, pro diversa quoque qualitate & indole assumptorum, variare possint, adeo, ut vel perspiratio auctior urinæ quantitatem minuatur, vel alvus etiam solutior reliquas omnes excretionem modifcet. Id vero minimum in genere valde verosimile, nostris in regionibus, nisi extraordinariæ aliæ causæ externæ accedant, urinæ copiam in sanis quantitatem materiæ perspirantis superare.

§. VI.

Deinceps ad accuratorem huius doctrinæ notitiam pertinet etiam, ut Medicus perspectrum habeat, quantum solidæ materiæ in libra una lotii sanorum contineatur. Quemadmodum vero ad explorandam specificam

gra-

De
quæritur.
se solidi
le m.
na.

gravitatem fluidorum; five quantitatem solidi in fluido contentiam, nihil apertius est, cylindricitatem hunc in finem artificiose confecti usu; ita etiam Medicus commodissime ejusmodi instrumeto non modo ad contenta liquidorum quæ inogentur, ut cerevisiæ, vini, aquarum & lactis, sed & urinx, uti potest; de quo tamen nemo fere hæcenus cogitavit. Altum enim de ponderatione urinx in scriptis medicis est silentium, ac de ejus quantitate, colore, sedimentis, item aut turbida, vel pellucida sit? sermo duntaxat habetur; quum tamen nihil solidi deglutiamus, cujus partes non quotidie ex malsa sanguinis secedant & cum urina eliminantur: in quo etiam maxima in statu sano & præternaturali deprehenditur diversitas. In genere vero id perpetuè observationis est, quod quo major est in corpore perspiratio & interior calor, quo minus fluidi aquei, quo plus potus spirituosus assumitur & corpus motu agitur, eo gravior semper est urina, levior vicissim, si hæc dicta contraria sunt. Ego itaque per aliquot septimanas memorata victus ratione utens & tempore brumali domi degens sanus ceterum & valens, emissam postea quam surrexissim urinam ad lancem hydrometricam exegi, ac notavi, libram ejusdem minimum unciam dimidiam, interdum etiam drachmas 5. complecti, & facta aliquoties evaporatione, pariter ex libra dimidia drachmas duas, vel dimidiam adhuc, obtinui. Eandem quoque solidæ in urina substantiæ esse quantitatem notavit Antonius de Heyde obs. 89. qui ex urinx uncis tribus per evaporationem drachmam unam materiæ sicce eduxit.

Per ponderationem & assensionem cognoscenda.

Experimenta cum residuo in aqua.

§ VII.

Ut vero porro ad penitiorem & uberio rem materiæ ab evaporatione relicte cognitionem pertingerem, complura institui curiola experimenta, quæ hoc loco recensere haud abs re erit. I. Vel solus aspectus testatum fa-

cit, materiam ex urina restibilem, penitus differre ab ea, quæ exhalata cerevisia restituit, ex quo utique conficitur, liquidum quidem ex potu transire in urinam, sed non solidum, quod magis ortum suum ex humoribus interioribus vitalibus, sanguinis & feri massa, trahit. II. Malsa post urinx exhalationem non facile ad siccitatem constantem deducitur, sed quantumvis arida, in aere tamen liquefit, haud secus quam omnia salia neutra, quibus multæ particule oleosæ sulphuræ admixtæ sunt, ut terra foliata tartari & salia vegetabilium essentialia. III. Drachmæ hujus crammatis affudi unciam unam spiritus vini rectificatissimi, qui promte extraxit tincturam ex bruno-rubicundam, saporis salis paulisper amaricantis, relicto in fundo scrupulo minimum materiæ gryseæ spongiosioris terreæ, quæ nec aqua calida, nec spiritu amplius poterat dissolvi. IV. Essentiam sive potius tincturam hanc in cochleari argenteo ad novæ flammæ candelæ, & post evaporationem remansit instar mellaginis magna salso-amaricans, cui aliquot guttulas olei tartari per deliquium plenius saturati instillavi, & mox odor volatilis urinosus, instar salis ammoniaci, nares feriit. V. Eandem tincturam accendi, & deflagrato primum vini spiritu, postea flamma successit, plane alius coloris atque naturæ, instar ignis, qualis emergere solet, quando oleum destillatum in spiritu vini solvitur, & deflagratione instituta post vini spiritum combustum oleum ardet. VI. Partem magnam ab evaporatione urinx relicti miscui cum oleo tartari per deliquium, & penetrans urinosus, volatilis fœtor mox diffusus est. VII. Eiusdem malsæ nonnihil igne cremavi, & cineres relictæ sunt nigri, qui saporem salis communis linguæ imprimebant. VIII. Cineribus his affudi quicquam aquæ, ut sal in se reciperet, & liquamen instillavi solutione lunæ, unde facta præcipitatio. IX. Alii hu-

jus residui portioni in vitro affudi oleum vitrioli, & vehemens facta est surgescentia & ebullitio, cum denso & albo ascendente vapore, odoris penetrantissimi, qualis solet emergere, quando oleum vitrioli admiscetur sali communi, vel sali ammoniacali, Denique hisce a me institutis tentaminibus addere placet ea, quæ *Barchuseus* adornavit & *in pyro sophia* recenset: uncia nempe sex urinæ sani hominis, destillatione Jederunt uncias 5. & drachmas sex phlegmatis, residui in cucurbita scrupuli 5. & scrupulus semis, ulterius igne rite tractati, salis volatilis drachmam semis, olei empyreumatici scrupulum semis, tantundem salis fixi & terræ grana octodecim præbuerunt.

§. VIII.

Ex hisce commemoratis experimentis facillimum jam erit, genuina urinæ elementa cruere ac siliere. Hæc inter primum & potissimum locum obtinet aqua, quam ex ingesto maxime potu accipit, & cuius partes 30. ad unam partem solidi remixta deprehenduntur. Post humidum urinæ principium commemorandum sal, quod triplex in ea hospitatur, culinare nempe, acidum & volatile. Ex culinare quidem cum alimentis ad massam sanguinis transit, ac per renes, seu congruum salium emunctorium, cum urinoso sero colatur. Quod vero sal urinæ ad communis naturam accedat, ex eo patescit, quod non solum urinæ inspissata cum oleo vitrioli spiritum & vaporem salis communis volatilem in auras erigit, sed etiam lixivium ex cineribus combusti residui cum aqua factum solutionem argenti præcipitem det, itemque per destillationem, quod sæpius a me factum, sal enim culinari in omnibus quoad effectus simile, educi queat. Alterum in urinoso latice comprehensum sal, est acidum, quod etiam per alimenta, quæ multum acidi sovent, in ipsius connubium transit. Hoc autem purum obtemperari nequit, sed partim cum parti-

eulis terreis alcalinis, partim cum tertia salis in urina specie, volatilis nempe urinoso, quale in sanguine largius hospitatur, lese miscet, & salis ammoniacalis genium habet. Hinc enim est, quod addito oleo tartari per deliquium, acidum figurat & spiritus volatilis urinosus avolet, cuius ortus non ex alimentis, sed ex ipsius sanguinis massa derivari debet.

§. IX.

Accedit oleum, quod urina in complexu sovet, duplex iterum, temperata nempe pinguedo. & oleum valde subtile calidum. Illa ex alimentis & chylo, quæ multum pinguis substantiæ complectuntur, ortum trahit, & si largius immixta, non modo innatat urinæ, sed etiam matulæ parietibus adhærescit, ut sæpius fit in nimio æstu, qui pinguedinem colligat; hoc vero valde tenue, evaporabile & inflammabile, ex intestina partium sanguinis sulphurearum agitatione gignitur, & in destillatione oleum empyreumaticum largitur, ac in tincturam redactum, post deslagrationem spiritus vini, instar olei ardet. Quod enim urina ex sanguine recipiat particulas sulphureas, calidas, oleosas, ex eo patet, quia e suaveolentibus oleosis, ut oleo juniperi, ligni sassafras, nucis moschatæ, balsamo de copaiva, urina suaveolentem & quasi violaceum odorem; indicetum vero ac foetidum ab alio, balsamo sulphuris, asæ foetida asquirat. Quartum elementum est ipsa tertia, quæ rursus vel tenuis, valde, vel crassior, & fixior est. Fixior & crassior, cum alimentis, præsertim aqua, quæ semper multum calcaris fixæ terræ continet, corpus subit, ac præcipuum fundamentum tartari qui matulis accrescit, nec non concretionibus calculosis præbet, & instillato oleo vitrioli, effervescentiam suscitatur. Tenuior sanguinis lobeosus est, & cum aqua & oleo pingui mixta, mucilaginem constituit, quæ instar nubeculæ descendens oculis conspicitur, vel etiam, si ejus major quan-

*Oleum
de tart.
refine.*

*Urina
elemf.
ad con-
rione
agnum
& salt.
nem.*

quantitas in fundum secedit, nec vini spiritu, nec vitrioli oleo, solvitur.

§. X.

¶ Color
urinae
nodi?

Color urinae dependet maxime ab oleo calido subtili, quod, quo magis cum salibus miscetur, eo saturatio fit color; eo quod ea omnium salium natura, ut principium sulphureum, quod matrix coloris & odoris est, misceatur exaltando eum intendant. Et licet oleum & terra alias non bene & imitime misceantur; fit tamen hoc in urina, tam cum neutro, quam alcalino volatili. Quamque adeo salinum elementum cum sulphure & oleo intime permixtum sit, patet ratio, quare illud a purissimo vini spiritu, qui consortium puri salis alias respuit, sulphure autem admixto amat, absorbeat, haud secus ac videmus in tinctura sulphuris, scoriarum antimonii & antimonii acris, item quando spiritu vini rectificatissimo nitrum artificiale valde sulphureum, ex aqua forti, & sale ammoniaco, plene solvitur.

§. XI.

U-ina
ignem
feram
differt.

Et hæc omnia ita observantur in urina humana: dispar autem urinae jumentorum est ratio. Ita non semel evaporari jussi urinam vaccinam, quæ reliquit magma valde salinum flavum, amaricantis saporis, cui infusi spiritum vini purissimum & extraxi tincturam flavam, instar bilis amarissimam, eoque facto, remansit sal, cui affudi aquam pluvialem & solutionem filtratam rursus coagulavi, ita obtinui sal tartariforme neutrum, instar salis plantarum essentialis, quod originem suam ducit ex ipsis herbis, quibus vescuntur, nullum vero vestigium fuit salis communis. Ex quo etiam apparet ratio, quare urina vaccina tempore verno collecta, & interius ad aliquot hebdomades, quotidie ad majorem quantitatem ascendendo, pota, sæpius, uti aliquoties Berolini maxime, apud Gallos vidi, mirum effectum in affectibus chronicis, maxime cachecticis, icte-

ro, principio hydropis & mensium suppressione, præstiterit. Discimus etiam exinde, partes in urina sulphureas multum assonitatis habere cum iis, quæ in bile continentur.

§. XII.

Præsi-
gla ex-
urina
sunt
aquis

In conspectum sic ductis genuinis urinae humanæ in statu sano elementis, faciliori nunc & leviori modo in phænomenorum, quæ in lotio agrotantium subinde præsto sunt, meliorem explicationem & notitiam, unde proveniant & quas causas agnoscunt, pervenire poterimus. In quo quidem perficiendo, ordinis & brevitatis causa, observationes, quas in praxi subinde per crebriorem experientiam, annotavi, & quæ regulæ vim habere possunt, proponam & rationes postea subjiciam. Et primum quod attinet ad urinas pondere leves, consistentia, tenues, instar aquæ sæpe pellucidas, eas quam maxime in gravioribus internarum & membranosarum partium spasmodicis, pathematicis hysteriis, hypochondriacis, atrocibus, in cardialgia, affectione calculosa, nephritica, colica convulsiva, apparere, crebriori edocti sumus experientia. Pariter in gravioribus capitis morbis, ejus, nempe doloribus, in vertigine, phrenitide, mania, melancholia, epilepsia, valde tenues & leves emitti urinas, idemridem perpetuæ est observationis. Idem contingit in gravioribus nervosarum partium affectionibus, quæ a caustico veneno, vel a vermibus tunicas intestinorum rodentibus in convulsionibus concitantur. Et quod probe notandum est, tenues & aquosæ ejusmodi urinae non modo in ipso statu & exacerbatione horum morborum predeunt, sed & aliquot dies ante, ac paroxysmos imminentes nunciant. Unde non mirum est, quendam apud *Tulpium lib. 2. obs. 19.* ex tenui lotio, tria quo ante prælagire potuisse cordis palpitationem.

§. XIII.

Tenues quoque, aquosæ & perpetuæ.

Quid
Porten-
det in
febrili

tuo albæ ejusmodi urinæ in diuturnis morbis difficulter judicant & secūræ non sunt; in vigore autem febrium, si copiose fluunt & ante dies criticos, multum alunt periculi & phrenitidem imminentem præfagiunt, teste jam Hippocrate *sect. 2. aph. 22. sect. 4. aph. 70. qui lib. epid. sect. 2.* id confirmat exemplo ægri, qui secundo die surdus, circa meridiem deliravit & quinto die mortuus est, & alius *sect. 3. ibid.* qui quarto die obiit phreniticus. Idem auctor sæpenumero etiam observavit, eandem urinas, si in inflammationibus gravioribus internis, uteri, pulmonum, ventriculi comparent, nunquam periculi esse expertes, præsertim si creber stimulus sit ad matulam & copiosissimæ ac tenues reddantur. Nam dilutæ ejusmodi aquosæ, pondere leves, omnis sedimenti expertes & quæ paucillum solidi habent urinæ, a nimium per spasticas stricturas coarctatis & angustatis ductibus renum secretoriis & excretoriis proveniunt, & luculentum totius generis nervosi spasmis affecti testimonium sequunt, quum lege consortii & consensionis, renes etiam & ductus urinosi simul compatiuntur. Albæ autem prodeunt spasmis & pellucidæ hanc maxime ob causam, quod strictiores tubuli, plerumque nonnisi id quod valde tenue est & diametro canaliculorum respondet, admittunt, unde crassæ & sulphuræ moleculæ remanent. Et copiosæ ut plurimum profluunt, quia in affectibus spasmodicis, ob tubulos subcutaneos contractos, parum humidi perspirat, sed ad renes eo copiosius fertur ac urinæ insinuat. Quod vero in acutis morbis ejusmodi tenues & aquosæ urinæ inflammationem, vel jam præsentem, vel cetero futuram, in ventriculo aut capite, subindicent, hæc subest ratio: quia ob spasticas stricturas, sanguinis impetus urgetur ad interiora ac superiora, quo fit, ut is in tunicis cerebri & ventriculi, præsertim viribus jam fractis, firmius impactus subsistat & inflam-

Debat
spasmi

mationes præcipitis periculi pariat.

§. XIV.

Monendum tamen est, quod tenues, aquæ, plus minus turbidæ urinæ, non semper a spasmis ortum trahant, sed aliam etiam agnoscant causam, & vel vires valde fractas, vel partium sulphurearum in sanguine, a quibus & eorum motu calor & spirituscentia dependet, defectum, vel vim ventriculi digestricem imbecilem, vel etiam sanguificationem læsam & copiam crudatam, tam in primis viis, quam massâ sanguinis admixtarum, prodant. Quare qui novissime a morbo diuturniori convalescent, v. c. a dysenteria, a febre acuta exanthematica, morbo Hungarico variolis, si nimium præsertim indulgent appetentia ex defectu caloris & spirituscentiæ in fluidis, facile multas colligunt cruditates aqueas, quæ quum minus comode per cutem diffilari possint, subsistunt, intus remanent & per urinam secedunt. Et hæc utique est ratio, quod etiam in cachexia, leuco-phlegmatia, enormibus hæmorrhagiis, in principio anasaræ, in chlorosi virginum, in mensium suppressione, tales urinæ crudæ, turbidæ, pallidæ, subviridis, vel tenuis-citrini coloris, copiose mingantur. Notavit hoc jam Hippocrates, quæ ejusmodi urinas tenues & aqueas spleneticas appellat, quia in iis, quibus facies coloris luridi est & lien laborat, obtervantur. In fluore quoque mulierum albo, qui soboles ut plurimum cachexiæ & mensium suppressionum, plerumque urinæ etiam pallidæ & turbidæ, quandoque cum sedimento squamarum insit visitur.

§. XV.

Porro in omni calore præter naturam aucto & æstu febrili, urinæ pauciores & coloratiores, flavo & rubro colore plus minus saturato tinctæ, profluunt, eo quod internus accensus calor, partes sanguinis sulphureas, a quibus color, valde exaltat, augeat

Altitudo
causæ.

Urinas
in febrili
in sedimen-
to
modo

& hu-

& humidum insensibiliter consumit ac dissipat. Tales urinæ febricitantium plus minus rubicundæ, vel tenues & leves, vel crassæ & pondere graves, tam in intermittentibus, quam etiam continuis, manant. Scilicet ipso in paroxysmo, sive motuum febrilium, & intermittentium, & continuarum, exacerbatione atque vigore, urinæ redduntur tenues, perspicuæ, sine sedimento, ubi obvium est in tertiana continuæ aut intermittētis paroxysmo, in ardente, item cholericæ febre, ubi ordinatio urinæ pellucidæ, sed flammeo colore, qualis in destillatione spiritus nitri apparet, tinctæ conspiciuntur. In intermittētib; vero, aliquot horis post intermissiōnem & die a febre vacuo crassiores secedunt, & quam facile, si quiescunt, vel levi tantum frigori exponuntur, sedimentum dimittunt, quod etiam si sit in febribus continuis, circa dies præsertim criticos, febrem solutam & salutem portendit.

§. XVI.

Hoc sedimentum pro copia & diversa conditione ac temperie partium in sanguine, parcius vel copiosius, & differentis quoque coloris esse solet. Si colore est roseus & purpureus, sanguinis copia peccare, ut obvium in febribus synochis sive continentibus, indicio est. Quando sedimentum intense flavum, bilem, fusci autem coloris & atrii, copiam bilis atræ, sive secundum Recentiorum explicandi modum, copiosas sulphurea calidas particulas, acido terreis intime per calorem immixtas designat, quale in febre scorbutica purpurata, in quartana etiam, minus fausti est ominis. Si id quod subsidet admodum copiosum, magnam viscidorum & crudorum humorum copiam in corpore prodit, atque in corporibus repletis, obesis, spongiosioris habitus, febris intermittētis pertinaciam portendit. Et recte hinc scribit Galenus lib. 1. de cris. cap. 12. qui ex otio & repletione febricitant, si sanitati restitui

debent, necessario in urina subsidet.

§. XVII.

Quemadmodum vero boni ominis signum, si urinæ febricitantium crassiores sunt & sedimentum ponunt: ita contra quæ in febribus intermittētib; extra paroxysmum nullam exhibent subsidentiam & pellucidæ diu stillat, nec frigoris accessu in fundum quid deiciunt, pejoris sunt notæ. Inprimis crebriori experientia compertum habeo, quando in tertiana vel quartana febre, finito paroxysmo, urina non turbatur & crassamentum rejicit, pessimi esse prælagi, præsertim si ab imperitis Medicis improvide tractetur iis remediis, quæ motus febriles interpestive supprimunt & sufflamant. Non semel enim sed aliquoties hac ratione in pueris ingruente paroxysmo lethalem epilepticum insultum accessisse vidi: senes autem non facile convalescunt, sed demum viribus fractis, sub frigore & spasmis, nullo succedente calore intereunt. Quod si porro in febribus inflammatoris pleuritide, peripneumonia, inflammatione ventriculi, meleniterii, uteri, urina vel tenuis perspicua & purpurei coloris, vel bruno & austero colore imbuta exit, cum spuma, sine omni sedimento, non faustum præbet signum. Antiquissimum hanc in rem Hippocratis est testimonium prænot. §. 11. ita differentis: si in febribus urina flava est & tenuis, materiam incoctam significat, si vero diuturna fuerit talis, periculum est, ut homo sustinere possit, nisi concocta fuerit. Pariter id etiam perpetuum est, turbidam in febre continua urinam, quæ nec igne, nec quiete clarescit, aut sedimentum ponit, multum periculi minari; malum tamen etiam est indicium, quando in continuis urinæ primis diebus crassescunt, reliquis vero & maxime criticis, tenues & sine sedimento manant.

§. XVIII.

Ratio vero quare in febribus æstuo-

Si enim
sem se-
dimen-
tum
malum
omne.

Tota pa-
roxyfma
subsidi-
ant.

Sedimentum
quid
inducit

Cor
per
malum

vis urinx claræ tam ancipitis & periculi pleni omnis, contra quæ multum coctæ materiz deponunt in fundum salutiferæ putentur, in procinctu est. Nam tenues ejusmodi & ruse urinx magnum æstum & vehementem partium internam agitationem, simul etiam solidarum & nervosarum partium spasticam ingentem affectionem significant, quæ spasmodorum diuturnitas atque vehementia multum certe periculi alit. Crassior vero urina si prodit, certum præbet signum, spasmum tam nervosarum, quam vasculosarum partium, vehementiam remittere, ampliari ductus secretorios & excretorios & excrementa crassioris substantiæ transmittere, quo fit, ut non solum urina cum sedimento copiosior fluat, sed & totum corpus æquabiliter sudore idemtidem crasso, fetido ac viscido perfundatur & alvus antea adstricta solutior fiat. Ex quo quidem dilucide patet, multum interesse, ut Medicus critica illa in morbis tempora, quæ Veteribus coctionis dicuntur, ex urinx inspectione cognoscat, & sic cum certa ratione verax de morbi eventu iudicium interponere queat.

§. XIX.

In declinatione febrium catarrhalium, item variolarum & morbillorum, urinx in vigore morbi & febre pellucidæ & aquosæ, crassiores etiam & coloratiores cum sedimento secedunt, certo indicio, morbum, idest spasticas constrictiones partium, solvi atque remittere, ut ductibus urinariis iterum patulis redditis, impuritates salinæ sulphureæ viscidæ seri, quæ ipso morbi tempore progenitæ, liberum jam habeant ingressum atque exitum. Quandocunque vero post phthisicum aut alium vehementem ac diuturnum morbum, urina diutius fertur crassa, pauca, saturata & obscure rubra, cum copioso sedimento, pinguedo supernatans vitri urinarii parietibus adhærescit corpusque interea tabescit; morbum in febrem

lentam & hæticam concessisse testatur, qua rarissime æger servatur, eo quod corrupta ex læso viscere materia sanguini & lymphæ intimius nupta, instar fermenti motu instestino calido mixtionem & crasin sanguinis temperatam dissolvit, & optimum etiam alibilem succum in excrementis falso-sulphureas sordes convertit, simulque pinguedinem corporis colligat. Idem metuendum periculum, quando in hydropicis urina hæticorum similis profuit. Nam parcum ejus stillicidium, lympham ex ruptis vasculis lymphaticis in cavitatem vel porosam partium substantiam secedere, & color obscure rubicundus crassiusque sedimentum, partim motum intestinum calidum sanguinem dissolutorium, partim etiam obstructum hepatis emunctorium, quo sordes biliosæ separari solent, arguit.

§. XX.

Dantur tamen etiam in morbis chronicis, citra febrem & calorem internum auctum, urinx crassiores, valde saturato colore rubicundo bruno tinctæ, pondere admodum graves, adeo ut interdum libra una, teste cylindro statico & evaporatione, uncias tres, vel quatuor, solidescens materiz in complexu foveat. Obvium hoc est quam maxime in scorbutico confirmato, in arthritide & paralyti scorbutica, senectute extrema, quandoque etiam in passione nephritica, conquiescentibus dolorum tormentis, nec non in istero novo & atro. Læsam autem in ejusmodi urina esse proportionem elementi aquosi & salino-sulphurei, exinde patet, quod asfusa sufficienti aquæ solius simplicis copia, ad naturalem tincturam reduci possit. Crassities quippe & color ille fuscus ab excrementarum salinarum & sulphurearum partium in sanguinis & humorum massa hospitantium copia, orium trahit, quæ propter hepatis obstructionem, a jecorum vitalium connubio non rite segregantur. Nam jecoris viscus,

Urina
crassa
fusa
fusa

In scorbutico

In declinatione febrium catarrhalium

Urina diutius fertur crassa

eum in omnibus chronicis morbis, tum maxime in scorbuto patitur, ut etiam *VVillifus in tr. de febribus* fide-
dem faciat: se plurima scorbuto de-
functorum cadavera secuisse, & ob-
servasse, quod in culpa fuerit in non-
nullis hepar prorsus exsangue & instar
uberis vaccini exsuccum, in aliis ve-
fica biliaria, aut vacua, aut lapidi-
bus obfessa, aut amurca minime a-
marefcente repleta.

§. XXI.

1740 Quando porro ejusmodi crassiores.
1740 mirum aulteri coloris urinæ, (*uvie*
1740 *dickes braunes Bier*) crocea tinctura
immersa linteamina inficiunt, cer-
tum est indicium, bilem propter ob-
structos, vel spasmo contrictos du-
ctus hepaticos & cysticos & denega-
tum in duodenum influxum, per vasa
lymphatica regurgitare ad sanguinis
& lymphæ massam, & iterum adefe-
re. Ubi vero color in atro-brunum
vergit, iterum designat nigrum,
qui non tam a bile refluus, quam po-
tius ab ejus secretionem in hepate plane
impedita nascitur. Nigredo autem
acido admixto tribuenda; eo quod ob
defectum bilis, quæ alcalino suo ele-
mento, acorem, qui ingestis inest,
temperat atque obrundit, succi ace-
tosi ad sanguinis massam transeunt,
ibique sulphureis, oleosis ac biliosis
particulis unitæ, atrum excludunt
colorem, haud secus ac videmus, acido
liquore bili affuso, post digestio-
nem eandem primam viridescere ac
deinde nigrescere. Quumque in pro-
vectiori senectute, ob angustationem,
contractionem & collapsum tubulo-
rum excretoriorum in hepate, nec
non in cute, multæ salinæ sulphuræ
& viscidæ sordes, retineantur: urinæ
solenniter in ætate gravibus cras-
siores, graviores magisque tinctæ
redduntur, præsertim si paullo libe-
ralius vino utantur, in primis spirituo-
so, ut Hungarico, quod oleosum est
multum atque sulphureum.

§. XXII.

Nonnunquam redduntur urinæ co-

piosa materia pingui imbutæ, sive
oleosæ, quæ sine strepitu mittuntur. *Quid tm
dicitur
oleosa?*
in superficie cutem variegati maxime
cærulei plerumque coloris exhibent,
ac vitri urinalis parietibus tam firmi-
ter adhaerescunt, ut nonnisi lixivioso
liquore detergi possint. Origo harum
procul dubio calori interno nimio,
ipsam pinguedinem colliganti tri-
buenda, quæ liquefacta, & postea in
sanguinem recepta, sese miscet cum
sanguine & sero, ac humore salso mu-
riatico deum dissoluta, per renum
colatorium in urinam deservit. An-
notavit *Sylvius* exemplum semine
juvenculæ, cujus urinæ tam copiosa
innatavit pinguedo, ut in perfrigera-
tæ superficie butyri instar aut olei fri-
gidi concreti comparuerit. Et me-
morabilis quoque est *Fernelii lib. 3.
cap. 2. de urina* historia, de bibulo
quodam optimi corporis habitus, qui
diebus circiter octo, ex ingenti cor-
poris mole ad summam gracilitatem,
circa ullam morbi vim, traductus est.
Potissimum tamen tales pinguiusculæ
urinæ in consumptione corporis, atro-
phia, phthisi, hæctica observantur;
quinimmo in omnibus febribus, uri-
næ quando profluunt crassioris sub-
stantiæ, multum pinguedinis secum
evehunt, quæ eo copiosior est & diu-
tius durat, quo corpus est pinguius.

§. XXIII.

Supra quoque cum de analysi urinæ *Tartar*
naturalis actum fuit, mentio facta
est, quod sal acidum cum alcali, sive
volatili, sive fixo mixtum, sive neu-
trum & tartariforme, ordinarium sit
urinæ ingrediens, quod dubio procul
ab excessivo acido per alimenta inges-
to & in sanguine contento, oriatur.
Hæc autem tale tartareo si urinæ ni-
mium refertæ sunt, quod cognoscitur,
quando matulæ parietes & fundus co-
pioso tartaro incrustantur, indicium
est dispositionis ad calculum renum &
vesicæ. Majoris periculi est, ubi
crassum, rubrum & triabile sabulum,
mox emissa urina, fundum petit, *salute
sc.*
quippe quod morbum nephriticum
adefse

adesse plane evincit. De quo luculentum Hippocratis suffragium aph. 79.

Sect. 4. quibus perhibentis, in urina subsident fabulosa, in vesica calculo

com. 117. laborat. Interdum quoque crystalli micantes fulvæ copiosæ sese apponunt lateribus matulæ, quæ doloris arthritici, rheumatici, plus minus fixi vel vagi, indicium præbent.

pa. 117.
sc. 120.
st. 120.
sc. 120.

Quando urina mingitur mox cruenta, mox ob puris miscela lactescens, interdum glutinosa, crassa tenaci materia mali odoris onusta, quæ fundo adhæret, nec vitri agitatione dissolvitur, certum exulcerationis renum vel vesicæ documentum præbet. Quin ipse in calculo & ulcere vesicæ sæpius lotium tam tenax vidi, ut instar albuminis ovi cohereret, nec guttatim aut per vices potuerit effundi, sed inclinata matula, omne simul massæ instar elapsum sit. Eandem quoque in rem facit notabilis observatio, in M. N. C. Dec. 3. A. 8. obs. 11. consignata, de urina crassa glutinosa, quæ ad ulnæ longitudinem potuit extendi, & filtro imposita, ne guttulam transmissit.

§. XXIV.

In gonorrhea, præsertim chronica & maligna, non solum prostratæ, sed plerumque vesica etiam exulcerationem patiuntur, unde urinæ turbida & crassa, vix Kraus-Lake, emittuntur, quæ sedi mentum copiosum rejiciunt mucosum, quod exsiccatum & carbonibus injectum, fetidissimum odorem spargit. Alias semen purum, propter levitatem, urinæ innotat. Pariter sæpissime in calculo vesicæ, hæc ipsa vel ejus sphincter erosus est, ac tum urina crassa fursuracea mingitur, cum exiguis carunculis & fibrillis, quæ a vulgo pro verminibus habentur, id quod confirmat Hippocrates sect. 4. aphor. 66. 67. quibus, in quibus, in urina crassa existens, caruncula, aut veluti capilli, aut fursuracea quedam, singul exerunt, hæc vesica scabie laborat. In stranguria crebrius ad mingendum est stimulus,

pham.
gula.

sed parum mittitur, idque turbidum, valde fassam & acre, cum filamentis, identidem fundum petentibus, & tum sphincter plerumque spasmodici quippiam patitur. Si sanguis lotio est admixtus, instar loturæ carnis, seu vini rubri comparet, sed postea cruerima petit, & purpureum colorem, quando ex renibus, atro fuscum vero, ubi ex adaptis vesicæ venis prodiit, refert. Talem sanguinolentam urinam in sene vegeto octogenario, qui jugiter dolore pressorium in regione pubis sentiebat, quæviscunque equitabat, vidi.

§. XXV.

Ex hisce quæ jam attulimus, li-
quido elucescere arbitror, utrosco-
piam & uromantiam haud exiguæ
utilitatis esse in praxi medica, nec
ceu inutilem & fallacem floccipen-
dendam, multo minus despectui ha-
bendam, eo quod non modo fluido-
rum, sed & solidorum conditio, ha-
bitus & status hoc ipso adminiculo
perspicui potest ac erui. Nam ex urina
levi ac tenui, præternaturaliter &
spasmodice affectum esse nervosarum
partium systema patet; ex crassiori
vero & ponderosa, ductum utripario-
rum nimis relaxatus tonus, seu at-
onia elucescit. Deinceps hoc subsidio
depravatam esse sanguinis mixtio-
nem, sive ejus dyscrasiam & impura-
rum salino-sulphurearum partium co-
piam, optime cognoscimus maxime
in morbis chronicis & qui a cacochy-
mia nascuntur. Porro viscerum san-
guinis depurationi inservientium, præ-
sertim hepatis, constitutionem lo-
tium prodit. Tum proportio & vin-
culum seri ac sanguinis, quale sit in
morbis, sive acutis, sive chronicis,
inde elici potest. Præterea gradus in-
terni caloris, sive intestinæ partium
sanguinis sulphurearum commotionis,
hac ratione paullo clarius, præsertim
in æstu febrili, dignoscitur. Defec-
tum quoque caloris naturalis, virium
ac spiritualentiæ, quæ ad digestio-
nem ingestorum & mutationem in
suc-

et mi-
sta a
sato.

Uroman-
tia utri-
usque in
partem
logica.

succum & sanguinem necessariæ sunt, inspecta urina quadantenus comperimus. Maxime vero urinx solentiori consideratione & examine viarum & ductuum urinariorum ac seminalium, ut renum, uretherum, vesicæ, ejus sphincteris, urethræ, vesicularum seminalium & prostratarum dispositio ac constitutio manifestatur. Neque minus in febribus, tam continuis, quam intermittentibus, urinx inspectio eximio pollet usu, eo quod ex hac non caeco massa sanguineæ conditio, sed & an materia febrilis cocta vel incocta sit? an crisis morbi completa vel incompleta? qualis spes valetudinis? num funesti quippiam imminet? an recidivæ vel alius morbi metus? planum fit ac innotescit.

§. XXVI.

*Esse-
rap-
stis.* Tandem urinx etiam consideratio in therapeuticis haud spernendam præstat usum. Quia enim vera pathologia sive exquisitorum cognitio status morbi, quem uroscopia patefacit, basis est rationalis therapix: multum utique adjumenti ad hanc dextre suscipiendam ac perficiendam illa afferre videtur. Et aquosa quidem urinarum tenuitas, si præsto est, probe inquirendum, num a spasmis? an vero defectu virium & spiritus ascensæ ortum trahat? Ubi hoc, spirituosus, analepticus, balsamicus, aromaticus, quæ balsamum sanguini foverant, adhibenda; si illud, fugienda sunt hæc, & potius leniora diaphoretica cum antispasmodicis, nitrosis, cinnabarinis permixta locum inveniunt. Quando paxo in febribus intermittentibus tenuis, levis, & flammeo colore apparent, nihilque deponunt, a cortice chinæ & quæ parum cum ipso, maxime conspiciendi & febrilis motus suppressendi facultatem habent, penitus abstinendum est, quorum usus, quam urinx crassiores secedunt, prævia evacuatione alvina, inutilis est. Intensiores urinx colorem in febribus, humectantia, acicula nitrosa exposcere, quisque judi-

cabit; crassas vero & rubicundissimas citra calorem in affectibus chronicis minguntur, diluentia, inque primis emunctiorum tubulos obstructos referantia, aquarum mineralium, acidularum thermalium & martiatarum convenientem, nec non feri lactis dulcis usum, exigere. Ubi ex viarum urinariorum vel spermaticarum vitio urinx turbide, & larga crassa mucosa tartarea substantia forte redduntur, nil præsentius & efficacius est fontibus medicatis temperatioribus, ut aquis Spadanis, Wildungensibus, Selteranis, theriacis, Piperanis & Emfensibus, ad eluendas ac detergendas sordes, acrimoniam diluendam & partes afflictas consolidandas, adjunctis simul exterius balneis temperatis. Calculosa tartarea concrementa & mucidum ex ulcerata renum substantia prodians lotium, apertius omnium efficaciter diureticorum, salinorum, ipsarum quoque Carolinarum, quæ propter calcareum salinum elementum fortiter nimis pellunt, usum interdiciunt, & potius traumatica, leniter roborantia & demulcentia injungunt, ut sunt emulsiões seminum quatuor frigidorum, dauci cum lycopodio, infusa vel decocta ex hedera terrestri, equiseti, virga aurea, fragaria, veronica, radice altheæ, aliisque id genus pluribus.

§. XXVII.

At vero non solum ex urina, sed etiam ex aliis excretis, inter quæ *Esse-
rap-
stis.* subtiles excretionis cuticularis sordes potissimum fere locum tenent, de statu integro, nec non vitiatu, ac præcipue de salutari, vel insaluto morborum eventu, Medicus tanquam ex certis signis indicium petere debet. Veteres ut refert Jo. Langius in epist. tam in cognoscendis, quam judicandis morbis, plus sudoris calorem, odorem & saporem, quam lotii differentias observarunt: quare etiam moris fuit, sudores in balneo strigili exceptos & olfacere & degustare

Nare. Sudor enim, ut *Galenus de salubr.* ait omnium humorum per universam corporis compagem index est: urina vero tantum eorum, quæ in conceptaculis venarum continentur. Neque hæc assertio fundamento destituit. Nam urina potissimum potui, cui etiam proportionalis est, materiam debet; & crassiores aqueas; & maxime varii generis salinas, quæ per alimenta assumptæ fuerunt, atque in ipso sanguine progenitæ sunt, recrementitias materias e corpore evehit; quandoquidem renes & vix urinariæ congruum salium emunctorium constituunt, quin omnis generis salia, sive alcalina, sive acidia, sive neutra, volatilia, sive fixa fuerint, vel etiam caustica, item nitrosa, singulari plane ratione ad renale illud vasculolum cribrum feruntur, & urinam quoque movendi facultate pollent. Per fibrosam vero ac poroso-rubulosam cutis. restatur, corpus magis a partibus aqueis tenuioribus, & maxime sulphureis, sub forma vaporis, vel madoris; expurgatur.

§. XXVIII.

Perpirationis & sudoris differentia

Diligenter tamen hoc loco observandum est: ingentem inter perspirationem & sudorem intercedere differentiam. Scilicet perspiratione, insensibilis halituum e corporis cortice succedit diffusio, adeoque tantummodo particulæ tenuissimæ aqueæ & sulphureæ salinæ magna quotidie in copia in auras mittuntur, linteaminibus corpori circumvolutis siccis remanentibus: in sudore vero particulæ aqueæ & sulphureæ magis crassiores, peculiaris saporis & odoris, vel fetoris prodeunt, quæ cutem & indusia conspiciunt humectant, adeo, ut interulæ interdum post sudorem quinque vel sex uncias gravesiores quam aqua deprehendantur, quum contra in perspiratione pondus indusii per hebdomadam gestati vix uncia una crescat, ob materiam mucidam oleosam crassiorem in poris obhærescentem. Deinde observamus, perspira-

tionem in robusto, sudorem vicissim magis in imbecilli corpore fieri, & plus etiam materię excrementitiæ illa, quam hoc excludi, ut hinc probe notante *Sanctorio* in aureo de *Medicina statica* libello, corpus a perspiratione longe agilius & levius, a sudatione vero debilius & gravius redatur. Porro saluberrima illa minus in sensus cadens sordium per corticem corporis excretio magis a vegetiori sanguinis progressivo motu & circulo & vigore motus cordis & arteriarum oboritur: sudor autem potius a calore & motu intestino partium sulphurearum, quæ in mixtione sanguinis continentur, & a fibrarum & tubulorum cutaneorum majori relaxatione, provenit. Tum frequenti constat observatione, sub constitutione aeris sicca & ventis ex euro & borea flantibus, expansiva elastica reddita, & scandente altius in barometro argento vivo, insensibiles in corpore perspirationem quam maxime vigere: contra vero sub aere levi & rarefacto, humido, flante potissimum zephyro & austro, nec non lapsu mercurii, corpus ad sudationem mirum dispositum esse. Quin ipse multiplex observatio confirmatum habeo, quod sub debilitate, a morbo potissimum relicta, & atmosphæra existente admodum levi, humida & pluviosa, sudores ex cutis tubulis largiter profuant, cum urina simul crassiore, multum sedimenti ponente; indusia autem per mutationem ventorum e contraria plaga spirantium, aeri alia constitutione, protinus sudores resciscuntur & cohibeantur, urina quoque largior & tenuior secedat, corpusque longe agilius, somnus quietior, animus ad labores magis dispositus & erectior reddatur. Ex quo satis clare intelligitur, tam insignem atque conspicuam esse fluidi aerei & ætherei ad mutandos excretorios in corpore motus potentiam, ut supervacaneum & sterile molimen foret, ad occultum quoddam & vere imaginarium principium

cupium motus in corpore, in explandis hisce phænomenis, tanquam ad asylum confugere.

§. XXIX.

*Sudoris materia sulphurea tan-
delle est*
Hæc autem materia, quæ subcutaneos tubules ex intimis corporis penetralibus foras amandatur, quod valde sulphureæ naturæ, & cutis præcipuum sulphuris excrementitii, haud secus quam renes salini excrementi, sit emunctorium, plura evincunt. Etenim sudor peculiarem & odorem, & colorem, & pinguedinosam quoque substantiam, quæ phænomena, secundum Chymicorum doctrinam, principii sulphurei foboles sunt, exhibere solet. Et mirum certe, quam eximie effluvia, quæ e corpore halant, immo etiam ipse sudor pro ratione ætatum, temperamentorum & ingessorum, differant. Nimirum qui alio & cepis frequenter utuntur, insectum dispergunt odorem, contra vero quibus suaveolentia balsamica, item moschus & ambra, in frequentiori usu, gratum spirant. Sic etiam odor sudoris ratione anni tempestatem discrepat, ac æstate potissimum acidum, sæpe instar aceti vini penetrantis, redolet. peculiarem quoque sudor in nonnullis morbis & specificam quasi obtinet nidorem, ut in scabie, lue venerea, variolis, morbillis & maxime omnium purpura, adeo ut vel solo odore, ægrotantes ejus præsentiam dignoscere queant. Quod quidem quemadmodum de odore in proptulo est, ita pariter observationibus constat, quod sudor industria vario colore tingere soleat. Placet in hujus confirmationem quædam in *Miscellaneis naturæ curiosorum* consignata recentere exempla, dum

Dec. 1. An. 6. pag. 20. attri Dec. 2. An. 3. pag. 83. sub axillis miniati An. 4. pag. 203. cærulei An. 6. pag. 45. cruenti An. 4. pag. 329. crocei. An. 6. pag. 5. rubicandi, pag. 29. viridis, Dec. 1. An. 6. & 7. pag. 110. lutei sudoris, mentionem injiciunt.

§. XXX.

Sudor quoque varius & quoad loca differt etiam
Maxime omnium tamen illud notatu dignum, quod sudor non unius ejusdemque naturæ ubique e corpore manet, sed pro diversitate partium varius. Ita specifiçi odoris est, qui profluit ex capillitis, & peculiaris odor percipitur, quando regio pone aures digito asperius fricatur. Sub axillis graveolens sæpe offenditur ex sudore nidor, nec non in inguine, item in scroto & osse sacro gravem & discrepantem spirat pædorem, qui adhuc differt ab eo, qui inter digitorum pedum interititia prodit. Ipse quoque sudor copiosior in una, quam in altera corporis regione manat. Nam in partibus superioribus, ut capite, collo, dorso & pectore, item in posterioribus liberalius, parcius vero in inferioribus & anterioribus, erumpit. Jam quidem mirum videri posset, qui ex uno fonte & materia, sanguis nempe sinu, tam diversus & alius sudor secedat; sed mirari desinet, qui considerabit, ita comparatam esse corporis ubique machinam, ut vel viginti, quos facile numerare liceret, diversæ indolis, qualitatis & virtutis succi utiles atque inutiles, ex una sanguinis massa, discernantur & excernantur: haud secus ac in nutritione vegetabilium, ex sola aqua pluviali, pinguiuscula terrestri materia facta, diversæ formæ, saporis, coloris, virtutis, consistentiæ germina, ut folia, cortices, flores, fructus, succi, gummata generantur ac producuntur. Quod mirabile naturæ tam in regno vegetantium quam animantium negotium, non ut quidam somniant, spiritui peculiari architectonico, plastico; aut alii omnia morahiter & rationaliter dirigenti, vel peculiari partium virtuti attractrici, splendidis certæ ignorantiz terminis, in acceptis ferendum, sed a sola diversa mechanica structura, flexura, magnitudine & figura minimorum tubulorum, quæ apparet maxime in glandulis, duci ac derivari debet.

bet. Neque ea propter est quod dubitemus, quin sola tubulorum structura & ductu, ita motus fluidorum dirigantur, ut crassus, mixtio & unio partium corpus constituentium mutetur ac invertatur, & ex emergente inde nova combinatione & unione partium, alius formæ virtutis & qualitatis substantiæ gignantur.

§. XXXI.

*Sudoris
caus-
sa
intesti-
na fan-
guinis
commo-
tio.*

Jam si porro in causam sudoris & largioris & frequentioris, sive præternaturalis, inquirimus, illa duplex merito asserenda. Prima est partium sulphurearum, quæ mixtionem sanguinis ingrediuntur, intestina valde agitata commotio & evolutio, quæ ipsa massa sanguinis & feri tandem in excrementitium salino-sulphureum humorem dissolvi incipit. Altera est tubulorum subcutaneorum nimia relaxatio, sub qua humores serosi facile secedunt a crassioribus sanguineis, ac sensim protrusi eliminantur. Quibus jam politis, facile apparebit ratio, quare omnia ea, quæ ad intestinum partium sanguinis sulphurearum motum augendum faciunt, ad sudorem movendum aptissima sint. Horum in numerum referenda cholericæ corporis constitutio, ætas juvenilis, macilentus corporis habitus, tempus æstivum, paullo vehementior corporis motus, aer calido humidus australis, vini, præsertim oleosi & spirituosius, ut Hungarici, potus & medicamenta, quæ oleo subtilissimo evaporabili imbuta sunt, quo nomine nota sunt ex vegetabilibus radix enulæ, petasitidis, ostrutii, levistici, angelicæ, imperatoris, crocus, flores sambuci, ex animantibus, omnes spiritus & olea destillata, ex mineralium classe flores & lac sulphuris, regulus antimonii medicinalis sulphur antimonii, nostro modo præparatum & fixatum. Vicissim in procinctu quoque erit ratio: quare infantes, senes, obesi, humoribus repleti, otio & somno nimium indulgentes, parum ad sudorem dispositi sint, quippe qui spissos

non modo & viscidos in vasis humores, qui difficiliter per minimos cutis tubulos feruntur, alunt, sed & imminutam partium sulphurearum in sanguine experiuntur intestinam agitationem.

§. XXXII.

*Et cau-
sa de-
positio
sunt.*

Requiritur vero etiam ad prolificendum sudorem certa dispositio in cute, quæ consistit in convenienti ejus relaxatione & pororum ac tubulorum aperture, ut sudoris materia sufficienter adduci & secerni queat. Nam si in ulla corporis parte vis expansiva & elastica eminens est, certe in ipsa cute conspicitur, quæ, ut gravidæ & hydropici testantur, mirum sese inducere atque expandere, iterumque in priusnam dimensionem contrahere potest. Et elastica hæc cuti propria virtus non aliter quam in omnibus inanimatis elasticis corporibus, ut chordis, funibus, tabulis ligneis, comparata est, ac non modo pro diversa aeris constitutione, at humidæ & levis, remittitur, siccæ vero & frigidi iterum adducitur, sed & a causis internis, fluidi tenuissimi, quod est in sanguine ac nervis, motu, varie in relaxatione & constrictione modificatur. Hinc enim est, quod in omnibus gravioribus doloribus, in affectibus spasmodicis, ira, nimio sanguinis fervore; cutis plane siccæ, aspera & arida ostendatur, adeo ut facilius sit e pumice aquam, quam ex ejusmodi corpore sudorem elicere. Secus vicissim fit & facillima ad sudorem proclivitas, in declinatione paroxysmorum febrilium, spasticorum, item in imbecillitate virium a morbis resistente, ab atmosphæra humida & calida, pluviosa, balneo vaporoso, vel a medicamentis, quæ dolores ac spasmos sistunt ac sedant, ut nitrosis papaveraceis assumptis, prælo est, eo quod hæc omnia mirifice relaxant & ampliant cutis poros ac tubulos. Quin diuturnus etiam animi moeror peculiarem hunc pariter exerit effectum, quod cutis, præsertim pedibus inducitur, tonum solvat

solvat ac remissorem reddat, ut hinc, quod sæpius observavimus, sudore largiter diffusant.

§. XXXIII.

Sudores boni omnino quilibet. Postquam igitur eausas, viam & modum, quo cuticularis excretio perficitur, paulo curatius pervestigavimus; haud difficile nunc erit ex sudoris natura atque eliminatione in statu morbofo & præternaturali, præsertim febribus, ratione eventus indicium & iudicium desumere. Quum vero vetustissimus artis nostræ parens Hippocrates passim in scriptis suis, maxime aphorismis, prænotionibus & coacis, multa eximia & veritati apprime consentanea præcepta & axiomata prognostica, ex sudoris natura & modo excernendi petita proposuerit: hæc in pauca conferre & sic in compendio exhibere, operæ duxi pretium. Affirmat quippe hic Medicorum principes, boni omnino sudores esse, qui circa dies criticos, ut dimidium quarti, septimum, undecimum, decimum quartum, decimum septimum, vigesimum primum erumpunt, qui porro per universum corpus, nec in una tantum parte, nec parce & interrupte, sed copiose & sufficienter manant, quos alleviatio symptomatum & virium erectio sequitur, & qui cum ignis coctionis in urina, alvi secessu, vel præcedente, vel comite, succedunt. Nos maxime illos iudicamus salutiferos, qui fiunt quando pulsus præter naturam celer, vehemens vel durus, in molliorem & sedatorem transit.

§. XXXIV.

Quid malum sit? Contra vero omnes sudores, qui in febribus statim in principio & extra dies criticos contingunt, symptomata non levant, sub alvo constricta, cum urina tenui sine sedimento, ac pulsu præternaturali nec immutato prodeunt, a docta antiquitate, cui etiam experientia firma & constans suffragatur, semper pro malis & symptomatibus merito habiti fuerunt; eo quod ingentem virium imbecillitatem, par-

tium solidarum atoniam, mixturæ sanguineæ dissolutionem atque etiam causam morbi adhuc nobilioribus nervosis partibus firmiter insidentem produunt, & multiplici experientia constat, plures sub & in ejusmodi sudore occumbere. Insauti etiam præfagii sunt, qui tantum unam corporis partem occupant, & recte utique Hippocrates sect. 4. aph. 38. prodidit: *qua parte corporis sudor manat, morbum illius partis arguit.* Nam in morbis capitis, apoplexia, phrenitide, affectibus soporosis, caput sæpe totum sudore diffluere, pedibus frigidis observamus. In asthma convulsivo, catarrho suffocativo, peripneumonia, pectus multo sudore perfunditur, & plerumque omnes, qui in peripneumonia primis mox diebus citra levamen sudant, pereunt, ac sphacelosa plerumque subest inflammatio, vel in suffocativo asthma polypus absconditur. Quin id quoque observatione compertum est, quando symptomata post sudorem non levantur, plerumque subsequi recidivam, vel morbum diu extrahi. Quam in rem egregium est Martiani in comment. ad coac. testimonium: *si sudor non tollis febrem, sed hæc remanet, tunc symptomaticus est, & morbi recidiva, vel ejus longitudo expectanda.* Omnium tamen pessimi sunt frigidi, præsertim quando interiora ex inflammatione ardent; unde Hippocrates Sect. 4. aph. 37. item in prognost. cap. 2. frigidos sudores cum febre acuta mortem indicare affirmat; in mitiori autem morbo ejus longitudo.

§. XXXV.

Porro quotidiana docet experientia, ipso in paroxysmo & vigore febrium, item dolorum & motuum spasticorum, in gravi cephalalgia, cardialgia, dolore intestinorum, colica, epilepsia, in nimia etiam feri profusione per alvum, salivam aut urinam, vel etiam nimis hæmorrhagiis, cutem aridam, siccam & frigidam esse, ac sudore penitus destitui, *Sudor in paroxysmo nullus.*

L. 2. simul.

Simulac autem, sava hæc parthemata de vehementia remittunt, vel penitus intermittunt & morbus est in declinatione, sudor protinus ex toto corpore evocatur, id quod maxime obvium in declinatione intermittentium. Incidit quoque sæpius, ut post febres, tam acutas, quam chronicas, curatas, ingens dispositio & habitus corporis ad continuos & largos sudores remaneat, qui etiam facili de causa, levi externo calore, vel si oculos claudant & somnus obrepat, provocantur. Causa hujus largæ sudationis vel ex regimine in sudoribus criticis minus curate ab ægris servato repetenda est, vel quod nimis cito auræ frigidiori se committant, ut remanens intus excrementitia quæ sudore diffilatur materia, mixtionem sanguinis ad dissolutorium quandam motum disponat, veletiam quod superato morbo avidius & largius cibum ingerant, qui ob imbecilliorum a morbo redditam digestivam ventriculi & intestinorum vim, non bene solvitur & subigitur, unde copiosus & crudus chylus sanguini affusus, non bene cum eo miscetur, sed quam facile per emunctoria ab eo secedit.

§. XXXVI.

In nullo tamen morbo profusiores manant sudores, quam in purpura, sive rubra scorbutica, sive alba cum febre juncta; certo indicio, a fermentali quodam impure succo totam sanguinis & humorum massam in coliquativam dissolutionem esse conjectam. In malignis morbis, quorum causa interna partium sphacelatio, cum summa visum jactura, sub pulsæ debili & minus frequenti, urina quoque non adeo colorata, sed sanorum simili, manant sudores copiosi, foetidi, sæpe frigidi, & lethales, qui de putrida sanguinis resolutione testimonium exhibent. Solennes quoque sunt hæcicis & ubi partes nobiliores abscessum vel ulcus alunt, copiosi & valde debilitantes sudores, qui in scholis medicis colli-

quativi vocantur, & idemtidem a materia purulenta corrupta, quæ sanguinem in intestinum fermentativum motum ciet, proficiuntur. In scorbuticis quando ex hepatis vitio & sub deficiente biliosorum partium separatione, lymphæ multis sulphureis excrementis scatet partibus, sudores etiam nimii valde molestant, præsertim si alvus simul obferatur.

§. XXXVII.

Et in hac quidem effusa nimis sudatione, perquam utilia deprehendi alvum laxantia ex manna, tamarindis, item serum lactis dulce, cum pulvere nitroso præcipitante datum. In aliis autem longis & largis sudoribus, quorum causa nimia cutis atonia & interna partium sulphurearum in sanguine resolutio commotio, egregie ex usu fuerunt analeptica, cum roborantibus & leniter contringentibus, item acidula, quippe quæ non modo partium solidarum tonum ac robur firman, sed & unionem ac mixtionem partium sanguinis vinciunt & servant, quorum classem liquor meus anodynus mineralis, spiritus salis dulcis, spiritus sic dictus regius Michaelis, ex spiritu rosarum, salis dulcis cum moscho, ambra & confectio- ne Alkermes paratus, tinctura rosarum cum phlegmate vitrioli acidulato confecta, saccharum rosaceum, tinctura coralliorum vel earum solutio cum succo citri facta, ducunt. Alii eundem in finem species de hyacintho valde extollunt, quarum virtus sine omni dubio ab ingredientibus, quæ sunt leniter contringentia, item ab admixta camphora, ambra & moscho, licet horum dosis exigua sit, minime vero a sterili efforto gemmarum pulvere minus solubili, petenda est ac derivanda.

§. XXXVIII.

Hæstus de excretionibus, quæ per urinarias vias, & universale cutis emunctorium succedit, indole & prompendo inde judicio egnavus; supergit jam,

jam, ut etiam de ea, quæ per alvi feces contingit, nonnulla addamus. Quemadmodum autem per urinam maxima & superflua liquidi ex potu portio, una cum salinis crassioris texturæ partibus, secedit, & per cuticularem evacuationem salino-sulphuræ, intestino calido motu ex intima sanguinis mixtione evolutæ sordes, proscribuntur: ita per alvum non modo reliquæ post chylum ex alimentis extractum fœculentiæ & sursus, sed & crassiores sulphuræ biliosæ, in amplissimo hepatis vicere segregatæ ac per peculiare canales intestinis insinuatæ scoræ, unacum lymphaticis fermentalibus, ex pancreate, glandulis & tunicis glandulosis intestinorum stillantibus succis, foras ejiciuntur; eum pariter in finem, quo reliqui vitales corporis humores a sordibus pernicialibus repurgentur, nec unquam a temperata ad integritatem necessaria indole deficiant.

§. XXXIX.

Non quidem negandum, eam alvinæ excretionis esse rationem, ut interceptus ejusdem legitimus naturalis successus, non tam præstanteo damno sanitatem afficiat, quam si per spiratio aut urinæ fluxus cohibetur, sed sapius diu sine vitæ, vel manifesto valetudinis periculo retineri potest. Quia enim sanguinis massa per cutis tubulos, & maxime renale cribrum, & recrementis salinis & sulphureis liberaliter depuratur, his rite & sufficienter secedentibus, non illico noxa metuenda, licet feces crassiores aliquandiu in longo & amplo intestinorum tractu moram neclant, modo totius hujus canalis non adeo sit labefactus, ut statim cedat, sed iisdem elidendis ac demum scybalis egerendis sufficiat. Et certe complura in observatis Medicorum commemorantur exempla de diuturna alvi obstructione indemni, ut apud Rhodium Cent. 2. obs. 81. Mænichen obs. 5. necnon in M. N. C. Dec. 1. An. 3. obs. 25. Dec. 2. An. 3. obs. 85. quo etiam referenda, quæ Tom. III.

Listerus in comment. ad Sanctorii Medicin. flat. pag. 150. memorat, de sene quodam, octogesimo & sexto ætatis anno adhuc perfectè sano, qui, licet multum cibi carnesque pariter subcrudas ingereret, a pluribus tamen annis rarissime & nonnisi semel per hebdomadam, alvum deposuit.

§. XL.

Nihilominus tamen ex solennioribus ac eminentioribus excretionibus est alvina, ac non solum vitali corporis conservationi, sed etiam morborum solutioni, quæ nonnisi evacuatione absolvitur, quam maxime intersit. Quare ejusdem consideratio, utique tam ad sanum, quam morbosum corporis statum cognoscendum, ac ferendum de eo iudicium, utilis admodum est atque necessaria. Potissimum tamen ex eorum quæ alvo secedunt copia, habitu & modo excernendi, Medicus non tantum de alimentorum digestionem & chyli elaborationem, nec non de humoris biliosi ac pituitosi secretionem atque excretionem, verum etiam de motus intestinorum peristaltici, immo totius generis nervosi constitutione, indicia sumere ac certior reddi potest.

§. XLI.

Jam itaque quum feces colorem flavum naturalem ab admixta bile mutantur; his albis, vel gryseæ tantum tinctura infectis secedentibus, in proclivi est judicare: biliosi humoris in intestinis esse defectum. Hic autem defectus, vel ab obstructis, aut restrictis biliferis ductibus, ut in ictero, proficiscitur, vel ab exsuperante acidorum succorum prima in regione copia, qua bilis obtunditur ejusque color extinguitur, ortum trahit, uti obvium est in senibus, hypochondriacis, infantibus, si lac in ventriculo coalescit, omnibusque, qui paullo largius potum, multum acidi in complexu fœventem, ingerunt. Actum quidem candescentes feces, minus fortes, cum coloris sensu, præsertim in recto, ac tenesmo secedunt.

L 3

Quan-

Et
alligat
duo
fuo
non
Jupp
mi
pugis

M
recto
en
eodem
judic
piten
dum.

Exer
menta
alba
bi
lis
de
fectum
indi
cant,

Quandoque etiam eandem ob causam difficilius est ac tardus alvi secessus & varia in abdomine acidunt pathemata ac tormina, inprimis tamen molesta nauseabunda circa prae cordia adest censatio, quam nostri *das Ubelseyn* appellant, quae maie potissimum & ob soluta digestionem percipitur. Ac in his quidem omnibus nullum praesentius datur remedium pulvere acidum absorbente, cum diluente & leniter carminativo vehiculo assumpto. Cessant quippe hoc facto dolores & alvus ad officium redit. Quod vero absorbentia & sic dicta praecipitantia, quo etiam referenda magnesia, nec non pulveres bezoardici terrei, sedes, uti crebrioris observationis est, moveant, haec utique subest ratio, quod alcali terreum acidus prima in regione succos imbibens, convertitur in sal neutrum, nervae intestinorum tunicas ad excretionem sollicitans. Notabilis hanc in rem est observatio *Schelhammeri* in *M. N. C. Dec. 2. An. 5. p. 30.* de puero, qui convulsivis motibus simulque alvo pertinacius obstructa laborans, propinata ex aquis refrigerantibus cum absorbentibus mixtura, & purgatus est, & convaleuit.

§. XLII.

*Fusca
& bruna
bilis
supra.*

Vicissim quando scybala austero, bruno, vel fusco colore infecta alvo feruntur, largius in sanguine progigni & copiosius ab eodem separari biliosas sordes, indicio est. Excluduntur autem biliosa ejusmodi excrementa solenniter tempore aestivo, quo ob vehementem calorem multum bilis generatur & ad intestina fertur. Observantur quoque in cholerica constitutionis hominibus, nec non in iis, qui corpus crebrius motu exercent, vini ac spirituosorum potui nimis indulgent & in iram proclives sunt. Potissimum tamen in febribus biliosis, cholericis, tertiana continua & intermittente, febre quoque ardente sive caula, sordes alvinæ multæ, bile largiter refertæ, maxime sub declinatione & perfecta morbi solutio se-

cedunt. Quia enim hi morbi ne, partim ab ipsa bile stagnante & corrupta natales ducunt, partim etiam sub ipsis per motum intestinum calidum ad auctum largus bilis est proventus: ratio utique patet, cur tam biliosa egerantur scybala, ac remittente demum sub declinatione febre spasmo, copiose, insigni tamen cum emolumento, prodeant, ipsorumque morbum solum tum haud raro indicent. Pariter in melancholia hypochondriaca, mania, cachectico morbo & hysterico malo, alvus non solum segnis est & tarda, sed foeces etiam duræ ac intensius flavo ac fusco colore, quin nigricante conspicuæ, exsolvantur, nullam plane aliam ob causam, quam quod ob acidi ubiorem in canale alimentorum proventum, adstringitur excretio, ac bilis acido commixta ob diuturnam moram nigredinem contrahit.

§. XLIII.

Ex eodem fonte, bilis nempe constitutione, viridescentium excrementorum origo repetenda. Sunt hæc quam maxime familiares infantibus lactentibus & plerumque atrocibus ventris torminibus, inquietudine, jactatione corporis, febre, insequente crebro convulsione epileptica, stipantur. Mali igitur sunt indicia, & lac acidum factum & cum bile quasi confertum, viridem colorem & corrosivam indolem contraxisse produnt. Excluduntur tamen interdum etiam in adultis virides per alvum sordes, ut in passione cholerica laborantibus, praesertim quando post vehementem iram copiosa bilis ad tenuia intestina, acidis succis referta, propellitur. Neque minus in hypochondriacis & hystericis, sæpius non solum per vomitum, sed etiam alvum, viridia sub gravissimo pathematum spasmodicorum insultu excrementum. Sæpe etiam ipsa natura per biliosas & copiosas dejectiones, sponte repurgat corpus a redundantibus galino-sulphureis scoris, quæ ætate nimis

*viridis
excre-
mento-
rum co-
lor est &
a bile.*

— 4 —

nimis fervida progenitæ, cohibita, ab aere frigido & humido, ineunte maxime autumno, perspiratione, partim ad hepar, partim etiam ad glandulosas intestinorum tunicas relabuntur, ac demum in ipsum canalem delatæ, molesta tormina & spasmos excretorios producant. Quod si tamen acres hi succi diutius per intestina feruntur, tonus non solum eorundem nimium destruitur, sed ipsæ demum etiam tunicæ exeduntur, ut atrophia, hæctica, tormina continua, affectus hypochondriacus flatulentus, tumores œdematosi, ipseque hydrops accedant.

§. XLIV.

Ut color, sic quoque fœtor excrementorum bilis infædem immixtæ plerumque debetur, quæ proparcius infest, ut albis, eo minor est nidor, eo gravior, quo largius. Quod si igitur fœces mirum fœtent, aut cadaverosum plane pœdorem diffiant, indicium est vel bilis copiosæ & corruptæ, vel sphæculosæ in intestinis corruptionis. Hinc quando in malignis vel dysenteria scybala fœtidissima secedunt, putredinis lethiferæ ipsiusque mortis præsagium præbent. Putent tamen etiam sæpius scybala infantum a veribus, si in putrilaginem fatiscunt, ac tum simul adsunt vagi in abdomine dolores & corporis æstus cum virium languore. Ubi vero alvus fœtida non solum, sed etiam spumosa, crebra & varii coloris fertur, cum ardente dolore & continuo ad desidendum stimulo, ut in dysenteria, humores valde acris & corrosivæ naturæ ad intestina ferri, & talem quoque rodentem & recti glandulas amandari, haud fallax suppeditat indicium.

§. XLV.

Porro sæpius contingit, ut feces admodum mucidæ, pituita crassa tenaci scæcentes exsolvantur. Ex his de imbecilli ventriculi & intestinorum digestrice virtute, nec non de alimentorum crudorum ac difficillioris solu-

tionis, potus quoque minus salubris: usu judicandum; id quod sæpius obvium est in iis, qui novissime a morbo convalescunt & avidius cibos ingerunt, in senibus ac his, qui vitæ genus agile, cum otioso, & victum calidum, cum frigido commutant. Quando vero major mucis pellucidi, vel qui albumini ovi similis est copia, cum tenesmo ac molestissimo recti dolore excernitur, certo ut plurimum argumento est, sanguinem exitum molientem in fine recti obhærescere, ac mora in glandulis largiter deponere mucum, pressione vero dolorem cum tenesmo ciere.

§. XLVI.

Nonnunquam etiam excrementa liquida prodeunt & copiosa, appetitus simul viget, corpus tamen emaciatur magis, quam increfcit. Quod si contingit, exiles villosæ in intestinis tunicæ ductus mucos obfessos & inviscatos esse arguit, ut nonnisi tenuis & aquea chyli portio a minus patulis oculis recipi queat, pinguis vero, gelatinosa & nutritibilis portio ingressu exclusa, feces dilutiores & sic diarrheam reddat chylosam. Merito quoque ab obstructione lacteorum lævitas intestinorum senibus familiaris repetenda, eo quod ætate ingravescente alvei minutissimorum in corpore canalium sensim angustantur, corrugantur ac concidunt, ut hinc nutritio interdicat ac multum alibilis liquidi per anum effundatur. Vicissim quando scybala durissima, instar lapidis compacta, magna cum difficultate egeruntur, haud fallaci indicio concludendum: ob mucosas intestinorum glandulas obstructas aut plane induratas, vel nimium calorem, excrementa siccescere, & labefcente simul motu peristaltico, diutius retineri. Quin non raro ea intestinorum siccitas alvique est durities, ut nonnisi injecto clysmate, aut sumto pharmaco, quicquam exsolvatur, quam in rem memoratu dignus casus a Ballonio lib. epidemior. pag. 58. enarratur,

Excre-
menta
liquida
& co-
piosa.

dura
stimu-
lante

Fœtor
excre-
mentorum
na-
dis?

Fæces
mucidæ
quid in-
dican?

ubi post insuperabilem alvi siccitatem, facta sectione jejunium ita angustum & cartilaginolum deprehensum est, ut vix per illud chylus deflueret. Et hinc quoque est, quod nonnulla medicamenta purgantia calidiora, præsertim si humidum jam deficit, excretorios in intestina hiantes ductus stringendo, alvum potius obstruant, quam solvant.

§. XLVII.

Exit præterea cum fecibus quandoque sanguis sincerus, quod, si sine torminibus exquisitis succedit, ex aniveis stillat, ubi autem dolores circa umbilicum gravissimi & crebriores dejectiones simul urgent, ex erosio ab acris humore tenuium vasculorum manare & dysentericum morbum adesse testantur. Et sicuti prius plerumque pro sanitate est, ita posterius, si longius extrahitur, affectum hypochondriacum flatulentum, tormina, hydropem, tumores œdematosos, atrophiam & hæticam, ob exesas sensim intestinorum tunicas inducit. Cruori quoque admixto debentur excrementa instar picis nigra, quæ cum summo virium lapsu & mirifico scetore deiciuntur, ac de morbo sic dicto nigro documentum ferunt, præsertim si vomitus simul sanguineus accedit; eo, quod sanguis post diuturnam in vasculis melaericis stagnationem, demum in ileum tenuissimam membranam obductam perumpit, & ad crassa descendens, cum fecibus quasi confermentatus, nigrorera & fetorem ipsis conciliat. Et de ejusmodi dejectione intelligendus utique Hippocratis aph. 21. Sect. 4. *dejectiones nigrae, qualis est sanguis niger, sponte venientes, sive cum febre, sive sine febre, pessima: & quanto coloris magis prævi fuerint plures, pejor.*

§. XLVIII.

Præter hæc, de bilis aliorumque in intestinis succorum indole, signa, alvina quoque excretio de motus peristaltici & universi nervosarum par-

tium systematis constitutione indicium suggerit. Quemadmodum enim alvi facilis & conveniens successus, reciprocum relaxatorium & constriktorium motum in tunicis intestinalibus ordinate & æquabiliter succedere testatur: ita contra, simulac hæc motio vitium patitur, & nimia adeest vel adstrictio, vel dilatatio, seu atonia, alvus aut supprimitur, aut effusa fuit. Nervosarum autem partium constitutio, eo certius ex alvina evacuatione cognoscitur; quomajor inter has & intestina viget consensus, qua vitium ex illis ad hæc, & ex his ad illas, mutuo propagatur.

§. XLIX.

In genere igitur tenendum, legitimum intestinalis excretionis successum, illibatæ sanitatis; turbatum vero adversæ valetudinis, certum esse indicem. Alvi enim torpor vel plenaria suppressio, recte sentiente Sponio aph. 27. Sect. 2. omnium conturbationem & vasorum impuritatem avertit, eaque propter merito inter signa imminantis morbi refertur, eo quod sensibiles corporis partes gravius affectas esse & spasmodicam jam stringi subindicat. Inprimis teste eodem Sponio loco citato aphorism. 28. & per experientiam compertum est: obstructo inferiore ventre, flatus in universum corpus discurrere, ut distentis postea nimium ab his intestinis cum ventriculo, sanguis liber progressus impediatur, & ad alia superiora maxime loca conversus, varia, eaque gravia pathemata, cieat. Nimis effusa autem per alvum secessio indicio est, post vehementiorem, sub crebriori dejectione stricturam, succedere nimiam fibrarum remissionem, & laxitatem, qua fit, ut copiosior humorum affluxus eo contingat, quibus denuo spasmi ac tormina cum dejectione proritantur. Haud ab similibus ratio est, quando alvus aliquandiu fluit, postea vero per aliquod tempus ten-

In gy-
næcia
mala
alvina
tarda.

alvina
fluenta.

Inordi-
nata.

Aboluit
quæ de
motu in-
testinali
cum re-
laxatione

tenfa est ac stricta, quippe quod pariter vitiosum peristalticum motum, ac intestina mox spafmo, mox atonia detineri, arguit. Quumque adeo reciproci huius in intestinorum volumine motus conservatio magnum conservandæ valetudinis sit præsidium, destructio autem matorum morborum & symptomatum mater; omni utique studio, tam in statu naturali quam præternaturali, ea vitare decet, quæ eundem turbant ac trahunt, ut sunt inprimis ira, terror ac mœsticia, frigida potio largius fudanti corpori ingesta, omnia austera, acida, adstringentia & duræ compages alimenta, cibi nimis pingues & stultus nimis cerevisiæ, vini & spiritus vini potus, omne frigus, nimis vigilie & mentis fatigatio, ex medicamentis, creber usus purgantium, inprimis drasticonum, opiata, mercurialia, saturnina, item acida stipitica.

§. I.

Ad morbos quod attinet & iudiciū ex alvina egestionē in iis petendum, in omnibus capit & nervorum affectibus, propter mutuam partium nervosarum consensionem, alvus stringitur, & omnis ipsius constipatio ingignit, foveat & exacerbat capitis & nervorum morbos. Obvium hoc est in vehementiori cephalalgia, emicrania, epilepsia, mania, melancholia, affectibus paralyticis, ophthalmia & auditus quoque difficultate, qui omnes morbi optimè solvuntur alvi fluxu paullo diuturniori, quippe qui sedatos esse primis in viis spafmos, humores ad caput urgentes, & materiam peccantem ad inferiora descendere ibique exsolvi testatur. Hinc ex vero Celsus lib. 4. c. 3. alvum fluxam superiores partes sæpe resolvere; & Hippocrati Sect. 7. aph. 5. dysenteriam in infania bonam esse, asserunt. In reliquis quoque chronicis passionibus spasmoticis, pathematicis nempe hypochondriacis & hysteris, alvus ut plurimum constipata, pedesque frigidi observantur. Quæ ambo ubi præsto sunt, certo prædicti possunt variè ac multè in

superioribus afflictiones, ut præcordiorum anxietates constrictivæ, cardialgia, difficilis spiratio, melancholia, cephalalgia, vertigo, cordis palpitatio, ructus, digestio vacillans & abolita, dolor stultus in hypochondriis, eo quod hæc omnia post inæqualem redditum per spafmos in inferioribus humorum cursum, eundemque ad superiora coactum, subsequuntur.

§. LI.

Accedunt febres, de quibus pariter experientia compertum est, nullam earundem, si sit continua, sive intermittens, inflammatoria, vel exanthematica, lymphatica, lenta, aut hectica, sine prævia alvi adstrictione accedere, quæ etiā sæpius diu in morbi decursu perdurat, eundemque eo graviores reddit. Quod si vero alvus secundum naturam ferri incipit, tam quoad qualitatem, quam quantitatem, haud fallaci spe sanitatis restitutio expectanda, eo quod hoc facto, certum est, spafmos qui morbum proxime faciunt, in nervosis partibus solvi atque remittere. Quin multæ febres, præsertim putridæ & malignæ, item biliosæ, oborto iusto tempore alvi fluxu solvuntur, & ex eodem, reliquis quoque concurrentibus, salutis petendum est indicium, quod pluribus in differt. diarrheæ in febribus malignis salutatis, excusli. Monendum tamen, quod si in principio febrium & extra dies criticos intempestive alvus largius secundat, malum & infausti decursus præbeat indicium.

§. LII.

Quum igitur in omnibus affectibus chronicis spasmoticis, convulsivis, hypochondriacis & hysteris, alvus segnis, adstricta & dura admodum noxia sit: artis utique est ac prudentiæ, utilissimè huius excretionis successum conservare, quod tamen minime acrioribus stimulantibus perficiendum, sed potius apprimè ex usu sunt salina, abstergentia, nec non absorbentia & balsamica pilule, quas ex-

aliisq;
spafmo,
diets
morbo
qualit.

in feb-
ribus
quæ
na qui
mala p.

Ad alvum
autem
quoque
modo
in feb-
ribus.

& febri-
bus pro-
ducent
morbo

extracta amara, resinæ temperatæ, extractum rhabarbari & aliquot grana aloes rite præparatæ ingrediuntur, una cum clysteribus emollientibus, carminativis & oleosis. In febribus autem, quia æque strictura nimia, quam laxitas, periculosa, eo magis artificij providendum, ne in alterutro delinquat, sed potius accommodata diætâ ac regimine, & congruis tam internis, quam externis præidiis, alvinæ excretionis successum perite moderetur. Hinc ubi alvus subducenda, neutiquam drasticis, acrioribus & stimulantibus utendum, sed leniora propinanda, mannata scilicet, tamarindinata, tartarea atque nitrolosa, cum clysteribus lenientibus ac oleosis. Neque etiam dejectiones, licet nimis videantur, adstringentibus, opiatâ & narcoticis vi sunt comprimendæ, ac potius blanda diaphoretica fixiora, mitigantia, cum aliquot granis nitri, vel uno aut altero corticis chaccarillæ, nec non succino præparato, vel floribus sulphuris & dimidio grano theriacæ coelestis, omneserunt punctum.

& ul-
miâ ob-
pessida

C A P U T XIV.

De crisi- bus & criticis diebus in experientia rationali fundatis.

§. I.

Ad pro-
gnosis
referen-
da crisi-

AD prognosin medicam, sive judicium de morbis, præsertim acutis, eorumque fausto vel infaus- to eventu ferendum, referenda etiam doctrina de crisi- bus, a plurimis Veterum maximi habita & passim in scriptis celebrata, a multis vero Recentioribus, quibusdam etiam Præscorum, partim in dubium vocata, partim neglecta. Primus autem, omnium qui de crisi scripto mentionem fecit, est vetustissimus. Medicinæ antistes Hippocrates. Is enim serio inculcavit, septimæ cujusvis & dimidiana, septeni diei, in acutis morbis Medico rationem esse habendam, eo-

quod iisdem per sudorem maxime, alvum aut hæmorrhagiam, a natura instituantur excretiones, quarum successu absoluto, ipsæ febres demum solvantur. Et hos dies vernacula sua criticos, sive decretorios, nuncupavit, quia judicium de morbi eventu ferrent. Per crisisin vero, quod vocabulum erat *μολυσμός*, prisca vel noxiorum e corpore excretionem, quia Hesychie & Suida auctore, notante Langio lib. 1. epist. 37. τὸ κριτικόν, sequerestrare & veluti per cribrum aliquid excernere, denotat) intellexerunt, vel ipsam morbi solutionem criseos nomine insigniverunt, (uti effert Hippocrates l. 1. de præception. κρισεὶς ἐστὶν ἀμύδνσις τῶν,) vel etiam crisis pro ipsius nature motu & pugna cum morbo habuerunt. Alii quoque crisis judicium Medici, quod format, vel formare debet ex morbi circumstantiis de ejus eventu, esse voluerunt.

§. II.

Ut autem genium criseos sensus & criticorum dierum ratio eo luculentius pateant, ex his, qui multum iisdem deulerunt, maxime Hippocrate, tanquam primo fonte hausta, adducemus præcipua testimonia. Primum esto, quod exstat de dieb. judicatas. §. 9. ita habens: *judicantur febres quarta die, septima, undecima, decima quarta, decima septima & vigesima prima, quadam etiam trigesima & quadragesima. Et Sect. 2. apb. 23. & 24. criseos, successum sic conceptus delineat verbis: acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur, septima quarta index est. Alterius hebdomadis octava principium est. Consideranda vero est undecima; hæc enim quarta est secunda hebdomada. Deinde rursus consideranda decima septima; ipsa enim est quarta quidem a decima quarta, septima vero ab undecima. Porro lib. 3. de præfag. §. 7. & 8. perite monet: morbos advertere a prima die oportet, atque singulos dierum quaterniones observare, si enim haud obscure scies, quo se conversurus sis morbus.*

quid per
est in-
tellectu-
morbo
quæstio.

Crisis
septi-
maria &
sensu
prensio
vires
compa-
randa.

Nam.

Nam febres ardentes epidemica judicantur bono ordine in septem ac decem diebus. Huc etiam referenda, quæ lib. de prænor. §. 20. prodidit: placidissima febres & signis securissimis nitentes, quarto die desinent, aut prius; malignissima vero & signis horrendissimis obiter, quarto die aut prius occidunt. Eandem cum Hippocrate lententiam tætuor Galenus, qui integrum de diebus decretoriis concinnavit librum, in quo principes dies criticos vocat septimum, decimum, quartum, & vigesimum primum, ac in iisdem plures sanari, quam mori declarat.

§. III.

*At si cum ex-
cessione* Septenos itaque, & semiseptenos dies Veteres crisi dicarunt, quibus acutæ & continuæ febres in salutem terminentur. Ipsam vero crisin his diebus per excretiones, sudorem potissimum, alvum, vel hæmorrhagiam succedere idemdem tradiderunt, omnesque evacuationes, quæ extra criticos dies contingunt, pro minus salubribus, sed symptomaticis censuerunt. Et de sudore quidem perspicuis id testatur verbis Hippocrates Sect. 4. aphor. 36. sic scribens: sudores febriæ anti si incepterint boni, sunt tertia die & quinta, & septima, & nona, & undecima, & decima quarta, nec non decima septima & vigesima prima, porro vigesima septima & trigesima prima & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos judicant, qui vero non sic sunt, dolorem significant, & longitudinem morbi, & recidivas. Idem confirmat Galenus de dieb. decretor. qui sudores, inquens, manant diebus indicantibus, non criticis, laborem significant et diuturnitatem morbi: nam judicatoria, non judicantia, aut sunt junctæ, aut certe sinistri iudicii. Ac in eodem libro de sudoribus extra periodos crifimos fluentibus sic prodit: in sexta judicantur agri cum difficilibus symptomatibus et periculo non mediocri, imperfecte & obscure.

§. IV.

Perficitur vero etiam sollemniter crisis per sanguinis stillicidium, & alvi fluxum. De utroque in prociectu sunt testimonia. Nam de hæmorrhagiis criticis egregius est locus Hippocratis lib. 1. epid. §. 115. in febribus, in quientis, ardentibus populariter grassantibus, quibus bene ac largiter sanguis per nates erupit, per hoc maxime servabantur, & nullum novi, qui in hac constitutione mortuus esset, si recte sanguis profluxisset. In Philisco enim, Epaminone ac Sileno, quarta ac quinta die parum de naribus stillavit, & moriebantur. Sanguis autem plurimus erupit; maxime adolescentibus & in vigore constitutis, & talium plerique perierunt, quibus sanguis non erupit; senioribus vero ad morbum regium res devenit, aut alvi ipsis turbata sunt, aut dysenterici facti sunt. De salubritate autem liberalioris alvinæ in morbis excretionis passim aut Hippocratem exstant effata, ut Sect. 4. aphor. 28. sect. 6. aphor. 17. sect. 7. aph. 29. inprimis tamen huc referendum quod de febribus iaculcat, dum lib. de iudicat. §. 4. ardentem febrem biliosa, ait, solvuntur plerumque septimo, aut decimo quarto die, sudore, aut alvo liberiore.

§. V.

Tam magnifice de crisi & criticis diebus sentierunt Hippocrates atque Galenus, quorum tamen fidem subiectam reddere & hanc doctrinam plane in dubium vocare haud veriti sunt antiquorum Medicorum nonnulli. Hos inter primus fuit Asclepiades, qui teste Cælio Aureliano lib. 1. cap. 14. pag. 36. asseruit: non esse in passionibus itatos dies, quos crifimos appellat, nec certo aut legitimo tempore ægritudines solvi. Idem cum Asclepiade profectus est Celsus lib. 3. cap. 4. est, inquens, de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque tanquam tunc de agris judicaretur nuper non minabant. Id Asclepiades jure ut va-

Hæmor-
rhagiæ
aut alvi
fluxum

Crisi
repa-
rante
morbo
quidæ
& val-
entibus
ies.

num repudiavit. Neque in ullo die, quia par imparve eſſet, ægris majus vel minus periculum eſſe dixit. Inevadum enim pejores dies pares fiunt. Nunquam etiam in ipſo morbo dierum ratio mutatur, fitque gravior, qui remiſſe eſſe conſueverat. Et paucis interjeſtis ſic pergit: Verum in his quidem antiquor tunc celebres admodum Pythagorici numeri ſeſſerunt; cum hic quoque Medicus non numerare dies debeat, ſed ipſas acceſſiones intruere. Ex recentioribus Comes de Flifco, vanitatem criticarum periodorum adſtruxerit, lib. de ſato perhibens: in praxi numero hunc dierum non ſemper obſervari, & ſæpius aliis etiam diebus crifeſ fieri. Ut mittamus, quæ Helmont. lib. de tempor. it. de febr. nec non Chriſtianus Langius in Miſc. nat. curioſ. & Faber in panchymagogo, contra obſervationem criſium in medium attulerunt.

§. VI.

Mitiorẽ hac de criticorum dierum exiſtentia ſententiam ſovent, ii qui licet non penitus eoldem negent, autumant tamen, in Græcia tantum, minus in noſtris regionibus, ſuccedere crifeſ. Hunc in ſenſum ſcribit VValdſchmidius fundam. medit. pag. 113. nihil opus, non adeo curioſos eſſe debere in cauſſis criſium rimandis, quum in noſtris regionibus & noſtro hoc tempore, tales crifeſ, non amplius fiant, nec prædictiones noſtra in morbis acutis adeo certa, nec indubitata fidei prout apud Hippocratem inveniuntur. Eidem ſententiz pollicem premit Euſtadius de die aſtronom. in noſtra, iniquiens, Germania regionibus, & præſertim ſub noſtro polo & in ſolo noſtro, rariuſ perfectæ ad ſalutem veniunt. Et Hollerius comment. in aph. Hippocr. teſtatur: in frigidis & borealibus regionibus rariffime expectari criticas exactas evacuationes. Neque ab his diſſentire videtur Baglivus Prax. pag. 140. aſſerens: in Græcia perfectæ ſuccedere crifeſ in acutis morbis, non vero ita in ſepten-

trionalibus regionibus, idque adſcribendum putat aeris puritati & tenuitati illius regionis & adjacentis orientis valde elallicis, quum noſter aer aqueis & craſſis impuritatibus ſœdatus, humores quoque corporis magis impuros faciat, ut ad debitum criſeos, ſive deſpumationis officium, nunquam pervenire poſſint.

§ VII.

In hiſce tam diverſis auctorum opinionibus & objectis tot difficultatibus, non expeditur ad veritatem invenendam via, quam ipſa experientia (quæ facta ingenuè ſiſit ac optima veritatis & ratiocinationis medicæ parens eſt,) duce patet, prudenter in conſilium vocatis obſervationibus præcificis. Quare in exponenda hac criſium ratione ac natura, inſtituto meo apprimè ſatisfacturum conſido, ſi exuto omni auctoris præjudicio, ea, quæ per inſtitutum, a quadraginta & quod excurrit annis, artis exercitium, mihi iterato de febrium ſolutione, quomodo? & an certis ac ſtatis diebus eodem contingat? innoverunt, candide tradam, & poſtea rationes adæquatæ ſubjiciam. Scilicet frequentius obſervavi, febres qualdam viginti quatuor horarum ſpatio perfectè terminari, quas Veteres eapropter dixerunt ephemeræ. Synocham mitiorem quarto & graviorem ſeptimo die, vel per narium ſtillicidium, cum proclivitate ad ſomnum, vel per largum ſudorem cedere; ardentes vero & bilioſas febres, cauſas diſtas, niſi ſuneſtum fortiantur exitum, utplurimum tertio, vel undecimo die, liberali ſudatione, plerumque cum alvi fluxu, ad finem pertinere, expertus novi. Ipſæ tertianæ ſæpius intenſo cum æſtu aggregiuntur; circa tertium autem & quartum diem remittit inſultus, ac in intermittentis typhum tranſiit. Compluries quoque, & maxime anno 1700. Berolini, obſervavi catarrhales & epidemicas febres cum gravibus ſymptomatibus ingruentes, quarta autem die

Quid
per ex-
pſiſ-
ſiam
conſeſ-
de criſi

in aph-
mera,

ſynocha

conſeſ-

tertianæ

catarrhales

die solutas, excretionē facta pustulari circa nares & labia, cum sudore pruriginoso.

§. VIII.

*Pleurisi-
da vera
& peri-
pneu-
monia.* In pleuritide vera & peripneumonia leviore, inter tertium & quartum diem per tussim cum levamine ejici materiam cruentam, hanc in junioribus & sensibilibus naturæ septimo, in adultioribus vero & ubi inflammatio paullo profundior, demum circa decimum quartum diem, inflammationis sequi discussionem, cum largo sudore & liberali secretu, respiratione quoque liberiori, identidem experientia compertum habeo; edoctus id crebrius, quum Minda VVestphalorum, ubi morbus quasi endemius, artem primum facitarem. Pleuritidis autem spuria & hepatidis decursus atque solutio, plerumque septimo, vel undecimo die, per sudorem, aut alvi profluvium, mukoties a me annotata. Febris quoque erysipelacea, quæ sepe cum gravibus symptomatibus, horrore, frigore, vehementi æstu, interdum etiam delirio invadit, intra diem tertium & quartum conquiescit, amandata ad summam cutim materia acri biliosa, cui nonnunquam tumor glandularum inguinalium jungitur. Qui de pestilentia vera scriplerunt observatores, confirmant, febrem pestilentem non nisi erysipelaceam malignam esse, ac in ea saluti præbere indicium, quando circa tertium, quartum, vel etiam septimum diem, in partibus carnosis carbunculi, aut in glandulis bubones apparent.

*Pleurisi-
side
spuria
& he-
patidis
acutis
levis.*

*Utr
pau-
silla
febris.*

§. IX.

*Varicel-
lis,
morbilli-
de.* Vix tamen ullo in morbo tam conspicua sunt critica tempora & naturæ ordo, quam in variolis. Hæ enim eodem modo ac morbilli cum truculentis symptomatibus adiunguntur plerumque; quæ facta circa dimidium septimum exanthematum eruptione, una cum febre eximie remittunt, idque durat in variolis ad septimum, usque quo succedente primum in facie, postea in pectore, brachiis & manibus, ac de-

num infimis partibus suppuratione, febris denuo accenditur sic dicta secundaria, quæ ad undecimum usque diem protrahitur, & donec pustule, eodem ut suppurari inceperunt ordine, a suprema ad infimam corporis regionem siccantur ac demum frustulatim decidunt. Et sic in salutem decurrit variolarum morbus, ubi vero vires ferendis symptomatibus non sufficiunt, nono vel undecimo die lethalis accidit catastrophe. Aliud periculosum exanthematum genus sunt petechiæ, quæ quarto, vel septimo die, in corporis cortice comparere, & prodeunt levamen cum liberiori respirationis successu inferre solent. Tandem multiplici quoque experientia perfectum teneo, febres multas epidemico grassantes continuas putridas, petechiantes, solvi & salutarem fortiri eventum circa undecimum diem per copiosum alvi profluvium, de quo pluribus egi in *differs. de diarrheæ in febribus malignis salutari.*

*petechi-
æ.*

*consti-
tuta &
epide-
miæ.*

§. X.

Quamvis igitur nihil dubii sit, quin in nostris etiam regionibus, in febribus præsertim acutis, septenarius dierum numerus, magnas mutationes in morbis adducat, ac eodem non modo symptomatum, sed & totius morbi cessatio, cum evacuationibus incipiat & successive absolvatur; nihilominus tamen non semper circa septenos dies crises, sive mutationes in pejus, vel deterius, sed extra dies quoque hos decretorios, paribus scilicet, octavo, decimo & duodecimo contingere, per experientiam constat. Potissimum in hominibus plebeiis, rusticis, simplici & populari victu fruentibus, & qui neque inordinata vitæ ratione neque affectuum impetu, sanguinis massam impuram reddiderunt, parum quoque medicamentis utuntur, crises cum sufficienti evacuatione perfectas fieri, idemudem a nobis observatum est. Pariter multiplici experientia confirmatum

*Crisis
etiam
extra
septen-
nos dies
constitui
possunt.*

*Quibus
mentis
motus
fuerit.*

*quibus
motus.*

tum teneo, hos, qui corpore præditi teneriori cum cute valde perfpirabili, naturæ agilioris & fenfibilioris, ætate juvenes vel viri funt, & febrilibus acutis, inflammatoriis & ardentibus laborant, citius crifes, quibus morbus ad falutem, vel mortem, terminatur, experiri, quam ii, qui torpidiores natura, temperamento phlegmatici ac fucculenti, quippe qui diutius cum morbis confiftantur, protracto ad tres & longius feptimanas, febrim difceffu.

§. XI.

Non omnis lar-
ge eva-
cuatio.

Monendum vero, quod non omnes largæ evacuationes, præfertim, quæ per cutem diebus ordinariis criticis fuccedunt, falutem fpondeant, fed ille tantum, quas fymptomatum notabilis remiffio, pulfus duri & celeris in molliorem & fedatiorem mutatio, liberior & minus anxia refpiratio, animus erectior, urina craffior confiftentia cocta, corporis quies, fomnus placidior, acut verbis Hippocrat. Secl. 2. aphor. 17. utar, nox placidior, comitantur & confequuntur. Nam aliquot certe ipfis criticis diebus, fub largis fudoribus occumbere vidi. Neque etiam omnis pathematum remiffio, quæ sæpe etiam diebus paribus accidit, crifis cenfenda, fed ea tantum, cui arteriarum motu magis naturali & refpiratione liberiore facta, evacuationes aut junguntur, aut poftea accedunt.

aut fym-
ptomati-
ca remiffio
crifis.

§. XII.

In crifis
cognofcenda
circum-
ftantia
viva.

Et certe præclare monet Galenus lib. 1. de dieb. decret. quod crifin cognituro nofcenda fit ætas, natura, anni tempus, locus & pulfum cognitio. Sicut enim hæc omnia de crifi & mixtione humorum, nec non difpofitione folidorum ad motus vegetos & promptos, aut imbecilles & tardos teftantur: ita pro eorundem differentia, ipfe non modo corporum naturæ variam, fed & operationes & effectus, qui in corporibus contingunt, diverfis comparent in morbis. Hinc perpetuæ fere obfervationis eft, quod

et poft

fi fudores largi in febrilibus, inflammatoriis, etiam exanthematicis, ftatim in principio & ante debitum eruptionis tempus manant, vel etiam materia variolacea ordinario termino citius expellitur & exanthemata cõparent, nec poft eruptionem pulfus fedator fit, fignum piffimi præbeat ominis. Ego quoque frequentius annotavi, quod febres epidemice graffantes, live catarrhales, live rheumaticæ, live exanthematicæ, fub ordinatis & conftantibus anni conftitutionibus prognatæ, ftatas magis & tempeftivas obtineant crifes ac folutiones, quam quæ præfto funt, ubi aeris temporumque viciffitudines præternaturales admodum præcefferunt, quippe quæ, non tam exacte fervant tempora, fed difficilius funt folutionis, quod fcire innuit Hippocrates Secl. 2. aph. 8. in conftantibus, inquit, temporibus, fi tempeftive tempeftiva redduntur, morbi conftantes & judicatio facillimi funt, in inconstantibus autem inconstantibus & qui difficulter judicantur.

et tem-
peftiva
ratio
habenda

§. XIII.

Deinceps medentum fagacioribus apprime cognitum eft, ordinatos & criticos ad excretionem cum falute tendentes in febrilibus naturæ motus, imprudenti medicatione mirum turbati, perverti poffe ac plane impediri. Egregia funt quæ hanc in rem affert Profer Marianus in comment. in lib. 2. de morb. Hippocrat. fecl. 2. pag. 174. continuo, inquit, medicamentorum refrigerantium ufus propter febre, incralfatis humoribus corporibusque denfatis, fpontanea evacuationes sæpe prohibentur, ut hæc non fit levis cauffa, cur noftros temporibus tam raro hiant crifes, quæ frequentiſſime erant antiquis. Neque minus luculentum eft Bagliui teftimonium, qui in prax. pag. 254. mirari defignant, ait, præctici, fi hodie nec frequentes, nec perfectæ fuccedant crifes, uti olim in Græcia, ſiquidem illi Græcarum legum vel ignari, vel obreftatores, a principio morbi ad declinationem ufque pur-

Crifis
per im-
prudẽ
et me-
dicam
rationem
turbant
parafit.

purgantibus, diaphoreticis, phlebotomis, spirituosius aliisque imprudenter & intempestive exhibitis medicamentis, aegrotantes fere conficiunt; ideo impossibile est, ut humorum, per tam diversas remedium seditiones distracti, ad critica desputationis negotium stato tempore disponantur, sed assiduus confusio inipitatur, loco criseos perfecta in metastases præternaturales desinunt, atque de hac causa nec criseos, nec dierum criticorum, nec aliorum demum naturæ motuum regulas ab antiquis traditas, in febribus observabimus. Quapropter exquisita nititur veritate quod idem auctor l. c. tradidit: rusticis & qui Medicorum opera non utuntur, crises per sudorem, alvi fluxus aliaque naturæ vias perfici & motu profus ordinato fieri.

§. XIV.

In nulla vero, ut supra neminimus febri, tam solenniter observatur criseos successus, quam in exanthematica illa, fere toti generi humano communi variolarum nempe & morbillorum; interim non desunt, qui, quod certe mirum, sine ulla solida ratione illum negare audent, aut minimum eundem minus curant; quum tamen merito nobis in febribus sit crisis, quando circa statum quoddam tempus, cum notabili quadam evacuatione, vel etiam excretionem per cutem, symptomatum fit remissio, immo cessatio, cum meliori pulsu & respiratione, quod certe per eruptionem variolarum & morbillorum conspectius obvium, licet postea tempore suppurationis, nova secundaria febris, magis symptomatica accendatur. Quare gravissimum utique hoc morbo per imprudentem medicationem conciliatur ab ignaris damnium, dum vel nimis expellentibus & calido regimine intempestive instant, vel etiam in contrarium eruptionem cohibent nimis refrigerantibus, ut valde nitrosis, quorum alias præstantissimorum etiam nostro jam tempore pessimus passim invalescit abusus, ut per eosdem mo-

tus ordinatos salutare turbatos, multoque, qui revera potuissent servari, periisse, observari. Quin omnes evacuationes in morbis criticæ, maxime tamen per sudorem, si supprimuntur imprudenter, vel minus sufficienter succedunt, morbi recidivas, vel peiorem priore, & solenniter febre lentam invehere solent, de quo notandus Hippocratis aphor. 12. Sect. 2. ita habens: quæ relinquuntur in morbis post judicationem, recidivam facere solent. In exanthematica autem illa febre, quæ sæculo abhinc nostris plane incognita, jam vero admodum familiaris, in expulsiōe materiæ causticæ ad corporis corticem critica, statim dies non tam certo observantur, symptomata tamen, quando eadem contingit, semper complacantur. Neque denique in recensendis observatis criticis omittendum, quod nulla dies in febribus continuis & acutis, etiam exanthematicis, maxime variolis, magis fatalis sit, quam nonus & undecimus, quorum alterutro plurimi occumbant, ut reliqui etiam non omni careant periculo.

§. XV.

Postquam igitur in conspectum ea produximus, quæ circa crises & dies criticos in certa experientie veritate ipsoque facto fundata sunt; nunc, quum nihil sine ratione sufficiente in rerum natura fiat, paulo curiosior incidit quæstio: cuinam scilicet causæ illa observatio, quod septenario numero, tam magna, vel in melius, vel deterius fiat mutatio, tribuenda sit? Veteres, quibus corpori nostri mechanico-organica structura, & rerum corporearum natura, proprietates & operationes, motuumque regulæ, plane erant incognitæ, naturæ, tanquam agenti cuidam & principio rationali omnia secundum ordinem, numerum, mensuram & tempus in corpore nostro producenti adscripserunt, in auxilium etiam vocatis cœlestium siderum, solis & maxime lunæ influxibus, quam Priscorum sententiam, plures etiam

Critica numero septenario adscribitur, non, ut primo loco tenet.

Testes: Ipsi & per y. & c. dicit.

pa-pa-ra non servat crisi.

gala omnia morbi.

Inprimis in variolis & morbillis.

tiam ex nostris sola credulitate sequi video. Sed qui in philosophicis errorem per petitionem principii argumentationem norunt & nihil in rationali explicatione & deductione, nisi quod clare & distincte concipi, definire, vel sufficientibus argumentis probari & adstrui potest, admittunt, fisiones quoque a claris, & distinctis conceptibus, sterilia nomina, a causis realibus distinguere didicerunt, minime hac philosophandi, quæ pigris, non vero sagacioribus ingenis accommodata admodum ratione contenti sunt, eo quod ex gratis supposito tali principio, nullum naturæ phenomenon commode explicari & intelligi potest, tantum abest, ut vel levissimum usum in applicatione ad praxin inde sperandum.

§. XVI.

Sed motibus in corpore,
ex formæ et effectus in diversis derivatis
Neque enim crisis pro actu quodam mentali aut ideali, quales quidem etiam dantur in corpore, haberi potest, sed potius pro mechanico, si-ve certo effectu motuum, qui sunt in corpore nostro, a causis potissimum corporeis & physicis. Nam quia omnes in rerum natura effectus, & mutationes, aliqua vitæ, conservatio, nutritio, mors, morbus, medicamentorum operatio, & sanatio spectant, nonnisi a certis motibus dependent, quin a certa rerum corporearum figura, magnitudine, nexu, situ & vi agente, resistente proveniunt, & omnes inde resultantes effectus certum etiam gradum ac numerum, si-ve quantitatem motuum desiderant; necesse utique est, ut notabiles effectus certo quodam absolvan- tur tempore, quia hoc nihil aliud est, quam certus motuum sibi invicem succedentium ordo & numerus. Quod vero solennissimæ naturæ operationes in toto universo, & maxime microcosmo, potissimum ad septenarii numeri terminum, uti ex diversis ætatum periodis & annis climactericis, de quorum rationali explanatione egi peculiari dissertatione, patet, succedant at-

que contingant, clarissime sapientissimi divini opificis, summam & infinitam in structura universi & præcipue corporis exhibitam artem arguit, eaque propter ordinati hi omnes lepenario numero adstricti & comprehensi universales & in sacris quoque obvii effectus, longe rectius a prima, una & infinita causa, Deo, quam a multis particularibus principiis rationaliter & moraliter agentibus, deducuntur.

§. XVII.

Ut itaque clarum etiam ac verum conceptum habeamus de crisi in morbis, illa nobis nihil aliud est, quam morbi & symptomatum successiva cessatio, quæ propter ipsarum universalium illarum, qui in febribus omnes nervosas & vasculosas partes occupat, maxime in emunctioris resolutionis & causam quæ ipsum produxit correctam, vel expulsum, contingit. Jam quum ipsæ febres acutæ, pro causa, vel stases sanguinis & humorum inflammatorias, vel humorem quandam causticæ corrosivæ indolis, partibus nervosis in hærescentem, habeant; ad stases vero sanguinis in vas præternaturales expediendas & materiam causticam nervis inimicam corrigendam & ab interioribus ad exteriora emovendam, certi partium solidarum motus & fluidorum appulsus requirantur: aliter sani fieri & res concipi nequit, quam ut certis etiam temporibus cessatio morbi & symptomatum sequatur atque eveniat, quam evacuationes liberaliores, remittentibus spasmis, per cutem, alvum, urinam, potissimum vero pulsum & respiratio melior & magis naturalis, testantur. Quod si itaque hæc omnia non observantur, neque evacuationes junctæ sunt, certum indicium est, morbum, vel ejus causam, nondum per naturam, hoc est motus naturales, victam esse & subjugatam, sed ingens adhuc periculum corpori imminere, quod cum tempore semper ingravescit.

Et sic quæque crisis in morbis ratione reddenda.

§. XVIII.

Parti-
mata ex
crisi
præfata

Reddita sic crifum rationali explicatione, multo rectius nunc Medicus de crifi Veterum perfectæ, imperfectæ, evacuatione critica salutari & symptomatica, judicare poterit atque decernere. Inde etiam ratio patebit, cur circa sic dictos criticos dies, rectissime monente Hippocrate, nihil moveri debeat, ne motus naturæ ordinati & salutares, quibus materiam peccantem per convenientia organa ejicit, turbentur & alia incongrua loca non sine periculo divertantur. Denique prona quoque elucescet conſequentia, evacuationes iſtas ſalutares, quibus partim materia, quæ morbum fecit, partim etiam noxi humores, qui ſub ipſo morbo geniti & accumulati fuerunt, excluduntur, non imprudenter cohibendas eſſe, ne vel recidivæ, vel lentæ febres, aut aliæ chronicæ affectiones ingignantur, ſed potius eo reſpicendum, ut ſi motus evacuationarii paullo ſegniore ſint ob debilitatem virium, roborantibus & analepticis iſdem adjuventur ac promoveantur.

§. XIX.

Criſis
quæque
pæſto
ſunt in
inter-
mittentibus

Quo quidem omnia ſicuti de febribus acutis, continuis & adtentibus in propatulo ſunt: ita jam quæſtio indagine haud indigna emergit: num etiam in intermittentibus febribus criſes dentur? quod utique certo reſpectu affirmamus. Licet enim in iſdem dies certi & ſtati, qui etiam ad eſſentiam criſum non pertinent, minus obviæ ſint: ubi tamen ſolutio morbi & ſymptomatum ſucceſſiva ſit, junctis largioribus evacuationibus, ibi recte noſtra ſententia criſin fieri aſſeritur, eaque propter quum in omnibus paroxyſmis febrium id eventat, ac ſub declinatione largi ſudores fluant, urina cocta & cum ſedimento appareat, non raro etiam vehementia ſymptomatum in tertianis per excretionem purulentas circa labia, item in quartanis per puſtulas ſcabioſas & ulcerofas, humore quodam acri corroſivo

Tom. III.

a partibus interioribus nervolis ad exteriores propulſo, mitigetur atque diſcedat, criſes in iſdem contingere nequitiam erit negandum.

§. XX.

Nec ad
aliæ
chronicæ
etiam
ble.

Neque etiam in aliis chronicis morbis inſolentes adeo ſunt criticæ ſolutiones. Nonnulli etiam morbi, quantumvis diuturni ac rebelles, ita ſunt comparati, ut cum die & tempore, maxime circa diverſas novas ætatis periodos, ſponte ſolvantur ac cedant. Ac de epilepſia quidæ notum, quod infantili & juniori ætati, quam maxime ſit inſeſta, pubertatis autem tempore ac erumpente in virginibus menſium fluxu, ſæpiſſime diſcedere ſoleat. Ut adeo experientia reſpondeat aph. 20. Sect. 3. Hippocras. plurimæ affectiones pueri judicantur partim in quadraginta diebus, partim in ſeptem menſibus, partim in ſeptem annis, partim ad pubertatem accedentibus.

epilepſia

dolor
bus

Deinceps omnes dolores gravioreſ, cephalalgia, cardialgia, atroces colici, nec non paroxyſmi epileptici & ſpafmodico-convulſivi, criſes ſuas ſervant, quibuſcum complacantur. Ipſe porro crebrius obſervavi, quod graves nervorū & capitis morbi, motus convulſivi ac epileptici item vertigines & inſanix, quin pathemata ſpafmodica, quæ hypochondriacæ melancholiam referunt, propulſi ad corporis ſuperficiem purpureaceſ effloreſcentiæ, aut erumpentibus puſtulis ulcerofiſ, ſeliciſſime terminentur, præſertim ſi Medicus congrua medicina ſalutarem hanc criſin proſequatur ac tueatur. Nam ſæpius hi morbi a cauſtica quadam ſcorbutica materia, nervoliſ partibus firmiter inhxreſcentes, natales ducunt, quæ ſi ad exteriores partes robore naturæ amandatur, graves iſtæ interiorum partium affectiones conquieſcunt. Sennertus quoque, Rhodius, Tulpius & Pecklinius multa conſignarunt exempla, maniam, melancholiam & epilepſiam, diarrhæa, excretionibus cutaneis & abſceſſibus diſceſſiſſe. Sopore profundos, vertiginem, mentis turbationem, nec non aſthmata convulſiva, accedente da-

nerve
rum
capitiſ

M lore

allu-
morbi.

lore podagrico, vel erumpente hæ-
morrhoidum fluxu, judicatos fuisse
ac penitus sublatos, sæpius vidi. Hy-
dropem anasarcam, obortâ spontanea
diarrhea, *Forestus lib. 10. obs. 31.* &
largissima narium hæmorrhagia *Hil-*
danus Cent. 1. obs. 50. sine medica-
mentis sublevisse ac evanuisse, testan-
tur. Et quæ plura hanc in rem facien-
tia, in superioribus jam cap. 8. & 9.
nec non antecedente 13. ac 12. spar-
sim inferuimus.

CAPUT XV.

*De certis imminētis in morbis pe-
riculi ipsiusque mortis indiciiis.*

Progn-
sticis
& an-
tefatis

§. I.

QUAMVIS non negandum sit, no-
bilem illam de morborum de-
cursu & maxime eventu perite
judicandi scientiam, non directe ad
finem artis obtinendum pertinere:
nullum tamen dubium est, quin ea-
dem utilis admodum & scitu necessa-
ria sit, & quam maxime ad evincen-
dam certam artis nostræ rationem ip-
siusque Medici exilimationem ser-
vandam conferat. Nam præclare pro-
more suo *Hippocrates*, artis prognos-
ticæ facile princeps, statim in limine
prænotionum tradidit: *Medicum præ-*
notionem adhibere optimum esse mihi
videtur. Prænotens enim & prædi-
cens apud ægros, & præsentia, & præ-
terita, & futura, & quæ ipsi ægri delin-
quunt exponens, fidem utique fece-
rit, quod ægrotorum res magis cognos-
cat: quare audebunt homines seipso
Medico committere. Idem lib prædict.
Sect. 3. inculcat, in prædictionibus
inquiens, Medici illius probe memores
esse debent, quod si cui successeris præ-
dictio, ita apud ægrotum intelligentia præ-
dictum admirationi fuerit; si vero quis
aberraverit supra hoc quod hodie habet,
forte, esse etiam insanire videbitur.

§. II.

Ardua
tamen
& dif-
ficulta

Dolendum modo, excellentem
hanc & divinam fere in morbis præ-

fagiendi scientiam, tam arduam, tam
invidam, incertam & dubiam depre-
hendi, non ut immerito iudicium de
morborum eventu ex vero forman-
dum sit in difficillimis; & Medici et-
iā periti sæpissime in hoc delinquant.
Nam quia Veteres non ex integris
morborum historiis, sed paucis dun-
taxat circumstantiis, regulas prognos-
ticas desumerunt, neutiquam certe
mirum est, parum certi iisdem inesse
ac easdem sæpius experientiz non res-
pondere. Accedit, quod, quum pri-
mi Medicinæ auctores, neque vitæ,
neque morborum aut mortis, in quo
posita sit, naturam & rationem intel-
lexerint, structuræ quoque corporis
humani atque ex ea pendendum mo-
tum plane ignari fuerint, ex obser-
vationibus etiam plenis veras causas
& notas futuri in morbi eventus, con-
venienti & rationali modo elicere
haud potuerint, sed potius etiam hanc
artis nostræ partem empirice tantum
coluerint, eaq; propter symptomata,
sub quibus aliquoties ægros mor-
tuos observant, pro funestis illico
declaratione, quum tamen eadem pro-
diversitate corporum, morborum, re-
gionum, morbi etiam temporum, mi-
rifice variant, ut hinc derivata prognos-
tica præcepta rariius veritati & expe-
rientiæ sint consentanea. Recentio-
rum autem quamplurimi vix alia in-
cedunt via, & simulacrum artem salutarem
opificii instar addiderunt, ad ejus
exercitium, minus instructi iis sub-
idiis, quæ rationalem efficiunt Medi-
cum, properant, aut statim inter
initia morbi præcipitanter nimis,
antequam certas notas habere possint,
iudicium interponunt, eaque propter
non possunt non in prognosi forman-
da graviter delinquere & falli, ut tan-
quam moribundum deferant, qui po-
stea convalescit, aut vicissim vel ju-
ramento, ut novi, fidem faciant, con-
valiturum, qui elapsis vix aliquot ho-
ris, occumbit.

§. III.

Sed quo magis difficilis & ardua
hæc

Addi-
tenda
sunt in
vitiis
§. II.

hæc præfagiendi ars est, eo magis laborandum Medico, quo eandem addiscat & potissimum certa ratione, & experientia subnixta imminentiis in morbis periculi ipsiusque morbis signa, acquirat, de quo etiam non est quod desperemus. Nam illud negari nullo modo potest, omnes eventus, sive ad salutem, sive interitum referendi sint, a certis, adæquatis & proportionatis cussis proficisci, nec sine his contingere posse. Quodsi itaque causas, cur æger necessario ex morbo mori debeat, quis probe noscat; nullum sane est dubium, quin ex earum præsentia futurum interitum conicere possit atque prædicere. Vicissim quando artifex exacte callet, quo modo, quo tempore, quibus viis aut excretionibus morbus solvatur & æger ad sanitatem traducatur: ex his utique confideret & cum certa ratione de salute futura iudicium promere poterit. Proinde quum in superioribus, & maxime capite quarto, genealogiam causarum, quæ sanitatem immediate pervertunt, & proxime antecedentibus ea, quæ de cognoscenda morborum ex variis signis solutione scitu necessaria, solide & rationali modo exposuerimus: expedita jam via est ad eruenda ac sistenda futuri in morbis vitæ discriminis signa atque indicia, quibus tuto in edendo præfagio inniti queat artifex.

§. IV.

Quod igitur ad morbos acutos, sive febres attinet, ex antecedentibus ut notum supponimus, in quavis harum duplicem obvium esse motum, probe invicem discernendum, alterum summe pernicipalem & vere morbosum spasticum, qui a circumferentia ad centrum tendit, alterum salutarem, post spasmum a centro ad circumferentiam directum, cujus beneficio exitiales illæ spasticæ partium stricturæ laxantur, inflammatoriarum stases discutiantur & tubuli excretorii, stricti antea & clausi, felicissime adaperiuntur. Jam quicumque binorum horum sibi

oppositorum motum genium, potentiam, effectus & mutuas eorum actiones & relationes penitus novit: is utique magna cum ratione & prudentia in omnibus agere, pericula prudenter prædicere & sautos eventus quam optime prænunciare poterit. Nam si infesti spasmi ac inde dependentes inflammationes, congestiones ac stases sanguinis, a motu calido resolutorio febrili, certo interposito tempore, non digeruntur ac discutuntur, sed firmius persistunt, in proclivi est iudicare: demum succubituram naturam, putredinem insequituram ipsamque mortem certo futuram: id quod eo magis metuendum, quando spasticæ stricturæ circa dies criticos, corpore a morbo jam debili reddito, non conquiescunt, sed potius incrementa sumunt.

§. V.

Ut autem lethiferi spasmodorum effectus eo clarius innotescant, breviter strictissime indicia exponemus haud fallacia, e quibus de illorum præsentia ac vehementiæ gradu coniciendum. Tenendum igitur, exitiales has spasmodicas stricturas, non unam sed plures in corpore, cum majori, vel minori discrimine, adoriri partes, eaque propter prout partes variant, variis quoque dignosci signis. Nimirum quando rigor cum frigore circa morbi vigorem observatur, vel sæpius recurrit, si corpus non æqualiter molle, sed durum, calidum & asperum est, si exanthemata retrocedunt, vel tantisper absconduntur, exteriora horrent & frigent, fonticuli quoque vel ulcera antea manantia siccantur, nihil boni porteadunt, sed summum mortis periculum minantur, qua propter spasmos in superficie corporis, sanguinis & humorum motus ad interiora coactus, pessimas inflammatorias congestiones facile suscitatur, & impedit, quo minus morbida materia perpiratione corpore possit expelli. Perigunt quoque in acutis spasmi plerumque ad excretorios emissarios, urina-

De indiciis periculosis acutis sive febrilibus.

De indiciis periculosis acutis sive febrilibus.

in genibus.

indicia.

spasmodici.

exanthemata.

arios nempe tubulos & ani ostium, ut urina tenuis aquosa reddatur, & alvus plane dura, tensa & oclusa sit. In quibusdam etiam, ob urgentem reciprocam stricturam, frequens mœjendi & desidendi adest stimulus.

§. VI.

*Spasmus
cordis
& tunc
aerum
arteria-
rum.*

Longe gravius periculum imminet, si quando spasticæ contractiones interiores ac nobiliores, quæ motibus vitalibus vacant partes, infestant. Nam pulsus parvus, contractus celer & durus item inæqualis & intermittens, non aliunde, quam a spastica & convulsiva strictura nervorum, qui cordis fibris & tunicis arteriarum implantantur, proficiscitur, & semper in statu morbi plurimum periculi portendit.

*nervorum
pneumonicorum
nam.*

Ejusdem notæ respiratio crebra, anxiosa & difficilis est, ubi in critica tempora incidit: quandoquidem sicuti sapienti Hippocratis effato in prognosticis, facile spirare magni momenti est ad salutem in omnibus morbis, ita crebrior & ægra inspiratio in acutis, minus fausta semper est ominis. Nervis præcordialibus spasmus affectus summæ urgent anxietates, inquietudo corporisque jactatio, ac ægri crebrius lectum situmque mutant. Oesophagi & ventriculi membranæ nerveo-mulculares quum stringuntur, vomendi adest conatus, potus regurgitat, non infrequenter e faucibus limpidum serum stillat, deglutitio difficulter perficitur ac inexhausta sitis, cum oris & linguæ ariditate affligit, quibus raptu in consensum simul duodeno, flavus corporis, maximeque faciei color junctitur.

*Spasmus
gi &
ventriculi
quæ.*

§. VII.

*Spasmus
universi
nervorum
quæ.*

Ubi vero atrocitas spasmus latius diffunditur ac universum nervosum genus graviter concurrit, atque convellit, ad ultima jam ventum esse indicio sunt nares acuminatæ, tempora collapsa, aures frigida & languida, oculi concavi, cutis circa frontem dura ac tensa, color fuscus aut perpalitus, quibus facies Hippocratica, certus mortis nuncius describitur. Huc quo-

que referenda nervorum distensio, quæ semper in acutis terroris, & periculi plena, juxta aph. 6. Sect. 4. ac potissimum cognoscitur, quando æger supinus cubat, genua contrahit, pronus subinde ad pedes ruit, brachia & pedes nudos exporrigit & inquietus jactitat, ungues ac digitos pallidos habet, manibus floscos legit simbriaeque diducit, vel in vicino pariete, si quæ minuta eminent, carpit, quibus si demum tendinum subsultus accedunt, hora adest decretoria.

§. VIII.

Quamvis autem plurimi ex acutis morbis ex inflammatione interna primam trahant originem eaque propter periculo non careant, laxissime tamen in ipso vigore morbi quæ superveniunt, vel in ventriculo, vel cerebri membranæ inflammationes, quæ nunquam non gravissimi sunt discriminis ac mortis prænunciæ. Atque hæc inflammations, sive alterutra earundem, sive ambæ simul adfint, non modo in malignis, petechialibus, contagio infectis & caltrensibus febribus, sed & in aliis acutis, lyncochis, ardentibus, purpureis, variolis & morbillis, circa septimum, nonum, vel undecimum diem accedentes, ægrum certissime perimunt. Et stomachi quidem inflammati signa sunt, quando intensus æstus & ardoris exquisiti sensus, cum acuto circa præcordia dolore urget, & circumscripta ibi regio tactu durior præcipitur, extrema algescunt, summa anxietas & inquietudo affligit, sique omne, quicquid vel medicamenti, vel potus assumptum, aut protinus vomitu rejicitur, aut retentum maximam creat molestiam, ipsamque anxietatem adauget. Quandoque tam late inflammatio sepiat, ut per oesophagum ad ipsas fauces propagetur, quæ inde ardentibus doloribus pustulis obducuntur, & viscido corrupto muco jugiter obducuntur, ex quo mortis præsagium petendum. Periculosior hac, licet sæpius ipsi jungatur, est illa mortem brevi ante-

*signa
inflam-
mationis
aust
talis.*

*signa
inflammationis.*

et cere-
bri in-
flam-
matio.

antecedens membranarum cerebri inflammation, Græcis phrenitis dicta, quæ plerumque assiduam & pertinacem vigiliam impensumque capitis dolorem excipit. Hanc futuram rigor, urinx copiosæ ac tenues, aurium tinnitus, tortis pulsatio in capitis interioribus & paucæ stillantes e naribus sanguinis guttæ nunciant præsentem autem produnt oculi rubicundi, scintillantes & torvi, mentis alienatio, sermo inconditus, male coherens, lacrymarum involuntarius sæpe effluxus, dentium stridor eum abolita humidi appetentia, quæ si convulsionibus demum stipantur, mortis serunt significationem.

§. IX.

Mal-
gustas
an quæ
cogno-
scenda.

Atque hæc sunt præcipua pathemata & signa, quæ vitam in discrimen adduci in acutis testantur, obvia maxime in iis, qui temperamento cholericis, sanguinei vel sanguineo-cholericis, ætate juvenes & viri, exquisitori sensu præditi, ad iram proclives, habitu corporis macilentis & qui spirituosius nimium indulserunt. Secus vero evenit in iis, qui succulenti & spongiosi sunt corporis, phlegmatici, ac vires vel per morbos, in ediam aut diuturnam mœstitiā, vel enormes sanguinis profusiones perdiderunt. Nam hi non tam per vehementes spasmos & gravia dolorifica pathemata jugulantur, quam potius ex motuum imbecillitate atque defectu, partiumque atonia mortem oppetunt, & stagnationes ac stases sanguinis atque humorum statim in principio in putridam corruptionem inclinant. Et licet sic dispositi ægri non sine ventriculi & cerebri membranarum inflammatione pereant: hæc tamen non tam gravibus spasmis & symptomatibus stipatur, sed sub mitiori insultu in corruptionem concedit. Hinc quia morbus plerumque lenioribus incedit symptomatibus sæpius Medicis imponit, ut in præfatio ferendo sallatur, quum tamen ob occultam perniciem eo difficilior sit judicium eoque majore

Tom. III.

rem foveat malignitatem. Cognoscuntur autem maligni ejusmodi morbi his indiciis: cum levis frigore & horrore accedunt, vires statim mirum prostratæ sunt, pulsus languidus & frequens simulque contractus micat, in situ erecto facile animo deficiunt ægri, somnus nullus, perpetua tamen ad eum adest inclinatio, & si obrepit, major viriam postea percipitur languor & mens ipsa emovetur, decumbentes de nullo dolore, siti, vel magna molestia conqueruntur, inquieti tamen sunt & sese jactitant, sique demum extrema algescunt ac pulsus deficere incipit, nec in carpo amplius percipitur, lethalis inammet catastrophe.

§. X.

Tissi-
nae in-
flam-
matio
in sphe-
celum
transiit

Quumq; porro omnis inflammatio demum in necrosin sive sphacelofam putredinem transire solet: noscenda quoque sint signa, quæ factum hoc esse subindicant. At tum quidem internus frigoris percipitur sensus, dolor acutus antea & acerbior, circa caput vel inferiores partes subito conquiescit, mens delira quodammodo ad se redit, virium vero defectus increfcit, pulsus penitus deficit, vel valde inæqualis, angustus & intermittens est, alvus stricta laxatur & vel præter voluntatem fertur, vultus feccus ac pallens comparet, tempora, cervix & pectus gelido sudore nudent, extrema corporis frigescent, borborigmi ac sonitus in ventre exaudiuntur & liquida immissa sonitum quando descendunt emittunt, *als wann sic in einen hoblen Topf fielen*. Quæ omnia si præsto sunt, mortem adesse manifesto produnt, eo quod ob sphacelum vires summentem, partium atonia & virium lapsus adeo increfcit, ut omnis in corpore motus, & cum eo vita, exspirent.

§. XI.

In par-
te & p-
alba.

Sunt vero adhuc alii affectus qui & inflammatione, & atrocioribus spasmis perimunt, in quibus non minus instans vitæ discriminem ex obviis phaz-

M 3

no-

nomenis conjici potest. Nimirum febris cum purpura alba, quæ lymphæ valde vappescēntis & corruptæ soboles est, si in fine associatur aliis acutis febribus, item variolis; morbillis, vel etiam in puerperio post lochia suppressa accedit, nunquam periculi expers est, ac ut plurimum per inflammationem interiorum partium, præsertim ventriculi & intestinorum necat. Funestum autem suggerit indicium, si æstus præcordiorum summamque anxietatem internus frigoris sensus, cum pulsu parvo, debili & inæquali excipit, purpura disparat, animi defectio, mens turbata & spiratio difficilis adsunt. Eodem in censum referendæ variolæ, quæ ubi statim primis diebus cum gravi dolore lumborum & delirio ingruunt & præmature secundo mox die exanthemata, in cute aspera instar purpuræ cum maculis, comparent, ac die quinto & sexto post plenam eruptionem pulsus non sedatior fit, sed celer micat totumque corpus pustulis oblitum est, raro quengquam in juvenili ætate evasisse scio. Neque minus periculi metuumdum, ubi circa nonum diem gravissimus ex suppuratione dolor accedit, qui sæpissime omnia, quæ salutis spem ostendere videntur, pervertit atque immutat. Hæc enim ardente sua vehementia, univēsum genus nervorum spasmus afficiens summas parit anxietates, corporis jactationem, pustularum subsidebantiam, donec respiratio difficilis, mentis turbatio, convulsio & pulsus languidus, parvus supervenientes brevi vitam eripiant.

§. XII.

Quicunque a veneno vel validissimo emetico aut purgante sumto moriuntur, hos identidem inflammatio sphacelosa, teste anatome practica, e medio tollit. Mortis autem præsagium ferunt ardores interni & summæ anxietates, pulsus valde parvus & inæqualis, vel plane deficiens, cum sudore frigido, delirio & convulsione, quam a pharmaco purgante concitatam ipse Hip-

poocrates Sect. 7. aphor. 25. & passim alibi, mortiferam pronunciat. Qui ex dolore a calculo decedunt, in his plerumque inflammatio lethalis ventriculi & meningum supervenit. Quod si enim vomitus & acutissimum dolorem febris sequitur, cum magna anxietate & siti vehemente, postea singultus & delirium cum extremorum frigore accedit, æger non diu amplius erit superstes. Illud vero atrocissimum dolorum in intestinis genus, quod colicæ convulsivæ nomine notum, sæpius quoque perimit, dum intestinum rectum ob exquisitissimum sæpe ex stagnante cruore doloris sensum, & inflammatione & sphacelo afficitur, sub quo ex putrescente intestino foetidissima prodeunt excrementa, pulsus frequens & debilis, cum summo virium lapsu, sequitur & sphacelosa corruptio quandoque ad extremas partes ipsumque scrotum serpit, ut obrepente animi tandem defectione, mors ipsa succedat.

§. XIII.

In passione iliaca, ubi acutissimi instant dolores cum contumaci alvi constipatione & vomitu assiduus etiam male olente accedente singultu, delirio, gelido sudore, extremorum frigore nervorumque distensione, certos adesse multis prodromos censendum, observante id dudum Hippocrate Sect. 7. aphor. 10. sic perhibente: *ab ilco vomitus, singultus, convulsio aut delirium, malum*. Chole- ricus morbus quando stipatur impensiori dolore & torsionibus, tam superius, quam inferius, magno impetu humores, præsertim virides, eliduntur, sitis vix extinguibilis urget, facies flavescit vel pallescit & pulsus parvus & concilius deprehenditur, in ancipiti ægrum versari significant. Ubi vero arteriarum motus lentim gracilescit ac plane deficit, crura contrahuntur, sudor frigidus prodit, animoque liquuntur ægri, inflammationem in sphacelum

Summo
veneno
aut dra-
matico.

dolore
calent

colica
convul-
siva.

Passione
iliaca,

cholera

jam

Signa periculosa. jam concessisse indicia confirmant. Dyſenteria quoque ſi languentem adhuc a priori morbo corripit, raro ſervatur æger, quia facilis tunc ad putridam corruptionem aditus, quam præſentem torminum acutiſſimorum ſubita remiſſio, exteriorum refrigeratio cum ſumma virum jactura iadicant, futuram autem, ſingultus, cardialgia, præcordiorum æſtus atque anxietas, pernicialiſſimæ ventriculi inflammationis ſigna, nunciant.

§. XIV.

Signa periculosa. Accedunt ſigna, quæ ſuffocationem ipſiusque periculum minantur, & antecedunt, conſpicua in iis, qui gravibus peſtoris morbis, angina, peripneumonia, empyemate, catarrho ſuffocativo, aſthmate convulſivo, thoracis hydropes detinentur ac tandem pereunt. Nam omnes hi aſſectus non modo liberum aeris in pulmones ingreſſum & ex iis egreſſum interceptiunt, ſed & ſanguinis per pulmonum vaſa, ex uno in alterum cordis ventriculum, ſufflaminant & tollunt, ac ſic jugulant. Angina quidem, quæ muſculos laryngis inter nos occupat, & Græcis cýnanche dicitur, ubi neque in cervice, neque in faucibus, quicquam vel tumoris, vel ruboris, conſpicitur, exquisitiſſimus tamen dolor ac vehemens febris affligunt, citiſſime per ſuffocationem necat. Actum quidem, ut verbis utar *Lomii obſervat. medicinal. lib. 2.* oculi vertuntur & rubeant & veluti iis qui ſtrangulantur prominent, vox impedita nihil ſignificat & qualis catulorum eſt tenuis editus, os apertum hiat frigidi aeris cupidum, ex eoque ſpumans ſaliva movetur, lingua exſeritur, potuidatus liquor per nares remeat, ipſe æger totus inquietus eſt; crebro e cubili exiit, tandem vero ſtrangulatu atque ſyncope oppreſſus perit. Ita etiam præſufocatione occidit peripneumonia, in qua ſi nihil plane exſecratur, ſed anxia adeſt ſpirandi difficultas & magna anguſtia, inquietudo, ſputum intus in peſtore ſtrepit,

pulſus inæqualis & intermittens ſerit, alvus infirmis jam viribus ſponte fertur, quod ſcreatu operoſe ejicitur ſpumofum, modo ſlavum, modo cruentum eſt, ſtomaſtum ſimul urget vigilia, phrenitis jungitur, ægri cupidiffime frigidam auram capiant, proni & erecti cubant & reclinati præfocari videntur, quinto, vel ad ſummum ſeptimo die, certo jugulantur.

§. XV.

males convulſivi. Qui aſthmate ſic dicto convulſivo idem tamen ſuffocatione pereunt. Naſcitur enim hoc malum plerumque ex hydropes thoracis, dum ruptis hydatidibus, humor effuſus pulmonum impedit liberam expansionem, ut nec aer ingredi, nec ſanguis per eos curſum conſicere queat. Oritur quoque ubi interior bronchiorum tunica, multis & magnis glandulis obſita, ita anguſtatur, ut nec ſpiritus in pulmonibus elidi, nec novum recipi patiatur. Quandoque convulſivus quidam ſpasmus tam ſortiter bronchia concurrit atque coarctat, ut ægri ſtrangulatione miſere intereant. Hinc in omnibus hiſce afflictionibus ſumma anxietas & inquietas cum tremula ſpiratione, pulſus inordinatus, & inæqualis, nec non ſibilus ac ſtrepitus in peſtore præſto ſunt, ægri crebrius locum ſitumque mutant & nihil niſi ſpumofi aut cruenti quippiam extunditur, tandemque in aſſeſcentibus corporis extremis, ſyncope & ſuffocatione opprimuntur.

§. XVI.

Catarrhus ſuffocativus. Idem contingit in catarrho ſic dicto ſuffocativo, qui maxime ſenes imbecilles atque infantes perimit, ac plerumque paralyſi nervorum pneumonicorum ortum debet. Trahitur in hoc pariter ſumma cum difficultate & anxietate ſpiritus, & quia bronchiis, ſecedente à ſanguine humores viſcido ſeroſo, repletis, nihil tamen ſputi ejicitur, aer admiſſus ſtrepitum & ronchum in ſiſtulis edit, donec præluſo penitus aere æger ſuffocatur.

let, graves primum patiuntur dolores, quos, si non excipit effusio lochialis sanguinis, sed fluxus magis obstitatur, uteri plerumque inflammatio & febris valde exitiosa sequitur. Testatur facit febrilem hunc morbum incendium ab inferioribus locis usque ad cordis regionem vergens, cui si magna anxietas, virium prostratio, inquietudo & omnis appetitus dejectio junguntur, postea sensus internus frigoris cum horrore accedit, pulsus frequens, parvus & debilis micat, visus quoque obscurare incipit, mortem ex spachelo instare, haud dubia est significatio. Plurimæ ex puerperis integra mente obire solent, & licet hæc antea turbata fuerit, paucis tamen ante mortem horis sæpe ad se redit, ut imperitiores rem penitus in vado esse sibi persuadeant, pulsus tamen moribundus proximi interitus semper certus est index. Alia phænomena præsto sunt in puerperis, quæ ob nimium sanguinis post partum & in puerperio profuvium, pereunt, quæ tunc lentus cum pulsu frequentia & debili calor assidue urget, neque etiam mane post somnum sedatur, juncta præterea est inappetentia viriumque plenaria dejectio, & circa exitum puerperii, hoc est sexta post hebdomade, syncopica plerumque mors succedit.

§. XXIII.

Denique morbi, quibus infantes decedunt, utplurimum spasmodici sunt & convulsivi, inflammationem & sphacelum, præsertim ventriculi, intestinorum, aur capitis, inducentes. In teneriori enim ætate, ob dolores ex dentitione, & abdominis ex hæc corrupto tormina acutiora, facili in epilepsiam & convulsionem, febres quoque atque asthmata est lapsus. Quod si vero epilepticus paroxysmus unus alterum crebro consequitur, & alvus antea fortiter clausa, sponte jam dimittit excrementa, matrem foetida & nigra, vox simul clangosa fit ac singultuosa, totumque cor-

pus ardet, haud dubie augurandum, imminere funestum finem.

§. XXIV.

Hæc itaque sunt potiora & certiora signa, quæ in vari generis morborum afflictionibus periculum, aut plane interitum nunciant: ita tamen comparata, ut in applicatione eorundem ad prognosin, magnum judicium, curata distinctio, omniumque circumstantiarum pensitatio accedere debeant; quo eventus formato ex iis iudicio respondeat. Et primo quidem sollicite distinguenda sunt pathemata in morbis spasmodicis chronicis obvia, ab iis, quæ in acutis comparent. Nam sæpillime in hypochondriacis & hysteriacis ejusmodi truculenta occurrunt symptomata, quæ in acutis lethalem effectum minantur, in aliis vero minus periculi alunt. Et quid frequentius est? quam quod hypochondriaco & hysterico malo laborantes sub paroxysmis maximis anxietates, spirandi angustias, cum extremorum frigore & urina aquosa, pulsu existente debili & parvo, patiantur, qui plane vehementis animi deliquium, perferant, quæ tamen omnia brevi remittunt, expirant sine periculo transeunt.

§. XXV.

Deinde probe discernenda sunt morborum tempora. Nam ex omnibus, quæ modo attulimus indicis funestis, si quædam, vel etiam plura sub initio & primis morbi diebus apparuerint, præcipitanter nimis ageret, qui statim mortem instare exinde judicaret. Alia vero ratio est, quando viribus nimio calore, vigilia assidua, inappetentia, anxietate, dolore, per plures dies infestante, strætis & exhaustis, funesti ejusmodi spasmi & ab iis oriunda symptomata prodeunt, maximeque iis temporibus, quibus morbus alius salutariter solvi solet. In primis etiam primus impetus & vehementia morbi invadentis curate expendenda; quæ, si statim in principio vires dejicit, pul-

In forma
prognosi
distin-
guenda

pathemata
chronicorum
& acutorum

Tempora mor-
bi.

De infan-
tibus.

sa valde frequenter feriente, nil boni portendit, sed potius imbecillitatem ferendo morbo imparem, succorum impuritatem & ad corruptionem proclivitatem luculenter arguit.

§. XXVI.

Corporis.

Porro exquisita etiam semper habenda est ratio corporum, quæ agitant, & maxime perquirendum: utrum ex imbecillibus, an robustis sint? eo quod illa nunquam non in morbis magis, quam quæ robustioris & validioris sunt constitutionis, periclitantur, ac potissimum facili negotio ex doloribus vel inflammationibus sphaceli corripuntur mortifero. Imbecillibus vero ratione ætatis senes & infantes, ratione corporis structuræ, qui repleti multisque & exilibus vasibus instructi sunt, annueramus, neque minus eos, qui a parentibus debilibus ac morbois procreati sunt, item, qui præcedente diuturno morbo, vel immodicis sanguinis profusionibus ac diuturna inedia, aut impenso animi affectu, mæsticia, cura & graviore meditatione, vires attriverunt ac consumserunt. Eundem quoque in censum referendæ puerperæ & qui ex vitio diætæ aut vitæ regiminis, nec non excretionibus repressis, ingentem impurorum succorum copiam sibi contraxerunt.

§. XXVII.

Ætatis.

Neque tandem omittendum, quod in signorum consideratione, studiose semper attendendum sit artificii: nûm a causis quibuscumque externis nocentibus, per iram, terrorem, corporis refrigerationem, aut cibum inalsubrem, vel pharæmum vehemens & virulentæ indolis, atrociam jam conspicuam suscitata sint symptomata? Quæ quidem in morbis per se periculosis corporibusque infirmis, in vitæ discrimen ægros adducere, vel ipsam mortem accelerare possunt; in morbo vero minus accipit & corpore valente, non adeo extimescenda.

C A P U T XVI.

De causis mortem in morbis gignentibus.

§. I.

QUUM princeps ac præcipuus salutari arti præfixus sit scopus, ut in curandis morbis quibus ad interitum facilis & ordinarius iter est transitus, corpus a morte modis defendat omnibus, idque Medicus cum certa firmâ & fundata ratione facere debeat: necesse utique est, quo proximâ & adæquatâ mortis causas & quomodo eadem ipse ex morbis gignantur, medentem quilibet studiose scrutetur atque pernoscat. Jam vero non melior imago apta ad perquirendas, quæ mortem in morbis inferunt causas suppetit via, quam per dissectionem corporum morbis defunctorum, qua clarissime, quid mors & quænam formalis ejus ratio, vel sensura ministerio, palpari possit ac percipi. Næpim ex omnibus consignatis observationibus & historiis anatomico-practicis, planum sit atque testatum: mortem nihil aliud esse, quam subitam penitus progressivam & circularem sanguinis ac humorum beneficio cordis & vasorum motionem, quam, vel canalium, præsertim circa cor & pulmones, a polyposi concretæ obturationes, vel largiores fori & sanguinis in cerebro aut nobilioribus aliis partibus, extravasationes, vel succorum in partibus eminentioribus usus nervoso-muscularis inflammatorie in sphacelosas putredinem transeuntis stases, vel etiam putridæ viscerum corruptiones, proxime gignant & immediate producant. Quapropter e re utique erit, ut quæ ex his in variis morborum generibus post mortem deprehendantur causæ, ex fide dignis qui instituerunt sectiones auctoribus delibemus, & ea quæ fieri possunt brevitate, hoc loco commemoramus, non maxime in finem.

Mortis
causæ
signa
scindat

non sit
in ge-
nere

Nam ex nostris sola credulitate sequi video. Sed qui in philosophicis errorum per petitionem principii argumentationem morunt & nihil in rationali explicatione & deductione, nisi quod clare & distincte concipi, definiri, vel sufficientibus argumentis probari & adstrui potest, admittunt, fictiones quoque a claris, & distinctis conceptibus, sterilia nomina, a causis realibus distinguere didicerunt, minime hac philosophandi, quæ pigris, non vero sagacioribus ingenii accommodata admodum ratione contenti sunt, eo quod ex gratis supposito tali principio, nullum naturæ phenomenon commodè explicari & intelligi potest, tantum abest, ut vel levissimum usum in applicatione ad praxin inde sperandum.

§. XVI.

Sed motibus in corpore,
Neque enim crisis pro actu quodam mentali aut ideali, quales quidem etiam dantur in corpore, haberi potest, sed potius pro mechanico, si-ve certo effectû motuum, qui sunt in corpore nostro, a causis potissimum corporeis & physicis. Nam quia omnes in rerum natura effectus, & mutationes, aliqua vita, conservatio, nutritio, mors, morbus, medicamentorum operatio, & sanatio spectant, nonnisi a certis motibus dependent, quin a certa rerum corporum figura, magnitudine, nexu, situ & vi agente, resistente proveniunt, & omnes inde resultantes effectus certum etiam gradum ac numerum, si-ve quantitatem motuum desiderant; necesse utique est, ut notabiles effectus certo quodam absolvantur tempore, quia hoc nihil aliud est, quam certus motuum sibi invicem succedentium ordo & numerus. Quod vero solennissimæ naturæ operationes in toto universo, & maxime microcosmo, potissimum ad septenarii numeri terminum, uti ex diversis ætatum periodis & annis climactericis, de quorum rationali explicatione egi peculiari dissertatione, patet, succedant at-

que contingant, clarissime sapientissimi divini opificis, summam & infinitam in structura universi & præcipue corporis exhibitam artem arguit, eaque propter ordinati hi omnes septenario numero adstricti & comprehensi universales & in sacris quoque obviis effectus, longe rectius a prima, una & infinita causa, Deo, quam a multis particularibus principii rationaliter & moraliter agentibus, deducuntur.

§. XVII.

Ut itaque clarum etiam ac verum *Et sic quædam crisis in morbis* conceptum habeamus de crisi in morbis, illa nobis nihil aliud est, quam morbi & symptomatum successiva cessatio, quæ propter spasmodum universalem illum, qui in febribus omnes nervosas & valculosas partes occupat, maxime in emunctioris resolutionis & causam quæ ipsum produxit correctam, vel expulsum, contingit. Jam quum ipsæ febres acutæ, pro causa, vel stases sanguinis & humorum inflammatorias, vel humorem quandam causticæ corrosivæ indolis, partibus nervosis inhaerescerent, habeant; ad stases vero sanguinis in vasis præternaturales expediendæ & materiam causticam nervis inimicam corrigendam & ab interioribus ad exteriora emovendam, certi partium solidarum motus & fluidorum appulsus requirantur: aliter sani fieri & res concipi nequit, quam ut certis etiam temporibus cessatio morbi & symptomatum sequatur atque eveniat, quam evacuationes liberaliores, remittentibus spasmodis, per cutem, alvum, urinam, potissimum vero pulsus & respiratio melior & magis naturalis, tellantur. Quod si itaque hæc omnia non observantur, neque evacuationes junctæ sunt, certum indicium est, morbum, vel ejus causam, nondum per naturam, hoc est motus naturales, victam esse & subjugatam, sed ingens adhuc periculum corpori imminere, quod cum tempore semper ingravescit.

Red-

§. XVIII.

Perij-
mata en
crisi
præstite

Reddita sic crifum rationali ex-
plicatione, multo rectius nunc Medici-
cus de crisi Veterum perfectæ, imper-
fectæ, evacuatione critica salutari &
symptomata, judicare poterit atque
decernere. Inde etiam ratio patebit,
cur circa sic dictos criticos dies, re-
ctissime monente Hippocrate, nihil
moveri debeat, ne motus naturæ ordi-
nati & salutares, quibus materiam
peccantem per convenientia organa
ejicit, turbentur & alia incongrua
loca non sine periculo divertantur.
Denique prona quoque elucescet con-
sequentia, evacuationes istas saluta-
res, quibus partim materia, quæ mor-
bum fecit, partim etiam noxi humo-
res, qui sub ipso morbo geniti & ac-
cumulati fuerunt, excluduntur, non
imprudenter cohendas esse, ne vel
recidivæ, vel lentæ febres, aut aliæ
chronicæ affectiones ingignantur,
sed potius eo respiciendum, ut si mo-
tus evacuatorii paullo segniores sint
ob debilitatem virium, roborantibus
& analepticis eidem adjuventur ac
promoveantur.

§. XIX.

Crisis
acuta
per affe-
ctum in
inter-
mitten-
tibus.

Quo quidem omnia sicuti de febris
acutis, continuis & ardentibus in
propatulo sunt: ita jam quæstio inda-
gine haud indigna emergit: num et-
iam in intermittentibus febribus cris-
es dentur? quod utique certo respec-
tu affirmamus. Licet enim in ist-
dem dies certi & statim, qui etiam ad
essentiam crifum non pertinent, mi-
nus obvii sint: ubi tamen solutio mor-
bi & symptomatum successiva fit, jun-
ctis largioribus evacuationibus, ibi
recte nostra sententia crifum fieri asse-
ritur, eaque propter quum in omni-
bus paroxysmis febrium id eventat,
ac sub declinatione largi sudores flu-
ant, urina cocta & cum sedimento
appareat, non raro etiam vehementia
symptomatum in tertianis per excre-
tiones purulenta circa labia, item in
quartanis per pustulas scabiosas & ul-
cerosas, humore quodam acri corrosivo

Tom. III.

a partibus interioribus nervosis ad ex-
teriores propulso, mitigetur atque dis-
cedat, crises in istdem contingere neu-
tiquam erig negandum.

§. XX.

Nec ad
allos
chronic-
os mor-
bos.

Neque etiam in aliis chronicis morbis
insolentes adeo sunt criticæ solutionis.
Nonnulli etiam morbi, quantumvis
diuturni ac rebelles, ita sunt comparati,
ut cum die & tempore, maxime circa
diversas novas ætatis periodos, sponte
solvantur ac cedant. Ac de epilepsia
quidē notum, quod infantili & juniore
ætati, quam maxime sit infesta; puber-
tatis autem tempore ac erumpente in
virginibus mensium fluxu, sæpissime
discedere solet. Ut adeo experientia
respondeat aph. 20. Sect. 3. Hippocras.
plurimæ affectiones pueris judicantur
partim in quadraginta diebus, partim
in septem mensibus, partim in septem an-
nis, partim ad pubertatem accedentibus.
Deinceps omnes dolores graviore, ce-
phalalgia, cardialgia, atroces colici, nec
non paroxysmi epileptici & spasmodi-
co-convulsivi, crises suas servant, qui-
buscum complacantur. Ipse porro cre-
brius observavi, quod graves nervorū
& capitis morbi, motus convulsivi ac
epileptici item vertigines & insanix,
quin pathemata spasmodica, quæ hypo-
chondriacam melancholiam referunt,
propulsi ad corporis superficiem purpu-
raceis efflorescentiis, aut erumpentibus
pustulis ulcerosis, felicissime terminen-
tur, præsertim si Medicus congrua me-
dicina salutarem hanc crifum prosequatur
ac tueatur. Nam sæpius hi morbi a
caustica quadam scorbutica materia,
nervosis partibus firmiter in hærescen-
tes, natales ducunt, quæ si ad exteriores
partes robore naturæ amandatur, gra-
ves istæ internorum partium affectio-
nes conquelescent. Sennertus quoque,
Rhodius, Tulpus & Pecchlinus mul-
ta consignant exempla, maniam, mel-
ancholiam & epilepsiam, diarrheam,
excretionibus cutaneis & abscessibus
discessisse. Soporos profundos, vertigi-
nem, mentis turbationem, nec non
asthmata convulsiva, accedente do-

epilep-
siadolori-
busnervorū
& capitis.

M lore

lore podagrico, vel erumpente hæmorrhoidum fluxu, judicatos fuisse ac penitus sublato, sæpius vidi. Hypodropem anasarcam, oborta spontanea diarrhæa, *Forestus lib. 10. obs. 31.* & largissima narium hæmorrhagia *Hil-danus Cent. 1. obs. 50.* sine medicamentis subsedisse ac evanuisse, testantur. Et quæ plura hanc in rem facientia, in superioribus jam cap. 8. & 9. nec non antecedente 13. ac 12. sparsim inseruimus.

CAPUT XV.

De certis imminuentis in morbis periculi ipsiusque mortis indiciiis.

§. I.

Prognosis
in
morbis
& mor-
tali

Quamvis non negandum sit, nobilem illam de morborum decursu & maxime eventu perite judicandi scientiam, non directe ad finem artis obtinendum pertinere: nullum tamen dubium est, quin eadem utilis admodum & scitu necessaria sit, & quam maxime ad evincendam certam artis nostræ rationem ipsiusque Medici existimationem servandum conferat. Nam præclare pro more suo *Hippocrates*, artis prognosticæ facile princeps, statim in limine prænotionum tradidit: *Medicum prænotionem adhibere optimum esse mihi videtur. Prænotens enim & prædicens apud egrotos, & præsentia, & præterita, & futura, & quæ ipsi egroti delinquent exponens, fidem utique feceris, quod egrotorum res magis cognoscas: quare audebunt homines se ipsos Medico committere. Idem lib. prædict.* Sect. 3. inculcat, in prædictionibus inquires, *Medici illius probe memores esse debent, quod si cui successerit prædictio, is apud egrotum intelligentia prædictum admirationi fuerit; si vero quis aberraverit supra hoc quod hodie habetur, fortasse etiam insaniere videbitur.*

§. II.

Ardua
tamen
& dif-
ficilis

Dolendum modo, excellentem hanc & divinam fere in morbis præ-

fagiendi scientiam, tam arduam, tam inhdam, incertam & dubiam deprehendi, non ut immerito iudicium de morborum eventu ex vero formandum sit in difficillimis; & Medici etiā periti sæpissime in hoc delinquant. Nam quia Veteres non ex integris morborum historiis, sed paucis duntaxat circumstantiis, regulas prognosticas defumaserunt, neutiquam certe mirum est, parum certi iisdem inesse ac easdem sæpius experientiæ non respondere. Accedit, quod, quum primi Medicinæ auctores, neque vitæ, neque morborum aut mortis, in quo posita sit, naturam & rationem intellexerint, structuræ quoque corporis humani atque ex ea pendendum motuum plane ignarifuerint, ex observationibus etiam plenius veras causas & notas futuri in morbis eventus, convenienti & rationali modo elicere haud potuerint, sed potius etiam hanc artis nostræ partem empirice tantum coluerint, eaque propter symptomata, sub quibus aliquoties egros mortuos observant, pro funestis illico declaratione, quum tamen eadem pro diversitate corporum, morborum, regionum, morbi etiam temporum, mirifice varient, ut hinc derivata prognostica præcepta rarius veritati & experientiæ sint consentanea. Recentiorum autem quamplurimi vix alia incedunt via, & simulacrum salutarem opificii instar addiderunt, ad ejus exercitium, minus instructi iis subsidiis, quæ rationalem efficiunt Medicum, properant, aut statim inter initia morbi præcipitanter nimis, antequam certas notas habere possint, iudicium interponunt, eaque propter non possunt non in prognosi formanda graviter delinquere & falli, ut tanquam moribundum deserant, qui postea convalescit, aut vicissim vel iuramento, ut novi, fidem faciant, convalesciturum, qui elapsis vix aliquot horis, occumbit.

§. III.

Sed quo magis difficilis & ardua hęc

Addi-
tenda
sunt in
notis
fig. 6.

hæc præfagiendi ars est, eo magis laborandum Medico, quo eandem addiscat & potissimum certa ratione, & experientia subnixâ imminentiis in morbis periculi ipsiusque morbis signa, acquirit, de quo etiam non est quod desperemus. Nam illud negari nullo modo potest, omnes eventus, sive ad salutem, sive interitum referendi sint, a certis, adæquatis & proportionatis cussis proficisci, nec sine his contingere posse. Quodsi itaque causas, cur æger necessario ex morbo mori debeat, quis probe noscat; nullum sane est dubium, quin ex earum præsentia futurum interitum conicere possit atque prædicere. Vicissim quando artifex exacte callet, quo modo, quo tempore, quibus viis aut excretionibus morbus solvatur & æger ad sanitatem traducatur: ex his utique confideret & cum certa ratione de salute futura iudicium promere poterit. Proinde quum in superioribus, & maxime capite quarto, genealogiam caussarum, quæ sanitatem immediate pervertunt, & proxime antecedentibus ea, quæ de cognoscenda morborum ex variis signis solutione scitu necessaria, solide & rationali modo exposuerimus: expedita jam via est ad eruenda ac sistenda futuri in morbis vitæ discriminis signa atque indicia, quibus tuto in edendo præfagio inniti queat artifex.

§. IV.

Quod igitur ad morbos acutos, sive febres attinet, ex antecedentibus ut notum supponimus, in quavis harum duplicem obvium esse motum, probe invicem discernendum, alterum summe perniciæ & vere morbosum spasticum, qui a circumferentia ad centrum tendit, alterum salutarem, post spasmum a centro ad circumferentiam directum, cujus beneficio exitiales illæ spasticæ partium stricturæ laxantur, inflammatoriæ stases discutuntur & tubuli excretorii, stricti antea & clausi, felicissime adaperiuntur. Jam quicunque binorum horum sibi

oppositorum motum genium, potentiam, effectus & mutuas eorum actiones & relationes penitus novit: is utique magna cum ratione & prudentia in omnibus agere, pericula prudenter prædicere & falsos eventus quam optime prænunciare poterit. Nam si infesti spasmi ac inde dependentes inflammationes, congestiones ac stases sanguinis, a motu calido resolutorio febrili, certo interposito tempore, non digeruntur ac discutuntur, sed firmius persistunt, in proclivi est iudicare: demum succubituram naturam, putredinem insequituram ipsamque mortem certo futuram: id quod eo magis metuendum, quando spasticæ stricturæ circa dies criticos, corpore a morbo jam debili reddito, non conquiescunt, sed potius iucremēta sumunt.

§. V.

Ut autem lethiferi spasmorum effectus eo clarius innotescant, breviter strictique indicia exponemus haud fallacia, e quibus de illorum præsentia ac vehementiæ gradu coniciendum. Tenendum igitur, exitiales has spasticas stricturas, non unam sed plures in corpore, cum majori, vel minori discrimine, adoriri partes, eaque propter prout partes variant, variis quoque dignosci signis. Nimirum quando rigor cum frigore circa morbi vigorem observatur, vel sæpius recurrit, si corpus non æqualiter molle, sed durum, calidum & asperum est, si exanthemata retrocedunt, vel tantisper absconduntur, exteriora horrent & frigent, fonticuli quoque vel ulcera antea manantia siccantur, nihil boni portendant, sed summum mortis periculum minantur, qua propter spasmos in superficie corporis, sanguinis & humorum motus ad interiora coactus, pessimas inflammatorias congestiones facile suscitât, & impedit, quo minus morbida materia per spiratione corpore possit expelli. Perigunt quoque in acutis spasmi plerumque ad excretoriorum emissaria, uri-

Indicia
ex

De iudiciis
periculosis
acutis
sive fe-
brilibus.

in ge-
nere

Indicia
ex

spasma
cutis

Ex-
cretio-
rium

antece-
dentem
denti-
bus illis.

antece-
dentem membranarum cerebri inflammationem, Græcis phrenitis dicta, quæ plerumque assiduam & pertinacem vigiliam insensumque capitis dolorem excipit. Hanc futuram rigor, urina copiosa ac tenues, aurium tinnitus, fortis pulsatio in capitis interioribus & pauca stillantes e naribus sanguinis guttæ nunciant præsentem autem produnt oculi rubicundi, scintillantes & torvi, mentis alienatio, sermo inconditus, male coherens, lacrymarum involuntarius sæpe effluxus, dentium stridor cum abolita humidi appetentia, quæ si convulsionibus demum stipantur, mortis ferunt significationem.

§. IX.

Atque hæc sunt præcipua pathemata & signa, quæ vitam in discrimen adduci in acutis testantur, obvia maxime in iis, qui temperamento cholericis, sanguinei vel sanguineo-cholericis, ætate juvenes & viri, exquisitori sensu præditi, ad iram proclives, habitu corporis macilenti & qui spirituosius nimium indulerunt. Secus vero evenit in iis, qui succulenti & spongiosi sunt corporis, phlegmatici, ac vires vel per morbos, in ediam aut diuturnam mœstitiam, vel enormes sanguinis profusiones perdiderunt. Nam hi non tam per vehementes spasmos & gravia dolorifica pathemata jugulantur, quam potius ex motuum imbecillitate atque defectu, partiumque atonia mortem oppetunt, & stagnationes ac stases sanguinis atque humorum statim in principio in putridam corruptionem inclinant. Et licet sic dispositi ægri non sine ventriculi & cerebri membranarum inflammatione pereant: hæc tamen non tam gravibus spasmis & symptomatibus stipatur, sed sub mitiori insultu in corruptionem concedit. Hinc quia morbus plerumque lenioribus incedit symptomatibus sæpius Medicis imponit, ut in præfatio ferendo fallantur, quum tamen ob occultam perniciem eo difficilioris sit iudicio eoque majore

Tom. III.

rem foveat malignitatem. Cognoscuntur autem maligni ejusmodi morbi his indicibus: cum levis frigore & horrore accedunt, vires statim mirum prostratæ sunt, pulsus languidus & frequens simulque contractus micat, in situ erecto facile animo deficiunt ægri, somnus nullus; perpetua tamen ad eum adest inclinatio, & si obrepit, major viriam postea percipitur languor & mens ipsa emovetur, decumbentes de nullo dolore, siti, vel magna molestia conqueruntur, inquieti tamen sunt & sese jactitant, sique demum extrema algescunt ac pulsus deficere incipit, nec in carpo amplius percipitur, lethalis inminet catastrophiæ.

§. X.

Quumq; porro omnis inflammatio demum in necrosin sive sphacelofam putredinem transire solet: noscenda quoque sint signa, quæ factum hoc esse subindicant. At tum quidem internus frigoris percipitur sensus, dolor acutus antea & acerbus, circa caput vel inferiores partes subito conquiescit, mens delira quodammodo ad se redit, virium vero defectus increfcit, pulsus penitus deficit, vel valde inæqualis, angustus & intermittens est, alvus stricta laxatur & vel præter voluntatem fertur, vultus secdes ac pallens comparet, tempora, cervix & pectus gelido sudore nudent, extrema corporis frigescent, borborigmi ac lunitus in ventre exaudiuntur & liquida immissa sonitum quando descendunt emittunt, *als vuanu sic in einen hoblen Topf fielen*. Quæ omnia si præsto sunt, mortem adesse manifeste produnt, eo quod ob sphacelum vires fumentem, partium atonia & virium lapsus adeo increfcit, ut omnis in corpore motus, & cum eo vita, expirent.

§. XI.

Sunt vero adhuc alii affectus qui in inflammatione, & atrocioribus spasmis perimunt, in quibus non minus instans vitæ discrimen ex obviis phæ-

M 3

uo-

Yræph-
yos in-
flamma-
tionis
to spæ-
cium
inducto

In part-
a

nomenis conjici potest. Nimirum febris cum purpura alba, quæ lymphæ valde vappescēntis & corruptæ soboles est, si in fine associatur aliis acutis febribus, item variolis; morbillis, vel etiam in puerperio post lochia suppressa accedit, nunquam periculi expertus est, ac ut plurimum per inflammationem interiorum partium, præsertim ventriculi & intestinorum necat. Funestum autem suggerit indicium, si ætuum præcordiorum summamque anxietatem internus frigoris sensus, cum pulsu parvo, debili & inæquali exeipit, purpura dispareret, animi defectio, mens turbata & spiratio difficilis adsunt. Eandem in censum referendæ variolæ, quæ ubi statim primis diebus cum gravi dolore lumborum & delirio ingruunt & præmature secundo mox die exanthemata, in cute aspera indur purpuræ eum maculis, comparent, ac die quinto & sexto post plenam eruptionem pulsus non sedatior fit, sed celer micat totumque corpus pustulis oblitum est, raro quenquam in juvenili ætate evasisse scio. Neque minus periculi metuentum, ubi circa nonum diem gravissimus ex suppuratione dolor accedit, qui sæpissime omnia, quæ salutis spem ostendere videntur, pervertit atque immutat. Hæc enim ardente sua vehementia, universum genus nervorum spasmodici afficiens summas parit anxietates, corporis jactantionem, pustularum subsidentiam, donec respiratio difficilis, mentis turbatio, convulsio & pulsus languidus, parvus supervenientes brevi vitam eripiant.

§. XII.

Quicunque a veneno vel validissimo emetico aut purgante sumto moriuntur, hos identidem inflammatio sphacelosa, teste anatome practica, e medio tollit. Mortis autem præsagium ferunt ardores interni & summæ anxietates, pulsus valde parvus & inæqualis, vel plane deficiens, cum sudore frigido, delirio & convulsione, quam a pharmaco purgante concitatam iple Hip-

poocrates Sect. 7. aphor. 25. & passim alibi, mortiferam pronunciat. Qui ex dolore a calculo decedunt, in his plerumque inflammatio lethalis ventriculi & meningum supervenit. Quod si enim vomitum & acutissimum dolorem febris sequitur, cum magna anxietate & siti vehemente, postea singultus & delirium cum extremorum frigore accedit, æger non diu amplius erit superstes. Illud vero atrocissimum dolorum in intestinis genus, quod colicæ convulsivæ nomine notum, sæpius quoque perimit, dum intestinum rectum ob exquisitissimum sæpe ex flagnante cruore doloris sensum, & inflammatione & sphacelo afficitur, sub quo ex putrescente intestino foetidissima prodeunt excrementa, pulsus frequens & debilis, cum summo virium lapsu, sequitur & sphacelosa corruptio quandoque ad extremas partes ipsumque scrotum serpit, ut obrepente animi tandem defectione, mors ipsa succedat.

§. XIII.

In passione iliaca, ubi acutissimi instant dolores cum contumaci alvi constipatione & vomitu assiduus etiam male olente accedente singultu, delirio, gelido sudore, extremorum frigore nervorumque distensione, certos adesse multis prodromos censendum, observante id dudum Hippocrate Sect. 7. aphor. 10. sic perhibente: ab ileo vomitus, singultus, convulsio aut delirium, malum. CholeERICUS morbus quando spiratur impensiori dolore & torsionibus, tam superius, quam inferius, magno impetu humores, præsertim virides, eliduntur, sitis vix extinguibilis urget, facies flavescit vel pallescit & pulsus parvus & concisus deprehenditur, in ancipiti ægrum versari significant. Ubi vero artierarum motus lenis gracilescit ac plane deficit, crura contrahuntur, sudor frigidus prodit, animoque liquuntur ægri, inflammationem in sphacelum jam

Sumis
veneno
aut dra.
lico.

dolore
causant

colica
convul.
siva.

Passione
iliaca.

cholera

jam concessisse indicia confirmant. *signa periculi.* Dysenteria quoque si languentem adhuc a priori morbo corripit, raro servatur æger, quia facilis tunc ad putridam corruptionem aditus, quam præsentem torminum acutissimorum subita remissio, exteriorum refrigeratio cum summa virum iactura indicant, futuram autem, singultus, cardialgia, præcordiorum æstus atque anxietas, pernicialis in ventriculo inflammationis signa, nunciant.

§. XIV.

Accedunt signa, quæ suffocationem ipsiusque periculum minantur, & antecedunt, conspicua in iis, qui gravibus pectoris morbis, angina, peripneumonia, empyemate, catarrho suffocativo, asthma convulsivo, thoracis hydropse detinentur ac tandem pereunt. Nam omnes hi affectus non modo liberum aeris in pulmones ingressum & ex iis egressum interceptum, sed & sanguinis per pulmonum vasa, ex uno in alterum cordis ventriculorum, sufflamant & tollunt, ac sic jugulant. Angina quidem, quæ musculos laryngis inter nos occupat, & Græcis cýnanche dicitur, ubi neque in cervice, neque in faucibus, quicquam vel tumoris, vel ruboris, conspicitur, exquisitissimus tamen dolor ac vehemens febris affligunt, citissime per suffocationem necat. Ac tum quidem, ut verbis utar *Lomii observat. medicinal. lib. 2.* oculi vertuntur & rubent & veluti iis qui strangulantur prominent, vox impedita nihil significat & qualis catulorum est tenuis editus, os apertum hiat frigidi aeris cupidum, ex eoque spumans saliva movetur, lingua exseritur, putridatus liquor per nares remeat, ipse æger totus inquietus est; crebro & cubili exsilit, tandem vero strangulatus atque syncope oppressus perit. Ita etiam præfocacione occidit peripneumonia, in qua si nihil plane excreatur, sed anxia adest spirandi difficultas & magna angustia, inquietudo, spiritum intus in pectore strepit,

pulsus inæqualis & intermittens ferit, alvus infirmis jam viribus sponte fertur, quod screatu operose ejicitur spumiosum, modo flavum, modo cruentum est, continua simul urget vigilia, phrenitis jungitur, ægri cupidissime frigidam auram capiant, proni & erecti cubant & reclinati præfocari videntur, quinto, vel ad summum septimo die, certo jugulantur.

§. XV.

Qui asthma sic dicto convulsivo idem tamen suffocatione pereunt. Nascentur enim hoc malum plerumque ex hydropse thoracis, dum ruptis hydatidibus, humor effusus pulmonum impedit liberam expansionem, ut nec aer ingredi, nec sanguis per eos cursum conficere queat. Oritur quoque ubi interior bronchiorum tunica, multis & magnis glandulis obrita, ita angustatur, ut nec spiritum in pulmonibus elidi, nec novum recipi patiatur. Quandoque convulsivus quidam spasmus tam fortiter bronchia concutit atque coarctat, ut ægri strangulatione mi ere intereant. Hinc in omnibus hæc afflictionibus summa anxietas & iniquas cum tremula spiratione, pulsus inordinatus, & inæqualis, nec non sibilus ac strepitus in pectore præsto sunt, ægri crebrius locum situmque mutant & nihil nisi spumosi aut cruenti quippiam extunditur, tandemque inalgescitibus corporis extremis, syncope & suffocatione opprimuntur.

§. XVI.

Idem contingit in catarrho sic dicto suffocativo, qui maxime senes imbecilles atque infantes perimit, ac plerumque paralyti nervorum pneumonicorum ortum debet. Trahitur in hoc pariter summa cum difficultate & anxietate spiritus, & quia bronchiis, secedente à sanguine humore viscido seroso, repletis, nihil tamen sputi ejicitur, aer admissus strepitum & ronchum in fistulis edit, donec præcluso penitus aere æger suffocatur.

M. 4

Catarrhus suffocativus.

Phili.

tur. Quod antequam evenit, pulsus aliquot sæpe ante horis intermittit, sensim gracilescit penitusque intercidit, nonnunquam etiam mentis turbatio cum extremorum frigore supervenit. Pari quoque ratione phitilici, si ob virium plenarium lapsum humor parulenti, copiosius in exesa ampla cavitate reconditus, non eliditur, sed exspuitio cessat, præcluso spiramento, exspirant, ita tamen, ut periculum & suæneis eventus diu ante colligi possit, quando totum corpus tabe consumitur, assidua hæctica febris urget, genæ rubent, alvus nimis fluit, ungues pallent, pedes intumescunt, oculi concavi & nares acuminatæ apparent.

§. XVII.

In morbis chronicis exitus pariter certis quibusdam signis potest dignosci.

Ex morbis autem chronicis eminentissime maxime hydrops, scorbutus, cachexia, marasmus, bæctica & tabes, quorum periculum & futurus lethalis exitus pariter certis quibusdam signis potest dignosci. Scilicet qui iisdem decumbunt, lento gradu ad mortem procedunt, propter successive incrementem & latius serpentem viscerum ex humorum stagnatione & extravasatione corruptionem, quæ, quoniam nulla arte arceri aut perfanari potest, certo mortem ingenerat. Indicia vero viscerum in inferiori ventre corruptorum adeoque sequuturi interitus sunt, appetitus penitus prostratus, cum fastidio etiam eorum alimentorum, quibus sani mirum delectati fuerunt. Deinde lenta febris si incrementa sumit & pulsus etiam mane post somnum celer est, nunquam non internam corruptionem producit. Denique summi virium cum respiratione difficilis lapsus, somnus valde laboriosus & plus debilitans, quam reficiens, in pessimis sunt. Hæc enim si diutius astigunt nullique remediis mitescunt, certo mortem præfagiunt, maxime si corpora sunt senilis, vel ex morbo præcedente chronicis ejusmodi passionibus implicata.

§. XVIII.

Quod speciatim ad hydropem attinet,

si is post asthma diuturnum cordisque palpitationem, vel ex induratione hepatis post quartanam sequitur, ægrum non facile servari posse, confidenter pronuntiandum, sique utina pauca, turbida & rufa redditur, omen est admodum periculosum, & simulac superiora contabescunt, faciesque flavescit, mortem aliquot menses antequam accedit, haud dubie præfagire licet, quæ etiam certissime, sobbre aucta, & respiratione difficili reddita, sequitur. Pariter his, qui sæpius, & maxime post motum corporis, & animi vehementiorem, gravem ac contumacem cordis palpitationem sentiunt, ac postea asthma convulsivum, hæmoptylum, aut hydropem incurrunt, diu mortiferum discrimen prædici potest. Nam horum omnium causa polyposa in cordis valvis concretio est, quæ nulla ope submovenda, tandemque concusantibus aliis causis, funestum ingenerat morbum, cujus periculum eo certius & gravius, si subito & sine manifesta causa sæpe anima deficit, quod certissimum reddit polypi suspicionem, qui repentinam mortem inferre solet, confirmante id jam Hippocr. Sect. 2. aph. 41. quæque sæpe multumque sine causa animo linquitur, si subito mori consuevit.

§. XIX.

In cachexia quando totum corpus intumescit ac pallidum fit, ciborum fastidium adeit & crebrior maleolentia vomitus urget, per alvum pauca feruntur, urina cruda & pauca secedit, spiritus difficulter trahitur, & e corpore adversus odor spirat, accedente postremo pulsu frequenti, mortem aliquot mensibus ante prænunciare licebit, quæ eo certius insequitur, quo ægrotans majora in victu, nimisque potu errata admisit, vel diuturnam animi moestitia fatigatus fuit. Hepar amplissimum illud abdominis viscus ubi mortifera corruptio occupat, fastidium cibi adeit, maximeque carniū nausea, frequens & multa uric sitis, febris urget, vires prosternuntur,

Spectatim hydropem.

Cachexia.

Corruptio pelone hepatis.

ror, singultus quassat subinde diaphragma, vomitu quoque excutitur serum vel flava bilis, ipsumque corpus tabe penitus sensim marcescit, & sapissime certe in his pathematibus defunctis, jecur sphacelolum plane & nigrum sectione deprehendi. Pariet ventriculi exulceratio longum & lethalem adducit morbum, & cognoscitur, quum summa anxietas & vomitus cibum assumptum, excipit, que oblata acri salina aut spirituosae medicina augetur, corpus interim contabescit, pulsus celer jugiter vibrat, extrema rigent & quandoque horrent, fonticuli siccescunt & ad cicatricem ducuntur, somnus accitus est & laboriosus. Et his feralibus qui detinentur passionibus, tertio vel quarto plerumque post mense expirant, ac diu ante mortis signa circumferunt.

§. XX.

Cancro exulcerato nemo facile servatur, propter summam corruptionem, quam sanies nigra, tenuis, odore abominabilis prodit, & lenta febris cum virium defectu, somno anxio, laborioso vel nullo comitatur, donec ultimo animi defectio & mors sequatur. Porro accidit interdum, ut inflammationes in exterioribus partibus consistentes, cujus generis sunt erysipelata, podagra & chiragra, retrocedant ad interiora & cito vitam eripiant, non alia ratione, quam inflammatione & sphacelatione ventriculi, aut intestinorum. Majus discrimen est, si in peste carbunculi vel bubones interiora repentes disparent, vel non rite prodeant. Hoc enim si contigerit, horrore æger concutitur, summa anxietate & inquietudine affligitur, æstu cum exteriorum refrigeratione regione ventriculi insidet, ad vomendum est conatus, vel etiam singultus accedit, donec ultimo sub mentis sublatione & syncope, æger exanimetur. Qui ex nimia sanguinis profusione, ut infelici abortu, hæmoptysi, vomitu cruento, vel mor-

bo nigro Hippocratis, aut gravi hæmorrhagia in febribus obeunt, ex animi quidem detectione & syncope pereunt, notabile tamen est, quod plerumque vehemens sitis, inclinatio ad vomitum & pulsus cum debilitate frequentia, nec non artuum distensio, præcedant, indicio, sanguinem in partibus interioribus, ventriculo & capite subsistentem, quosdam adhuc movere spasmos.

§. XXI.

Superfunt signa mali omnis in partu ac puerperio, quibus plures feminae discedunt. Nimirum quando mulieres vel ob incongruum foetus, præsertim grandioris, situm, continuus spasms doloribus ac laboribus per aliquot dies altitudis, junctis simul ardoribus internis vehementissimis, quos pulsuum celeritas arguit, defatigatæ sunt, accidit sæpius, ut parturientes, vel partu brevi defunctæ, dejectis repente viribus, in sorte animi deliquim, vel affectum apoplexiæ similem incidunt, nullaque arte vel ope vires & vitam recipere possint. Hic autem affectus, ubi aliquot horas perdurat, nec penetrantissima medicina, qualis est spiritus. salis ammoniaci cum calce viva paratus & oleo rutæ essentificatus, naribus intrusa, anima revocari potest, lethi signum est. Si facies sub synoptica hac affectione colorata manet, sanguinem ex vehementioribus spasms impetuofo ad cerebrum coactum hoc, apoplectico per omnia simile malum, produxisse subindicat, ac plerumque post obitum ex ore & naribus serum sanguineum tætidum effluit. Sæpius etiam evenit, ut foetus, expirante sub partu matre, post mortem demum, ob relaxatas tum vias & interiorem fermentativum motum, foras ex utero mortuus pariter propellatur.

§. XXII.

Quæ in puerperio decedunt feminæ, ut plurimum ex retento impuro sanguine, qui enixo partu ex utero salutæ per aliquot dies maneat: solent,

Tætidum
serum.

Tætidum
serum.

Stomachi
anxia.
ræsp.

Cancro
exulcerato.

Retentio
dentis
æstus.
datis.

Carbunculi.

Nimiam
hæmorrhagiam.

let, graves primum patiuntur dolores; quos, si non excipit effusio lothralis sanguinis, sed fluxus magis obstitatur, uteri plerumque inflammatio & febris valde exitiosa sequitur. Testatam facit febrilem hunc morbum incendium ab inferioribus locis, usque ad cordis regionem vergens, cui si magna anxietas, virium prostratio, inquietudo & omnis appetitus defectio junguntur, postea sensus internus frigoris eodem horrore accedit, pulsus frequens, parvus & debilis micat, visus quoque obscurare incipit, mortem ex spachelo instare, haud dubia est significatio. Plurimæ ex puerperis integra mente obire solent, & licet hæc antea turbata fuerit, paucis tamen ante mortem horis sæpe ad se redit; ut imperitiores rem penitus in vado esse sibi persuadeant, pulsus tamen moribundus proximi interitus semper certus est index. Alia phenomena præstio sunt in puerperis, quæ ob nimium sanguinis post partum & in puerperio profluvium, pereunt, quippe tunc lentus cum pulsu frequentia & debili calor assidue urget, neque etiam mane post somnum sedatur, juncta præterea est inappetentia viriumque plenaria defectio, & circa exitum puerperii, hoc est sexta post hebdomade, syncopica plerumque mors succedit.

§. XXIII.

Denique morbi, quibus infantes decedunt, ut plurimum spasmodici sunt & convulsivi, inflammationem & sphacelum, præsertim ventriculi, intestinorum, aut capitis, inducentes. In teneriori enim ætate, ob dolores ex dentitione & abdominis ex hæcæ corrupto tormina acutiora, facilius in epilepsiam & convulsionem, febres quoque atque asthmata est lapsus. Quod si vero epilepticus paroxysmus unus alterum crebro consequitur, & alvus antea fortiter clausa, sponte jam dimittit excrementa, mirum scerda & nigra, vox simul clangosa fit ac singultuosa, totumque cor-

pus ardet, haud dubie augurandum, imminere funestum finem.

§. XXIV.

Hæc itaque sunt potiora & certiora signa, quæ in variis generis morborum afflictionibus periculum, aut plane interitum nunciant: ita tamen comparata, ut in applicatione eorundem ad prognosin, magnum judicium, curata distinctio, omniumque circumstantiarum pensitatio. accedere debeant; quo eventus formato ex iis iudicio respondeat. Et primo quidem sollicite distinguenda sunt pathemata in morbis spasmodicis chronicis obvia, ab iis, quæ in acutis comparent. Nam sæpissime in hypochondriacis & hysteriacis ejusmodi truculenta occurrunt symptomata, quæ in acutis lethalem effectum ruinantur, in illis vero minus periculi alunt. Et quid frequentius est? quam quod hypochondriaco & hysterico malo laborantes sub paroxysmis maximis anxietates, spirandi angustias, cum extremorum frigore & urina aquosa, pulsa existente debili & parvo, patiantur, qui plane vehemens animi deliquium perfenscant, quæ tamen omnia brevi remittunt, expirant & sine periculo transeunt.

§. XXV.

Deinde probe discernenda sunt morborum tempora. Nam ex omnibus, quæ modo attulimus indicia funestis, si quædam, vel etiam plura sub initio & primis morbi diebus apparuerint, præcipitanter nimis ageret, qui statim mortem instare exinde judicaret. Alia vero ratio est, quando viribus nimio calore, vigilia assidua, inappetentia, anxietate, dolore, per plures dies infestante, frastus & exhaustus, funestis ejusmodi spasmi & ab iis oriunda symptomata prodeunt, maximeque iis temporibus, quibus morbus alius salutariter solvi solet. In primis etiam primus impetus & vehementia morbi invidentis curate expendenda; quæ, si statim in principio vires dejicit, pul-

In formam
mandi
prognosi
didit
Guenda

pathemata
chronicorum
& acutorum

Tempora morbi

Ac. in
sancti
bata.

Id valde frequenter feriente, nil boni portendit, sed potius imbecillitatem ferendo morbo imparem, succorum impuritatem & ad corruptionem proclivitatem luculenter arguit.

§. XXVI.

Porro exquisita etiam semper habenda est ratio corporum, quæ egrotant, & maxime perquirendum: utrum ex imbecillibus, an robustis sint? eo quod illa nunquam non in morbis magis, quam quæ robustioris & validioris sunt constitutionis, periclitantur, ac potissimum facili negotio ex doloribus vel inflammationibus sphaceli corripuntur mortifero. Imbecillibus vero ratione ætatis senes & infantes, ratione corporis structura, qui repleti multisque & exilibus vasibus instructi sunt, annumeramus, neque minus eos, qui a parentibus debilibus ac morbofis procreati sunt, item, qui precedente diuturno morbo, vel immodicis sanguinis profusionibus ac diuturna inedia, aut impensio animi affectu, mæstitia, cura & graviore meditatione, vires attriverunt ac consumierunt. Eundem quoque in censum referendæ puerperæ & qui ex vitio diætæ aut vitæ regiminis, nec non excretionibus suppressis, ingentem impurorum succorum copiam sibi contraxerunt.

§. XXVII.

Neque tandem omittendum, quod in signorum consideratione, studiose semper attendendum sit artifici: nûm a causis quibusdam externis nocentibus, per iram, terrorem, corporis refrigerationem, aut cibum insalubrem, vel pharmacorum vehementem & virulentum indolis, atrociam jam conspicua fuscitata sint symptomata? Quæ quidem in morbis per se periculosis corporibusque infirmis, in vitæ discrimen ægros adducere, vel ipsam mortem accelerare possunt; in morbo vero minus accipiti & corpore valente, non adeo extimescenda.

C A P U T XVI.

De causis mortem in morbis gignentibus.

§. I.

Quum princeps ac præcipuus salutari arti præfixus sit scopus, ut in curandis morbis quibus ad interitum facilis & ordinarius lece est transitus, corpus a morte modis defendat omnibus, idque Medicus cum certa firma & fundata ratione facere debeat: necesse utique est, quo proximis & adæquatas mortis causas & quomodo eadem aq. & ex morbis gignantur, medentum quilibet studiose scrutetur atque pernoscat. Jam vero non melior magisque apta ad perquirendas, quæ mortem in morbis inferunt causas suppetit via, quam per dissectionem corporum morbis defunctorum, qua clarissime, quid mors & quænam formalis ejus ratio, vel sententia ministerio, palpari potest ac perlinqui. Nimirum ex omnibus consignatis observationibus & historiis anatomico-practicis, planum fit atque testatum: mortem nihil aliud esse, quam sublatam penitus progressivam & circularem sanguinis ac humorum beneficio cordis & vasorum motionem, quam, vel canalium, præsertim circa cor & pulmones, a polypolis concrementis obturationes, vel largiores seri & sanguinis in cerebro aut nobilissimis aliis partibus, extravasationes, vel succorum in partibus eminentioris usus nervoso-muscularis inflammatoriarum in sphacelofam putredinem transientes itales, vel etiam putride viscerum corruptiones, proxime gignant & immediate producant. Quapropter e re utique erit, ut quæ ex his in variis morborum generibus post mortem deprehendantur causæ, ex fide dignis qui instituerunt sectiones auctoribus delibemus, & ea quæ fieri possent brevitate, hoc loco commemoramus, cum maxime, in finem.

Mors
causa
signo
fieri

quæ fit
in ge-
nera

Corpo-
ra.

Et inf.
sa.

finem, quo medentes mortíferas has causas congruis remediis tempeſtively averruncare conſulque ab interitu tueri poſſint, nec unquam imprudenti medicatione ad earundem geneſin quicquam conſerant.

§. II.

*Epilepsia
sim. in
apople-
nia.*

Incipiemus autem a ſuneſtis capitis morbis, quorum in numero poſſimum apoplexia, lethargus, epilepsia atque phrenitis ſunt, & primo loco diſpicimus: cur ſæpius ſani & robuſti, in optimo ætatis & virium vigore conſtituti, ex apoplexiatam repentina morte pereant? Et de hac quidem curatori eadem deſunctorum anatome clariffime confirmat; quod ſanguinis vel ſeri extravasatio in cerebro ejus ſit cauſa. Poſſimum *VVeſperus*, quo nemo majori ſolertia in hujus mali generationem inquiſivit, in extremo de *hiſtoriis apoplecticorum* libro, teſtatur: ſe ſemper ſere effuſum ex plexu choroideo cruorem, in cerebri penetralibus reperiſſe. Deinde *Villifur* lib. de anim. brutor. cap. 9. pag. 222. reſert hiſtoriam de juvene ſanguineo, plethorico & vino indulgenti, in cujus aperto capite, anterior cerebri cavitas ſanguine grumolo cum ſerico pia impleta viſa eſt. Et *VVarthonus* in *adenograph* cap. 2. fidem facit; ſe in iis, quos apoplexia ſubito abſtulerat, ventriculos cerebri ſanguine reſertos deprehendiſſe. Haud diſſimilis obſervatio legitur in *Miſc. nat. curioſ.* Dec. 2. An. 10. obſ. 161. dum diſſecto apoplectico, multum ſanieoſi ſeri ex cerebro diffuſiſſe, ſinus ſacatus, cruore turgidos & ventriculi lymphareſerti, fuerunt oſtenſi. Alius apoplexia interemtus, ut l. c. Dec. 2. An. 7. obſ. 154. proditum eſt, in ventriculis ſanguinem ſerolum extravasatum copioſum exhibuit; & grumus ſanguinis, ovi columbini forma, nec non quartus ventriculus cum infundibulo ſanguine turgidos repertus.

§. III.

Et quemadmodum apoplexiam ob ſanguinem vaſorum alveis elapſum

inducitur: ita in lethargo, paralyſi & hemiplexia, quæ ſæpe diuturnis cephalalgis, ſcorbuto aliſque graviſſimis aſſectibus chronicis, lethali eventu ſuperveniunt, ingens ſerico pia in cerebro conſpicitur. Sic *VVilſon* l. c. pag. 155. in cephalalgia diuturna ex lethargo demortuo, cerebri anfractus, tam exteriores, quam cavitatem internam, aqua limpida repletos offendiſſe. Puer trium annorum, teſte eodem auctore l. c. cap. 9. pag. 225. poſt ophthalmiam & faciei exanthemata ſoporofus factus, largam copiam limpidæ aque ſub meningibus ſtagnantis exhibuit, cujus copia etiam ventriculos & thalamos opticos implevit, eodemque comprimendo cæcitatem intubuit. Ex cephalalgia ſcorbutica demortuum, ventriculos cerebri copioſiori & acriori lymphâ tam turgidos geſtaſſe, ut uncie decem effluerint. *Miſc. nat. curioſ.* Dec. 2. An. 6. obſ. 3. teſtantur. Paralyticum quoque factum, vaſa cerebri atro ſanguine quammaxime turgentia & ventriculos largo ſero diſſentis oſtendiſſe; *Pezoldus* obſ. 60 auctor eſt. Idem confirmat *Harderus* obſ. 34. exemplo paralytici a longo tempore cachectici, quo poſt mortem ſectio, verſus ventriculos & prope baſin cerebri ac cerebellum, exundans ſerum occurrit, polypos quoque oblongus ex eodem loco extractus eſt.

§. IV.

Ex epileptico malo qui intereunt, *Epilepsia* in capite vaſa plerumque cruore turgida obtinent, & ſerum quod a ſanguine ſecelſit in inferiore cerebri parte ſtagnans. Idem ſit, quando quis ex phrenitide moritur, cui etiam ſuneſta epilepsia ordinario ſollet ſupervenire. Confirmat hoc *Harderus* obſ. 34. caſu epileptici quatuordecim annorum, qui ſanguine diducta habuit cerebri vaſa, protuberantibus inſtar veſicæ aque repletæ anterioribus ventriculis, e quibus facta incitione, ichor copioſiſſime profluſiſſe, qui in tertia & quarta cavitate non minori quantita-

te delituit. Eandem in rem facit observatio *Villisi lib. de morb. convuls. pag. 504.* ubi in femina, motibus convulsivis & epilepticis mortua, vasa meningum adeo sanguine facta fuisse narrat, ut quasi tota sanguinis massa in capite aggregata visa sit, cerebri vero substantia humore aquoso redundantius irrigata fuit & ventriculi aqua limpida repleti. Similem historiam idem auctor *l. c. pag. 542.* consignavit de femina, pathematibus convulsivis & hylericis oppressa, cujus vasa cerebri mirum sanguine distenta fuerunt, ut ejus vis quiequam in reliquo corpore effluerit, cerebri cavitatibus ac recessibus rosea colluvie plenis. Simili ratione *Petr. Pavu. obs. 8.* commemorat, in epileptico & phrenitide demortuo, vasa meningum sanguine atro & adusto fuisse distenta & in cerebello putridum humorem repertum. Et *Joh. Rhodius Cent. 1. obs. 39.* in phrenitide membranas cerebri cum rubore adeo tumentes invenit, ut venæ a cerebri substantia potuerint separari, in alio autem *obs. 40.* piæ matris vasa inflammata fuisse, scripto confirmat.

§. V.

Sanguinis itaque vel feri in capite exundantiam atque effusionem subito mortem inferre testatur experientia, neque etiam ratio deficit, cur id contingat, luculenter demonstrans. Nimirum cerebrum sanctius animæ domicilium ac tenuissimæ ac purissimi liquidi, quod vim, robur, tonum ac motum fibræ & solidæ corporis partibus præstat, secretorium ac officinam esse, & saniorum Veterum tulit sententia, & diligentior Recentiorum observatio anatomica confirmat. Nam spirituosum fumæque activitatis liquorem in, vasculoso cerebri cortice secerni, per medullaris substantiæ mandros ad oblongatam medullam pergere, & ex hac, nec non spinali, per appensos nervos ad subiectas partes derivari, ex eo clarissime patet: quod constructo vel dissecto membri

cujusdam nervo, protinus ejusdem sensus & motus expiret, diffracta vero vel discissa spinali medulla, partes infra læsionem illico omni sensatione ac movendi potentia priventur, & cervice fracta, nec non læso vel obturato spinæ principio, animans exemplo penitus exanimetur. Quumque ex oblongata in basi cerebri medulla, novem illa nervorum paria oriantur, quæ sensorius maxime præstunt & ad præcipuas vitales partes cor & pulmones abeunt, in proclivi est judicare: hac a ferro vel sanguine extravalato obstruata, aut compressa hunc mobilissimi nervei liquidi influxum, quam maxime intercipi, ut non mirum sit, animam nihil amplius percipere & cor atque arterias activo & vitali systoles mutu orbari ac ita mortem subito conciliari.

§. VI.

A morbis capitis progredimur ad eos, qui in pectore sedem ac domicilium suum habent, ac mortem cient, quorum in numerum referendi syncope, a Veteribus sic dicta cardiaca, asthma & catarrhus suffocativus, peripneumonia & phthisis. De hisce etiam experientia anatomica edocumur, quod non alia ratione inter necioni dent hominem, quam quod liberum circuitum & transitum sanguinis per cor & pulmones sistant ac intercipient; id quod testatum faciunt polypæ concrectiones canalium alveos obturantes, neque minus scirrhusi tumores & corruptiones saniosæ ac sphacelose, quæ pulmonum substantiam in hisce vitiis infestant. Ad syncopen quod attinet, quæ sæpius subito & præter omnem opinionem plures extinguunt, immo in læto, quem sani firmique conscenderant, mane exanimis offendi, non novum, sed res crebræ experientiæ est; causa tam repentinæ mortis non alia, quam viscidior & coagulata membræ oacea massa, quam polypum vocamus, & quæ prius cordis columnis & lacertis, quali radicitus implantata, tandem

Causa
morbis
in pectore
sedens
morbis
pleuræ
que per
syncopen

vidimota, ostia majoris vasis obturans, liberum iter ac motum sanguinis penitus intercludit, unde protinus tota sanguinis circulatio sistitur ac perit. Plura ejusmodi exempla memoriz prodita sunt in *Boneti anat. pract. lib. 1. Sect. 2. lib. 2. Sect. 2. Malpighii diff. de polypo, Bergeri disp. de polypo cordis & nostra de subita morte præcavenda*. Inprimis etiam huc referri meretur *Bartholini lib. de lacteis thoracis cap. 14.* testimonium, fidem facientis: se in iis quos subito fato extinctos apparuerit, majora cordis vasa sanguine concreto repleta invenisse. Solent vero polypi plerumque dextram cordis cavitatem eique annexa vasa occupare & grandiores quoque ibi delitescere, quam in sinistra, fortasse quia non solum redux a nutritionis & perspirationis negotio sanguis, multis particulis tenuibus liquidis, sulphureis & salinis castratus, viscidior est & facilius concreescens, sed etiam a chylo ex ductu thoracico affuso, facile in coagulum filamentosum præcipitur, quod in auriculæ finibus, vel amplis dextri ventriculi columnis obhærescens, ex agglutinatæ viscidis præterfluentis feri moleculis, sensim paulatimque in majorem molem excrescit.

§. VII.

Uter
asthma
re &
catarrho
suffocato
vivo.

Sæpius etiam polypus alijs gravibus & periculosus in pectore malis sese associat & citra suffocationem trucidat. Nam in iis, qui asthma & catarrho suffocativo jugulantur, plerumque polyposas in vasis cordis & pulmonum concretiones repertas fuisse, observationum fide constat. Testatur id maxime *Greiselinus in Misc. nat. curios. An. 1670. obser. 74. quotquot, iniquens, catarrho suffocativo, quo homo frequenter morte decedit subita, mortuus apertus, in omnibus corpora callosa, viscida ac glutinosa in cordeprehendi*. Sic quoque *Pozoldus obs. 61.* in asthma suffocativo & pectoris hydropo cor magnum, polypo solido repletum, cum magna in vasis atri

coagnati cruoris copia, observavit. Pariter *Misc. nat. curios. Dec. 2. An. 10. obs. 174.* asthma ex polypo cordis & pulmonum, cum duro sinistro pulmonali lobo, descriptum tradunt. Potissimum vero notabile est, quod adduxi in dissertatione de *asthma convulsivo*, Grætzium, scilicet Medicum quandam castrensem, vel qui nongentos milites asthma suffocatos incidisse, atque semper vel hydropem pectoris, vel polypum cordis ventriculos & vasa oblidentem, advenisse. Ipse non minus confirmatius asseverare possum, me quotiescunque copia fuit asthma defunctos disseccandi, polypum in vasis pulmonum & cordis, nec non serum foetidum effusum in thoracis cavo offendisse, cujus origo merito difficilius sanguinis cursui per pulmones debetur, unde serum per lymphatica vasa rupta exprimitur inque pectus descendit, ut hinc perpetuo fere gravi asthma junctus sit pectoris hydrops, de quo egregias observationes prodidit *Carolus Piso lib. de morbis ex seros. colluv. pag. 217.* nec non *Baglivus in Praxi pag. 107.*

§. VIII.

In peripneumoniis non modo pulmones materia crassa & cruore repleti ac inflammato, sed & sæpiissime polyposa in vasis concrementa deprehendi, anatom: identidem confirmatur. Recenit tale exemplum in dissertatione de *peripneumonia* §. 10. juvenis, hoc morbo vita functi, cujus exenti pulmones admodum duri apparuerunt instar carnis, & libra examinati, quinque pondo graves fuerunt, aquæ autem injecti submersi sunt. Ipsæ vesiculæ quasi carnea crassa rubicunda substantia fuerant infartæ, ac discissæ parum putridi sanguinei ichoris, nihil vero puris, fuderunt. Aspera arteria spumofam & tenacem materiam recondidit, pulmonalis autem & arteria & vena, circa confinia cordis obfessa fuit polyposis concretionibus, quæ cordis colum-

Peripneumonia.

nis & fibris firmius conner., ex hoc, auriculis ramisque appensorum canaliculorum extractæ, unciarum duarum pondus excefferunt Cordis etiam ventriculi cruore crasso nigricante penitus fuerunt constipati, & in pericardio sex ad minimum cochlearia aquæ, instar loturæ carnis comparuerunt.

§. IX.

Rara quidem sunt exempla eorum, qui hæmoptysi pereunt: notavi tamen hic ante aliquot annos memorabilem ejusmodi casum, videlicet virginem octodecim annorum, teneræ constitutionis, ex mensium obstructione diu respirandi difficultate pressam, inopinato enoravis sanguinis profusio cum tussi ex pulmonibus, iteratis aliquot vicibus incescit, & tertia vice tanta copia erupit cruor, ut aliquot vasa eodem replerentur, simul quoque frusta dura, magna, carnosa & faucibus protracta sunt, quæ aqua calida elota, examine instituto, non nisi polyposa & fibrosa membranacea concrementa fuerunt deprehensa, & ponderata, quatuor unciarum gravitatem superarunt. Quo tam immani sanguinis profusio, omnes penitus consumptæ sunt vires, ut tertio post die honestissima virgo placide animam efflaret. Id vero ex hac singulari historia merito elicitur; polyposa hæc corpora excreta aneurismatibus, vel varicosis pulmonum vasis infedisse, unde illis disruptis, in majores bronchiorum ramos simul apertos penetrarunt. Neque dubium est, quin gravis hæmoptysis sæpissime ex magna obstructione, a polypo vel cirrhecentia lobi cujusdam pulmonis proveniat, unde libero sanguinis itinere impedito, ipse impetuosus ruit ad alia vasa, quæ nimium distendendo, tandem aperit funestumque ciet fluxum. Confirmat idem notabili observatione Willisus in op. posth. Sect. 1. cap. 7. fidem faciens: totum sinistrum lobum a tumore scirrhuso ita obriguisse, ut penitus contractus & quasi lapideus apparuerit, ac plane

non mirum fuerit, quod cruor per pulmones rapidissime trajiciendus, alicubi e vasis eruperit.

§. X.

Qui palpitacione cordis detinentur, eos poly pus cordis plerumque interficit. Egregie hanc in rem prodidit Baglivus Prax. med. lib. 2. pag. 229. sic scribens: *scitis cadaveribus plurimis, observavimus in cordis ventriculis polypos, aneurismata, grumos sanguinis ingentes & consimilia, inter quæ elapso quinquennio annotavimus in cadavere sexagenarii, palpitacione demortui aneurisma ingentis magnitudinis in aorta ascendente, ubi proxime a corde exoritur, & in cavitate aneurismi, polypum magnitudine cui asserimus. Jam facile patebit ratio, quare palpitatio sola corporis incurvatione, vel capitis ad terram inclinatione, quoties impetit, cohiberi possit, & pro varia in latus, vel dextrum vel sinistrum, decubitu, exacerbetur aut complacetur, de quo memoratu digna observatio de juvene, qui, quoties in lecto lateri dextro incumbat, spirandi difficultate, cum suffocationis metu cordisque tremore laborabat, quæ mutato in latus sinistrum decubitu, protinus cessabant. Tandem mortuus reperiebatur, & dissectus ingentis magnitudinis polypum auriculæ dextræ impactum exhibebat. Observatur vero etiam in iis, qui palpitacione pereunt, solenniter ingens feri copia in pericardio, testantibus id Pisone de morb. a serof. colluv. pag. 170. Olao Borrichio in Act. Hafniens. pag. 173. Tulpio lib. 4. cap. 20. & Ferneto lib. 5. pathol. cap. 11. Neque alia hujus extravasati sero origo est, quam difficilissimus sanguinis per cordis thalamos transitus, unde serum per poros auriculæ dextræ nimium dilatatus expressum, in pericardii conceptaculum descendit.*

§. XI.

Accidit quoque interdum, ut quidam asthmate intereant, ubi pulmonum moles amplissima & sensu inte-

Palpitacione
cordis

Asthma
mole

Hæmo-
ptysi.

gra, totam thoracis cavitatem replet. In his mortis causa querenda est in tunica illa glandulosa, interius univ-
ersum bronchiorum tractum inve-
stiente, quæ tumida, vel scirrhosa
impedit, quo minus aer intrare, ite-
rumque exire possit, unde sanguinis
quoque liber per vasa pulmonum cir-
cuitus, intercipitur. Notavimus ta-
lem casum aliquot ante annos in
Theologo primario Cizensi, qui mul-
tos per annos ex difficili respirazione
laboravit, tandem quoque eadem
decessit. Aperto post mortem thora-
ce, pulmones omnem ejus cavitatem
occupabant & nihil præternaturale
ibi videbatur, præterquam quod mul-
ta scirrhosa tubercula & granula in ra-
mis internis bronchialibus eminerent.
Huc quoque referendam censeo *Ruy-
schii obs. 19.* qua casum proponit de
virgine, quæ postquam per multos
menses orthopnoea suffocativa labo-
rasset, extincta est, in cujus cada-
vere aperto culter anatomicus in par-
te pulmonis magnum pellucidarum
vesicularum acervum detexit, quæ
aere ita expansæ erant ac infartæ, ut
is nonnisi validiori compressione eli-
deretur, neque immixtus per asperam
arteriam status ullum cum expansis
hisce vesiculis habuit commercium.
Similes historias idem auctor *obs. 20.*
& *21.* refert, de viro ac puero dysp-
noea mortuis, in quibus totum malum
hæsit in obstructa pulmonis parte,
cujus omnes vesiculæ oppilatæ & ex-
tensæ apparuerunt. In demortuo
Principe, qui orthopnoea & hæmopty-
si obierat, teste *Verzarscha obser. pag.*
307. pulmo univversam thoracis cavi-
tatem implevit, aspera autem arteria
sanguine grumoso & florido repleta,
& exterior pulmonis superficies in nu-
meris ulcerculis obfusa.

§. XII.

Phthis. Ex affectibus chronicis ipsa phthisi
pectoralis & consummata nullus facile
majoris periculi est, dum hominem
lento gradu omnibus viribus exuit ac

demum inopinato suffocat. Id defun-
ctis culter anatomicus sequentia de-
tegit. Primo in omnium fere, qui
phthisi decedunt, pulmonibus inge-
ntes scirrhositates, vel dura tubercula,
quæ partim pure latent, partim in-
flar steatomatum, sebaceum concre-
mentum recondunt, reperiuntur, de
quæ exempla prodita in *Misc. nat. cur.*
Dec. 2. An. 3. obs. 188. Hafn. P. 1. An.
1673. nec non apud Pezoldum obs. 64.
74. & Harderum obs. 46. Deinde in
nonnullis pulmonum lobi penitus ab-
scessu & pure consumti, in quibusdam
exsiccati nullum amplius pus funden-
tes visuntur, & propagines asperæ
arteriæ, nec non sanguinea vasa al-
bescunt, & a pulmonum exesa sub-
stantia, sine ulla dilaceratione, solu-
ta cernuntur, fidem potissimum fac-
iente *Paw. obs. 22. & 25. Harderum*
obs. 51. & Bartholino Cent. 5. obser. 7.
Porro nonnunquam in pericardio,
item thorace, ingens feri impuri fœ-
tidi copia ostenditur, id quod quam-
plurimis exemplis confirmatur in
Misc. nat. cur. Dec. 1. An. 1. obs. 15. Dec.
2. An. 3. obs. 199. Harderi anat. pract.
obs. 41. 45. 47. 51. & 52. Blancardi
anat. pract. pag. 189. Pezoldi obs. 74.
& 92. Platti obs. liq. 3. pag. 689. Præ-
terea in omnibus fere observationibus
quæ anatomen phthisicorum sistunt,
obvium est, quod pulmones firmissi-
me collis itemque diaphragmati ad-
hæreant. Tum quoque crebriori ob-
servatu constat, polyposas massas,
vel cruorem coagulatum, in corde vel
pulmonum vasis phthisico malo ex-
tinctorum offendi, de quo phenome-
no inprimis consuli potest *Harderus*
obs. 45. 49. & 52. Barthol. hist. Cen. 1. 4.
obs. 7. item Misc. nat. cur. Dec. 2. An. 5.
obs. 65. Denique concretamenta calcu-
losa tartarea interdum in exulceratis
pulmonum sinuositatibus reperiun-
tur, uti constat ex *Harderi anat.*
pract. obs. 46. Misc. nat. cur. 3. Dec. 2.
An. 4. observat. 35. Dec. 3. An. 3.
observ. 188.

§. XIII.

§. XIII.

Unde
phthisis
& mor-
bus.

Hæc autem omnia & singula in cadaveribus phthisi demortuorum conspicua phaenomena; tum morbi generis & symptomatum rationem, tum interitus causam satis perspicue declarant. Nam qui prima phthiseos incubula atque originem ex obstruētis minimis pulmonibus vasculis tumefactis ac induratis deducunt, recte, mea quidem sententia, judicant. Hæc quippe tubercula, quæ cum vesiculis pulmonales; tum bronchiales fistulas occludunt, impediunt, quo minus aer pulmonum compagem sufficienter elevare atque distendere possit, unde intercepto libero sanguinis itinere, cum difficultate, angustia atque anxietate fit respiratio, eoque gravior, quò majorem pulmonis partem scirrhositas occupat. Hæc quoque tubercula, & mole sua, & acrimonia lymphæ, vel purulentæ quæm recondunt materię, nervosas bronchiorum partes perpetuo irritando, continuæ, siccæ & serinæ tussis causam subministrant. A libero vero sanguinis per pulmōnes præpedito circuitu, is reergitur ad cor, quod nimium ampliando ac opprimendo, maximas anxietates, phthisicis admodum solennes, parit, ubi etiam facta nimia accumulatione, in polyposam massam successive coalescit, qua postea sanguinis iter magis adhuc per cor atque pulmōnes sufflaminatur, ut hinc in universo venarum systemate circulatio fiat tardissima. Quin iterum secedens inque porosam partium substantiam concedens, tumores pedum & abdominis gignit, qui subinde phthisicis accidunt & mortis significationem ferunt. Idem quoque serum a sanguinis conubio dilapsum, in cordis conceptaculo hydropem pericardii ciet, ac tandem etiam perruptis lymphaticis vasīs, in thoracem exundat. Frequentior vero pulmonum ad pleuram adhesio, sero, quod ex poris pulmonum, sub difficili transitu exprimitur, tribui de-

Tom. III.

bet. Hæc enim, exhalantibus partibus tenuioribus, tenax fit, quo partes conterminæ conglutinantur. Igitur quoque gravior est læsio pulmonum, consumtio, scirrhositas & obstruētio, eo majus, ob difficiliorem sanguinis com meatum, suffocationis periculum imminet, qua plures phthisicorum intereunt. Ac demum phthisi perpetuo fere hecticus calor, cum ingenti virium defectu jungitur, qui liquido nervæ a putredine inquinato, jure est adscribendus. Quamque sub continuo hoc æstu interno succi & vires successive consumantur, lente cordis motus fatiscit, tandem extinguatur, atque mors sine ulla turbatione mentis plerumque inexpectata, & ex improviso quasi obrepit.

§. XIV.

Ex chronicis porro malis vix ullum frequentius hydrope perimit, qui plerumque aliis gravibus affectionibus, ut asthma, quartanæ, cachexiæ & scorbuti supervenit. Causam mortis si inquīramus; inspectione cadaverum diligentiori, ingentem copiam feri putridi, tam in abdominis cavitate, quam sæpiissime etiam in pectore & pericardio, deprehendimus, quod interiora, præsertim omentum (quod nunquam non consumtum & putridum visitur), aliaque viscera corrupta, & ipsæ adeo intestina, livida ac sphacelosa redditis, confirmantibus id *Bartholino Cent. 3. hist. 81. Miscell. natur. curios. Dec. 2. An. 7. observ. 187. item observ. 188. Dec. 3. An. 3. observat. 161. Dec. 1. An. 4. observat. 3 Dec. 2. An. 6. obs. 73. Dec. 1. An. 6. obs. 165. Perizon observat. 77. 88. 65. Hardero observ. 72. Petr. Pavv. observat. 3. item 28. Et ubi hæc feri extravasatio in hydrope decumbentibus non præsto est; ibi etiam nondum omnis spes salutis evanuit. Quod vero ut plurimum paracephalicū factum mors subsequatur, in causa est aer admissus, quo accedente, feri putrelactid mākum*

N

pro-

promovetur, quæ ubi incipit, non modo omnis appetitus tollitur & quicquid virium adhuc restat consumitur, sed & calor præternaturalis, sine quo non facile hydropicus moritur, supervenit atque incenditur, qui penitus omnes vires & superstites vitales succos ita exhaurit, ut cordis musculus a motu suo vivifico in totum dejiciatur.

§. XV.

*Petr. 60.
Asthmate.*

Fit quoque hic morbus sæpissime ex asthma, asthma vero ex polypo cordis, in caviatibus ejus detentio, aut minimum tumore nodoso majorum vasorum ostia coarctante, qualis etiam in hydropicis dissectis non raro in conspectum prodit, uti patet ex *Cent. 3. Misc. nat. curios. observ. 117. Dec. 3. An. 3. observ. 161. it. observ. 65. Pezoldi obs. 77.* nec non *Boneti Sepulchreto*. Neque rationem difficile est invenire, siquidem retardato sanguinis per pulmones motu, is regurgitans ad venarum systema, ibi tardius movetur atque subsistit; unde feri in partibus inferioribus, per quas semper ascensus sanguinis, quia perpendicularis, difficilis est, recessio fit, magnoque collectio.

§. XVI.

*Petr. 60.
Hepath.*

Quin naturalis illa difficilior sanguinis in hepate, ex vase portæ venoso in venam cavam trajectio, multarum chronicarum passionum, & quam maxime hydropis, causa potentissima utique censetur. Nam sanguis ex hoc vase per connexos eidem canales regurgitans in pancreas, lienem, melenterium, intestina, hæc viscera multum infarcit tumidaque reddit, & minimos glandularum ductus occludendo, hæc omnia scirrhalia ac dura efficit; quæ etiam viscerum vitia semper lere, facta inspectione, oculis sese ingerunt, multisque exemplis comprobantur a *Misc. nat. cur. Dec. 3. An. 3. observ. 161. Dec. 2. An. 8. obs. 100. item An. 6. obs. 73. An. 7. obs. 187. An. 1. observ. 12. An. 5. obs. 73. Dec. 1. An. 6. observ. 68. item obs. 165. & 221. Hardero observ. 71. & 72.*

Petr. Pavu. observ. 5. & observ. 28. Pezoldo observ. 88. Baribolino Cent. 3. Hist. 31. Riverio Cent. 2. observ. 33. Ruyfchio in obs. 45. & 46. Per indurata sic & obstructa vero viscera, libero sanguinis cursu præpedito, indicitur ejus stagnatio in vena portæ, & inde serum secedens ad vasa fertur lymphatica, quæ nimium distenta & a tono suo dejecta, diducuntur in hydatides, (quarum ingens sæpe copia in dilectis visitur,) quæ disruptæ, illam exitalem feri extravasationem efficiunt.

§. XVII.

Ratione haud dissimili hydropis origo ex sanguinis circulo per uterum, vel ob vasa, a materia polyposa aut cruore coagulato varicosa reddita, vel ob ipsius uteri substantiæ scirrhecentiam, impeditiori factio. Nam obice sic posito, sub lentiori progressu atque stagnatione, serosus humor a vinculo discedit & copia ac impetu in vasa lymphatica confluit, eorum latera ampliat, ut interjecta valvulis spatia in hydatides abeant, quæ tandem divelluntur & contentum humorem effundunt: quæ exempla passim in observatis medicis & maxime in *Misc. nat. cur. Dec. 2. An. 9. obs. 99.* nec non apud *Harderum in apario obs. 37. Vesalium lib. 5 de corp. human. fabrica cap. 9. & Mauritium Cordæum Comment. in lib. 1. Hippocratis de morb. mulier. consignata reperiuntur.*

§. XVIII.

Præterea sæpissime mors in cachecticis, tabidis & diuturna lenta ac hectica febre detentis, ex ingenti abscellu interno rupto natales trahit. Effusum enim scetidissimum pus, non modo viscus, cui insidet penitus consumit, sed & vicinas quas tangit partes labe inficit atque corrumpit, simul quoque fetore suo tenuissimum illud fluidum, quod fibris vim motricem confert, admixtione sua contaminat; unde verum Hippocratis effatum *Sect. 7. aph. 8. ex tuberculi sinus ruptione exsolutio, vomitus & ani-*

*Aut u-
teri vi-
tio.*

*Si ca-
chectica
& he-
ctica
ad h-
morbi
super-
venerit.*

no deliquim fit. Occupant autem ejusmodi abscessus maxime mesenterium, hepar, uterum ac renes, ac pariter fiunt ab intercepto, propter insuperabiles obstructions: & compressiones vasorum viscerumque scirrhotates, libero sanguinis circulo, unde cruor statim concipiens vasorum tunicas perforat, ac cavitates sibi efformans, tandem in pus foetidum convertitur. Junguntur his abscessibus, testes observatione anatomica, plerumque tumores atque duri scirrhi, prout fidem facit *Parvus lib. 23. cap. 36. exemplo femine*, cujus mesenterium penitus scirrhotum observavit, tantæ molis, ut libras decem cum dimidia pondere æquaret, adhærescentibus quamplurimis abscessibus, sua quoque cystide incluso. Pari ratione *Hildanus Cent. 1. observ. 7.* meminit puellæ, cujus mesenterium tumore duris scirrhotis & steatomatibus repletum fuit, præcipue circa venas, quæ ad portam tendunt. Et *Coiterus observ. anatom. in hydropico tumore* & magnam colluviem puris foetidi, quod hepar putredine infecerat, animadvertit. Et quæ plures huc referendæ observationes memoriz prodixit sunt in *VVariboni tract. de glandul. pag. 30. Raygeri observ. & Misc. natur. curios. Dec. 3. An. 3. obs. 73. & 131. Speciatim de iis abscessibus quæ renes & hepar occuparunt consullerentur, Misc. nat. curios. Dec. 1. An. 4. observ. 114. Dec. 3. An. 3. observ. 72. Hildanus Cent. 2. observ. 39. nec non Harderus observ. 76. Frequentius tamen abscessus in muscibus abdominis, præsertim a causa externa relidet, quo interius rupto, mors ut plurimum sequitur, de quo digna sunt quæ evolvantur in *Misc. natur. curios. Dec. 2. An. 1. obs. 88. Hildanus Cent. 2. obs. 37. Riverio Cent. 1. obs. 92.* Quod vero apostema mortem inferat, causa subest, quia febre lenta, quæ abscessus nunquam non stipat, omnes paulatim vires exhauriuntur, & tota humorum massa suc-*

cessive in excrementa resolvitur ac consumitur.

§. XIX.

Qui ex calculo renum & vesicæ moriuntur, hos non minus corruptio putredinosa, vitali moventi insensibilissima, necat. Nam si quando calculus in vesicâ vel urethre hæret, efficit, ut colatum per renale cribrum serum falsum immane quantum & uretheres & renes distendat, quæ vehementi distensione & vasorum compressione, renum substantia inflammatur atque in abscessum vel putrilaginem, quæ penitus tandem exeduntur ac consumuntur, concedit. De hoc frequentissima apud observatores est mentio, e quibus adduxisse sufficiet, *Misc. nat. cur. Dec. 2. An. 8. obs. 53. An. 2. obs. 13. Dec. 1. An. 2. obs. 81. An. 4. 23. Bartholini hist. 35. Cent. 3. cent. 1. Petr. Paw. obs. 3. Verzaschi obs. 2. Fernandus de part. morb. & symptomat. lib. 6. c. 12. pag. 316. Riolanum lib. 2. cap. 29. Tulpium lib. 3. obs. cap. 6. Pancirollum Per. teco. quart. obs. 31.*

§. XX.

Insuper compluries in iis, qui ex calculi tormento & ischuria diem obierunt, ventriculi inflammationem, ex suis signis dignoscendam, nec non epilepticas convulsiones supervenientes, animadvertimus, procul omnibus quod atrocissimos spasmos in ventriculo, vel ipsum caput, per consensum derivatos. Nam licet in iis quas perlustravi observationibus, parum hujus phenomeni mentionem invenierim, sed sectores plerumque repperito calculo, tanquam mortis causa, aliarum partium inspectionem supervacaneam crediderint; nullus tamen dubito, quin, si in dissectione cadaverum etiam ventriculi & intestinorum constitutio curatius investigetur, proximior ibi, maxime in senibus & debilitatis, mortis causa, inflammatio nempe & sphacelatio, sit comparitura.

§. XXI.

Eadem ventriculi & intestinorum inflammatio & sphacelatio, quæ ple-

rique, qui morbis acutis & malignis decedunt, item ex veneno, vel validiori pharmaco, nec non peste, morbo Hungarico, dysenteria, colica vel iliaca passione, aut acuta vel omni alia febre succumbunt, tanquam presonissima mortis causa, in dissectis reperitur. Etenim in nullis certe corporis partibus, inflammatio vel sphacelatio periculosior est, quam in iis, quæ nervosæ ac membranosæ sunt texture & exquisitiore sensu ac motu gaudent, inque minus cum universo nervorum genere consensum alunt: cujus generis ventriculorum & totum intestinorum canalem esse, vix ullus addubitabit. Venena vim suam maxime exferere in ventriculorum & vicina tenuia intestina, sphacelo eadem corripiendo, sectiones & observationes passim proflantes luculenter declarant, in cujus confirmationem instar omnium allegari poteretur *Vesperus* in *tr. de cicuta aquatica*, qui plura experimenta instituit, & quæ in animantibus observavit, collegit.

§. XXII.

Aque aut alius liquoris frigidum potum, corpori calefacto copiose ingestum, vel brevi mortem, vel alias ad mortem tendentes afflictiones invohere, res certæ, quotidianæ & indubitæ experientie est. Neque alia tam subitæ ac funestæ catastrophes suppetit ratio, quam quod frigidus potus celeriter ipsam sanguinem in vasculis ventriculi intestinorum coagulet ac in circulari motu sistat, unde, nisi mature discutatur, ut in sphacelum concedat, necesse est. Digna est, quæ hic interluserit observatio, quam ante aliquot annos notavi. Princeps erat excelsa non minus indole, quam corporis forma gratiosissimus, sanguine & succis redundans, oberior paullo, nec tum vigesimum quintum ætatis annum egressus, qui perfecte antea sanus, quum vehementi motu corpus exstiuasset, ac postea liberalem cerevisiæ frigidæ hauritum ingessisset, simulque frigido & aperto aeri sese iterum ex-

posuisset, mox de languore, horrore, calore intensiori & vigilia conquesta cepit. His succedebant atrociora pariter, impensa quippe virium prostratio, lipothymiam erecto tantisper corpore statim munitans, pulsus languidus, inæqualis & celer micabat, conatus ad vomitum, erat persequens, anxietas perpetua, tantopere lubinde increscens, ut non modo huc & illuc membra agitarer, sed & in uno loco diu contineri non posset, hauritum exspirabat foetidum, ac digm morbi septimo inter maximum suorum luctum mortem cum vita commutabat. Concedebatur sequenti die Medicis, facultas, corpus aperiendi, eaque instituta, ventriculus totus propemodum inflammatus comparuit, ac quod rarum observatu, aliquot cochlearia sordidi & corrupti sanguinis in ejus cavo. Lien, admodum fuit distensus, flaccidus, sanguine lividi coloris refertus & corruptioni tam propinquus, ut ad levem attactum ipsa substantia ejusdem dissolveretur. Totus similiter pulmonis lobus niger deprehensus est, corruptus ac foetidissimus, e quo humor putridus rursus nidoris in thoracis cavum destillabat, tam erodentis indolis, ut spongiam qua detergebatur, atro inficeret colore, nec inulta ei macula ullo artificio posset deleri ac elui. Vasa de reliquo sanguinea maxima ex parte inanita, ipsumque cor minoris magnitudinis ostendebantur. Eundem cum gelido potu in senio confectis & viribus orbatis effectum præstare fructus refrigerantes, ut melones & persica mala, avidius devoratos, observationum medicarum fide constat. Nam notum est, quam pronus senum, quia etiam scorbuticorum & imbecillium sanguis sit in sphacelolam corruptionem, quæ hinc accedente levissima sæpe causa, quam facile suscitatur.

§. XXIII.

Quos pesilentia & febres malignæ tollunt, in his ventriculus & intesti-

In febr.
bus pe-
stilen-
tialibus
& ma-
lignis.

na nunquam non sphacelata conspiciuntur: in quod etiam de omnibus ferme febris acutis, ardentibus, cholericis, semitertianis, variolis aliisque intelligendum est. Ego certe plena restari possum fide, quod omnes eos, quos ex febre quadam acuta obiisse novi, ex inflammatione ventriculi, intestinorum, vel meningum superveniente, decessisse deprehenderim: idque non modo ex symptomatibus dijudicavi, sed ex dissectionibus, quas administravi, & de quibus alii fidem mihi fecerunt, comperit habui. Potissimum memoratu dignus videtur casus femine annorum 26. sensibilibus naturæ, quæ ex vehementi iracundia febre ardente biliosa, juncta cum crebris alvi dejectionibus, correpta fuerat. Hæc quidem adhibitis congruis remediis, ex accipiti tantisper levata videbatur, post immensam vero denuo ex ira animi commotionem, priora non solum, sed pejora etiam redibant pathemata, quæ licet alvi fluxus erumperet, undecima tamen die ægram jugulabant. Dissecto post mortem cadavere, totus intestini jejuni & ilei tractus, partim inflammatus, partim sphacelatus & niger cum fœtore in conspectum prodit, luculento indicio, inflammationem intestinorum diarrhææ quoque in febris, & in sphacelum concedentem, mortis esse causam. Eandem in his morbis mortis causam testatam facienti consignatæ passim in commentariis medicis historię, ut apud Forestum lib. 6. obs. 13. Diemerbroecium pag. 273. Helmontium pag. 887. Bartholinum Cent. 3. hist. 68. Cent. 5. obs. 4. item Cent. 3. ep. 92. & 29. Misc. nat. curios. Dec. 3. An. 3. obs. 100. Dec. 1. An. 6. obs. 161. Peroldum obs. 87. Blancardum obs. 67. nec non in differt. quam ipse de inflammatione ventriculi, ante aliquot annos divulgavi.

§. XXIV.

Neque alia internecione diarrhææ, jecturæ vel dysenteria correpti, quam inte-

Tom. III.

stinorum sphacelatione, perimuntur, id quod pariter non solum signa, sed etiam sectiones manifestant. Laborant vero maxime his in morbis crassa intestina putrida ex sphælo corruptione, multisque simul tuberculis obduntur, fidem facientibus Misc. nat. curios. Dec. 2. An. 6. observ. 104. Alt. Hafn. P. 2. obs. 17. Platæo lib. 3. pag. 821. Bartholino Cent. 6. hist. 2. Beningero Cent. 4. obs. 48. Eadem ratione in colica spasmodica vel iliaca passione correptis, ex intestinorum ligatione & corruptione mors accedit, ut patet ex Misc. nat. cur. Dec. 2. An. 3. obs. 65. & 193. Blancardo anat. pract. Cent. 5. obs. 2. Haldano Cent. 2. obs. 61. Kerkringio obs. 42. Villisio de medic. oper. pag. 28. Idem fatum ex intestinorum sphacelosa affectione insunt infantes, quos vermes enecant, de quo casus consignati in Act. Hafnens. tom. 2. pag. 88. & Lemlii Misc. medic. pract. pag. 365.

§. XXV.

Id vero adhuc notatu perquam dignum est, quod in his quibus colica spasmodica, vel veneno non adeo præcipiti internecione occidente, aut aliis atrocioribus in intestinis tormentis, pereunt, intestina plerumque conne-
xa atque mutuo coalita offenduntur. Et licet ipse hanc intestinorum præternaturalem concretionem nunquam observarim, fidem tamen mihi fecerunt viri, quibus sæpius corpora his morbis ubi crebro occurrunt defuncta incidendi occasio fuit, & similes quoque casus memoriæ proditi a Rhodio Cent. 2. obs. 32. Petr. Pav. observ. 5. Bartholmo hist. anat. Cent. 3. hist. 6. Hæchstero Dec. 2. cas. 6. Misc. nat. curios. Dec. 2. An. 7. obs. 15. Causa hujus peculiaris phænomeni vix alia poterit suppeditari, quam quod fœrum ex intestinorum tunicis glandulosis & vasculis minimis sub arctis illis spasmus exprimitur, quod avolantibus fluidis tenerioribus partibus, glutinosum & tenax redditum; istam coalescentiam efficit, haud fecit ac

N 3

tu.

superius de coalitu pulmonum cum pleura & contiguis partibus, in pectoris affectibus, meminimus.

§. XXVI.

*Puerperæ
& la-
fantibus*

Accedunt puerperæ febre inflammatoria pereuntes. Hæc simili ratione uteri sphacelo tolli, & symptomata in iis obvia, & sectiones post mortem administratæ, commovent, cuius generis plures continentur in *Misc. nat. cur. Dec. 2. An. 2. obs. 85. An. 4. obs. 195. Dec. 1. An. 4. obs. 94. Dec. 3. An. 1. obs. 22. An. 3. obs. 123.* Infantes denique, pusillos & uberibus adhuc victitantes, ex torminibus ventris, nec non epilepticis convulsionibus, ab acrimonia humorum caustica, abripi, res vulgo notissima est. Neque dubium est, quin etiam in his, intestina, e quibus non raro antequam expirant, nigra secedant, sphacelata in dissectionibus reperiantur, modo frequentius a Medicis corporum infantium & omnis ætatis examinatorum dissectione institueretur & a cognatis concederetur.

§. XXVII.

*Mortis
non cum
morbis
causa
confun-
denda*

Hæc itaque sunt observata, quæ per cadaverum sectiones, tanquam vere interitus in morbis causæ, innotescunt. Monendum tamen est, id quam maxime hoc in negotio esse vitandum, ne mortis causæ cum morborum causis perperam confundantur, quod certe sæpissime animadvertimus. Id enim quamplurimis medicum in more positum est, ut ægro periculoso ex morbo decedente, cadaveris incisionem suadeant, & inventis sub ea internis partibus sphacelatis atque corruptis, adstantibus mortiferam labem monstrant, speciose differentes, jam defunctum, ob tam ingentem & immediabilem læsionem, nullo plane modo servari potuisse ac perianari. At vero hi gravissimum admittunt errorem, ac morbis causam apertissima fallacia, pro morbi causa venditant, quum potius id in questione sit: annon ipsæ hæc quæ mortem induxerunt causæ,

convenientibus & tempestive adhibitis auxiliis præscindi potuissent atque averti: Sed hæc Medicorum techna, quæ ignaris speciosum fucum facit, & famæ servientes, delicta, si quæ forsitan in medicatione commiserunt callide atque astute obvelare student.

§. XXVIII.

*Quæ rai-
ones
hæc causæ
morbida,
&
quidam
extraneas
rationes*

Jam perspectis sic adæquatis exitii causis; id utique in futurum usum inde eliciendum erit Medico: ut ejusmodi medendi rationem ineat, quæ easdem opportune prima in herba submoveat & averruneet. Scilicet stagnationes, stases & extravasationes sanguinis atque humorum in capite præcipitem afferunt interitum, plerumque vero a nimia congectione sanguinis, ab extremis & inferioribus partibus per spasmos ad caput, maxime in plethoricis facta, subnascuntur, quæ eo gravior est eoque facilius contingit, quo magis ipsum caput a causis antecedentibus fuit debilitatum. Quamobrem prudentis atque periti est Medici, impetum & accumulationem humorum a capite arce-re ac divertere, id quod commodissime convenienti sanguinis missione in inferiori corporis regione, pediluvio, clysteribus emollientibus, alvum leniter ducentibus & antispasmodicis ac carminativis perfici potest, cavendo omnia vaporosa medicamenta, spirituosa, absinthia, ac interdicendo refrigerationes, animi affectus, impensas medicationes & incubationes, omniaque quæ caput infirmare ullo modo possunt.

§. XXIX.

*Polyporum
generatio-
ne*

Deinceps polypum multarum chronicarum, gravium ac lethalium affectionum causam constituunt, quorum vero ea est ratio, ut ulla ope aut medicina tolli possint iterumque dissolvi, & hinc Medicus in eorundem medela id tantum agere debet, ut vel mature eorum generationem impediat, vel si jam adfuerint, incrementum præscindat. Jam vero experientia confirmatur, polyporum generatio-

ratione admodum accommodos atque obnoxios esse eos, qui otio indulgent, spongiosi habitus sunt, venas gerunt exiliores, ac vel nimis calidis esculentis & potulentis, vel etiam acidorum liberaliori usu, tenuiorem aqueam partem, quæ sanguinis fluiditatem conciliat ejusque motum intestinum custodit, absumunt, hisque simul efficiunt, ut crassiores terrestres moleculæ & fluidi sinu discedant atque concrecant. Quare injungenda utique exacta vitæ victusque ratio, & ejusmodi diætetica maxime prædida commendanda, quæ vitiosam hanc sanguinis dispositionem corrigunt ac tollunt, inter quæ principem merito obtinent locum, motus & exercitatio corporis cum aeris mutatione, potus tenuis, nec non conveniens aquarum mineralium usus, præsertim earum, quæ temperationes indole & sal alcali evehunt, ad dissolvendas fibrosas ad concretionem pronas in sanguine partes, accommodatissimum.

§. XXX.

Porro, quia illæ in morbis diuturnis obviæ viscerum indurationes, corruptiones, ulcerationes & abscessus, nonnisi a stagnatione & quiete humorum circumagendorum natales ducunt, tutiori longe & certiori ratione hæc pariter mala præcaveantur, quam persanantur; cui fini obtinendo identidem quam maxime inferviunt, deprompta ex diætâ & bono vitæ regimine subsidia. Temperies quippe & mediocritas in rebus dictis non naturalibus, est efficacissimum auxilium, quo & corporis integritas servatur & morborum causæ averruncantur: omne autem nimium, periculosissimo Hippocratis effato, naturæ inimicum, dum sanitatem labefactat, ac destruendo humorum vitales in corpore motus, causas morborum præparat atque ingignit. Potissimum ad chronicorum morborum genesis faciunt nimia velocitas, otium atque desidia, animi maceror,

aer densus, humidus, impurus minusque elasticus, potus intemperatior, cibi insalubres semiputridi, quæ omnia ea propter summo evitare debet studio is, qui corpus a gravi vel plane lethifera labe immune præstare nititur.

§. XXXI.

In acutis vero morbis, qui inflammatione, eaque in sphacelum concedente, necant; summa opus est prudentia, quo in eorundem curatione omnia ea evitentur, quæ inflammatoriam statim ipsamque putredinem conciliare possunt. Nam profecto, si in ullo, certe in acuto, qui præcipit est periculi morbo, perquam leves etiam commissi errores, tam perniciosi sunt effectus, ut in summum discrimen ægros adducant, præsertim si jam per aliquot dies symptomata vehementia continuo æstus & assidua vigilia corpus exhaustum viresque infirmatæ fuerint. Compluribus certe observavi, a situ paullo diutius erecto, ab improvida lintemini mutatione, a pedum refrigitatione, ab ira, timore vel terrore iaculo, a potu spirituoso, nimis calido, ab assumpto vino, a cibo etiam morbo declinante largius ingesto, multo magis a medicamento nimis calido opiato, purgante aut clystere acriori, omnia in pejus mutata & lethiferam contractam fuisse inflammationem. Hinc licet ipsa natura acutas has & difficillimas passiones quam optime sanet; verumtamen quia plurimæ dantur causæ, quæ naturam in opere suo impedire, turbare & motus salutares pervertere possunt, Medici, seu naturæ ministri est, omnes has causas probe tenere perspectas modisque declinare omnibus; unde etiam præsentia sua decumbentibus crebro adesse debet, ne vel ipsi, vel aditantes, damnum procurent; id quod sapienter etiam præcipit Hippocrates Sect. 1. aphorism 2. oportet, inquit, non solum seipsum exhibere quæ decent faciem, sed

Inflam-
matione
nem &
sphacelo
laborem
esse.

Præ-
parat
causas
morborum
diuturnorum
et
periculosissimas.

etiam agerem, & presentes, & quæ externa sunt.

§. XXXII.

Mortis
naturam
hæc causæ
sunt quæ?

Non autem alienum erit, si huic de generatione mortis in morbis disquisitioni, nonnulla de vera inevitabilis omnibus moriendi necessitatis causa, subnectamus. Hanc omnibus ex æquo, incurrere nemo non novit; in quo, vero ejus genuina & adæquata ratio posita sit, tantum non omnes & Medicorum & Philosophorum libri sicco, plane prætereunt pede. Ego vero in *Medicamentorum Systematice* Tom. 1. pag. 62. seq. nec non Tom. 2. pag. 54. seq. in mortis naturalis genuinam causam inquirens, eandem non tam in fluidarum, quam potius solidarum corporis nostri partium depravata constitutione, fibrarum, nempe & membranarum, incrementa cum ætate, crassitie, duritie & compactiore textura constituendam esse, primus fere merito asserui. Nam quia temporis diuturnitate cartilagine in ossa densantur, hæc magis, magisque indurantur, tendines cum fibris musculosis obrigescunt, omniumque annosiorum animantium carnes longe solidiores & compactiores sunt quam juniorum, ac proinde coctione ægrius mollescunt, nullum etiam dubium est, quin tunicæ vasorum, e quibus corpus penitus coagmentatum est, crassescant, alvei canalium his angustentur, occludantur, ut minimi eorundem demum concidant, ac nihil plane fluidi transmittant. Hoc autem si contigerit, interceptum non solum vitalis ille humorum per universum corpus circulus, sed etiam secretiones cum excretionibus per minimos tubulos non rite perficiuntur, succi vitales spissescunt & sordescunt, vires concidunt, digestio perit, nutritio deficit, & sic sensim sensimque ad morbos paratur aditus, ipsaque mors obrepit.

§. XXXIII.

Quod si itaque vita diutius conservanda & senectus a familiaribus ipsi morborum insulstibus vindicanda, eo quam maxime in vitæ victusque ratione dirigendum est consilium, quo partes solidæ flexiles, canales patuli & humores fluxiles, tenues ac puri serventur. Hinc evitanda merito omnia qualitate & quantitate excessiva, senili corpori insensibilissima, omnia acida, adstringentia, salsa, cibi nimii statulenti, duri, difficilis concoctionis, præsertim ex mari desumpti, potus nimium spirituosus, frigidus & crassus, otiosa quies, frigus, patheticæ animi impensiores commotiones, veneris intempestivum exercitium, diuturna vigilia, excessiva corporis agitatio, aer vappidus, impurus ac nubilus, Vicissim temperie & moderationi in rebus sic dictis externis non naturalibus sollicitè studendum, animus ad hilaritatem & tranquillitatem componendus, cibis paucis, mollis & facilis concoctu cunctis potu tenui & expedite transeunte usurpandus, vinum moderate, non acidum, sed dulce & spirituosum bibendum, juscula analeptica forbilanda, balnea & pediluvia subinde admittenda, venæsectio crebrior, sed parca instituenda, corpus moderate exercendum & in aere puro saluberrimo, rurali maxime, commorandum, corpus subinde blando calore fovendum, alvus nonnunquam elementer subducenda, & quæ plura eundem in finem præcepta in dissertatione, de *tuenda senum valetudine*, tradidimus.

Et quomodo
dicitur
an
cenda.

§. XXXIV.

Neque postremo alia, quam in *Lethali* morbis & ex naturali necessitate, ratione, motuum nempe vitalium, tam in solidis systaltici & diastaltici, quam in fluidis circulatorii & progressivi, plenaria destructione atque extinctione, mors a gravi per violentas causas externas læsione evenit. Nimirum pleræque mortiferæ per

Lethali
morborum
læsionis
ratio.

per externam quandam vim illatz
læsiones, enormi sanguinis profusio-
ne atque extravasatione trucidant ,
dum , ex fauciatís tam in , quam
extra-amplíssima corporis viscera ,
majoribus vasís , cruor nulla ope
compescendus manat , ac demum
cum viribus vita , exhausto penitus
liquore vitali , concidit . Aliæ lethales
violaciones ita sunt comparatz ,
ut vitalem illum systoles atque dia-
stoles motum extinguat , hinc si cor
ampliore vulnere fauciatur , illico e-
xanimatur læsus , non solum ob ex-
travasationem , sed maxime quod
circularis sanguinis progressus , per-
eunte in corde , tanquam centro ,
recipiente & expellente motu , lista-

tur atque cesset . Idem fit , quando
principium nervorum , quod in me-
dulla oblongata cerebri est , sive per
vulnerationem , aut ab incumbente
gravius humore , ostensam patitur ,
eo quod sufficiens liquidi nervei in-
fluxus , a quo motus cordi & vaso-
rum contractorius & relaxatorius ad-
vitam necessarius , dependet , inter-
cipitur penitusque aboletur . Aliæ
denique inflitz vulneraciones putre-
dinem sphacelofam & corruptionem
post se trahunt , eademque latius
serpente ipsosque vitales succos con-
taminante lethum inferunt ægrum-
que lente consiciunt . Ac in his o-
mnium absolutæ lethalis læsionum
ratio fundata est & continetur .

S E C T I O I I .

D E

METHODO . ORDINE

Et Legibus medendi , tam Naturæ ,
quam Artis .

N E C N O N

De Remediis , Eorum quatuor generibus , Operandi & recte applicandi modi , una cum cautelis , Observationibus & medicamentis compositis selectissimis .

C A P U T I .

DE OPTIMA NATURÆ

Morbis Medendi Methodo .

Natura sola sepius morbus janitor .

§. I.
QUOD plurimi , præsertim ex plebeiis , rusticis & qui simplici ac populari victu fruantur , & tranquillioris quæ ab intemperantia affectuum vacui sunt animi , a febris acutis , etiam gravioribus , pestilentibus , malignis , sine omni medicamento & sine singulari artificiosa Medici ope , sola abstinentia & quiete , qualicunque evitacione nimiarum refrigerationum , tutius & felicius , solius naturæ , qua pollet energia , robore ac viribus sponte liberentur , & tutius , felicius ac certius , quam multi alii , divites quoque & Magnates , qui famigeratissimis Medicis eorumque pretiosis arcanis utuntur , convalescant , tam evidens & notum est , ut nulla plane egeat probatione . Quin ad unum fere omnes ex an-

tiquissimis & recentioribus Medicis in eo consentiunt & cum Hippocrate lib. 6. epid. 5. fatentur : quod natura optima sit morborum medicatrix , quæ suis viribus usu , juxta Galenum , noxia e corpore expellat & utilia salutis causa retineat , ut sine ejus auxilio etiam Medicus nihil solidi præstare possit .

§. II.

Quid vero per hanc naturam , quæ tam efficaciter vitam , & sanitatem tuetur , hominemque a præsentis mortis & morborum periculo defendit ac liberat ; intelligendum sit , obicura inde ab omni ævo fuit questio , quam maxime tamen evolvenda . Veteres , quorum sapientia in physicis plus inanibus nominibus , quam rebus & veris causis occupabatur , naturam corporis humani dixerunt omnis motus in eo principium & causam : qua vero definitio-

Quid per se intelligi possit .

Et quod
dū re-
sultat
res.

ne nihil aliud egerunt, quam ut id quod in quaestione erat repeterent, sive idem per idem explicarent. Quidam non incelebres nostri ævi viri paullo pressius naturæ vocem expositura, perhibent: omnium actuum, tam mentalium, moralium, idealium, quam physicorum & mechanicorum in corpore nostro, unam & primam causam, unum agens & principium esse, nempe animam, ratione & interna cognitione instructam, omnesque motus ad certum finem & salutem corporis dirigentem. Hanc, quando vitaliter agat, id est, motus ad vitam conservandam administret, naturam appellandam, quæ quidem non actu & contractu quodam physico, absolutæ necessitatis, sed tantum morali quadam causarum nocentium & læsionum imminantium æstimatione, motus ad eas removendas ac ejiciendas corpore, quamvis sæpius erronee, instituat, adeoque omnes hos motus & conatus, quom in salutarem finem, nempe conservationem corporis tendant, in se & sua natura semper bonos & salutare esse, eamque ob causam perperam noxios & morbosos a vulgo Medicorum haberi.

§. III.

Assue
vero in
corpore
est plures

Nova hæc est ac ingeniose excogitata hypothesis, quam tamen examini subicere & pluribus ac evidentibus argumentis infirmare jam nec loci est, nec nostri instituti, inprimis quum etiam jam de eadem abunde in *Medicinis hujus systematicæ tom. 1.* a nobis actum, & alioquoque, quos inter eminet D. Burchardus, Professor Rostochiensis celeberrimus, in *tr. de principio movente primo in animatis*, id docete satis & solide præstiterint. Id saltem hoc loco monendum esse duxi: quod triplices in homine observentur actus, in se & sua natura distinctissimi, nempe mentales, quæ intellectu & voluntate absolvuntur, ac homini proprii sunt, ideales, qui in receptione idearum ex objectis & inde mergente certa sensatione & perceptione sunt, quos cum brutis animantibus

communes habemus, & denique actus pure physici, sive motus, qui ex operatione & mutua actione rerum corporum resultant, & pro diversa structura, sive nexu, dispositione, magnitudine & figura solidorum & fluidorum, certo numero, ordine & fine etiam eveniunt, ac a Philosophis dicuntur mechanici, & neque principium illud quod ideas format, sed vim motricem, quæ omnibus rebus corporeis essentialis est, varie modificatam, pro causa vera, proxima & immediata agnoscunt. Et tales actus physici sunt verum Medici & Medicinæ objectum, eo quod vita, sanitas, læsis actionum, sive morbus, eorum extinctio, sive mors, præservatio & restitutio a morbis, item vis & virtus rerum quæ nocent & profunt corpori humano, ab his primo, proxime & immediate dependent, ut non negari possit, ex divina commercii & consortii lege, quam summus opifex inter actiones vitales, sensuales & mentales fancivit, cogitationes ac phantasias hominis limitatam & determinatam quandam habere potentiam, actus illos pure physicos, non casualiter efficiendi, sed potius turbandi & quodante-nus disponendi.

Ex his
morbis
nec
Medic.
eius
objectum

§. IV.

Horum
morbis
arcano.
mota
vita.

Ut itaque paullo clarius, & specialius mentem nostram promamus, per naturam corporis humani, quæ secundum Hippocratem omnis sermonis & ratiocinationis in Medicina principium esse debet, nihil aliud intelligimus, quam progressum & in circulum abeuntem sanguinis & omnis generis humorum motum, a cordis & vasorum, quibus fluida continentur, aliorumque solidorum motu contractorio & dilatatorio reciproco, dependentem, quo solidorum & fluidorum decenti motu, tam partium utilium & qui in usum retineri debent, continuæ secretis, quam etiam variz indolis inutilium, per convenientia emunctoria & cribra excretio perficitur. His motibus recte & ordine succedentibus,

tibus, vita & integritas corporis conservatur ac morbidæ læsiones arcentur, iidemque inordinate se habentibus, partium & actionum læsiones, sive morbi oriuntur, quorum sanatio illis in ordinem per convenientia auxilia redactis, evenit atque conficitur. Hic autem activus, vegetus sýloles & contractionis solidorum motus, tanquam vera causa, quæ recte dici potest anima actionum vitalium, non a principio quodam spiritali, morali & metaphisico, sed partim a solidorum & valorum structura organica & virtute elastica, partim a fluidi tenuissimi, magna potentia movendi instructi, ac in sanguine arteriolo & nervis contenti, in motrices omnis generis partes maxime tubulosas influxu dependet.

§. V.

Jam quum clarissime constet, quid sit natura illa corporis conservatrix & medicatrix; nunc dispiciendum erit, qua methodo, qua via, hæc ipsa natura, cujus plane mirabilis in liberando corpus a præsentibus morbi & mortis periculis vis est ac energia, hoc solenne negotium perficiat. Nam certe cognitio hujus methodi, qua natura, quæ infinite sapientem architectum pro auctore habet, utitur, merito vera ac firma cynosura est artis medicæ, quæ secundum hanc leges & regulas suas medendi construere debet, ut naturam recte agentem non turbet, vel pervertat, sed potius sequatur & imitetur, vel deficientem & impeditam adjuvet atque in ordinem reducat. Palmarium vero momentum, in quo methodus & ordo, tam naturæ, quam artis in medendo, quam maxime conveniunt, in eo versatur, quod utroque causæ morborum, quæ œconomiam motuum secundum naturam turbant & corrumpunt, removeantur atque corpore ejiciantur. Hinc recte docet *Galenus lib. 1. method. medend.* perfectam curationem a causis exordiri. Et ex *Celsi mente* is recte curat, quem causæ o-

rigo non fallit; quia causæ investigatio ejusque primordia & occasio, in affectionis, & remedium cognitionem amplissimam deducunt. Idem confirmat *Fergellus lib. 1. cap. 4. method. med.* asserens: morbos absque causarum præcognitione, nec præcaveri, nec delictis curari posse.

§. VI.

Quod si itaque sola natura sponte & suis viribus usa, sine ope & arte Medici & sine pharmacorum apparatu, morbos subinde sanat, idque causas morborum penitus removendo præstat, jure meritoque queritur: quænam sint illæ morborum causæ, & quomodo, quo ordine ac methodo eadem a natura vincantur ac submoveantur. In hac autem decidenda tenendum est: quod sicuti, uti jam monuimus, ad conservationem corporis nihil magis necessarium, quam motus tam progressivus, quam excretorius: ita nihil naturæ infestius, & ad destructionem invehendam aptius, quam sanguinis & humorum quies, stagnatio, italis, extravasatio, vasorum obclusio, sordium retentio & viscerum induratio. Hæ enim efficacissimæ sunt causæ ad inducendos motus febriles, spasmodicos & convulsivos, quibus maxime motuum morbosorum apparatus continetur, hæ quoque putredinem, quæ & mixtioni & structuræ solidorum insensibilissima est, inferunt, quam recentiores Medicorum malignitatis nomine insigniunt.

§. VII.

Has igitur morbiferas causas subigere ac remove debet natura, si officio suo recte perfungi velit. Ad hoc vero exsequendum non convenientius ac efficacius excogitari poterit medium, ipso motu, tam solidorum, quam fluidorum, auctiori facto. Hujus enim indoles & præcipua virtus est, ut humores subtilitentes eorum que stiles & stagnationes concutere, latibulis extundere, resolvere, iterum in motum cedere & sic obstructions valorum referare possit. Hic quoque mo-

Causæ
quæ
sunt?

Ad eas
remo-
vendas
infer-
re mo-
tus sol-
idorum
& fluid-
orum.

Methodus
est
in
conf-
remov-
m. e. a
stilla

motus spissos, immobiles impactosque humores fluxiles ac progressus idoneos reddit, pariterque copia delinquentes succos ipsamque sanguinem per congrua loca exonerandos; nec non excrementitios, serosos, salios per diversi generis emunctoria proscribendos, quam maxime idoneus est, biliosos quidem & viscidos per alvi secesum, salios aquosos per urinam & subtiliores aqueas salino-sulphureas sordes per universale cutis emunctorium exonerando.

§. VIII.

Jam vero memoratu admodum dignum est, omnem morbosicam causam, siue quantitate seu mole, siue intemperie & activitate infensa sit, principaliter actione sua afficere partes subtiliori motu & sensu præditas, quales nervoso-membraceæ & musculosæ sunt, & ex illius maxime compositi omnes canales & tubuli qui fluida vehunt & motu systoles atque diastoles pollent, quos moleste vel distendit & comprimit, vel lancinat, irritat aut erodit, quod dum efficit, vigore legis mechanice microcosmice, molesta quædã spasmodica tractoria motio, siue reactio, universum sæpe systema partium nervosarum, & fibrosarum in similem motum per consensum abripiens, suscitatur, quæ spasmodica motricium, musculosarum & nervearum partium contractio, evidentem, primam & proximam motuum morbosorum causam unico constituit atque abolvit. Hæc quippe est, quam omnibus motibus, qui alias secundum naturam ordinate fiunt, turbandis & pervertendis apta est, hæc functiones partium lædendi ac invertendi potentia pollet, & ex hac omnium in morbis obviatorum symptomatum origo merito petenda est. Quod vero mirandum, idem hæc spasmodicus motus, est instrumentum ac medium, quo natura utilissime utitur ad ipsam morbi causam, quæ motus hos morbosos concitat, superandam ac præcindendam, ut adeo infinita summi architecti sapien-

tia & providentia in construenda corporis humani machina merito admiranda sit, quæ factum, ut morbosus motus subinde remedium sint, ipsis morborum causis corrigendis ac removendis.

§. IX.

In quo quidem quum magni naturæ medicatricis arcanum & res maximi momenti contineatur: scopo nostro quam maxime erit consentaneum ut mentem nostram circa hoc negotium paullo clarius exponamus. Videlicet observatur, ut passim inculcavimus, in omnibus motibus & paroxysmis spasmus, qui recte primo in universalem & particularem, deinde in salutarem & perniciosum dispecitur. Universalis, si totum vasorum genus, præcipue venter & arteteriarum ac fibrarum systema affligit, & facta per æternaturali in iis contractione, systoles & diastoles intenditur sanguinisque progressus acceleratur, febris recte dicitur, cujus pulsuum frequentia certissimus index est. Alter particularis, in certis tantum corporis partibus consistit, quas contrahendo coarctat, sanguinisque liberum progressum intercipit, adeoque inæqualem commeatum efficiendo, sanguinis copiam ad alias partes minus strictas impetuose urget. Potissimum spasmodica hæc affectio particularis nervosæ & membræ, naceas partes exagitat, ut sunt ventriculus cum toto intestinorum volumine, in quo scenam sæpe adornat, quod morbus ille spasmodicus, qui mali hysterici vel hypochondriaci nomine notus, pathematum & varietate atque atrocitæ planum facit testatumque. Præstis quoque est hic spasmus in omnibus hæmorrhagiis, nimis sanguinis ad certa loca congestionibus, humorum decubitu, in omnis generis doloribus, cunctis anxietatibus & excretionibus suppressis. Quod si vero hic vehementior spasmus duram matrem, quæ totum cerebrum ac cerebellum involvit ac nervorum omnium immo ossium membranis ortum præbet, tangit, non modo celerissima fluidi-

Quoniam
plenius
minus
hic.

Qui
dilecti
fuerunt
mo
bo
facti
et
sibi
vult.

ner.

nervi per totum membranarum & nervorum systema sit trajectio, sed & citra voluntatem artus vel stringuntur, vel distorquentur, aut validissime agitantur, & sic epilepsia, sive convulsio universalis nascitur, quum contra convulsivi motus ex spasmo membranarum ac nervorum spinalis medullæ originem fortiantur.

§. X.

*Qui en-
ita ad
salutem.* Hi sunt præcipui illi naturæ motus, qui in morborum insultu vel paroxysmo nunquam non advertuntur; jam disquirendum: quinam ex iisdem saluti & causis morborum removendis opti sint, & quinam vicissim ad perniciem ipsamque mortem tendant? Salutares itaque eos in morbis motus ac spasmos dicimus, qui ita sunt comparati, ut causam morborum sive spasmodicorum motuum auferant, & tam humores stalin vel stagnationem concipientes expediant iterumque in motum ciant, quam & acres causticos corrigant atque contemperent, simulque ad excretionem materiæ peccantis vergant. Exitiosos vero multumque periculosos censemus eos, qui cutim & omnis generis emunctoria constringunt, materiam quæ in vitio est ipsumque morbi fomitem intus detinent, & ad ima viscerum, ac interiora vitæ penetralia pellunt, neque evacuant. Illos sanitas, hos mors excipit.

§. XI.

*Spas-
mos
quomo-
do fiat
salutem
vel.* Ea quidem, omnium spasmodorum indoles est isque effectus, ut sanguinem & humores a corporis ambitu ad interiora agant, ac emunctoriorum minimos ductus stringendo, evacuationes quodammodo sufflamment: nihilominus tamen salutares sæpe fiunt, quando scilicet interposito certo temporis spatio, excernicula antea occlusa laxantur, crispatis tubuli adaperiuntur & postea major succorum ad corporis superficiem partesque externas succedit, appulsus, cutanea excretio augetur, sudor manat, urinæ crassæ, minguntur & alvus biliosa, ac viscida copiose dimittit. Et ex his excretioni-

bus, quæ morbos & spasmos certo præfertim tempore subsequuntur, salutaris effectus & auspiciatus eventus merito dijudicandus, unde etiam Medici easdem criticas, sive morbum judicantes, appellare suescunt. Solent autem hæc ipsæ, si cum salute contingunt, die maxime impari critico capropter dicto, succedere, dimidiato scilicet septimo, nono, undecimo ac decimo quarto, & his diebus vel ad mortem, vel ad salutem morbus concedit. Ubi enim hæc diebus notabilis symptomatum sit remissio & evacuationes eveniunt, optima salutis est significatio: quando vero symptomatum atrocis persistit, spasmi urgent nec evacuationes animadvertuntur, gravissimum imminet discrimen, ac mors ut plurimum morbum terminare observatur. Quare licet plures motuum morbosorum in se & sua natura a norma ac ordine deficiant, dirigente tamen sic divinam artificiosam solidam, & fluidam: machinam nostram constituentium partium dispositione, structura & motibus inde resultantibus providentia, laxissime sunt: salutares causisque morborum expugnandis idonei, ipsique morbis sic optime medentur, quo etiam sensurecta a Veterum sapientioribus natura dicta est morborum medicatrix.

§. XII.

Igitur genuina, tuta ac saluberrima corpori a summo conditore jam insita methodus, lex ac norma, qua & secundum quam ipsa natura, morbos percurat, in eo maxime versatur, ut a causa morbi, sive mole, sive qualitate peccet, spastici motus in genere vasculoso, & membranoso etiam suscitantur, qui ad ipsam causam morbi removendam, vel convenienti tempore eliminandam, tendant. Hi quando ex vato succedunt, sola natura morbos sanat & Medicus tantum spectatorem agit, quod si autem, hæc sola id præstare nequit, artifex eidem viæ ac methodo insilire, naturam adjuvare, impedimenta tollere, motus moderari,

*Natura
causa
salutis
sanat
morbus.*

ri, vel intendere, materiam ad congrua loca ducere, ab incongruis divertere, variis debet accommodis remedium generibus. Ut adeo in eam unice omne medentis auxilium, omnis intentio ac sanandi ratio fundata esse & consistere debeat, quo methodum naturæ, si in materia subsistente dissolvenda atque expedienda, acrimendanda, & temperanda demumq; debito tempore, per convenientia loca expellenda, occupata est, observet, sequatur, adjuvet ac in rectam viam ad salutarem finem traducat.

§. XIII.

Naturæ
processus
in
febris
acutis.

Sed necessarium æque ac utiliter, quo mentem nostram paullo clarius exponamus & hanc naturæ methodum in variis morbis investigemus, ostendendo, qua ratione in eodem corpus sæpe a præsentanea nota vindicet. Ex horum numero potissimum sunt febres, tam acutæ, quam chroniæ. Acutarum quidem pleræque sunt inflammatoriz & fixam sanguinis stasim in tubulosa partium aut vicerum substantia pro causa agnoscunt, quæ dum spasmus in universo genere fibroso & vasculoso suscitât, sanguinem per totum systema vasorum celerius agit & majori copia ad partem affectam appellat, quo fit, ut sanguis subtilens & firmiter inclusus, succellive abtergatur, eluatur, resolvetur ac in motum redigatur, quod plerumque circa septimum diem contingit. Et si tunc spasmus cum omnibus symptomatibus etiam ipsa febre remittit, cortex cutis glandulosus laxatur, exhalatio repetit, sudor liberius manat, generatur sub febrili commotione multæ recrementitiz salino-sulphureæ lordes, solius naturæ beneficio utiliter evacuantur, ipsa tebris ex voto solvitur, qua certe naturæ methodo plures, præsertim plebei, siue ullius Medici ope, sæpe elicitur, ex febribus in primis continuis evadunt.

§. XIV.

Medici
affid.

Hæc naturæ methodus curandi quam maxime Medico monstrat viam

quid in hujus generis febribus facere vel omittere debeat. Lex enim curandi hæc est: impactus tubulis sanguis succellive & paulatim citiori sanguinis appulsus resolvendus est. Ex quo facile colligitur, quia a sanguinis abundantia, qua nimium vasa distenta sunt & turgent, impeditur sanguinis per partem inflammata liberior transpulsum, ut potius exinde major sanguinis in eadem fiat stagnatio ipsaque inflammatio incrementum capiat, talem casum nihil præsentius esse, quam sanguinis detractionem provide institutam, partim quo major stasis & inflammatio impediatur, partim etiam ut liberior cursus universo sanguini & transpressio per partem affectam concilietur. Vicissim & illud ex prima & principe morbis medendi lege naturæ addiscimus, non valde nimiam esse sanguinis quantitatem exhaustiendam, siquidem detracta, nimia sanguinis copia, non sufficiens sit ad partem affectam ejus appulsus, quo tamen stasis, quæ causa morbi est, dissolvi debet. Quare graviter ii peccant Medici, qui in febribus inflammatoriis quando sanguis deficit, repetitas venæsectiones moliantur, quibus nihil aliud perficiunt, quam ut inflammata partem celerrime ad sphacelum perducant. Et dum in minimis & capillaribus vasculis sanguis & humores stasim ac in inflammationem capiunt atque ex his ipsis eluendi sunt, per hæc tamen sanguis crassus & densus difficillime transit, facile apparet, ea omnia, quæ humores fluxiles reddunt, quæ diluunt, humectant & immodicum calorem, quo serum tenue absorbitur, contemperant, remedia convenientissima esse: contra omnia, quæ humores incrassant, quæ calorem augment, humidum absorbunt, uti opiata & calidiora sudorifica, in omni inflammationum genere non xiosissima esse.

§. XV.

In acutis gravissimis febribus, quæ In vici
natho-
method
morbis
febris

jungi solent variolis, morbillis, purpura, petechiis, bubonibus pellentia.

quod
natura
faciat.

tialibus, serum sanguinis causticum, acre, tenue, in partibus nervoso-membranaceis, præsertim ventriculò & intestinis, acerbis spasticis constrictiones, nec non humorum ad varias partes congeries efficit, simulque febrem accendit, cujus beneficio sanguis, a partibus exterioribus ad interiores, ubi materia peccans hæret appellitur, ut copiosior lymphatici humoris & sanguinis affluxu materia acris caustica temperetur, corrigatur, resolvatur & apta ad excernendum fiat. Quod si naturæ beneficio id feliciter accedit, spasmodorum omniumque fere symptomatum fit remissio, pori & tubuli subcutanei relaxantur & sanguis ad summam cutem & ambitum corporis fit major affluxus, unde materia morbifica caustica ibi fecernitur atque sub forma exanthematum, pustularum, bubonum excernitur. Et sic sæpe naturæ solius beneficio pestis, variolæ & morbilli citra singularem apparatus medicamentorum sanantur. Nam perspicuis certe verbis *Sam. Eborius sect. 1. aph. 139.* confirmat: plebejos magis liberari a peste, quam divites, qui multis medicamentis utuntur & *Sydenham* in limine *acut. morb.* ita disserit: *ipsa pestis quid obsecro est aliud, quam symptomatum complicatio, quibus vitæ natura ad inspiratos unum aere particulas mis/modos per emunctoria, apostematum specie, vel aliarum eruptionum opere, excutendos.*

§. XVI.

quod
medico
facien-
dum.

Quod si igitur hac via, natura sola hos gravissimos morbos curat, utique etiam Medicus, qui naturæ minister audit, huic viæ insistere debet, si natura sola id perficere impeditur. Regula namque exanthematicis hisce febribus medendi hæc est: materia acris, caustica, vitalibus partibus inhærens, uberiori sanguinis & lymphæ benignæ appulsu temperanda est, ut apta ad excretionem per ambitum corporis fiat. Ex quo jam conficitur: omnia ea, quæ ad contemperandam

materiam acrem faciunt, & quæ succos sanguini dulces, gelatinosos, benignos ingenerant, naturæ vacillanti egregie opulari. Hinc patet, præstantissimum in his morbis usum esse decoctorum, quæ leniunt & demulcent acrimoniam; qualia parari solent ex dactylis; ficibus, radice glycyrrhizæ, floribus papaveris rhæados, semine foeniculi. Patet quoque porro, plane extremum esse usum bezardicorum, quæ fixioris indolis sunt & acrimoniz humorum temperandæ egregie serviunt. Neque ex dictis amplius obscurum esse poterit, quam valde graviter & perverse in curando procedant ii, qui statim ab initio, antequam materia cocta, temperata & ad exelusionem apta reddita sit, sudoriferis valentioribus & expellentibus hos morbos tractant, quibus certe nihil aliud efficiunt, quam ut acerbiora symptomata ipsorumque funestum exitum accerlant. Denique ex aliatis id quoque patescit; quod quum materia per cutem sit eliminanda, nefarii sint eorum ausus, qui eo tempore, quo ipsa ad hoc in superficie corporis emunctorium transmitti debet; valentiora purgantia, diuretica, aut emetica, vel etiam acida refrigerantia, aut opiata, vel nimia quantitate nitrosa, præsertim in infantili ætate, propinant, aut, corpora liberiori aeri exposunt.

§. XVII.

Febres quoque intermittentes remedium & præsidium quippam complexuntur; & haud raro sine Medici auxilio cum insigni subsequente emolumento discedunt. Quum enim contomaces ex iisdem, ut sunt quæ autumnus, vel hieme accedunt, nec non quartanæ, focum ac fomitem plerumque altius in abdominis visceribus, hepate, liene vel pancreate constitutum habeant, eaque propter corpora sanguine crasso facta crebrius infestare soleant, ac nonnunquam vel sponie, vel per imprudentem medicationem, in tælerum, anasarcam, ascitem, pedum œdemata,

aut

Feb. int.
mitt.
sist. na.
ta. alla
decur-
sus.

aut lienis tumorem concedant : nihil certe efficacius magisque aptum ad obstructa & infarta hæc viscera referenda excogitari poterit , quam citatior atque validior sanguinis ad oppilatos tubulos appulsus ac motus , quo utique succi crassi , & impacti urgentur , labribus eliduntur iterumque in motum percipiuntur , ut hinc solutis obstructionum repagulis , ipsa febris , vel sponte sæpe , vel exigua artis ope , felicissime desinat .

§. XVIII.

Quia vero graves a sanguine nimis copioso & crasso oppilationes , minus ex voto a sola natura expediri queunt , sed potius recurrentibus tam crebro paroxysmis , sanguinis massa admodum consumitur , intemperiem calidam biliosam contrahit , ipsæque vires simul exhauriuntur ; omnino artificis est , optimum naturæ processum opera sua , quantum fieri potest , secundare , omniaque auxiliorum genera eo dirigere , quo facti obstructione viscerum meatus referentur . Quo pertinet maxime prudens & circumspexitus pro diversitate corporum usus salium aperientium , spissos succos colliquantium & abitergentium , decocta & infusa ex radicibus & herbis amariorum aromaticis incidentibus balsamicis concinnata , accommodata evacuantia , ut sunt balsamica nostræ pilulæ , item mercurialia rite præparata ; quæ omnia debito ordine ac tempore administrata , utique ad debellandas has contumaces febres & corpus ab imminente periculo tuendum , præstantissime sunt efficaciae . Contra vero nefaria sane & perversa rebelles intermittentes sanandi est methodus , qua mox in principio purgantia validiora & emetica , item sudorifera , opiata & adstringentia , liberaliori præsertim manu , propinantur ; eo quod hoc factis , obstruções potius obfirmantur & pessimæ recidivæ , vel alia longe graviora mala arcessuntur , quæ nullam sanationem admittunt .

§. XIX.

Accedunt arthritice , rheumaticæ & catarrhales febres , in quibus maxime peccat serum copiosum excrementitium , tenue , salum , quod languescente perspiratione retentum , & ad interiora , atmosphæra præsertim a ventis borealibus compressa , repulsum , in-glandulosis asperæ arteriæ vel faucium locis , aut membranis articulorum vel musculorum hærens , spasticas ibi stricturas movet , unde extremorum horripilatio , refrigeratio , lassitudo corporis gravatæ , appetitus prostratio , alvi restrictio , frequentior ad urinam stimulus , calor sub vespere & noctem auctior , sternutatio , tussis , dolor artuum , subsequantur . Nihilo tamen secius sub hisce naturæ contrariis ab ambitu ad interiora moribus , subsidium latitat atque remedium ; quandoquidem dum sanguis , & temperatio lymphæ ad partes stimulo salino exagitatas largius advehitur , tubuli antea restricti ampliantur & materia caustica contemperatur , sive coquitur , atque adeo ad excretionem cum copioso humore viscido in tussis & coryza , vel ad exhalationem per cutis spiracula in arthritide & variis rheumatismi speciebus apta redditur . Et hic naturæ processus Medico planius monstrat , quid in ejusmodi morbis proliit , vel obsit , & quid ipsi faciendum , vel omittendum . Prima enim atque palmaria ejus intentio esse debet , quo congruis præfidiis , acrem & saltam materiam corrigeat , altera , ut non prius quam cocta & rite præparata tuerit , ejusdem ejectionem moliat , tertia , quo per convenientia loca & emuntoria excretionem proriset , minime vero ad alia incongrua excretoria per improvide adhibita momentia , purgantia aut emetica , pertrahat , vel plane eliminationem , quæ exhalatione perficitur , præposito topicorum , adstringentium ac repellentium usu , impediatur aut cohibeat .

Naturæ
medicæ
lib
lym-
phæ
stru-
ctis
fau-
cibus

Et ar-
thritide
variis

Artifi-
cis
offi-
cium.

§. XX.

Hæmorrhagia in salutem a natura sustinetur,

Quemadmodum igitur natura febres, causam earundem per motus auctiores subigendo ac ejiciendo, sola sæpe per sanat: sic quoque eadem methodo per varii nempe generis excretiones alios morbos & arcet & percurat. Animadvertimus videlicet sanguinem in vasis, præsertim in sexu sequiori, ætate juvenili, habitu corporis spongioso, molli, vitæ genere delicatiori & quietiori, statim temporibus vel temporum periodis redundare, stagnare, & hinc inde in vasis majoribus impeditus moveri, quo fit, ut spasmo, qui una abdominis maxime petit, atque ex dolore circa lumbos, flatulentia in abdomine, alvi adstrictione, extremorum refrigeratione, urinæ tenuitate cognoscitur, obortæ, venæ in mesenterio & abdomine comprimantur, & hinc sanguis majori nisu & impetu in feminis ad uterum, in sexu nobiliori & provectiori ætate ad hæmorrhoidales venas, in adolescentia ad caput & nares urgeatur, ac majori ibi facta collectione, vasa extrema intra tunicas teneriores narium, ani vel uteri jacentia, nimium distendantur, tandem aperiantur atque notabilem sanguinis copiam effundant. Equis est, qui hic non animadvertat, salutarem & utilissimam esse hanc sanguinis excretionem, quæ liberat corpus a copia, libero vitalis hujus liquoris progressui contraria & ingens corporis periculum minitante.

§. XXI.

Medica cornu d'iron statio.

Et salutare hoc negotium ubi natura recte in movendo & excernendo exsequitur, nihil moliri debet Medicus. Imprudens enim ipsique rationi contrarium molimen foret, si has excretiones salutiferas externis vel internis constringentibus, aut motus sustentibus, opiat, narcoticis, cohibere niteretur. Quando vero natura in opere deficit, & vel motus isti spastici non sunt sufficientes ad sanguinem expellendum, vel sanguis nimis crassus, tenax ac viscidus est, vel viæ, per

quas debet fieri evacuatio obstructæ aut nimis spasmo contractæ sunt: ejus vertigini merito insilendum & sanguinis exolutio facilitanda ac promovenda, eumque in finem emmenagogorum moderatorum cum sufficienti humido, item potus theæ, coffee, balnearum, aquarum mineralium, nimiam spasmodorum vehementiam sedantium, sotorum, frictionum, eo tempore quo exitum affectat sanguis, usus longe est efficacissimus.

§. XXII.

Sæpe etiam fit, ut provida solius naturæ ope, graves & vix ulla arte sanabiles morbi, sanguinis profluvio solvantur & finiantur felicissime. Ut enim mittamus criticas illas in febribus acutis maxime obvias hæmorrhagias, de quarum salubritate frequenter apud Hippocratem, aliosque Veteres est mentio; multiplici certe experientia compertum est, insaniam, vertiginem, convulsivum asthma, colicam convulsivam, affectus soporosos, item paralyticos, hemicranias, arthriticos & rheumaticos dolores, pathemata hypochondriaca, exsoluto per ani venas sanguine, motu & exercitatione corporis, remisisse ac cessasse. Sæpius quoque a me observatum est, epilepticas convulsiones & convulsivas artuum tractiones, quæ per multos annos juvenculas affligerant, accedente mensium tempore ac prodeunte fluxu, sponte conquiescisse. Pariter experientia constat, cephalalgias, tinnitus aurium, vertiginem aliaque gravia capitis mala, tempestivo narium in juvenibus stillicidio, egregie levari ac abigi. Et quæ plura *Sect. I. cap. 6.* de damnis ex cohibitis sanguineis evacuationibus in medium adduximus. Ut adeo in ejusmodi casibus nihil satius magisque pro sanitate sit, quam ut artifex naturæ ductum sequatur, successum evacuationis teneatur atque faciliiter, nec ullo modo eundem inturbet.

Hæmorrhagia salutis morbus.

§. XXIII.

Tam salubri eventu adornantur a natura.

Natura natura evacuationes sanguinis: præter
sanita- quas tamen plures adhuc aliorum hu-
et mor- morum aliarumque materiarum quæ
sur. corpori perniciem intentant, ab eadem
 per varia loca instituuntur excretio-
 nes. Nimirum serofus quoque humor,
 tam quantitate, quam qualitate quan-
 doque morborum causam constituit,
 eaque propter cum insigni sanitatis e-
 molumento natura administra corpori
 subtrahitur. Obvium hoc est vere ma-
 xime & autumno, ubi per glandulosam
 narium & sinuum capitisunicam, pi-
 tutariam dictam, item per glandulo-
 sas bronchiorum pulmonalium tuni-
 cas, seroso-mucidos humor copiose sub
 coryza, tussi aliisque catarrhalibus
 ac rheumaticis affectionibus elimina-
 tur. Pariter accumulatis nimium in
 corpore penetrabilibus serosis, acris,
 biliosis falsis fuccis, sponte sæpe ob-
 oritur alvi profluvium, quo iidem
 egregio cum levamine ejiciuntur,
 morbisque inde oriundis minera sub-
 trahitur. Sæpe quoque per cutis spi-
 racula natura molitur exitum & su-
 dorem movet copiosum, tam acrem
 & mordacem, ut ipsam cutem exco-
 riet, cum molestissimo ad scalpen-
 dum pruritu, quo vidimus scorbu-
 ticam diathesin sublatam. In aliis,
 suppressa inprimis cuticulari exte-
 rione, exsuperantem serosum humo-
 rem per urinarios tubulos emittit,
 corpusque per copiosum urinx fluxum
 ab eo liberat.

§. XXIV.

Ter vo- Singulari porro naturæ vigori &
mitum. beneficiotribuendum: quod si ven-
 triculus a copia ingestorum, præser-
 tim incongruorum, vel crudorum &
 semicoëctorum ciborum sarcina opple-
 tus est, vomitu cito citius eum depleat,
 quod certe apprimè pro sanitate est,
 quippe ubi moles illa relicta stoma-
 chum aggravat, protinus ructus, fla-
 tus, borborygmi, hypochondriorum
 dolores, sanguinis ebullitiones, cum
 pulsu magno & celeri somnique defe-
 ctu accedunt. Hinc etiam de lacten-
 tibus pusillis pervulgata opinione non

linea ratione creditur, quod in crebri-
 ori vomitu magnum ad sanitatem eor-
 um momentum sit repositum. Idem
 sentiendum de iis egestionibus, qui-
 bus natura delitescens intus & no-
 xam minantes morbificas causas ad
 habitum corporis utilissimè protrudit,
 quod subinde evenit in variis cutis
 defecationibus, scabie, lepra, tinea
 capitis, achoribus, variis, mac-
 ulis cutaneis, tumoribus erysipelat-
 ceis & lespiginosis ulcusculis aliisque
 in cute efflorescentiis. Inprimis quo-
 que de podagra senes invadente expe-
 rientia & rationi subnixafert sententia,
 eandem longævam præstare
 vitam, de quo scitum *Syndehami* ef-
 satum: *quid podagra, inquietis, nisi*
natura providentia ad depurandum se-
rum sanguinem, atque ad expurgan-
dum corporis profundum, ut cum Hip-
pocrate loquamur. Quæ quidem omnes
 hæcenus enumeratæ criticæ egestio-
 nes, quum sanitatem tueantur & mor-
 bos mineram ejiciendo arceant, neu-
 tiquam intempestiva ac præpoëtera o-
 pe sunt compescendæ, aut materia ad
 corticem criticæ amandata, infido ar-
 tificio repellenda, ne eo majus eoque
 gravius in corpus redundet detrimen-
 tum.

§. XXV.

Quod veroquam maxime miran-
 dum, is sæpe naturæ in tuenda cor-
 poris integritate est processus, ut uno
 illo fluido:um & solidorum motu au-
 thiori facto, binas morbificas causas
 tollat & sic morbos per morbos expu-
 gnet. De febribus, quod convulsionem
 solvant, prisca est *Hippocr. sect. 5. aph.*
 17. sententia. Quin quantans illud *Me-*
dicorum scandalum convulsionem ip-
samque epilepsiam abigere, non modo
idem auctor sect. 5. aph. 70. nec non
Conc. 3. 80. perhibet: sed etiam exem-
plis confirmatur a Barbolino Cent. 2.
hist. 68. Salmutho Cent. 2. obs. 84.
 Ipse quoque complures observavi,
 motus convulsivos ex vermibus; ac-
 cedente febre vermibusque per æstum
 vel bilem acrem enectis, sponte cessas-

fe. Pathemata hypochondriaci adolescentis ac juvenes diu exagitantia, nec ulla medica ope expugnabilia, superveniente quartana, vel tertiana, evanuisse, idem talem novi. Neque minus infanias & passiones spasmodicas prodeunte in conspectum purpureo in cortice corporis scorbutico exanthemate, remissile ac penitus discessisse, compertum habeo. Coryzam in aurium tinnitu, cephalalgia robali & oculorum vitiiis, cum bonis ægrorum rebus, oboriri, experientia uberius constat. Dysenteriam ac diarrheam hypochondriaciis, & melancholia hypochondriaciis laborantibus, podagricis etiam, subinde tulisse suppetias, & recentiorum & Hippocratis testimoniis confirmatum est. Aliquot etiam mihi innotuerunt exempla, quod anasarca, item hydrops pectoris, cum cordis magno tremore & suffocationis metu, succedente post pilularum balsamicarum & salis aperitivi usum ingenti per uterum aquosi humoris fluxu, subsederit atque cessarit. Idem per largum alvi profluvium, per lenem stimulum procuratum, contigisse, & ipse vidi, & testatur *Ballonius lib. 1. epid. pag. 6.* Hydropem quoque faccatum, fuscitatem per lapsum ex improvviso copioso urinæ stillicidio, disparuisse ac feliciter fuisse sublatum, uberius enarratur in *dissert. naud* ita pridem hic habita, de *hydropica lapsu integro abdomine curata*. Et quæ plura rariora exempla passim in observatis Medicorum sunt consignata.

§. XXVI.

Sic quidem natura sola optime his morbis medetur, & ineffabili sæpe profusus modo corporis integritatem ruetur: alia vero ratio est morborum chronicorum, quos natura sola non vincit, sed qui utique artificis opem atque accommodatam medendi methodum per efficaciam præsidia exposcunt. Nam recte in præfatione *Calii Aureliani* asseritur: *celeris passiones sua sponte solvantur, nunc fortuna, nunc*

natura favente, fluore sudoris; sanguinis, vel ventris: chronici vero solius Medici peritiam poscunt, quum neque natura, neque fortuna solvantur. Et *Celsus* scire non minus quam ex vero *lib. 3. cap. 1.* eandem in rem diserit: *magis ignoscendum est Medico parum proficiensi in acutis morbis, quam in longis. Id enim breve spatium est, intra quod si auxilium non profuerit, æger extinguitur. Ibi & deliberationi & mutationi remedium tempus patet, adeo ut raro, si inter initia Medicus accessit, obsequens æger illius vitio pereat.* Scilicet longe dispar chronicorum, & acutorum morborum est ratio, dum non solum in illis vehementes spastici motus, qui morbi causam impetuose aggrediuntur, celeremque exitum gignunt, adfunt; in his vero rarius, neque continuo, sed cum mutabili intermissione præsto sunt, sed etiam illi ut plurimum celeriter corpori valenti accedunt, hi vero successively generantur & lentis adolescent incrementis. Accedit, quod eorum qui diutius trahuntur morborum causæ plerumque sunt obstructions, & indurationes minimorum vasculorum in emunctoriis & glandulosis visceribus, inutilium & superfluum tam se quam excretioni dicatis, quibus oppilatis, non potest non ingens vitalis succis conciliari impuritas, ac de mura ipsa viscera & glandulosa excernicula penitus oppleta, indurata & tumefacta in putridam corruptionem, exulcerationem cancrum vel in abscessum concedere, aut funestis lymphæ effusionibus ansam suppeditare. Adeoque quum in his causa morbi ipsa mora firmissimas agat radices, & labe latius serpente, vires exhauriat, motus supprimat ipsamque naturam mirum debilitet: non mirum est, naturam in expugnandis iis languere, moribus auctis raro eisdem aggredi, nec dispellendis iis sufficere, sed artis potius hic vigere opus, natu-

ræ

*morbi
chroni-
ci non
solvuntur.*

re vacillanti succurrere, idque perficere, in quo ipsa deficit.

§. XXVII.

Quia
in
mendi.

Hoc autem ex voto exsequendi, nulla itidem alia suppetit methodus, quam qua vitalis ille, vitæ sanitatisque auctor, sanguinis, & humorum per omnia vascula itus ac reditus liber redditur, sordiumque per omnis generis excernicula evacuatio integra præstatur, adeoque obstructions, ubicunque consistant, citissime expediuntur atque humores qui in vitio sunt per congrua emanatoria educuntur. Jam vero ipsa dietitatio ratio, vasculorum obstructions nec prius solvi, nec succos vitiosos eliminari posse, quam mobiles, fluxiles & ad excretionem apti redditi fuerint. Hinc utique omnis per longos morbos sanandi methodus in eo continetur, ut humores crassi mobiles ac fluidi efficiantur, dura emolliantur, stricta laxentur & postea validiori facto sanguinis impulsu, per intensam solidorum actionem, impacti humores concutiantur, dissolvantur, & eluantur & sic obstructionum repagula referentur. Ex quo quidem clarissime patet, efficacissimum ad hunc scopum obtinendum esse thermarum, acidularum & aliarum medicatarum aquarum, infusorum, decoctorum, fotorum, balnearum, & omnium, quæ incidente & aperiente virtute polent, tempestivum usum; contra vero ante debitam materiam quæ in vitio est præparationem, damnosam ac præposteram validiorum purgantium, diureticorum, sudoriferorum, salivantium, mercurialium & metallicorum oblationem, ut certe nihil imprudentius sit, quam intestinis fecibus duris confertis lorte purgans exhibere, vel calculum impetuosè pellere, ubi a doloris & spasmi atracia urethres cum ductibus urinariis stricti calculusque impactus, aut aquas hydropicorum purgante exturbare niti, ubi succi viscidit adhuc intra membranarum tunicas obhærescunt, vel denique

Tom. III.

sudorem elicere velle, ubi spiracula cutis spasmo stricta atque compressa.

§. XXVIII.

Naturæ
motus
minus
salutares
in
hæmorrhagiis

Neque vero tantum natura quandoque in opere deficit, verum etiam nonnunquam alienos plane ac perniciosos in corpore concitat motus, qui causæ removendæ neutiquam accommodati sunt, sed potius exacerbationi favent. Hunc in censum referendæ sunt illæ sanguinis evacuationes, quæ si non sanguinis copia delinquit, sed serum acre causticum nerveo membranosis partibus insidet & enormes propositiones in impuris cachecticis corporibus suscinat, uti sæpius contingit in purpura, variolis, morbillis, scorbuticis & arthriticis minus plethoricis eveniunt, sub quibus sanguis, qui potius servari debebat, unacum viribus effunditur, nec ullo modo tenuissima acris massa morbi causa ejicitur. Hinc utique in tali casu Medico opera danda est, ut qua fieri potest celeritate has perniciosas ejectiones compescat, quod tamen non violentis stipticis & contriungentibus expedire consuevit, sed spasticæ multo magis stricturæ laxandæ, humor acris temperandus & discutiendus, quod commodissime diaphoreticis sedativo nuptis præstatur. Eadem ratio est hæmorrhagarum, quæ ex obstructione, induratione, vel infarctu viscerum, subnascuntur in cachecticis atque hydropicis. Tunc enim sanguinis evacuationes per nares, hæmorrhoides, vel etiam vomitum frequentiores, maxime detrimentosæ esse solent, quia mali causam non tollunt, sed potius vires consumendo, fatalem morbi exitum procurant.

§. XXIX.

Fibræ
nerv.

Ex febris, live febrilibus spasticis generis nervosi & vasculosi commotionibus, minus salutes sunt, quæ a sphacelo interno, ut sunt malignæ, vel a corruptione lenta viscerum, aut apostemate, ut sunt hæcticæ, oriuntur, & phthisicis, cachecticis atque hydropicis superveniunt, quippe quæ

O 3

re-

reliquias boni sanguinis ipsasque vires penitus consumendo, certissime ad mortem ducunt. Ab assumpto veneno caustico, a latione vel punctura externa partium nervosarum ac tendinosarum, a calculo metheribus infixio, bile caustica, vermibus, hernia incarceratione, ardore ex concedentibus in exulcerationem confluentibus variolis, omnibusque gravissimis doloribus, febres fieri acutas, quas Veteres dixerunt symptomaticas experientia indies edocet. Sed omnes sic accedentes febres, nihil boni, sed plus damni minantur, & merito qua fieri potest celeritate & dexteritate exorbitantes hi motus sunt sistendi: quandoquidem frustra causis a quibus pendent opponuntur, nec easdem ullo modo subigere & abigere possunt, sed potius dum ad affectum, & irritatam partem sanguinis majorem affluxum proritant, inflammationem ipsamque postea sphacelationem inducunt. Haud dispar indoles est quarundam intermittentium, earum scilicet, quae a prohibita perspiratione, iracundia graviore, cibo cum nausea sumto & male digesto, saburra vitiosorum prima in regione succorum, & bile acri caustica proficiuntur. Hæc enim si subsunt causæ, febriles impetus atque commotiones ad illarum emotionem parum omnino faciunt, quin potius expedit, vel emetico, vel salibus deterfivis, aut conveniente laxante, & acrimoniam temperantibus, causas aggredi, ac postea, ubi febriles motus sponte penitus conquietescere renuunt, roborantibus ac tonicis eisdem sistere atque componere.

§. XXX.

*Epileptici
et convulsivi
motibus*

Iisdem minus salubribus naturæ motibus accendi sunt, qui tam membranas cerebri, quam spinalis medullæ infesto fortiori spasmo exagitant, eorumque nervorum & musculorum systema in consensum pertrahunt. Horum classem ducunt epileptici & convulsivi insulti, qui ex dolorum atro-

sia in dentitione difficili, torminibus infantum, calculi cruciatibus, vermium morfu, lationes cerebri, fractura cranii, punctura dura matris a seculis, nec non in variolarum principio vel fine accedunt, nec ullo modo superandis his causis accomodi sunt. Neque cordis palpitatio, cujus causa ut plurimum est polypolum in cordis thalamis hærens concretum, bono & salutari fine contingit, eo quod validissima hæc qualisatio causam minime vincere valet. Pariter inanis ille singultus & vomitus a ventriculi inflammatione & insidente virulenta materia, omni utilitate destituitur, tanto magis quando materia vellicans intra stomachi membranas, ut in purpura, variolis & morbillis repereussis solenne, hæret. Tussis quoque sicca ferina, quam dura pulmonis substantia obdientia tubercula cient, nullius plane usus est, sed potius vires consumit, somnum aret & stomachum ad vomitum sollicitat. Ita etiam copiosæ cum sævis torminibus in diarrhæa ac dysenteria, vel post acré purgans assumptum dejectiones, nec quicquam ad salutem conferunt, eo quod non humorum copia, sed maligna qualitas in vitio est, cui frustra tanta sanguinis & seri egestio opponitur, qua vires magis exhauriuntur, & boni ac temperati humores cum detrimento subtrahuntur. Idem tenendum de diarrhæis, quæ nonnunquam inflammatorii febribus symptomaticæ accedunt, quippe quæ pariter neutiquam discussioni itales inflammatoriz favent, sed plerumque in causis sunt, ut inflammatio latius, etiam ad intestina, serpat eoque citius necet. Denique omni etiam usu ac fructu carent motus isti fortiores, qui graviorem animi affectum, iracundiam, vel terrorem excipiunt, qui certo adeo intempestivi sunt, ut vitam in summum subinde adducant discrimen. Ut adeo pateat perniciosos hos naturæ motus ab iis, qui ad salutem tendunt

*cordis
palpitatio*

*singultus
et vomitus*

*tussis
ferina*

*dejectiones
copiosæ*

*post animi
affectum*

dunt provide atque sollicitè esse distinguendos, & quum non solum fructu destituantur, sed succos viresque exhauriendo etiam noceant, tempessive compescendos, ita. tamen, ut simul causæ morbi per congrua præsidia removendis exquisita habeatur ratio.

§. XXXI.

Vidimus itaque naturam solam se posse morbos egregie percurare, arcere & corporis integritatem tueri, vidimus ejus vires non omnibus morbis expugnandis sufficere, sed artis juvamine indigere, vidimus quoque eandem sæpius incongruos moliri motus corpori damnolos, eaque propter ab artifice hoc prudenter esse emendandos ac componendos. Jam vero vehementer utique optandum esset, ut omnes qui salutarem artem exercent, genuinam illam & probatissimam naturæ methodum, quam morbos feliciter sanat, intimius perspectam tenerent, & molimina sua ad ejus præscriptum adornarent. In quo quidem laudanda meritis Veterum sententia, qui ad unum fere omnes professi sunt, Medicum esse naturæ ministrum, spectatorem, imitorem, & adiutorem; ita ut Hippocrates passim prodiderit, naturam impulsam artis peritis quæ faciendæ sunt monstrare, nec quicquam salutariter fieri posse, nisi quod ipsi naturæ convenienter fiat; id quod etiam *Daretus*, optimus Hippocratis commentator, lib. de hum. purg. pag. 17. urget; præstantissimum, asserens, artis magistrum illum esse & dici debere, qui fidelissimus naturæ imitator, observator, & adiutor. Neque minus scite hanc in rem scripsit *Fernelius in præfat. lib. 1. thesaur. medicinar. iniquiens, leges naturæ legibus debens esse consentaneæ. Et felix medicatio, cui adjuræ natura fuerit.*, istina vero, quæ repugnante natura ventatur, non absurgit pariter *Horr. ab Heer obs. 5. perhibens*, Medicum motum naturæ op-

minæ suæ observare debere, & nihil ea operante temere mutare, nisi, ut vel infrenem frenet, vel ut pigriorem excitet.

§. XXXII.

Sed. dolendum omnino plurimis ignotam esse optimam, & securissimam naturalem morbos sanandi rationem. Plures quidem præpostero nisi arcana ad certos, immo universalia ad omnes morbos curandos, magno studio undique conquirunt, quæ accuratius perpensare, spernunt, quæ fallunt & manifesto ignorantiam arguunt medentium, quasi in tanta corporum causarumque morbosicarum diversitate, unum idemque omnibus aptum esset atque accommodum: pauci autem de simplici, facili & compendiosa naturæ methodo cogitant, quum tamen non tantum medicamenta curent, verum ipsa potius natura, per remedia convenienter adjuta. Et licet sint, qui naturam mirum extollunt ut præteream nihil sapere videantur: teste tamen experientia, haud raro in eo delinquant, quod nec ipsas naturas, nec motus naturæ, qui in salutem, ab his, qui ad perniciem tendunt, sollicitè distinguant, & naturæ opus, ad salutarem, ut putant, finem, licet incongrua ratione, directum, in interpellare nolint.

§. XXXIII.

Proinde e re utique erit, ut ultimo loco quodammodo naturarum differentias delineemus, disquirendo maxime, quæ ad spontaneam medicationem aptæ sint ac dispositæ, quæ minus jam naturæ vel robustæ sunt, vel debiles. Robustam quidem sic describit *Aræteus lib. 2. cap. 3.* quod sit, quæ est probe temperata, quæ omnia superat, omnibus dominatur, ac per humorem & spiritum ac solida, hominumque omnium convenientem ordinem ac methodum, hominum vitam administrat. Quæ certo definitio ut antiquissima, ita elegantissima & principis naturæ mechanici quam maxime accommodata, utpote in æqualitate

O. 4. tate

His
geni-
na me-
thodis
naturæ
de or-
dinanda.

1792:
naturæ
disting-
guenda.

tate & temperie, ordine ac motu solidorum æque ac fluidorum, consistit, utique administratio vitæ & sanitatis, & hunc quæ imperturbatum servat natura successum, jure robusta dicitur ac valens. Sunt verò maxime plebei pauperes & rustici, qui simplici, & populari victu fruuntur, a robustis parentibus geniti, nec robur affectuum intemperie ac impetu, vel immoderatis animi fagitationibus atterunt, ætate juvenes, ac viri, qui naturæ robore pollent. Vicilium languet plerumque ac debilis est natura in nobilibus, opulentis, laute ac inordinate viventibus, a parentibus morbidis prognatis, patheticis commotionibus cerebro obnoxii, meditationibus studiisque nimium indulgentibus, senibus ac infantibus, post morbos perpeffos, aut ubi occulta labe fluidis vel ipsis visceribus inhæret, in quibus motus solidorum & fluidorum anomali sunt inordinati atque remissi.

§. XXXIV.

Valens igitur ac robusta natura, ad tuendam & revocandam corporis integritatem apta est, debilis autem & infirma minus, sed in præstando saluberrimo hoc negotio languet. Illa morbos gravissimos sæpe sola, vel levi tantum arte adjuva, remotis nonnunquam tantum obstaculis, percurat, hæc vero difficilis est ad sanandum, non sola sufficit, sed opportuno Medici consilio & auxilio indiget, quin omnem sæpe exquisitissimam medicatæ ludat artem. Hinc unique multum interest, quo Medicus naturam ægi curare noscat, & felix sanæ censendus, cui fortuna in eo favet, ut natura valente pollentes sanandos nanciscatur, fortunatior adhuc, si genere, honoribus atque divitiis eminentes, qui ipsum illustri præconio nobilitatem simulque muneribus excipere possunt amplissimis.

CAPUT II.

De methodo, ordine & legibus artis in medendo.

§. I.

IN superioribus satis, ut puto, evidenter ostendimus, a benignissimo & infinitæ sapientiæ corporis humani opifice ita constructas & coagmentatas esse machine animalis varii generis partes, ut certi ac determinati motus solidorum & fluidorum progressivi simulque secretorii, depuratorii & excretorii contingant, qui non modo ad vitalem conservationem, & durationem corporis in se corruptibilis vergant, sed etiam summo artificio ita instructi sint, ut ubi a nocentibus rebus & causis inordinati sive morbidi fuerint redditus, illi ipsi ad submovendas & destruendas illas causas a quibus pendent, conspirent. Et hoc est quod Veteres voluerunt, & quod etiam ipsa attenta confirmat experientia, plures nempe & graves etiam ægitudines, ipso solius naturæ viribus, sine peculiari Medici auxilio, sanescere, & naturam optimam morborum esse medicatricem.

§. II.

Possent itaque quispiam facile inde hoc elicere dubium, quod quom tam eximia sit naturæ virtus atque potentia, vana & supervacanea censeri mereatur in morbis tollendis omnis Medicatæ opera. At vero licet hoc de valente & robusta corporis humani natura, neque adeo corrupta vel debilitata, locum habere possit, quum tamen mirum quantum naturæ, & corpora quæ morbis affliguntur inter se differant, alia firmiora & valentiora, alia imbecilliora & vitata sint, adeoque non sufficiant ad negotium sanationis recte conficiendum, utique necessarium est, ut artis opus ipsi subveniat & congruis auxiliis luceat. Quam experientia subinde docet, ipsam robustam & idoneam alias ad

Naturæ
in me-
dendo
magna
virtus.

Artis
tamen
opus est
quæ
naturæ
jape
debilita.

inter-
alia im-
pediunt.

sanandum corporis morbum naturam, non solum semper sufficientem esse ad satundum; sed indigere simul variis adminiculis externis, ne impediatur, vel plane invertatur salutare, quod molitur negotium; quorum si non adhibetur observatio, plures, quibus robusta etiam natura, in variis, morbillis & febribus continuis, etiam inflammatoris levioribus, percutunt, qui potuissent fervari, dum regimine nimis calido in lecto, & conclavi, vel refrigeratione intempestive admissa, potu frigido, vel etiam spirituoso, cerevisia vel vini, cibis improvide in vigore morbi datis valde nutrientibus, situ corporis nimis diu erecto, improvida linteaminum mutatione, iisque rebus & occasionibus, quæ animum ad iram & terrorem movere possunt, damnum & noxa procuratur, ut hinc omnino opus sit, quo prudens Medicus, si non pharmaceuticis, minimum diætheticis, utilem operam præstet.

§. III.

Deinceps sepe in ægrotantibus præsentunt obitacula, quæ si non remouentur, totius naturæ negotium in curando plane turbatur, vel pervertitur, nec tamen sine Medici auxilio & consilio eadem removeri possunt. Exemplo sit: quando corpus sanguine redundans atque repletum morbis tentatur acutis, præsertim inflammationibus, natura sine superflui cruoris per venæsectionem imminutione, eisdem superare & curare nequit. Vel etiam si sordibus & scybalis copiosis ac duris canalis intestini crassi invadente morbo repletus est, hunc vacuare & recrementa protinus in principio educere expedit, ut felicius & debito ordine motus causam morbi expugnantes succedant, & ad eum cui destinati sunt fuerint, perungere queant. Aut quando etiam evenit, ut prima regio colluvie vitiosorum & semiputridorum humorum conferta sit, idque statim in morbi, sive sit acutus, sive chronicus, invasione,

quam maxime proficuum est; convenientibus auxiliis, vel per superiora, vel inferiora, eam prius exturbare, ne vis morbi & symptomatum inde augeatur & exacerberetur.

§. IV.

Porro licet non negandum, naturam firmam & præstantem suggerere subsidium, in emovendis iis morbis, scilicet caulis, quæ motibus obsecundant & expugnari possunt, in alteratione tamen & correctione humorum nocentium non minus necessaria, eadem parum vel nihil opitulatur. Sic quando acidi, pontici & corrosivi humores primas vias obfident, qui vehementes dolores, spasmos ac tormina, uti apparet in infantibus, concitant, item in hypochondriacis, in quorum ventriculo omnia coaccescere solent, plus certe commodi & utilitatis ab acidum absorbentibus expectandum est, quam ab omnibus naturæ motibus. Idem sentiendum, si bilis exsuperat præcalida, eaque acris caustica inflammans est, tum certe natura sola non sufficit, sed medicamentum demulcens, organum bilis acris depressens, v.g. nitrosum & absorbens, omne fere curationis punctum absolvit, quænam immodum id luculenter patet in affectibus cholericis & ex gravi iracundia enatis. Neque etiam venena quæ paucio tempore necant assumpta, solius naturæ ope curantur & noxa eorundem abigitur, quæ experientia testatur, sub vehementibus a natura suscitatis vomitibus & purgationibus, mox ægros, qui deamulcentibus, oleosis & lachryosis potuissent fervari.

§. V.

Præterea in multis morbis, præsertim acutis, natura evacuationes per hæmorrhagias sudorem & alvum molitur, quæ tamen sepe non sufficiunt, sed imperfectæ sunt, ideoque arte adjuvari & promoveri debent, vicissim crebrius nimias profusiones sanguinis & humorum suscitatur, quæ quia vires

Et factus est aliter potest.

Nitrosum fuit per omnia.

adimunt corpus nimium exhauriunt, componende sunt atque sedandæ. Nihil quoque sere evenit frequentius, ac ut motus vehemens ad destructionem potius vitæ, quam expugnationem caussarum morbosicarum & vitæ conservationem tendentes, instituat, uti in atrociori moribus epilepticis, convulsivis, doloribus, præcipue qui per consensum partium nervosarum subnascuntur, ubi sedativis quam maxime opus est. Chronicas jam prætereo passiones, ut scorbutum, luem veneream, cachexiam, hypochondriacam affectionem, quæ a sola natura sive Medici ope, plane non superari possunt. Quid præterea crebrius evenit, quam quod ex uno morbo, quantumvis egregie sanato, propter imbecillitatem partium relictam, alter sæpe deterior, nisi per artem roborantibus in declinatione cito ac tempestive occurratur, ingeneretur. Neque denique dubitandum est, quin morbus, qui a sola natura temporis beneficio demum superari posset, longe citius atque felicius opitulante arte tolli queat. Quod utrumque differis verbis inculcat *Celsus lib. 2. cap. 14.* dum ait: *potest morbus etiam, qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibitis auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est, & ut quam primum bona valetudo contingat, & ne morbus qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gravis esse quam fuerit, neque ideo tamen solvi, sed reliquis quibusdam inherere, quas admatum, aliquod auxilium discutias.*

§. VI.

Ex quibus omnibus adductis observationibus utilitas & necessitas artis medicæ clarissime elucescit, iidemque, quasi totidem argumentis uberime confirmator, sive natura in morbis languida, sive robusta fuerit. Interim tamen id certum manet ac firmum, quod ob imperitiam & temeritatem medentium, qui ductus natu-

re non sequuntur, sed crebrius pervertunt, satius sæpe sit, soli naturæ negotium relinquere, quam imprudentis ac imperiti auxilio uti. Ne igitur in hoc tanti momenti negotio peccet Medicus, sed firmam habeat regulam, normam ac legem, ad cuius præscriptum consilia & molimina sua instituere atque dirigere queat, non utique alienum, sed convenientissimum erit, ut universales quedam regulæ & medendi leges, jam præscribantur, quibus summo cum fructu in medendo uti possit artifex.

§. VII.

Ex his prima est: *omnibus in morbis ordinem & secessum actuum moruorumque spontaneorum, immo ipsa tempora, quibus natura sola medelam in salutem agrotantium molitur atque absolvit, curare & perquam sollicitè observare decet.* Vix vero ullus e morborum classe est, in quo tam conspicua naturæ methodus tamque distincta decursus tempora, quam in variolis. In variolarum enim morbo observatur, naturam primo certotemporis spatio ita ad materiam illam causticam partibus nervosis inherescentem, tamque lævæ, in principio consistentem symptomata, atque temperandam, quo mobilis & disposita fiat ad evacuantium, hoc factò, deinde excretionem ordinariæ intra tertiam & quartam diem auspiciari, eidemque iterum certum, duorum vel trium dierum tempus impendere, ita quidem, ut a superioribus ad inferiores descendat partes, & corporis corticem per omnem ambitum successive exanthematibus conspergat. Absoluta eruptione, rursus determinatam periodum infamit suppurationi & materię evacuatæ maturatiori, eaque confecta, interposito certo temporis spatio, ulcuscula siccat atque consolidat, incipiendo pariter in superioribus, ad descendendum in inferioribus. Ex hac est solennis illæ naturæ hoc in morbo processus, hic ordo, hæc tempora, quarum ita

LXXII

Trans-
itus ad
Inflam-
mam.

Diſſe notare debet, quo tempeſtively ſarſeſcenti naturæ ſuccurrere poſſit, nec unquam adverſi quippiam huic methodo præpoſtere molliatur. Idem vero etiam in aliis morbis obvium eſt, adeo, ut cardo medendi rationis, qua natura utitur, in eo poſitiſſimum veratur, ut primo ſemper materiæ hoſtilis & vitioſæ correctioni ſtudeat, eandemque ad evacuationem diſponat atque præparet, idque ſere in omnibus morbis, febribus non tantum exanthematicis, verum etiam inflammatoriis, immo chronicis; quæ proinde methodus pari ſtudio ſervanda eſt ac imitanda. Quumque hoc præparationis negotium nonniſi certo temporis ſpatio abſolvi poſſit, utique ut maxime omnium tempus exſpectet, nec curſum præcipitet Medicus, necelle; quæ certe prudens exſpectatio in Medicina ſummum arcanum eſt, de quo non inelegans eſt *Gideon Harugi* libellus *de morbis exſpectatione curandis*, cui addi poſſunt ea, quæ in diſſertatione *de curatione morborum in tempore* inculcavi.

§. VIII.

Lex II. Secunda lex ſic præcipit: *tempeſtively & ſtatim in principio morbi occurrendum eſt, & materia qua in vitio breviffima via evacuanda*. Scilicet ex præſtantiffimis medendi regulis eſt illa Hippocratica, ſeſt. 2. aph. 29. ita habens: *incipientibus morbis, ſi quid movendum videtur, move, videntibus, vere, quietos agere melius*. In qua quidem graviffimus auctor merito utique rejicit omnem illam medendi rationem, quæ in morbi vigore, hoc eſt, ſtatu impetu & exacerbatione ejus, ubi omnia in vehementiffimo motu, per fortiora medicamina, maximeque evacuationia, ſuſpicitur; viciſſim vero accommodatiſſimum, ad medicinas quæ movent & evacuant porrigendas, morbi eſſe initium, ſerio inculcat. Rationem hujus canonis divinus ſenex in ſequenti aphor. 30. ſubiicit, dum ait: *circa principia & fines omnia debiliora ſunt, circa vigo-*

res vero fortiora. Nimirum quia ſub vehementia atque vigore morbi omnia in motu intenſiori ſtatuque turbulento conſtituta, partesque motibus vacantes muſculoſæ & nervæ ſpafmo obnoxie, in proclivi eſt ratio: quare tum omnia ſtimulantia & moventia locum non invenient, nihiloque agendum: ſed potius quieſcendum ſit, neque alia quam humectantia, temperantia & effrenes morus quodammodo placantia uſurpanda. Contra ea inchoante & declinante morbo, omnia ſunt debiliora, ideſt, ſpafmi & motus intenſi nondum in tanto gradu adſunt, vel vehementiam poluerunt; ideoque omnino, ſi opus eſt, materia & cauſa morbi ſtatim in principio extarbanda, vel alienus qui ſub morbi decurſu genitus eſt humor, ſub declinatione expellendus eſt. Si experientiam conſulimus, hæc pariter hæc medendi legem uberrime confirmat. Nam proſpecto ad graves ipſa in herba jugulandos morbos, præſertim qui contagio debentur, ut ſunt peſtilis, dysenteria, caltrentes & mali moris febres miasmate ſuſceptæ, non efficacius occurrit remedium, quam leve emeticum, ſimulac corpus idem inceſſerint oblatum; quo colluvies vitioſorum humorum una cum miasmate, quod cum ſaliva in ventriculum deſcendit, antequam ad ſanguinis maſſam & nervorum genus deſeratur, ſtatim eliminetur. Variolæ quoque, morbilli, purpura & continuæ plures febres, bilioſæ etiam & ardentes, nec non quæ arthriticis & podagricis inſultibus aſſociantur, longe mitioribus incedunt ſymptomatibus, & longe facilius ſanationem recipiunt, ſi mox in principio, ſimulac æger conqueri cepit, prima regio, vel leni emetico, vel elementi purgante, a ſentina vitioſorum humorum fuerit depleta: eo quod increſcente morbo, ſpafmi augeſcunt, quibus hæ ſordes intus retentæ morbi & ſymptomatum vim mirum exacerbant. Et quia intermittentium febrium, tam

tertianæ, quam quartanæ, fomes, initio plerumque in ventriculi & intestinorum plicis ac glandulis hæret; ere est, ut statim sub auspicio primæ viæ a sordibus, sive per mitiora emetica, sive salia deterfiva, sive commoda laxantia, repurgentur. Confirmat hoc luculentis verbis Hippocrates lib. de affect. si, inquit, quartana deprehenderit, vomitorium in principio exhibendum, rursus aliquo intervallo, aliud infra purgant medicamentum. Quod si per hæc non sedatur, medicamenta febrisuga dare oportet. Neque tamen purgantia fortiora, quæ ipse Hippocrates lib. de purgant. §. 5. rejicit propinanda, quippe quæ nunquam in febribus tuta, quoniam spasticas exacerbant motiones, vel easdem, si conquieverint, revocant & recidivas pariunt. In lentis febribus, quæ maxime intermittentes male curatas sequuntur, in principio & laxantia, & leniora emetica tutissima, quo iisdem alimentaris canalis a saburra acida viscida liberetur; quod, si negligitur, diuturniores paroxysmi ingentem & fluidis partibus & visceribus labem affricant, & lentæ febres ex facili in hæsticas contedunt. Periculi plenæ inflammationes internæ, ut pleuritis, peripneumonia, angina, matura sanguinis missione & subjuncto infuso diaphoretico, feliciter in principio discuti queunt; hoc autem neglecto, curatio, ob febrem ac intensiorem inflammationem, difficilis admodum fit & anceps. Ipsa quoque ventriculi inflammatio sæpissime ex potu frigido corpori sudanti copiosius ingesto, natales trahit, omne tamen periculum mox declinari potest, modo infusum ex herbis diaphoreticis cum aqua calida factum statim sorbilletur. Quod sphacelus exteriora occupans præsentaneo subsidio, simulac primordia cepit, suffocari & arceri queat, res in vulgus nota est, quum elapso hoc medicandi tempore, mors sequatur certissima. Atque ex his omnibus clarissime in-

notescit, tempestive morbis esse succurrendum & occasionem medendi solite captandam, in qua, ut ait Hippocrates lib. de præcept. §. 1. non multum temporis. Quare vehementer certe optandum foret, ut & Medici opportunitatem temporis in morbis sanandis curatius observarent & aucuparentur, & ipsi quoque ægrotautes mature medicam opem implorarent, eo quod in tempore curare & morbo occurrere, palmarium in sanationis negotio momentum est, & iusta temporis observatio, merito curandi & methodi medendi anima dicenda.

§. IX.

Lex III

Accedit tertia lex: *evacuaciones nunquam in morbis molienda, nisi materia excretionis apta & via patula fuerint.* Summa hujus præcepti sect. 2. aph. 9. Hippocratis continetur, sic perhibentis: *corpora quicunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet.* Nam ipsa sana ratio suggerit, frustra materiem commotionem & expulsiorem tentari, nisi ipsa ad motum ac emotionem disposita sit reddita. Primo itaque omnis scopus, omnis intentio medentium in sanandis perlongis morbis eo utique tendere debet, ut humores crassi fluxiles & mobiles efficiantur, durities molliatur, viæ adstrictæ relaxentur, & postea validiori facto sanguinis impulsu & strictura solidarum intensa, impacti humores excutiantur atque obilustiones referentur. Ex quo jam elucescit, quam incomparabilis sint usus ad hunc finem consequendum thermæ, acidulæ & aliæ aquæ salubres, infusa, decocta, foci, balnea & omnia, quæ emolliente & diluente virtute prædita sunt. Pater quoque exinde quod ante præparationem & mobilitatem materię, nunquam validiora purgantia, emetica, diuretica, sudorifera, mercurialia ad salivæ fluxum eliciendum, locum inveniant. Communis fere, sed pessimus hinc error est, quando deficiente mensium vel

vel hæmorrhoidum, aut subsistente lochiorum fluxu, pellentia fortiora, sic dicta emmenagoga, ut sunt myrrhata, succinata, crocata & alia adhuc calidiora, in usum præmature vocantur: siquidem hæc sine præmissa venæsectione, sine primarum viarum expurgatione, sine prævia vasculorum uteri apertione & dilatatione, sine antea adhibitis medicamentis fluiditatem sanguini conciliantibus, potius noxam afferunt & malum augment, tantum abest, ut juveni sint exoptato. Observationes enim docent, ab eorum intempestivo usu febres, capitis dolores, vertigines, anxietates, hæmorrhagias per incongrua loca, deliria, melancholiam, & mille alia symptomata, fuisse exorta. Præstat itaque potius prius plethoram demere, alvum laxantibus lubricare, sanguini fluiditatem decoctis & insulis appropriatis conciliare vasorumque obstructions balneis, vel aliis convenientibus remediis amovere, & tunc pellentia cum cura subungere, & sic demum exoptatus consequetur effectus. Hæc lex medendi & regula in sanandis morbis chronicis, præsertim scorbuto, lue venerea, hydropse, quartana, melancholia hypochondriaca, calculo, asthma, amplissimi non solum est usus, sed etiam in acutis egregia & curate observanda. Nam in his pariter extracrisin & ante materiæ maturationem, vel ut Veteres loqui amant, coctionem, in vigore paroxysmi, nunquam evacuantia cum fructu exhibentur. Hinc probe monet Hippocrates Sect. 1. aph. 22. *quæ matura coactaque sunt, medicamento purgante educere oportet ac movere, non cruda*. Natura ipsa huic methodo insitit, quippe quæ in omnibus tere febrilibus commotionibus, primos dies materiæ hostilis attemperationi & resolutioni statum in inflammationis & aliis acutis febribus, impendit, quam felicissime exsequitur motu & appulsu auctiori sanguinis ad loca affecta, quo non modo sensim

ac sensim sanguis & viscidil humores: impacti solvuntur, sed & discutuntur. In aliis quoque morbis, motum intestino, quam progressivo intensiori, crassi viscidil humores attenuantur, dissolvuntur fluidique redduntur, salsi quoque & acres cum oleosis, viscidis & terreis implcantur & contemperantur, acinimis fluxiles & tenues inspissantur, quem proinde naturæ ductum merito artifex sequi debet.

§. X.

Quarto inter præstantissimas medicinas leges hæc omnino connumeranda: *Evacuationes per loca humorum excrecendo convenientia fiant*. Aureum enim hoc præceptum dudum Hippocrates Sect. 1. aph. 21. his inculcavit verbis: *quæ ducere oportet, quæ maxime repunt, eo ducere oportet per convenientes locos*; idque merito a medentibus maxima cura atque diligentia observandum. Etenim si Medicus humorum, qui in vitio sunt, excretionis stimulo quodam promovere debet, probe omnino disquirendum, cujus conditionis ac indolis sit materia hostilis evacuanda, & quo in loco & parte etiam corporis sit constituta, ut brevissima via commode educi possit. Sunt quippe diversi generis excrementa, ideoque iis eliminandis non quælibet accommodata sunt emunctoria, sed quodvis excrementum, peculiare & proprium quasi habet excreciculum. Hinc si in ventriculo & prima regione stabulatur & fixam sedem habet vitiosorum corruptorum biliosorum humorum sentina, quæ anxietates, ructus, tensiones & dolores gravativos parit, ciborum appetentiam prostermit, somnum placidum impedit, phlogosin excitat, vel etiam febres minatur; tum utique emetica, deplendo hac saburra ventriculum, utilissimam præstabunt operam, & hac ratione magnus & periculosus morbus præscindi poterit. Si in principio morborum intestina infarcta, vel ex male assumtis & male concoctis edulsi, mul-

multas recondunt cruditates, facile patet, ea, quæ clementer intestinalem regionem expurgant, omnium opportunissima esse. In hypochondriacis prima regio, ac postimum duodenum, ingenti cruditate acidobilioforum colluvie subinde refertum est, quam si quis diureticis, vel sudoriferis præporiter vellet eliminare, nax is non leve damnum allaturus esset. Nam ejus generis humores temperantibus obtundendi & per ventrem evacuandi, unde etiam ex thermis & acidulis aliisque medicatis aquis, quæ alvinas sordes liberaliter emovent, convenientissima in hoc malo sunt præsidia. Graviori iracundie affectu motus canalium bilioforum peristalticus actus ingentem bilis sæpe corruptæ & acris copiam in tenuia intestina effundit, quæ parit anxietates, nauseam, ciborum fastidium, compressiones circa præcordia, interdum etiam cardialgias & inflammationes subortas notavi, & ut quisque etiam videre potest affectionem cholericam; quibus gravissimis pathematibus si fortiori emetico vel sudorifero quis vellet succurrere, is certe peritulentem errorem committeret, de quo complures lugubres eventus propter inflammationes subortas notavi, & ut quisque sibi caveat, serio hortatus sum in *dissertatione de medicina emetica & purgante post iram veneno*. Nam quia congruum humoris biliosi excretorius est venter, longe tutius & consultius bilis ab ira commota per rhabarbarina, cum nitro & pulvere præcipitante nupta, vel per alia mitiora laxantia, educitur. Quin sunt inter exempla quidam, qui ex gravi ira male habentes in balneum le demiserunt & fortiter sudarunt, hoc eventu, ut lentæ febres, artuum tremores, arthritides, immo hypochondriorum spasmi & contracturæ, sequutæ fuerint. Nihil quoque magis noxium vel intempellivum est, quam alvo per quinque, vel sex dies clausa, sudorifera, vel alia calida

spirituosa, offerre, aut emetico n præbere; nihil inconconsultius, ac seum in habitu corporis hydropici obhærescens per sudorem velle educere, quum potius per urinarias vias & alvinam regionem, ejus eductionem moliri e re sit. Pessime pariter ægotantium saluti prospiciunt qui circa illud tempus, quo variolæ, morbilli, purpura & alia exanthemata, vel inflammationes erysipelaceæ prodire debent, purgantibus, vel emeticis eos exagitant, sicque materiam illam acrem ad interiora nobiliora loca alliciunt, gravius damnum certo allaturam. Ubiqumque vero unius ejusdemque indolis humor per diversa emunctoria excludi potest, tunc certe non alienum est, excretionem in aliis etiam quam ipsi proprie dicatis excretoriis movere, quo divertatur affluxus humoris, qui partem diu infestavit. Ita in tussi valde humida, qua mucosa in maxima copia & immoderatus secreta ejiciuntur, opportune purgantia offeruntur, quia mucum ex pectore in glandulas mucosas crassiorum pertrahunt. Quod etiam valet in fluore albo & gonorrhæa, ubi sæpius ingens viscidorum humorum copia ad has partes affectas affluens excernitur, & purgantia eam obcausam, ut divertatur nempe humorum nimius appulsus, optime præscribuntur. Manet itaque firmum ac stabile, naturam semper in opere evacuatorio, si deficit, ut humores evacuandi commodè per congrua emunctoria duci ac ferri possunt, adjuvandum esse.

§. XI.

Non minus universalis ac utilissima est quinta hæc lex: *nunquam vi morborum cutationes aggredienda, vel evacuationis molienda, sed paullatim & successive agendum & tempus expectandum*. Sane si ullus ex aphorismis Hippocratis memoratu dignus & in artis exercitio memori mente tenendus, certe est Sect. 2. 51. sic præcipiens: *plurimum & repente evacuare aut replere, vel refrigerare, aut*

omni-

Lex V.

omnino quomodocunque corpus movere periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod vero paulatim fit, tutum est, tum alias, tum si ex altero in alterum transitus fit. Sicut enim omnes in rerum natura operationes per gradus, non per saltus, paulatim & successive, non vero cum impetu & violentia quadam, perficiuntur; ita eadem quoque via in sanandis morbis, in castigando & expellendo noxio humore, in obstructionibus referendis, procedit natura & temporis beneficio utitur. Quapropter etiam Medicus suo satagens officio naturam imitari & nunquam violenter agere, multo minus impetuose evacuationes urgere debet. Nam certa & diuturna experientia compertum habemus, non majus periculum esse errore & temeritate Medici ægrotantibus accedere, ac ab emeticis purgantibus validioribus, neque minus ab iis remediis, quæ vi sudorem pellunt, aut urinam & salivam movent & corpus fortiter calefaciunt. Neque etiam cum subita & ingens mutatio, quam corpus a validissimis & magna dosi exhibitis remediis patitur, utilis, sed potius valde noxia esse potest, quia omnes vehementes motus in eorum numero, qui naturæ insensibilis sunt, qui præternaturales, morbofi & corpori vim inferunt. Hinc quando emeticum porrigendum, consultius est parciore, quam liberaliori manu propinare illud, eo quod ubi humores ad ejectionem aoterica ininclinant, operatio erit sufficiens, & si non fuerit, iterato, vel auctiori dosi, pharmacum offerre præstat, ac uno impetu exturbare. Ubi per inferiora subducendi sunt humores peccantes, longe magis e re est, id clementioribus & repetito, quam simul & semel validioribus perficere: eumque in finem apprimè ex usu sunt pilulæ secundum Becheri exemplum confectæ, quæ aloem probeticuratum & extractum hellebori cum temperatis balsamicis gummatibus & extractis

amaris, habent, ita ut una dosi vix tria purgantium grana capiat, eaque propter tonum ventriculi & intestinorum, quem purgantia labefaciunt, firmant potius & conservant, aliquoties tamen datæ, alvum saluberrime vacuant. Idem faciunt infusa ex radicibus & corticibus antiscorbuticis, aromaticis, atque ex rhabbarbaro & agarico, addito stimulo salino tartarico, per extractionem cum vino confecta, & tam ad præcavendos morbos vere & autumnio, quam ad sanandos rebelles chronici affectus, egregii sunt usus. Quod si porro per corticem corporis halituosæ sordes excludendæ, nunquam in usum trahenda ea, quæ sudorem universam sanguinis & humorum massam commovendo fortiter pellunt; sed potius infusa & decocta diapnoica, vel etiam pulveres fixioris naturæ, nec non temperata balnea, quæ omne punctum in sanatione etiam rebellium morborum chronicorum, præter acutas passionis ferunt. In hæc venerea affectis, si salivæ fluxus proritandus est, nunquam impetu & larga mercurialium oblatione id efficere oportet, præsertim in iis, quibus genus nervosum debile & humores impuri ac intemperati, nisi feralia symptomata vel incompossibile salivæ stillicidium ciere velimus. Pariter in efferatis motibus componendis doloribusque sedandis, proficuum magis est semper anodyna refracta, quam plena & magna dosi adhibere, & litiensibus amico temperamento quædam stimulantia adjungere, quo nomine theriaca cœlestis, massa pilularum Starckii, Wildegansii, vel tinctura antimonii tartarificata, aut acris cum pauçillo extracti opii remixta, commendari mereantur. Quando denique roborandum, & partes nervæ, ne consuetos spasticos motus repetant, firmandæ, quod firmiter maxime in reprimendis paroxysmis intermittentiis, & quidem familiarissime per famigeratissimum illum chinæ corticem & alia roborantia;

tutius

tutius semper est, causa febrili prius subacta & evacuatâ illud efficere, in accisa & repetita, quam magna & continua dosi, & antequam causâ prospectum fuerit; eo quod hoc neglecto, experientia teste, phthisis, hydrops, althmata, hœtica & pathemata spasmodico-hypochondriaca conciliantur. Quapropter omnes qui artis operibus manum admoveere gēliunt, cum cura admonendi sunt, ut quantum fieri potest, ab omni validiori medicina, multo magis plena manu oblata, abstineant, sed potius temporis beneficio utentes, nunquam nimis festinent, & sic demum tuto, sine noxa & periculo, sua conficiant.

§. XII.

Lex I. Convenit interdum motus effrenus morbosos compescere, relicta a d tempus eorum causa. Sexta hæc lex est, amplissimi in praxi recte instituenda usus. Quenadmodum enim ii motus in morbis, qui a centro ad circumferentiam abeunt, qui comitem habent pulsus citatiorem, cutem relaxant, spasmos cum causa morbi tollunt & sic in salutem machinæ labefactæ tendere solent, nunquam a prudenti medico sustendi, sed potius pro circumstantiarum ratione conservandi, vel tantum moderandi sunt: ita e contra illi, qui vergunt a circumferentia ad centrum, quales sunt maxime spasmodici, qui omnia turbant in corpore, & dum liberam dispensationem & motum humorum ac debitam secretionem & excretionem impediunt, interitum minantur, vel nisi ad causâ remotionem directi sunt, interdum provido consilio protinus compescendi sunt, licet causa materialis efficiens eorundem adhuc intacta relinquatur. Quod ut testatius pateat, exemplo sit acerbissimus ex calculo dolor. Nimirum dimoto ex renum conceptaculo ac in urethere ob majorem molem vel aspritudinem firmius coarctante calculo, nerveo-membranaceus hic canalisis ob vim illatam arctius constringitur, non so-

lum dolor suscitatur exquisitus, & inflammatio cum febre accenditur, sed etiam per consensum simul ventriculus & duodenum afficitur, & inverso motu peristaltico, vomitus proriat, quin toto tandem genere nervolo in consensum raptis, deliria, tremores, convulsiones & epileptiæ excitantur, quæ, ut vidimus, quandoque mors funesta excipit. Sub hoc igitur motuum exorbitantium & symptomatum choragio, si quis velit causam, calculum, viemoliri, nec prius vias laxare; is sane nihil aliud efficere, quam ut spasmodicas constrictiones augendo, lethalem morbi catastrophem induceret. Quin potius longe consultius causa morbi tantisper relinquitur & motus quavis arte complacantur, & his demum ad temperiem reductis viisque ampliatis, faciliiori negotio causâ amolitioni tentari poterit. Pari ratione in colica passione, primum esse decet, ut vehementia spasmodum deliniatur clysteribus oleosis & unguentis ex axungia humana, pinguedine taxi, castoreo, zibetho & hujus generis aliis, & interius quoque ejusdem virtutis medicamenta adhibeatur, ut sunt oleum amygdalarum dulcium, antispasmodica, inque primis liquor noster anodynus mineralis, qui dolores & spasmos effrenes sistit, vomitus compescit, sine stupore tamen & sine omni noxa; hoc autem facto, facile ac tuto causâ materiali, siue illa hæreat intra canalem intestinorum, siue intra membranas ejus, appropriatis remediis poterit succurri eademque expelli. In hæmorrhagiis quoque nimis, quarum eruptio semper a spasms, sanguinem ad certam quandam partem adigentibus & vasa venosa eo excurrentia distendentibus, proficiscitur, vel potentissimis Ripticis, constringentibus sanguinemque cohibentibus fluxus non cohibetur, delinitis autem spasms, vel sponte cessabit, vel facillima ratione coerceri poterit. Tacemus plurimos alios spas-

spasmodicos, convulsivos & cum magna dolorum atrocia junctos affectus, in quibus semper expedit paroxysmos sedantibus prius invigilare, quam causis abolitionem urgere. Cavendum tamen quam maxime est, ne in ejusmodi morbis, ubi motus nimii pernicipem minantur, ad eos sistendos opiata vel adhuc fortiora sedativa & narcotica adhibeantur. Teillantur enim observationes Practicorum celeberrimorum, hoc perperam facto, spasmodicam colicam sæpius in paralyfin, aut etiam veram paralyfin, transiisse, aut calculi uretheri remisso nemo eo diutius inhaesisse, ac in universum, lethales inde subsequutos esse effectus, quales annoravit & exemplis confirmavit *Stahlius in dissertatione de impostura opii*.

Lin VII

§. XIII.

Excipit septima lex vigente paroxysmo: *Quando nata jam habet, ut fortioribus commoventibus & evacuantibus desistendum, ac potius excedentes motus moderantibus & ad temperiem redeuntibus, utendum.* Ipsi *Hippocrates* quom observasset, quantam noxam afferat, si quis in illis morbis, ubi sanguis cum impetu circumagitur & morbi vehementia est maxima, fortiora medicamenta, quæ majorem sanguinis cient orgasmum, propinare, aut purgantia exhibere audeat, sapienter *sect. 2. aph. 19.* præcepit: *vigentibus morbis, quiescere multo præstat: ac potillimum valentiora ejusmodi pharmaca tempore paroxysmi febrilis non præscribenda esse ferio in lib. de purgantibus suasit: quicumque inueniens, a febris fortioribus corripuntur, his medicamenta purgantia dare non oportet, donec remiseris.* Etenim quando vehementes motus vel spasmi intensiores prælo sunt, ut plurimum exteriores corporis partes cum summa acute contractæ sunt, & sanguis circumferentia ad centrum urgetur, alvus, renes, poruli cutis & reliqua epunctoria, propter nimiam constrictionem, non rite

munere suo funguntur & excretiones subsistunt; eaque propter nihil certe imprudentius poterit excogitari, quam tum motus ciere vel augere, & præsertim purgante, vel vomitorio, aut sudorifero valido, humores naturæ corporis nostri inimicos exterminare niti eoque symptomatum vehementiam magis exacerbare. Quiescendum potius tunc temporis est, vel parum agendum, & magis effrenes motus moderandi, ac cum violentis spasmis blande componendi. Hanc ob causam rectius procedunt ii, qui in morbi paroxysmorum vigore atque impetu, si quid arte tentandum, tantum diluentia, blandam diaphoresin conciliantia & moderate nitrosa ac sedativa naturæ amica exhibent. Ubi vero movendum, ac commodatissimum tempus est in acutis principium, vel quando vehementia remittit, in chronicis extra paroxysmum & quiescentibus spasmodicis motibus, quo etiam evacuantia congrua operationem suam bene exlequuntur. Egregium hanc in rem *Galii Aureliani lib. 2. cap. 8. pag. 217.* est monitum, dum ait: *nec phlebotomia, nec alius medicamentis, quæ cito & copiose peccantes humores detrahunt, unquam utendum in augmento passionis, sed potius tempore dimissionis.* Unde, pergit, in accessione simpliciter mitigantibus utimur adjuvantiis. Sed dolendum profecto, toties totiesque contra hanc impingi legem. Nam communis tam vulgi, quam Medicorum non incelebrium, olim fuit & adhuc est opinio, variorum, morbillorum, purpuræ atque pellis morbum, expellentibus & alexipharmacis fortioribus esse excipiendum, quo illud quod vitæ est inimicum, cito & sine mora per corporis peripheriam profcribatur, unde tot in officinis prostant tincturæ bezoardicæ, spiritus volatiles, salia volatilia, essentia antipeithentiales ac pulveres varii generis sudoriferi & alexipharmaci, olea calidiora aliaque id ge-

P nus

Tom. III.

nus plura. At vero sic calor calore fovetur, ignis igni additur, ipse sanguis quasi accenditur, mixto ejus naturalis & temperata crasis dissolvitur & destruitur, ac in univerfum nihil aliud efficitur, quam ut anxietates, inquietudines, deliria, epilepsia & convulsionem concitentur, placida & successiva eruptio impediatur, ipsaque materia exanthematica deleteria plus augeatur, quam imminuatur. Longe tutiora certe in expellendis variolis, morbillis, purpura & omnibus morbis, in quibus aliquid per corporis corticem excerni debet, sunt illa medicamentorum genera, quae nimias & turbulentas commotiones cum stricturis superficialibus amicitabiliter placant, & impedimenta removendo, eruptionem blande adjuvant. Quod quidem, quemadmodum de fortioribus sudoriferis in propatulo est: ita eadem cautio de eorum quae per os vel alvum vacuant usu, studiose tenenda. Neque enim unquam convenit, emetica vel purgantia, quin salia, majori dosi tempore paroxysmi tertianae, vel quartanae, aut non multo ante ejus accessionem, propinare: quippe per experientiam cognitum est, insultum inde longe reddi acerbiorum maximasque cum cardialgia anxietates laborantes affligere. Ratio in proclivi est. Scilicet haec medicamina non alia ratione quam spasmo agunt, & partes nerveo-membranosas subtili sale acri caustico vellicando ac stimulando, ut validiori crebriusque repetita strictura & separetur & exturbetur, quod in vitio est, efficiunt; in omni autem febre ejusque paroxysmis, jam tum teste nausea, dorsi dolore, pandiculatione, conatu vomendi, flatibus in abdomine, anxietate praecordiorum, horripilatione, cutis refrigeratione, alvique adstrictione, ad sunt spasmi & formalem ejus rationem abolunt, ideoque dum sic spasmus spasmo accedit, & stricturae intenduntur, non possunt non pathemata exacerbari &

paroxysmus longe gravior reddi. Ubi vero impetus recedit, nervosum genus irrequillum & partes spasma prius exagitatae languent ductusque patuli sunt, tutissime ac utilissime fomes & vitiosa materia artis ope laxantibus, purgantibus vel emeticis & latibulis evocatur atque proscibitur. Quae certe prudens temporis opportuni expectatio, tum in morbis, tum in omnibus moliminibus, tam necessaria est, ut sine ea frustraneus sit omnis conatus, de quo seite cecinit Ovidius:

*Dum furor in cursu est, currens
cede furori,*

*Difficiles aditus impetus omnis
habet:*

*Aggrediar melius tunc, cum sua
vulnera tangi.*

*Jam finet & veris vocibus aptus
erit.*

§. XIV.

Octava lex sit: ubi motus jam languent, anodyna & sedantia summa cum cura sunt evasanda, ac potius vires respicientia motusque excitantia usurpanda. Quemadmodum si non potior, certe haud postrema, dexterratis atque peritiis medicae pars in eo versatur, ut artifex exorbitantes motus opportune complacare nescat: ita profecto praeposterum ac damnosum est molimen, quando opprimuntur ac sopiuntur, ubi potius provocandi sunt & excitandi. Etenim anodyna & sopientia pharmaca & ex his frequentissimi usus opia, ex heroico-rum numero sunt, quae magna polent efficacia, & tam ad juvandum, quam nocendum parata, ideoque cautiissima, ac ut Celsus lib. 5. cap. 25. monet, non nisi nimia necessitas urgeat, usurpanda. Pessimus quidem quorundam mos fert, ut in quovis dolore aut somni defectu, imprudenti consilio, sine circumstantiarum perita pensatione, ad anodyna ceteram anchoram confugiant, & doloris mitigationem cum quiete procurare nitantur, quum tamen sapienter praecipiat idem Celsus lib. 3. cap. 18. quod

Lea
VII.

quod hæc moderatio semper sit adhibenda; nequem obdormire volumus, postea excitare non possumus. Semper igitur ante sedationem virtutis remedium usum, exquilita virium ratio habenda, eademque nunquam in usum vocanda, ubi varium, sive ob ætatis, sive aliam causam, adest imbecillitas, quæ ex impotentia membra movendi pulsus debili parvoque, item actionum animalium torpore atque segnitie, sufficienter cognoscitur. Hoc autem neglecto quam maxime detrimentosa sunt, senes ad affectus soporosos disponunt, plethoricis sanguinis excretiones supprimunt, quibusdam mentis abalienationem conciliant, in febribus autem malignis aliisque morbis, dum vires penitus prosternunt motusque ad expugnandum morbum necessarios. sopiunt, sphacelum ipsamque mortem inducunt. Et certe frequentissima est in observatis medicis mentio noxæ ex improvido sedantium & opiatorum usu, ut apud *Sanctorium de methodo vitandi errores lib. 7. c. 12. Villisium in pharmac. rationali P. 1. pag. 392. Sennertum Prax. lib. 6. cap. 1. pag. 7. & Forestum lib. 9. obs. 14.* qui narrat, cacochymicum, cui imperitus Medicus præscriperat in dolore calculi opium, somno sepultum esse perpetuo. Ipse quoque novi, quandam febre ardente laborantem, ad sopientiam diurnam vigiliam, aliquot granis laudani sumtis, æternam sibi committisse quietem. Quin non desunt exempla, ubi opium in forma suppositorii immixtum mortem induxit, cuius generis plura scripto reliquerunt *Tilingius lib. de opio pag. 46. Sennertus l. c. Marcellus Donatus hist. mirabil. lib. 4. cap. 18.* Et licet aliquando dolorem primum quodammodo mitigare videantur, ejusmodi sopientia attamen insidus est effectus & non ita multo post ætiora ingruunt pathemata, morbus pertinacior fit ac pejor, ipsaque mors haud raro succedit. Concepit id de colico dolore testatur ver-

bis *Trallianus lib. 10. cap. 1.* sic perhibens: *qui ex opio & alterco parantur; in colica non temere admoveere oportet. Esca enim doloris levationem asserere videantur, tamen efficiunt, ut postea dolor diutius permaneat, putoque bona ratione ipsa non conferre.* Et paucis interjectis sic pergit: *multi igitur, quum in ejusmodi affectibus iterum atque tertio dedissent, effecerunt, ut partes læsæ emorerentur resolverenturque, interdum vero etiam mortem omnino induxerunt.* Præstat igitur potius antispasmodicis, balsamicis, corroborantibus, analepticis, itemque bezoardicis paullo fixioribus & accuratiori insuper dictæ ratione languenti naturæ succurrere, ac motus conservare atque erigere, sique vel maxime, ob urgentes atroces dolores, ad complacationem aliquid videtur molendum, non opiatum & vehementioribus sedativis, sed blandissimis anodynis, cum balsamicis naturæ amicis nuptis, utendum, quæ virtute non possum non commendare liquorem meum anodynum sic dictum mineralem, qui vires non prosterit, sed custodit, ac tutissime sine metu omnis noxæ potest usurpari; cui interdum refracta dosi ballamum vitæ, vel spiritus bezoardicus ad mentem Bussi paratus adjungi poterit.

§. XV.

Ad nonam jam progredimur legem; *excreciones criticas & saluares promovere, non interscipere, decet.* Criticæ a Veteribus dicitur illæ evacuationes, quæ in acutis morbis, cujus generis maxime sunt febres, sponte a natura, sine ulla etiam arte, certis diebus, ut sunt medius inter tertium & quartum, septimus, nonus, undecimus, plerumque cum bonis ægri rebus eveniunt. Itæ enim, ut antecedenti capite docuimus, a sapientissimo opifice coagmentata est corporis humani machina, ut inordinati in ea motus, qui a causa morifica excitantur, sæpiissime in medicinam cedant, ac per eisdem ipsa morbi

caussa summe pernicialis corrigatur & correcta e corpore expellatur. Et quum hæc materiæ correctio certum & determinatum temporis spatium requirat, antequam commodè ex corpore eliminari possit, atque huic negotio divina sapientia septenarium maxime numerum dicaverit, ex eo fit, ut evacuationes, quæ circa septenos, vel semisepenos dies succedunt, in salutem corporis maxime vergant & naturam ordinatè sua perficere indicent. Duplici vero modò excretiones illæ salutares sunt. Vel enim ipsam causam, quæ functiones corporis turbavit, secernunt atque evacuant, ut fit in variolis, in morbillis, in febre erysipelacea, pestilente, quibus in morbis, ubi ad summam cutim, vel glandulas, nocens materia propulsa fuit, mox sævissima illa symptomata mitiora fiunt, aut plane conquiescunt. Vel criticæ evacuationes hoc nomine salutis sunt, quia effectum morbi pernicipalem a corpore separant, atque remonent, siquidem sub ipso morbo & motu concitatori febrili, sanguinis & humorum massa in multas excrementitias salsas, sulphureas sordes dissolvitur, quæ, dum morbus in vigore & impetu est, non commodè secedunt & expelluntur, simulac vero causa morifica est sublata, ac v. g. in inflammationibus stases sanguinis diffuse, spasticæ constrictiones corpus deserunt, tubuli excretorii relaxantur & omne alienum atque excrementitium, quod sub ipso morbofo motu generatum fuit, utilissime propellitur, ut sudor largiter profluat, alvus sua sponte descendat & copiosa excrementa mucida biliosa dimittat, urina quoque crassior secedat, atque copiosum deponat sedimentum, vel etiam humor crassus viscidus, in pectoris præsertim morbis, maxime acutis, uberius collectus per expectorationem educatur. Jam quisque facile perspiciet, nihil perniciosius esse, quam salutiferas has excretiones temere sistere, ac in-

tercipere. Sane quam gravia, immo sæpius funesta, mala, non modo a variolis, morbillis, purpura, crusta lactea, scabie, erysipelate, podagra, arthritide repulsis & ad interiora repercussis eveniant, plurimis observationibus atque experimentis in praxi medica quotidie innotescit. Perquam nota sunt etiam illa damna, quæ ex antiquis ulceribus sanatis, & diu gestatis fonticulis, præposcere consolidatis, pullulant. Pessime non minus ægotantium salutis consulunt, qui alvi fluxus in febris continuis, immo malignis, quibus sæpe salutariter morbus terminatur, noxios censent, eisdemque eapropter imprudenter cohibere ac sistere audent. Pariter exitiale molimen est, hæmorrhagias, quæ sæpe febris continuis superveniunt, sive in criticis diebus, sive extra eos obveniunt, vi quadam compescere, ex quo certe nunquam non capitale notavi damnum: quæ tamen omnia jam tunc *Sect. I. cap. 8. de damnis ex cohibita cuticulari & cap. 9. sanguineis. aliisque evacuationibus, nec non cap. 14. de crisi in experientia rationali sumptis* solus exposui. Interim si forsitan excretiones etiam salutares nimis & excedentes fuerint, ut vires ipsæ gravius pessundetur, non tam directe sedativa & sistencia adhibere e re est, quam potius ea, quæ appulsus humorum ad alias partes divertunt, & motuum impetus blande demulcent, atque placant.

§. XVI.

Decima lege præcipiendum, ut *Len. X.* morbo, vel paroxysmo finito, attifex roborantibus utatur, quo recediva vel novus morbus arceatur. Qui saniores a medendi rationem sequuntur, eos non latet, paroxysmos morborum, præsertim spasmodicorum vehementiores, sublequi magnam atoniam, ac debilitatem corporis, & illius inprimis partis, in qua causa morbi inherens vehementiam suam exercuit, quæ relicta debilitas, non modo facili-

liniè

time paroxysmos priores impetu longe fortiori revocat, sed & ob sanguinis circulum ibidem factum impeditiorem & vigorem deperditam, humores noxii eo decumbere consueſcunt, ibique ſtagnationem ſubeunt, chroniciſ diuturnis & maxime lentis morbis ampliffimam ſubminiſtrant occaſionem. Perire idem inculcavit artis noſtræ parens Hippocrat. aph. 32. ſect. 4. hunc in modum diſſerens: *quibus a morbo reſtitutis quippiam eſt infirmum, ibi abſceſſus ſunt.* Quem aphoriſmum Hærninius ita exponit: *quando poſt morbum infirmitatis aliquid ſuper-eſt, quæ ex laſtitudine & imperfecta criſi judicatur, ita ut ſuperſint materia febrilis reliquæ, aut ſi liberalius ſe potu aut cibo invient, quam immutata ventriculi actio, & temperamentum & habitus perſerre poſſunt, tunc in diſcrimen venit homo, quia partes internæ & externa læſaſcitata ſunt; hinc ſi non accurata diæta acceſſerit, hepatis & lienis ſcirrhi, vel cephalææ, vel ſoras in æntur, ſi ibi imbecillitas, abſceſſus eſſunduntur. Quare ne quid coarſceverit, dentur pilulæ aleophaſgina, maſtichina vel Ruſi, vel tale quid. Huc quoque referendus, aph. 12. ſect. 2. morborum reliquæ, quæ a criſi ſuperſunt, recidivos morbos parere conſueverunt, quod potiſſimum, ſicut ruruſ id optime explicat Hærninius, contingit, quando ob infirmitatem naturæ vim, materia morbiſica non tota fuerit excluſa, neque in declinatione alvus purgata ſollicitata. Quæ quum ita ſint & experientia quoque teſtimonio uberius conſiſtent, utique maniſeſto apparet, nihil eſſe finito motu morboſo ad reliquias mali extirpandas accommodatus, quam ut omne noxium & morbiſicum, quod adhuc hæret in corpore, tacitaſque ipſi ſtruit inſidias, hve in ventriculo, hve in venis ſubſtitern, mature excludatur & corpus ab omni excrementitio ſucco liberetur. Graviter vero in hoc errare ut plurimum ſolent Medici, quod in fine morbi & ægris ad ſanitatem redeuntibus, morbiſeras*

Tom. III.

reliquias neque evacuantibus, neque diaphoreticis eliminant, neque robur deperditum naturæ atque ventriculi per congruam diætam & probata ſtomachica apte reſtituant. Etenim quominus Medicus utilem opem conferre poteſt morbo in vigore conſtituto, eo majus eoque præſtantius in principio atque in declinatione ipſius eſt auxilium, ſiquidem initio, natura adhuc valida exiſtente, multum proderit, ſi omnia congruis ſublidiis obſtacula, quæ motus ſalutares ſuſſilaminant, dextre removeat & materiam vitiſam diminuat; in declinatione vero, ſi corpus debilitatum, ruruſ confirmet, vires languidas erigat, & quod reſtat adhuc noxium, expellat, & ſic non modo recidivas peiores, ſed & novos longe periculioſiores morbos plerumque ſuccedentes ſeliſſime avertat. Ad ſubigendas igitur morborum reliquias & reparandum univerſi corporis robur, egregia virtute ſplendent pilulæ baſſamicæ ut Becherianæ & ad harum exemplar paratæ Stahlianæ, vel noſtræ; quippe quæ aliquoties oblata, noxia clementer expurgant, ac ventriculo cum inteſtiniſ robur iterum conciliant, præter quas commendanda etiam ſtomachica, quæ digeſtionem promovent, motum perſiſtenticum infirmum egregie ſuſcitant & ſuccis vitalibz tenuitatem ac ſpiritualeſcentiam denuo conciliant, quæ tamen tauto utiliora ſunt, quanto minori, continuata tamen ſæpiuſque repetita doſi, aſſumuntur. Quod ſi autem ullo in morbo, certe in variolis & morbillis, reliquæ morborum ut proſcribantur, corpus firmetur & ab inſultibus morboſis defendatur, necesse eſt, quandoquidem hoc neglecto, ex facili varias exulcerationes, abſceſſus quoque viſcerum, aliæque graviffima mala ſubſequi, experientia planum facit teſtaturque. Deinde poſt partum, immo abortum, vel puerperium etiam, uterus valde enervatus & a tono ſuo dejectus ad priſtinum robur commoda medicina redu-

P 3

cen.

cedendus est, ne magnæ contumaces ac diuturnæ inde resurgent affectiones, cui scopo eximie pilulæ nostræ balsamica, vel insula laxantia leniterque purgantia, cum nervinis & uterinis mixta, unacum exquisito in vitæ vitæque ratione temperamento, satisfaciunt. Mirum quoque tonum ventriculi & intestinorum labefactare solent diarrhææ ac dysenterix, qui si non cito reparatur, lentæ inde febres, pedum œdemata, status cachecticus, ipsi hypochondriaci aliaque redundare possunt, ad quæ arcenda egregie usui, præter exactam dietam, est vinum generosum, uti Hungaricum, vel Gallicum Pontak, parcius inter cibandum potum, nec non elixir stomachicum, vel balsamum sic dictum vitæ, accisa dosi, sed diutius, usurpatum. Semper autem præstat hæc successively perficere, ac vires potissimum fractas atque depressas sensim analeptis reficere ac resocillare.

§. XVII.

LEM XI Eadem cura tenenda lex undecima: *debilibus debilia, valentibus valentiora conducunt.* Hanc totidem fere verbis consignavit Celsus lib. 2. c. 20. scribens: *Imbecillis hominibus rebus infirmis opus est, mediocriter firmos media materia optime sustinet, & robustis apta validissima est.* Et Hippocrates l. de loc. in hom. §. 55. eandem sic conceptis verbis inculcat: *medicamenta fortiora a natura in debilibus morbis dare non oportet: ac paulo post, medicamentum singulis secundum naturam, debilibus debilia a natura, fortibus vero, fortis natura pharmaca exhibenda sunt.* Ut autem hic practicus canoa eo clarius pateat, exponendum quid per debilia & valentia, tam corpora, quam pharmaca, sit intelligendum. Debilitas igitur ejusque oppositum firmitas & fortitudo, dicitur in genere a viribus, quæ valore effectus, id est potentia movendi, ut in microcosmo, sic etiam microcosmo, sese produnt. In homine quidem vires secundum functiones, in

quibus sese exerunt, optime in animales, naturales & vitales dispesci possunt, singulæ vero influxu subtilissimi, purissimi & mobilissimi, quod cum sanguine mixtum & in cerebro segregatum per nervos vehitur, tanquam causa & fundamento nituntur, & continentur. Quod summe activitatis liquidum, quum ex purioris aeris & alimentorum substantia ortum trahat; facile patet, quod qui bene appetunt, digerunt & egerunt, robustioris sint naturæ; contra ea quibus appetentia prostrata, ingestio, digestio atque egestio vacillat, debiles & languidi; eo quod in illis humores puri & temperati, in his vero impuri & intemperati redundant. Infirmi vero etiam dicendi, qui sensibilibus animi & corporis, & quorum nervosæ partes levi etiam ex causa ad suscipiendas anomalas motiones promptæ sunt atque dispositæ: valentes vicissim, qui animi compositi, nec tam facile a rerum externarum insultu afficiuntur aut leduntur. Atque adeo in procinctu est ratio, quare infantes, ætate graves, vel valde decrepiti, qui spongiosum fibrarum habitum obtinent, vasa, nervos ac tendines exiliores gerunt, vigiliis, animi affectibus, mentisque fatigationibus nimium indulgent, morbo graviori acuto, vel chronico laborant, aut nimium sanguinis profuderunt, in debiliu numerum merito referantur, unacum iis, qui morbo, multoque magis ejus paroxysmo jam detinentur. Per fortiora autem medicamenta intelligenda ea, quæ parva dosi magnis agendi viribus instructa evacuandi & adstringendi, commovendi & sistendi, calefaciendi & refrigerandi, imprimis ex minerali regno petita: lenia contra ac debilia nuncupanda, Galenica vulgo dicta, quæ non vi, sed blande ac successive operationem suam exsequuntur, nec majori etiam dosi facile nocent, ut sunt clementia & per epicrasin laxantia, clysteres, insula theiformia, lac

lac asininum, serum lactis, temperantia, diaphoretica fixa, absorbentia, liquores fixi alcalini cum balsamicis & amaris extractis conditi, nec non plura arcana illa universali, panacea, essentiae quoque solares dulces, quae innocenter pariter in omnibus morbis, firmis aequae ac infirmis praebere possunt, nec quicquam comprehendunt, quod conspicuam in morbis inducere possit mutationem. Jam quum ad omnes salutares in corpore humano perficiendos effectus exquisita inter agentis & recipientis vires requiratur aequalitas atque proportio, & natura humana ab omni excessiva, ut ait *Hippocrates*, qualitate ledatur, clarissime innotebit, in omni medicamentorum oblatione corpora curate esse distinguenda eorumque vires cum pharmacorum facultate sollicite comparandas, & sic accommodatam medendirationem inveniendam. Qui fecus procedit, is certe graviter nocet, & debilibus fortia porrigens, vires ipsidem opprimit penitusque prosternit, vel plane cum vita extinguit, debilia autem fortibus offerens, frustraneam prorsus locat operam, aut commovendo, nec emovendo quod in vitio est, malum exacerbare. Potissimum tamen cavendum, ne infirmos unquam validioribus pharmacis aggrediamur, sed hi semper magis diuteticis, quam pharmaceuticis sunt tractandi, & nullum medicamentum ipsis saepe est optimum. Quinque inprimis debiliu numero accensendi sunt infantes ac senes: patet certe, quam temerarium & imprudens sit molimen, infantibus dimidii vel unius anni lactentibus, epilepsia ex dentitione difficili correptis, aciora purgantia, ut pulverem ex resinae jalappa grano uno aut duobus, & mercurii dulcis binis, vel tribus granis, crebrius propinare, iisdemque demortuis, tamen de securissima medicatione, eum summa alterius contradicentis injuria, gloriari. Pariter aetate proventus tam

fortia purgantia damno sunt gravissimo; quippe quae teste *aph. 36. sect. 2.* sana etiam corpora cito exsolvant; multo magis senilia & imbecillia labefaciunt & detrimentum faciunt. Neque etiam infantibus, senibus aliisque imbecillibus, spiritusosa calida, sic dicta confortantia, tam proficua & amica sunt, ut vulgo putatur, eo quod haec, ipsumque, ut audit, lac senum, vinum potens, largius haustum, intestinum calorem in succis accendunt eisdemque per hunc exhauriunt penitusque consumunt; moderate vero & medicum cum optimi succi cibis assumptum vinum, acidodesitutum & generosum ac purum ut Rhenanum vetustum, vel Hungaricum, stomachi vires totamque naturam egregie reficit atque custodit. Neque vero tantum validiora pharmaca, verum etiam alimenta valentis, ut *Celsus* dicit, materiae, invalidis minus accommodata sunt atque proficua, licet & Medicorum & aliorum vulgus erroneam hanc foveat sententiam, debiles & a morbo languidos, cibo, potu & iusculis confortantibus ac nutrientibus esse subinde reficiendos. Recte enim jubet *Hippocrates Sect. 1. aphor. 2. in ipsis exacerbationibus cibos adimere oportet: nam praebeere noxium, & cum per circuitus redeunt morbi, in ipsis accessionibus, abstinendum est*; eo quod corpora, ut impura, sic etiam imbecillia, monent eodem auctore, quo magis nutritis, eo magis laesentis, & vires in morbis non meliori ratione reparantur, quam prudenti medicatione & successiva caussarum morbosicarum remotione. Quamobrem memori utique mente nunquam non reponendum: inter vires corporis & medicamentorum, mensuram quoque alimentorum ipsamque laborem & motum, exquisitam semper servandam esse proportionem, eumque in finem, ut petite vult *Hippocrates lib. de morb. curate expeulendam hominis naturam, eor-*

poris staturam, ætatem, anni tempus & constitutionem, sicut regionis aliasque id genus plures circumstantias.

§. XVIII.

Ann. XII.

Ad duodecimam nunc pergimus legem: *per paucos selectis medicamentis, ad morbos & sanandos, & arcendos, utendum*. Sane nihil magis medentem perturbat atque confundit, quam ingens illa remediumum multitudo atque varietas, qua libri botanici, pharmaceutici, chymici & practici referti sunt, ut non sine fastidio perlustrari possint & parum absit, quin artem ipsam exhorreat diffusissimum hunc campum ingressus. Tam innumera enim sunt remediumum genera, tot compositiones, tot medicaminum vulgo adscriptæ virtutes, ut ne quidem memoria his omnibus capiendis sufficiat, tantum abest, ut quæ de singulorum usu & perita applicatione sciri perquam necessaria, animo teneri queant insita. Celebrandum quidem in eo merito summi conditoris est providum institutum, quo benigna parens natura affluenter ex inexhausto suo penu varia & multiplicia in sanorum æque ac ægrorum usum suppeditat præsidia, neutiquam tamen opus est, ut omnia in usum vocentur, sed natura, ut in alimentis, sic etiam iis, quæ in medicina cedunt, paucis contenta est. Paucæ quippe & simplicissimæ sunt morborum causæ, ideoque iis etiam removendis paucæ sufficiunt adminicula, & ex vero scribit *Langius epist. 76. ego dico, desipere eos Medicos, qui pluribus medicamentis aliquid expediunt, quod paucioribus transigi potest*. Quis potius ipse ego scio & experientia edoctus sum, nunquam Medicum, qui immenso isto pharmacorum, quæ in pharmacopoliis aservantur & plerumque sine ratione & fide mirificis encomiis celebrantur, apparatus, utitur, crebrius ea mutat & assatim ægris ingerit, ad veram, certam & intimam eorundem cogni-

tionem, pertinere, in quæ tamen præcipuum felicitis medendi rationis momentum est repositum. Hinc egregium profecto *Damaseni aph. 34.* est consilium: *pharmaca pauca tibi tenenda sunt, & quorum operationes ac potestates jam multoties expertus es*. Totius enim multitudinis notitia incomprehensibilis est, ac quum per singulas volueris inquirendo discurre, multiplici diversitate distentus, ne scies, cui debeas fidem adhibere. Artis igitur atque prudentiæ est, ex tam numerosa suppellectile pauca & certæ virtutis quædam deligere ac per longam atque attentam experientiam quid in tot diversis, ut offeruntur quotidie, casibus & circumstantiis præstare queant, quid minus, addiscere, ac tum demum perspectis penitus eorundem viribus ac operationibus, iidem uti ac in medicatione cum certa ratione inniti. Nam scite hanc rem scribit: *B. Vvedelius de med. facult. cogn. & applic. p. 25. res se habet hæc instar amicorum. Magis estimamus unum vel alterum amicum, quam centum notos. Multi etiam amicitiam offerunt, pauci merentur. Ita etiam curiosum, selectum & expertum medicamentum reliquis omnibus præferendum est. Qui omnes habet amicos, neutrum habet, qui omnia novit, neutrum novit. Qui vero artem speculando tantum agitant & experientia destituntur, hic certe fluctuant & hallucinantur, nec firmum, solidum & eventum comprobandum interponere possunt consilium, multo minus quædam usui insistendum, quando desistendum, quæ dosi offerendum & quæ alia sigillatim circumstantiis accommodanda, ex vero præcipere.*

§. XIX.

Ex præcipuis præterea medendi legibus est decima tertia: *Medicus in juvando natura curatrix opere plus utatur remediis dieteticis, lenioribus. Et simplicibus, quam pharmaceuticis activioribus & compositis*. Per dietetica ea intelligimus, quæ ex iis rebus, quibus ad vitæ & sanitatis tutelam nemo

Ann. XII.

non indiget & quæ recepta in scholis denominatione rebus non naturalibus accensentur. Nam quemadmodum ex harum perverso & inordinato usu prima fundamenta & proximæ morborum origines pullulant pariterque vehementia augescunt: ita ad morbosas varii generis afflictiones accendas & subigendas, legitimo illarum usu & exquisita victu & vivendiratione aptius & accommodatius est nihil, nec ipsa natura sine hac quicquam boni in sanando præstare, nec medicina optatum exiteret potest effectum. Unde vera sunt quæ Galenus tradit: *nulum esse ex remediis medicina habet, quod solidum auxilium afferre possit, si ei victus ratio resistat, vel illud non adjuvet*. Sane ipse ego sanctè asseverare possum, quod remediis diæteticiis, quo aeris & cœli mutatio, corporis conveniens motus, accommodatus cibus & potus, nec non feri lactis, vel aquarum mineralium prudens usus, item abstinencia & quies, referenda, in expugnandis rebellibus chronicis morbis, qui maxime in imbecilli nervosorum partium systemate longara & fixam sedem habuerunt, ut affectus spasmodici & convulsivi, hypochondriaci & hysterici, id præstiterim, quod frustra artificioso compositis & concentratis medicaminibus tentarât alii, & ipse a magnæ famæ medicamentis expectaram. Diætetica quippe remedia humoribus & motibus vitalibus affinia sunt, & blande, successive & cum tempore laudatissimam suam exerunt operationem, naturam imbecilem, & morbidam in meliorem statum reducendo. At vero quo major est horum simplicium in Medicina utilitas, eo pauciores ex Medicis eorum cognitioni, multo minus dextro usui, debitum constituunt premium ac utilissimam dant operam, sed plerique pensi habitis diæteticiis præceptis, nonnisi operose concinnatis e pharmaceutico fonte petitis subditiis morbos oppugnare contendunt, quo tamen plerumque nihil aliud efficiunt,

quam ut naturam in saluberrimo sanationis ordine, progressu, & tempore turbent, vel festinatione opprimant. Hinc citante Langio lib. 1. *epist.* 76. multiplices medicamentorum ex simplicibus numeralis confascinationes compositiones falsæ jam pridem irrisit Phlarchus in *sympos.* Dec. 4. Cui Plinius *H.N. lib.* 24. c. 1. his verbis perbelle suffragatur: *ex terra nascentibus nata Medicina, Hec sola natura placuerat esse remedia parata, vulgo inventu facilis ac sine impendio ex quibus vivimus. Postea fraudes hominum & ingeniorum capta officina: invenerunt istas, in quibus sua cuique venalis promittitur vita. Statim compositiones & mixtura inexplicabiles decantantur. Arabia æque India in medio astimantur utroque parvo medicina a rubro mari importatur, quum remedia vera pauperrima quisque evertet. Ita est profecto magnitudo populi Romani perdidit ritus vincendoque victi sumus, paremus exteris & una artium medicina imperatoribus quoque imperat. Longe prudentiores in eo se gesserunt vetustissimi Medicorum, ut peritissimi Cœus, Celsus & Methodici, qui, re pube perpensa, quicquid in arte præstiterunt, solius naturæ ordine & ductu & ignobilibus huius auxiliis ac diæte beneficio effecerunt. Nam pharmaceutice quidem collecta prisorum medicamenta, magna ex parte incondita sunt ac nullius fere pretii; contra vero in eorum monumentis longe meliora & utiliora in regimine diætetico rectè adhibendo in morbis & extra eos reperire quispiam poterit præcepta, quam in ullo fere recentiorum scripto. Laudandus tamen merito hoc in genere Montanus ejusque optimus discipulus Crato, e quorum scriptis & ego multum profeci; quamque ipsa experientia de præstantia magis confirmaret, utilissimam me collocaturum operam putavi, si neglectui datam hanc potissimam artis salutaris partem omnibus modis excolere atque splendori suo*

fuo reddere antiter, evulgatis hunc in finem quam plurimis latino idioma- te & Germanice redditis iterum ite- rumque reculis schediasticis; non sine luculento peritorum applausu. Accedit & hoc, quod in universi- reum natura nullum purum datur sim- plex; sed omnia, quæ ad medendum tria sic dicta regna suppeditant; ex variis & diversis subiectis jam cum mixta sint, nec etiam nomine artifi- ciali mixtione & compositione opus sit, præferenda tamen maxime ea simplicia sunt compositis, quæ non uni, sed duplici, immo sæpius tripli- ci, indicationi curandi satisfactione. Ita v. g. manna præter facultatem al- bum stimulantem; aliud adhuc, vi- delicet acidum, ponticos humores de- mulcentem & simul spasmo contul- tas fibras intestinales relaxantem, ob- tinet, unde in hypochondriaci & pe- ctoris affectibus, omnibus aliis pur- gantibus palmata præripit. Rhabar- barum præter vim stimulantem, co- stodit etiam principium subadstringen- tis & roborantis virtutis, unde tutis- simum in diarrheis ipsique dysente- riis est laxans. Cortex chinæ quo- niam non modo amaritiam, quæ aci- dum vitiosum in intermittentibus corrigitur & blandior spiritus acentia sanguini conciliatur, habet, sed & elementum genus nervosum valde im- becille & ad novam febris materiam progignendi pronum roborandi aptum obtinet, aliis inferioribus & composi- tis recte antepositur. Pulvis florum chamomillæ vulgaris propter oleum virtutem anodynam & antispasmodi- cam, ac propter amaritiam subtilem vim aperientem & corrigentem re- condit. Mentha custodit oleum sub- tile roborantis pariterque anodynæ virtutis, simul quoque elementum adstringens terræ fixioris naturæ, ideoque in vomitis non datur ea præ- stantius. Neque tamen omnem omni- no simplicium sic dictorum composi- tionem, multo minores cum ratione institutam miscelam, rejiciendam,

sed potius quandoque proficuum ad- modum, immo necessariam esse, ar- bitror. Sic nitrum est simplex, si ul- lum; certe hoc præstantissimum, quod calorem intestinum sedat; acrimo- niam biliosam temperat; alvum fixat & urinae fluxum promoveret, quod si vero intentio est Medici præter has virtutes aliam addere, nempe acidum in primis viis corrigendi, commodissi- me ipsi pulvis ex lapidibus cancrorum absorbens adijcitur. Pari ratione opi- um, ne nimium sistat excretionem, non inutiliter miscetur cum purganti- bus, ut aloë, in pilulis VVildegansii, cum extracto hellebori & oleo ther- biothine in pilulis ScaroKii, five Ag- ghicani, cum alexipharmacis in the- riaceis eccelsi. Neque etiam laude sua detrahenda chymica, & ex metallo- rum sensu deprimenda pharmaca, maxi- me ubi periculum in mora & efficaci- citer morbi causa & aggredienda & exterminanda; semper tam in lethio- ra, quæ secuta, naturæ amica, & non tam exquisitam exposcent cir- cumspeditionem, præferenda æbio- ribus, quin prudentia, ut seire mo- net Mesuë; granum est, ad valentia- ra nonquam descendere, si debiliora sufficiunt.

§. XX.

Addenda denique lex 14. a crebra mutatione medicamentorum abstinendum. O securis atque probatis remediis insilendum, licet non statim conspu- cium afferant levamen. Et hæc ex præcipuis, quam Veteres ipsa ex- pientia edocti sollicitè inculcarunt. Nos enim medicamentorum continuatione maximi secisse, præter alios aucto- r est Senec. ep. 2. egregie ex ipso- rum mente perhibens: nihil aque sanationis impedit, quam remedium crebra mutatio. Hinc etiam medicamen- ta annalia, quæ per integrum annum usurpabantur; Priscie dicta sunt, quorum meminit Cyprianus Aurelianus lib. de passion. chron. c. 2. his verbis: Veterum quidam in passionibus prohibitis annalia medicamenta præbuerunt, ut

Lex 14

et

est diacanthium & diascordium, bibenda anno continuo judicantes iis, qui longo tempore fuerant passione vitati. Et profecto, prostant incomparabilis adversus multos morbos virtutis praesidia, quae sine continuato & repetito usu, parum, vel nihil juvant. Luculentum exemplo sunt soteriae aquae, Inprimis Carolinae thermæ, quarum in debellandis chronicis & rebellibus morbis mirae certe efficacia, sed nonnisi per longum tempus, & larga copia assidem potis, expectanda aut impetranda. Digna est quæ hic interlatur observatio ex M.N.C. Dec. 2. Ann. 4. obs. 179. Reverendus Pater multis ventris torminibus & compressionibus floris vexatus, suavis quorundam ad thermas Carolinas se contulit, & bibere cepit thermales aquas tanta in copia, ut fidem superare videretur, bibebat nempe 64. diebus 26089. sextarias, sextarius autem unus erat duodecim unciarum. Et addit, si citius discessisset & humores commoti non expurgati fuissent, in pejorem corporis statum incidisset, & omnia medica adhibita incussum abissent. Ab eo autem tempore curatus egregie fuit, & sex quaterque in annos thermas istas invisit: sex septimanarum spatium ibi commoratus. Quo etiam ceteroquid Caelii Aureliani i. e. monitum: in arteriorum passione usus adhibendus aquarum, tum calidarum, tum frigidarum, ut sunt A-buleæ & Coelinae, sed affectanda repetitio. Pariter in lacte, inque primis alimino, quam maxime praestabiles adversus chronicas passiones, phthisin, atropiam, podagram, arthritidem & scorbutum reconduntur virtutes quidem; quas tamen non brevi & parco, sed diuturno demum & largo usu, exferit. Quam in rem instar omnium esse poterit Pechlini testimonium obs. 23. ita differentis: lac est summum remedium, sed continuato id efficit usu, quo nempe per iteratas circulationes salis arthritici aculei ubi abundantur, & separato per alvum aut renes sanareo fermento, velut possit reduci, novus re-

coctusque sanguis emergat. At, recte subiungit, hanc ego curam eo absoluteiorem fore confido, quo lactis usus diuturnior est & diata in ceteris morosis. Verum cum deficiant statim ad prima experimenta delicatuli nostri, nec lactis usum cum decenti diata, quæ tamen his omne fert punctum, continent, mirum non est, si desideratus se non sistat effectus, aut plane sinister inde emergat eventus. De quo etiam argumenta plura attulimus in dissertatione de mirabili lactis asinini usu in medendo. Secum quoque lactis, praesertim secundum nostram inventionem recentior & dulce preparatum, spectatissima certe in morbis longis & rebellibus splendet efficacia, sed opus est, ut portatio ad unum vel alterum mensem extrahatur, ac eodem modo sub iisdemque cautelis in vitæ victusque regimine instituat, quam cum acidulis vel thermis solemne prout latius expolimus in diserti de feri lactis virtute longe saluberrima. Decocta medicata, praesertim temperata, quicquid in lue venerea ad sanguinem purificandum, & ex traumaticis, apertentibus & consolidantibus speciebus concinnata, quicquid in phthisicis & in ternis atque externis abscessibus praestant, id omne longo & continuato usu in acceptis ferendum, sine quo nulla fere virtus nullusque effectus conspicitur. Quin in plurimis chronicis affectionibus, uti malo hypochondriaco, hysterico, cachexia, chlorosi virgineæ, mentium suppressione, inque primis affectibus uterinis, parum, vel nihil, solidi levaminis afferre poterit Medicus, nisi paullo diutius appropriatis & accommodis remediis, ut sunt elixirium nostrum balsamicum temperatum alcalisatum, pilulæ polychrethæ balsamicæ, deterfiva, balnea, elixir stomachicum in notis ad Porerium descriptum, per aliquot menses insiluit. Cinnabarina, seu arcanum antepilepticum, a Chymiatris potissimum magnis laudibus extolluntur, sed vix respondet effectus, nisi in pulle-

largiori, ad grana decem, & repetita ad aliquot dies dosi, usurpentur. Quae quidem ratione, non modo in epilepsia a causa interna, sed etiam externa, a gravi nempe capitis percussione producta, vertigine, motibus convulsivis praesentaneam & inequimparabilem eorum facultatem olim saepius expertus sum, licet non eo, ut vulgo moris est, sine, seu sedativo & anodyno, sed potius, ut medicamentum, quod humorem alvis elapsum & membranis cerebri vel nervis ingrentem, resolvit & colliquat, adhibuerim. Nec mercurius dulcis, nec aethiops tinnialis, curat lue veneream, vel desordinationes aut exulcerationes cutis, nisi usus ejus continuetur. Neque etiam chinæ cortex intermittentes tollit, nisi ejusdem usui aliquandiu sub debitis cantellis insilatur. Neque denique fluor seminarum albus facile abigitur, quam balneis, laxantibus & roborantibus diutius paulo usurpatis. Et quae plura hac de re exempla & monita in dissertatione de prudenti medicamentorum continuatione, attuli. Igitur non possum non omnibus, qui cum laude in artis exercitio versari gestiunt, pauciora, sed selectiora, eaque leniora potius, quam activiora remedia, de meliori commendare, ac ut iisdem cum prudentia & constantia uti addiscant, quam maxime suadere. Nam vere dixit Helmontius: *pauci sunt, quae Medicum nobilitant*, sed haec, addo, pauca paucissimis sunt cognita, & apparatu quidem ac copia medicamentorum non destituimus; at perita & in experientia fundata eorumdem applicatio cum dexterritate adhuc semper & ubique in desideratis.

CAPUT III.

De medicamentorum viribus & causis ignorantiae eorum.

§. I.

Remedium
viribus
parum
cognitis

Quando Medicus naturam, cui principem in sanando locum

merito vindicamus, dextre adjuvare ac imitari nititur; nihil ei prius, nihil posterius esse debet, quam ut modo juxta Hippocratem lib. de flat. causas corporis affecti, sed & remedium, quibus tanquam instrumentis omnia ipsi perficienda, vires & facultates penitus cognititas habeat atque perspetas. At vero quo magis in artis exercitio utile est ac necessarium, veras & non fictas medicamentorum, pro tam diversa corporum & morborum ratione vires inimus nosse; eo magis utique dolendum est, quod si dicere licet quod res est, paucula sint remedia, quorum virtutes & operationes certae ac recte perspetae, sed pleraque ipem atque expectationem curantis frustrantur, qui verae pharmacorum facultates in Democriti quasi puteo adhuc latent. Quod quidem assertum paradoxon & plane a veritate alienum videri posset, quum tam numerosi libri practici, botanici, chymici & pharmaceutici, medicamentorum, tam simplicium, quam compositorum, Galenicorum & chymicorum copiam, non modo recensent, sed & eorum laudes atque efficaciam miris concelebrent encomiis, nec tamen satis deprecicare possint: nihilominus tamen re accuratius inspecta & adhibita ad tam magnificas laudes & tantopere decantatos effectus explorandos circumspicienda observatione, pauca certe supersunt: quae fide & expertae virtutis, plurima vero infida, suspecta, fallacia, ficta & energiae egentissima, licet in nullo mendacio secundum Plin. l. 29. c. 1. majus sit periculum quam in medico.

§. II.

Si causam hujus tam perniciose ignorantiae medicamentorum quoad veras suas vires & facultates disquirimus; sunt quidem plures, inprimis tamen ipsa immensa illa per ignorantiam pariter adeo accumulata moles & farrago remedium, quibus ars salutaris repleta & tantum non oppressa est, impedit, quo minus recte in exquisi-

Quod
famen
contra
impu-
tentia.

tam singulorum notitiam pervenire possimus. Nam quum tam mirifice dilaudatis pharmacis Practici uterentur, nec tamen expectatus effectus sequeretur, mox ad alia delapsi, nova condere, vel ab aliis recenter condita, in usum vocare cœperunt, quæ quum eodem modo ipsorum votis non responderent, sed ubiq; inertiam atq; defectum arguerent, alia rursus consilii inopes quasiverunt, immo ad chymica, panaceas & ipsa exotica, quorum modo fama afferebatur, conversi sunt. Hinc nata est tanta medicamentorum sylvæ, quæ certe nihil ad distinguendam ægrotantium salutem & ad præciosos rationalis & efficacies incrementum remorandum, deterius inveniri potest. Nam profecto sub tanto numero medicamentorum, quibus nostro tempore pharmacopolia referta & plane onusta sunt genuini & proprii cujusvis effectus & operationes, in tot differentibus naturis, morbis eorumque causis, recte haberi & cognosci non potuerunt, neq; etiam unquam cognitio intimior speranda, aut virium exploratio cum successu molienda, nisi prius ad paucorum & selectorum numerum redigatur innumerabilis apparatus.

§. III.

Altera causa, ob quam verè remedium in medendo proprietates adeo ignoræ atque obstruæ, est veræ pathologiæ ad hæc usq; tempora neglectus. Nam sicut secundum Hippocratem lib. cit. de flatib. si quis causas corporis affecti probe cognovi, potens est valde ea asserre, quæ corpori commodant, nimirum contraria morborum natura perspecta: ita omnis qui hac cognitione destituitur, vel erroneam hausit, neutiquam etiam accommodata remedia invenire atque in usum proponere potest. Quapropter pathologiam veram therapiæ primum & præcipuum fundamentum habendam esse recte ducimus, & hinc etiam non sine ratione, & sine in priori sectione copiosius, &

accuratius ad eam stabiliendam valde utilia capita adduximus. Quumque ex hac solida morborum philosophia planius innotescat, non multiplices, & valde abditas atque abstrusas, sed simplices, & manifestas esse multorum, & magnorum morborum ac symptomatum causas, quæ maxime pro differentia locorum quibus insident, valde differentes læsiones, & effectus producant: in proclivi omnino est judicare, non pluribus, sed paucis pariter ad removendas has causas quæ esse remediis.

§. IV.

Accedit tertio, & inter ea, quæ defectum in perquirendis & cognoscendis veris remediis, facultatibus arguunt merito referendum. & illud est: quod non modo vulgus, sed & ipsi Medici, qui doctis accenseri volunt, noxiam hanc foveant opinionem, quas ipsis medicamentis formaliter inhaerent noxiæ, vel salutare effectus, qui ipsum usum sequuntur. At vero hæc assertio non solum erronea, sed etiam perniciosa est, ac tum in phisicis, tum medicis rebus ingentem sterilitatem affert. Etenim omnes omnino corporum in rerum natura vires neutiquam sunt absolutæ, sed relativæ & conditionatæ, certis respectibus, & circumstantiis limitatæ. Nimirum omnes effectus, & operationes, quæ in corpus male affectum redundant, nonnisi motu accedunt; jam vero ex phisicis & mechanicis patet, non in uno, & simplici corpore motum existere, sed demum ex duorum congressu, & reactione emergere, ipsamque vim morticem unius corporis ab alterius reagentis mirifice modificari: adeoque de nullo etiam medicamento in se considerato, certus quidam effectus, qui species, motus, salutaris, vel minus talis, prædicari potest, licet eisdem vis quadam ad actionem exferendam ibilit.

Pathologia
vera
ignota

fulgor
med
dica
mentis
absolut
est
esse
vini

infit. Quapropter recte omnino colligitur corpora, sic etiam medicamenta, agere non tam secundum sphaeram activitatis, quam potius secundum receptivitatem, & remediorum effectum non modo ad causas morificas, le- & individua quæ varia sunt, & sine quorum cognitione fallax omnis medicinz operatio, recte simul referri. Hæc autem accuratio circumstantiarum cognitio ex parte difficilem, & conjecturalem attem nostram quidem reddit, sed rationale ab empirica quam optime distinguit, quandoquidem prudentis & cum ratione agentis Medici est, in fanando quovis morbo, omnes tam prævias, quam comitantes circumstantias probe inquirere, ponderare, naturam medicamenti cum genio morbi, & quidem sub tali corporis constitutione, probe comparare, hoc autem prætermisso, præter futilem, cæcæ & temerariæ Empiriam expectandum nihil. Et quamvis post cæco tantum ausu adhibitam medicinam interdum per accidens & casu, vel declinante jam morbo, salutaris succedat eventus, eo tamen, si non alio nomine, culpandum erit ejusmodi molimen, quod semper periculum sit, ne gravi damno, quod prudenti adhibita observatione vitari poterat, ægrotantes magis.

6. V.

*Quæ di
namque
conferat
quæ
sunt
sunt*

Res clarius patet exemplis. Ni-
micum hippis notum est atque tofno-
ribus, jalappæ purgantem. inesse fa-
cultatem. Hæc autem si eadem dosi,
ad drachmam dimidiam, vel decem
corporibus sanis, etiam ejusdem æta-
tis, mane offeretur, mirum certe erit,
quam diversus effectus ratione tem-
peramenti, constitutionis corporis,
partium nervosarum, immo virium,
inde resultabit, in hoc vel decem feds.
cum vomitu, in illo quinque tantum,
in alio paucas valde, sed anxietates
simul junctas cum inappetentia, mo-
vebit, in hoc vehementia tormina,
in illo, nulla excitabit. Et eadem ope-

rationis diversitas, non modo in reliquis purgantibus, sed & aliis evacuantibus, emeticis, sudoriferis & diureticis animadvertitur. Neque etiam in artis exercitio versantibus obscurum esse poterit, quantopere medicamentorum efficacia secundum clima, regiones, anni tempora & temperamentum constitutiones, victus & vivendi genus discrepet, unde recte *Celsus* dicit: *aliud medicamentum Roma, aliud in Græcia adhibendum*. Certe Westphalia, Pomerania, & septentrionalium regionum incolæ, purgantia, emetica & alia fortiora experientia teste quam optime ferre possunt, quæ Italici pestifera & tantum non venenata sunt. Hoc vero discrimen longe magis in statu morbofo obvium, dum unum medicamentum eodem modo & regimine, tempore ac dosi, eodem in morbo exhibitum, uni prodesse, alteri non convenire, sed nocere, per attentam observationem confirmatur. Expertus id naperis admodum sum, in binis puellis gemellis quinquæ annorum, quæ eadem victus & vivendi ratione use, eodem tempore variolis corripiebantur, & decumbentes iisdem medicamentis, eademque methodo trahebantur, diverso tamen plane eventu, dum altera gravior longe symptomatibus conficta, inter decimum & undecimum diem exspiraret, altera vero eadem pulsulatum copia obfita, mitius laboraret, & feliciter evaderet, ac in eo tantum diversa esset corporis constitutio, quod quæ moriebatur, laxioris & succulentioris, altera vero strictioris & firmioris esset habitudo. Pariter chinæ cortex circumspicte adhibitus divinum certe in intermittentibus est remedium; sed quam noxius inde etiam in iisdem febribus propullulare effectus, notissimum est. Martialis irocarbæxia, chlorosi, in affectione hypochondriacâ, effectum per se præstare longe saluberrimum, nonnunquam vero plus noxæ, quam emolumenti afferunt. Quam diversa remedium, quæ se-

da-

Que di
sunt a.
castro a.
expe-
riencia.

dativa virtute prædita, ut opiatorum, sit operatio, noxia & salubris, nemo non novit. Sulphura ex mineralibus, maxime ex antimonio, item medicamenta ex mercurio rite parata, incomparabili pollent virtute in chronicis & rebellibus morbis debellandis, imprimis lue venerea, sed nisi circumspice pro circumstantiarum ratione usurpentur, nocentissima sunt. Superfedeo plura alia adducere exempla, quum ex allatis abunde elucescat, verissimum esse Hippocratis lib. de arte §. 7. effatum: *qua profuerunt, ob rectum usum profuerunt, qua vero nocuerunt, ob id quod non recte usurpata sunt, nocuerunt.* Et Celsus lib. 3. c. 1. egregie ad veritatem sentire, dum asserit: Medicum non semper posse præstare artis effectum, licet sit perpetuum in arte medica, quid fieri debeat, tamen non esse perpetuum, quod sequi convenit.

§. VI.

Accedit quarta tam supinæ ignorantie in propriis & veris medicamentorum facultatibus cognoscendis causa frequentissima, quod nimirum medentes naturæ, morbi & medicamentorum vires atque effectus non curate invicem distinguant, sed sæpissime fallaciam causæ ut causæ admittant, quæ frequens & quasi propria est in Medicorum scholis, ut nullus facile sit, qui cum hoc non colluctetur vitio. Nihil enim frequentius est, quam quod naturæ, immo morbi effectus, a vulgo & ignaris Medicis pro operatione medicamentorum habeantur ac falso venditantur. Sane qui atrociam illa in variolarum initio obvia symptomata, delirium, epilepsiam, applicato antea clysteri vel interius assumpto medicamento adscriberet, is certe plurimum erraret, cum illo, qui vicissim medicamento diaphoretico, circa quartum diem, quo sponte omnia pacatiora sunt, propinato, pathematum cessationem tribuere vellet. Plures vero ex idiotis sæpe hac ratione immeritam plane quandam famam

calide aucupantur, ut oblato ab ipsa circa dies criticos, quibus sponte solvitur morbus, vel etiam sub declinatione medicamini subsequenter salutare effectum tribuant & ignaris imponant. Interim tamen non negandum, remedium, naturæ & morbi effectus non semper a priori distinctos satis comparare, sed prudentissimos etiam sæpe in cognitione falli, & recte dixisse Galenum de medicament. facult. lib. 2. sæpe propriam cuiusque medicamenti vim obscurari necesse est, ubi fallentem aliunde qualitatem acceperit. Quo etiam apprime facit elegans Pechini in observ. testimonium: aliquando, inquit, in Medicina eveniunt, quæ evenire non posse, nec debere, juratus crederes, adeo aliena illa sunt, cum a scopo Medici, tum medicaminis effectui. Nunc etiam quæ speras & fingis animo futura, non eveniunt, & quum eveniunt, aliter quam oportet.

§. VII.

Neque porro prætereundum, multum omnino ad hanc Medicorum circa medicaminum vires ignorantiam contulisse, quod perpauci iis articulis instructi sunt, quorum ministerio elementa & principia, quibus medicamenta agunt & in corpus operantur, indagari & cognosci possunt, philosophia nempe experimentalis chymico-mechanica, quæ variis mixturebus, distillationibus, extractionibus, solutionibus, corporum texturam, ingredientia, crasin, a qua eorum qualitates, proprietates & affectiones dimanant, detegit atque recludit. Ob hujus itaque scientiæ defectum, turpe dictum est, & per multa sæcula tota cana vetustas & recentiores quoque in pernoscendis medicamentorum agendi principiis summa in ignorantia versati. Antiquiores enim commentitis quatuor elementis, qualitatibus, humoribus & temperiebus tanquam saxo adhaerentes, nil nisi sterilia & futilia circa hanc rem proposuerunt. Post hos Philosophia Cartesianæ

Pechini
observ.
principia
lib. 2. c. 1.

Sanx additis nimis subtiliter de actione medicamentorum in corpus disserere, & eorum operationes ex varia particularum figura, magnitudine, nexu derivare voluerunt, sed parum ad usum. Et nostro jam ævo prodeunt, qui hæc omnia rejicientes asserunt: aliam esse actionem medicamentorum & corporum physicam, juxta physica principia explicabilem, aliam vero medicam ad vivum corpus relatum. At licet nemo unquam negaverit, vivo, non mortuo corpori offerenda esse medicamenta; in obscuro tamen evolvendum manet, quomodo hæc agant in corpore vivo. Et licet porro contendat, per vivum corpus intelligendum esse corpus principio interno activo, motus & omnem quoque medicamentorum actionem ad arbitrium & moraliter certum in finem dirigente, instructum, eaque propter supervacaneum penitus censeant illum conatum, quo principia & modus agendi remediorum investigantur: hæc tamen omnia sunt mera supposita, quæ nulla firma demonstratione nituntur, nec etiam quicquam utilitatis ad rationalem therapiam conferunt, ut potius cæcæ Empiriæ apprimere faveant.

§. VIII.

Per
Thibien
sophia
superi-
mentali

Igitur certum interea sit, pro diversa natura & indole medicamentorum, quæ etiam ex parte ipso odore & sapore cognoscitur, aliam atque aliam esse ipsorum operationem, v. g. refrigerandi, calefaciendi, sudorem, urinam & alvum movendi, motus sedandi & intendendi. Certum quoque ac firmum sit, omnes in corpore nostro effectus, a causarum suarum nexu indissolubiliter dependere, adeo ut remedia, si sub certis conditionibus applicentur, certum etiam activitate sua edant effectum. His autem ceu veris, ut sunt, tantisper suppositis, nullum dubium est, quin mediantibus experimentis variis chymicis & mechanicis, a priori quam optime in principia & vires medicamento-

rum quispiam inquirere & penetrare possit. Clarissimo sunt documento soterix aquæ, thermæ nempe & acidulæ, de quarum ingredientibus Veteres ex defectu scientiæ physicæ & chymicæ, nonnisi fabulas & commenta in conspectum produxerunt, ego vero, quod citra arrogantiam dixerò, primus fere in plurimis Germaniæ fontibus experimentorum ope genuina crui elementa, ut jam de eorum effectu judicare & quid in hoc vel illo morbo præstare possint, verum judicium ferre sit in proclivi. Neque minus ejusdem Philosophiæ experimentalis beneficio & mediante quoque sapore & odore, veras & genuinas in vegetabilibus detegi posse vires arbitror, ut pluribus asserui in exercitatione de methodo compendiosa vires plantarum indagandi, inserta sono primo opusculorum physico-medicorum. Quin tentaminum chymicorum ad miniculo, multorum certe arcanorum, in primis quæ ex auro sumtuose preparari jactitarunt, ingredientia, quantumvis occultata, sunt evoluta ac magnificè ipsis falso & fraudulenter adscriptæ virtutes manifestatæ.

§. IX.

Monendum tamen est, non omnes medicamentorum facultates & proprias virtutes, hac ratione solius experimentalis studii subsidio elici posse atque detegi, sed easdem demum a posteriori, sive effectu & experientia, melius in conspectum venire. Ecquis enim est, qui solis experimentis physico-mechanicis argenti vivi vim tam vehementer salivam moventem, nitri virtutem refrigerantem & antispassmodicam, arsenici exitialem venenatam, seminis hyoscyami narcoticam, rhabarbari purgantem, cantharidum diureticam, antimonii emeticam, a priori per ejusmodi experimenta, nisi accedat experientiæ suffragium, conicere, vel certo determinare poterit. Neque etiam virtutem quandam medicamenti semel, aut bis expertum pro certa & probata venditare licet.

Et ex-
perien-
tia

sed

sed iterata demum & aliquoties sine suspitione alius causæ confirmata experientia verum esse effectum evincit. Multi siquidem, ut perite monet Bagliv. 1. 1. prax. r. §. 8. ob saustos eventus, semel vel bis observatos, ex aliquo remedio, vel potius ob innotatam quandam proclivitatem, tum laudandi, tum suspensum ad lubitum medicamentorum vires, ita erga remedium aliquod afficiuntur, ut putent illud unum ad curandos quoscunque morbos summam vim ac veluti imperium obtinere, sed progressu temporis re melius perspecta, illud particulare & instabile, non vero commune ac perpetuum fuisse, animadvertunt.

§. X.

Denique etiam haud leve obstaculum penitiori virium in medicamentis cognitioni objicit, tum quod rarissime simplicia, ac ut plurimum composita, nec hæc sola, sed aliorum usu interpolata, usurpentur, tum etiam quod pleraque Medicorum turba animo fluctuet, nec uti quidem decebat, insulat usui, sed juvante non illico oblato medicamento, illud promat crebriusque mutet. Etenim adhibitis multis singul simplicibus, dubium utique est, cui potissimum adscribendus effectus, multo magis si adjecta ita sunt comparata, ut virtutem vel infringere, vel intendere possint. Et licet simplicia non semper omni indicationi satisfaciant, sed connubio eorum sæpe opus sit; tamen compositorum etiam genuina virtus nonquam innotescere potest, quando subinde alia atque alia interponuntur ac ipsa adhibendi methodus pluries variatur. Longe magis vero huic cognitioni obest crebra mutatio, quandoquidem remedium effectus nonnulli certo tempore perfici potest & cognosci, quod nisi expectetur ipseque usus aliquandiu continuetur, neitquam de virtute certi quippiam poterit asseri, sed quantum vis egregium pro sterili habebitur. Eximium hanc in rem est Celsi præceptum 1. 3. cap. 1. non statim inquentis, commendetur, si quid non statim profuit; minus vero removeatur, si quid paulo saltem juvat, quia

Tom. III.

profectus tempore expletur. Et idem etiam jam præcedenti capite lege 14. pluribus inculcavimus. Atque hæc sunt potiora impedimenta solidæ cognitionis virium in medicamentis, quæ qui superat ac removet, pariterque tempus exhibitionis, dosim & modum cum congruo vehiculo propinandi curate annotat, is omnino genuinas facultates & operationes explorabit, & cum certa ratione habebit perspectas.

CAPUT IV.

De medicamentorum quatuor summis generibus & operandi modo, speciatim alterantibus.

§. I.

Quum omne fere Medici officium in eo contineatur, ut quæ tum ad tuendam, tum redintegrandam labefactam valetudinem, nec non levanda & mitiganda urgentia pathemata faciunt, tempestive offerre, & vicissim, quæ insalubria & fugienda, perite arcere noscat; in proclivi est iudicare: ad hoc ex voto perficiendum nihil æque necessarium esse, ac distinctam & curatam sanitatis præsidiorum notitia. Hæc autem cognitio supponit non solum notitiam virium, sed etiam elementorum & operandi rationis; quo Medicus solido iudicare queat ratiocinio, quid ex omni apparatu in hoc vel illo morbo, hoc vel illo individuo, hoc vel illo tempore & pro diversa aliarum circumstantiarum ratione, oblit, aut proficiat. In quo quidem ut recte versetur artifex & habeat, unde cuius casui accommodum expedite promovere & cum fructu asserre queat; nihil aptius magisque proficuum est, quam si omnia hæc sua instrumenta, secundum ipsorum principia, modum operandi & effectus quoque, quos sub certis conditionibus præstare possunt, in certas classes perite & compendiose dispelcat.

§. II.

Jam quidem quamplurimæ ejusmodi

Medi-
camentorum
in class.
sic div.
tribus
classifica-
ritur.

Quæ ad
naturam
hæc

Q

di

*At hoc
est
deinde* de syllabi & catalogi materiz medicæ ,
a doctis etiam viris concinnati, passim
circumferuntur: sed si verum fateri
liceat, ita ut plurimum sunt comparati,
ut solidæ & rationali therapie inde
adornandæ, plus obliunt quam profint,
& a peritis ac in ipsa arte exercitatis
vix sine indignatione perlustrari que-
ant. Etenim obvix in iis sunt longe
plures quam par est & innumere tere
remediorum classes, ut non ita pridem
in ejus sarinæ libello vel 50. numerari-
m, prout nempe ratione partium
quas afficiunt, ratione morborum in
quibus conveniunt, & ratione effe-
ctuum quos interne & externe edunt,
variant. Ipsæ vero configurationes dis-
fusæ & tam variis diversæ ac plane
contrariæ indolis medicaminibus re-
feruntur, ut qui confiderent, sine nova cu-
rata distinctione, earum ductum in
conficiendis pharmacis sequi velit, non
possit, non in ingentem errorem atque
confusionem perducit.

§. III.

*Et ad
quatuor
tantum
classis
redu-
cenda.* Quapropter summa medicamento-
rum genera compendiose & longe re-
ctius sic describi posse censeo, ut quum
omnia quæ medendi scopo, ad remo-
vendas morborum causas quoad mo-
dum agendi dirigantur, in omni vero
morbo vitium vel sit in motu, vel in
materia, quæ movetur, immo ad mo-
tum disponit, motus porro vel nimis,
aut in universo corpore, aut in certa
tantum parte intensus, vel imminutus
sit, materia autem vel quantitate, vel
qualitate delinquant, cuncta remedia
vel circa motum, vel materiam opera-
tione sua in genere occupentur. Et ma-
teriz quidem qualitate vitiosæ corri-
gendæ dicata sunt alterantia, quantita-
te peccanti evacuantia, motui vero si
deficit, imminutus est & partes atonia
laborant, excitando & procurando ro-
borantia, si vero intensus nimis est &
adauctus ac partes spasmò exercentur,
componendo ac remittendo, sedativa
inveniunt. Hæc sunt generales quatuor
medicamentorum classes, ad quas om-
nia quæ naturæ promiscua ad medi-

cum usum suppeditant, commodissime
possunt reduci. Quin etiam omnes ar-
tis in medendo operationes, his admini-
culis & hac ratione quam optime per-
fici possunt, & Hippocrates elegantissi-
me hinc & vere mechanice Medicinæ
definit *lib. de flat. §. 3.* scribens: *Medi-
cina nihil aliud est, nisi ablatio & ap-
positio. Ablatio quidem eorum quæ ex-
cedunt, appositio vero eorum quæ defi-
ciunt. Qui autem istud optime facere
possit, is optimus Medicus censebitur
quantumq; quis ad hoc præstando defi-
cit, tantum deficit quoque ab ipsa arte.*

§. IV.

Deinde quod ad causalem influxum
ipsamq; remediorum actionem atti-
net; agunt ipsa immediate & proxime
vel in fluidas, vel solidas partes, ita qui-
dem, ut alterantia & evacuantia dicata
sint fluidis, roborantia & sedativa soli-
dis. Verum quia tam liquida, quam so-
lida, diversæ naturæ sunt, diversis etiam
rationibus succedunt operationes.
Quippe nonnulla ex medicaminibus
proxime actione sua afficiunt tenuissi-
mum ac mobilissimum illud fluidum,
quod in cerebro ac nervis hospitatur,
& motum præcipue & sensum partibus
præstat, illud vel augendo ac in motum
magis ciendo, ut analeptica, cordialia
& suaveolentia, vel intensiorem ipsius
motum sedando, ut vaporosa, anody-
na, opiata & graveolentia, quæ exigua
etiam dosi assumpta, præsentaneam ex-
ferunt virtutem. Alia medicamento-
rum immediate operantur in sanguinē
& qui ipsi servant succos, ut diluen-
tia, incrassantia, artenuantia, item ab-
sorbentia, & acrimoniam causticam
vel sulphuream contemperantia.

§. V.

Quæ in solidis effectum præstant,
ut plurimum immediate & proxime
eundem in nervosis partibus exsequi-
untur, præsertim ventriculo & intestinis,
quæ sensationis exquisitissimæ. Hunc
in censum veniunt pharmaca ex mine-
ralium classe potissimum petita, quæ
in dosi operantur, & in tenuissimas
ac stupendæ exiguitatis moleculas in-
te-

*Alia
vero
vel
Ablatio*

*Alteri
sum &
ex-ces-
sum
robo-
rium &
sedan-
tium.*

*Vel so-
lidas
partes
afficit.*

tegra virtute & textura dissolvuntur a-
quantim admissiois ad nervosas partes
sunt, nec tam facile elui possunt, ut ex
vomitoriis tartarus emeticus, ex sal-
vantibus mercurius precipitatus albus,
ex sulphuribus, sulphur antimonii no-
stra methodo paratum & salia volati-
lia. Alia vero sale subtili caustico ner-
vosas has partes adiunguntur, ut ex ve-
nenis arsenicum, ex purgantibus helle-
borus albus & niger, gummi guttæ, re-
sina jalappæ & id genus alia cum om-
nibus insectis, imprimis cantharidibus.
Notandum tamen quod ex his non-
nulla unam præ altero nervosa parte
magis afficiant, uti mercurialia glan-
dulas, lymphatica vasa ipsaq; fauces,
antimonialia emetica ductus bilarios,
colocyntiaca nerveas intestinorum
tunicas: helleborus oesophagum, la-
ryngem & asperam arteriam, cantha-
rides & insecta nerveos urinarios &
feminales ductus, salia volatilia o-
leosa & sudorifera ex sale volatili re-
gai animalis confecta tunicas vasorum
arteriosorum. Alia denique ex iis,
quorum operatio solidis dicata, plus
musculoso-fibrosis, quam nerveis &
membranaceis partibus facultatem
suam insinuant, quorum e numero
sunt roborantia, quæ vel leniori prin-
cipio constringente fixiori terreo, vel
sulphureo pollent.

§. VI.

Sic igitur in genere recte distinquen-
da medicamentorum seplex, & sic
quoque in compendio eorum actio &
operandi ratio concipienda: jam de
singulis seorsim. Quemadmodum vero
Medicina rationalis ab evidentibus
maxime causis, obscuris omnibus, ut
loquitur Celsus, non a cognitione ar-
tificis, sed ab ipsa arte rejectis, in-
strui debet: ita etiam illam scientiam,
quæ medicamentorum facultates pandit,
& ad rationem revocat, non
ex causis obscuris nimisque remotis,
vel principiis atomisticis & secundum
magnitudinem & figuram particula-
rum geometricis, quæ revera incom-
prehensibilia, sed ab evidentibus, pro-

ximis, in sensus cadentibus & compre-
hensibilibus, immo maxima ex parte
ipsa experientia petendam & haorien-
dam esse iudico. Cui proinde metho-
do etiam in præsentiarum insulam, &
in hac facultatum, & proprietatum
medicamentorum explicatione plana
admodum, simplici & facile concipi-
enda ratione procedam, ita quidem;
ut non omnes, sed selectas tantum &
usu comprobatas ex quavis classe spe-
cies recenscat, atque quoad agendi
modum atq; usum nerveose explicem.

§. VII.

Sermo autem primo erit de AL-
TERANTIBUS, quæ primam re-
mediorum classem conficere & maxi-
me circa correctionem materię, quæ
qualitate in vitio est occupari, sape-
rius dixi. Jam vero quia materia e-
mendanda in morbis corporibus af-
fectionibus variis modis delinquere
potest, varias etiam alterantium spe-
cies inde resultare elucescit. Nimirum
succus corporis nostri, qui secundum na-
turam blandi, dulces ac temperati esse
debent, vel satino-acidam & corro-
sivam naturam induerunt, vel intempe-
rie calida, subtili sulphurea infecti sunt;
vel nimis viscidam, tenacem & cras-
sam, vel valde acrem & corrosivam in-
dolem contraxerunt. Hinc ut quadruplex
hęc vitiosa qualitas corrigatur,
quadruplex etiam alterantium genus
esse debet. Et quidem ad acidum im-
bibendum ac obruendum, absorbentia,
ad æstuantem & biliosam intem-
periem contemperandam & refrenan-
dam, temperantia ad viscidum & spis-
sum dissolvendum ac colliquandum,
incidentia & denique ad acrimoniam
urentem & corrodentem involven-
dam ac mitigandam, demulcentia a-
pta sunt atque accommodata.

§. VIII.

Primum atque alterantium genus
complectitur ABSORBENTIA. Ho-
rum classem ducunt ex marinis mater
perlaram, concharum, cochlearum
& ostracordematum varię species,
corollaria rubra & alba, nec non os

sepix; ex animantibus desumpta cornua & ossa, sive per vaporem sub coctione emollita, ac ut in phar-macis audit, philosophice præparata, sive aperto igne usta, dentes & ungulæ, testæ ovorum, chellæ & lapides cancrorum, mandibulæ piscium, item unicornu animale & fossile; ex subterraneis lapis specularis, creta, crystallus præparata, osseocolla & omnes lapides calcinati & usti, varia bolorum, argillarum & terrarum sigillatarum genera; ex metallis limatura martis; ex chymice confectis omnia salia per incinerationem parata, cineres clavellati, sed tartari, nitrum fixum, spiritus salis ammoniaci urinæ, sal volatile ammoniacum, magnesia alba, tinctura salis tartari, item antimoniæ acris.

Theorema.

Absorbentium horum omnium ratio est ac indoles, ut cum obvio quocunque acido promte congregiantur, illud imbibant, quantum vis corrosivum hebetent ac destruant & cum eo in tertium quoddam innoxium corpus commigrent. Patet hic effectus exemplo spiritus nostri fumantis & inflammantis quam maxime corrosivi, olei vitrioli, mercurii sublimati, aquæ regis, fortis aliorumque summe causticorum, quæ adjecta ferri scobe, vel commixto alcalino sale, aut absorbente terreo, omnino rodente facultate orbantur, ut nec quicquam acidi aut arrodentis superlit. Quamvis vero cuncta alcalina salina & terrea in eo conveniant, quod acidum quodvis ciquent ac in tertium quoddam commutent: in eo tamen quædam intercedit differentia, quod salia alcalinæ indolis, sive lixiviosa, non solum a quovis acido, sed etiam liquore aqueo in corpore celerrime & ex toto solvantur, terrea vero non tam facile penitus liquefiant, uti conspiciendum est in coralliis, martis limatura, calce viva, quæ nec ab acido, præsertim vegetabili, prorsus dissolvuntur, sed semper fixior quædam terrestri substantiâ resistit. Deinde alcali-

na salia præter vim absorbentem, suscepto in connubium acido, novam acquirunt medicamentosam virtutem, viscidos nempe, limosos & tenaces succos incidentem & colligantem, leniter stimulantem, ac vel alvum, vel diuresin, vel etiam diaphoresin movent, & prompte quoque per excretoria transeunt: plurima vero alia ex corporibus alcalinæ naturæ non tam expedite excretionem proritant, sed potius quandoque adstringentem relinquunt effectum, uti solenne est limaturæ martis, coralliis, bolis & tetræ sigillatis.

Corollaria practica.

I. Quia igitur alcalina terrea non nisi ab acido dissolvuntur, hinc utique cavendum est, ne in iis morbis, ubi primam regionem, in qua absorbentia, maxime operationem suâ exsequuntur, magna crudorum & viscidorum succorum colluvies obstat, ne indurata ibi hæreant, stomachum gravent, appetitum & digestionem destruant, alvumque reddant adstrictiorem; id quod sæpius in febribus ardentibus, biliosis, hecticis & ubi languor motus peristaltici & constrictorii in ventriculo prælo fuit, factum fuisse observavimus.

II. Vicissim quia hæc absorbentia acidum tam promte absumunt atque invertunt, acor autem purgantium & vomitoriorum efficaciam, quâ maxime impedit atque infringit, utilissime digestivi loco, ubi iusta acidi exsuperantis suspicio, horum, usui præmittuntur.

III. Ut ut omnia terrea absorbent & obtundant acidum: ob diversam tamen singulorum texturam & naturam, quandoque hæc, ut productum ex ipsis valde differat, ac diversum, sæpe intentioni non respondentem in corpore effectum exsequatur, & hinc exquisitus in oblatione servandus delictus. Quando scilicet Medicus præter virtutem absorbentem, etiam quandam roborantem, & adstringentem desiderat: expedit marina potillimum & ex his corallia & ostreas, nec non testas ovorum, item varias margaritarum spe-

species, inprimis quæ sigillari solent, in usum vocare. Si lenius adhuc subadstringendum, perlarum mater & conchar, ac speciatim ad cohibendum seminis fluxum, os sepiæ, ex usu esse poterunt. Ubi per abforbens laxans simul effectus perficiendus, magnesias, quæ ex lixivio nitri debita enchiresi paratur & nonnisi tenuissimus calcis vivæ flos est, offerenda, quæ tota ab acido soluta, in sal medium amarum, ædum promte stimulans transit, eaque propter in hypochondriacis & ubi prima regio acidis succis scatet alvique strictior est, eximiam certe exserit efficaciam. Quum diuretics simul effectus præstandus, cancerorum lapides, cochleæ vel corallia usta, nec non osseocolia, utilissimam locant operam. Ad perspirationem una in morbis liberio-rem reddendam, animalium ossa usta, vel philosophice præparata commodissime inserviunt. Et denique quo stagnantes & densati humores impleq; coagulatus sanguis resolvantur, nihil certe domestico illo remedio præstantius, quo cancerum lapides in aceto liquati propinquantur.

IV. Abforbentia licet sint medicamenta admodum simplicia, fere domestica & facile parabilia, eorum tamen virtus & efficacia omnibus ferme aliis remediis superior, nec satis dilaudari potest. Nihil enim tam expedite ac promte noxios succos cicurandi & invertendi facultatem ex omni alterantium censu exserit, quam abforbeis, neque tamen facile tam securum ultum aliud & innoxium est, nisi majori quam par est copia ingeratur. Adhæc ubi admodum acidi in corpore est proventus, maxime in his, quibus bilis deficit, ut senibus ac feminis, nec non qui sedentariæ vitæ nimium indulgent, & potum, qui multum acidi recondit, largius assument, immo in multis morbis præsertim affectione & melancholia hypochondriaca, enormis plane; acidum autem toti animantium naturæ, & coagulante effectu, libero succorum vitalium

progressui, admodum inimicum est, & gravissimorum, præsertim chronicorum morborum, primam & originalem causam suppeditat: ideoq; clarissime innotescit, optima & præstantissimæ virtutis immo polychrestæ esse hæc abforbentia, quorum tamen usus Veteribus parvus admodum fuit vel plane nullus, ac demum *Helmontio*, *Tackkenio*, eorumq; in Belgio maxime affectis *Sylvio* & *Bontekoe* in acceptis fereudus, qui acidum multorum morborum causam esse perhibuerunt, & primis his acido oppositis usi sunt prætidis.

§. IX.

Secunda alterantium classis complectitur TEMPERANTIA, quæ non modo intestinum calidum partium sulphurearum in sanguine motum, sed & ipsum fervidum, urentem biliosum humorem in intestinis contemperant, cicurant & hac ratione refrigerant. Hac virtute ex vegetabilium censu splendent, radix & herba acetosæ, acetosella, poma citria, aurantia, Chinenisium granatorum, ribesia, fragra, berberes, baccæ rubi idæi, cerasa & ex iis parati succi, sirupi item aquæ ex recentibus his destillatæ, nec non semina quatuor frigida majora & decoctum avenaceum; ex animantium regno serum lactis, lac ebutyratum, succus cancerum fluviatilium, testudinum decoctum, decoctum dilutum rasuræ cornu cervi, & scorzonæ, cum vel sine hordeo, gelatina cornu cervi, aqua etiam a rasura cornu cervi destillata, hoc nomine commendanda: ex mineralium familia omnibus palmam præcipit nitrum, bene purificatum, melius adhuc regeneratum ex aqua forti per additionem salis tartari & ex chymicis denique & pharmaceuticis sal essentialle acetosellæ, cremortartari, phlegma vitrioli, clyssus antimoni sulphuratus, tincturæ rosarum, florum belididis, violarum cum spiritu vitrioli philosophico præparatæ, quam optime temperant.

Theorematum.

Temperantia agunt triplici ratione. Vel enim fale acido, particulas volatiles sulphureas ligant & motum earum calidum vorticofum intestinum figendo & illas coagulando, quodammodo minuunt. Vel operantur expansiva aereo-elastica quadam virtute, qualis delitescit maxime in nitro, quod fal acidum & alcalinum, ingentem partium sulphurearum nec non liquidi aereo-ætherei copiam involutam recondit, eodemque materiam calidam in vehementi motu vorticofa calido constitutam dissipat & a centro quasi ad peripheriam displodit, fale vero neutro materiam crassam, quæ calor & sulphuris matrix, attenuat, resolvit, disrarat, & subtili simul suo acido partes sulphureas in celerissimo motu sistit. Vel etiam partes sulphureas diluendo & disjungendo, humidum calore absumptum restituendo, simul etiam nimiam vasorum elasticitatem, a qua calor pendet, remittendo, operationem suam exsequuntur, uti potissimum observatur, ab aqueis, sero lactis, decocto cornu cervi & avenaceo.

Corollaria practica.

I. Hæc certe temperantia multi & magni usus sunt in Medicina, ubicunque calor præternaturalis exstinguendus, eaque propter in febribus omnis generis, item inflammationibus & gravioribus spasmodicis ac doloribus, qui perpetuo fere nimia & calida sanguinis commotione stipantur, iisdem nullo modo carere possumus. Sed acidis, quæ figendo & coagulando agunt, merito præferenda nitrosa. Nitrum enim non tantum refrigerantem, verum etiam rigidas & spasmo afflictas partes relaxantem, sive antispasmodicam, item urinæ & alvi excretionem promoventem virtutem possidet. Quin quomodo alia refrigerantia & acida fluida magis condensent & coagulent, nitrum potius colligat, rarefaciat, attenuat humores densos & viscidos, ita prorsus, ut si vel in pulverem redactum, vel in aqua prius solutum,

sanguini nigro coagulato inspergatur, eum & floridorem & fluidiorem efficiat. Quare non solum in inflammationibus ipsisque febribus inflammationis, quæ a sanguine nigro, coagulato & incarcerato nascuntur, acidis longe præstantius, sed etiam quia tenacem & spissam feri materiam, quæ affluens in sanguine inflammationi subjeclorum apparet, tam efficaciter fundit ac dissolvit, ad corpus ab inflammatione defendendum quam maxime proficuum.

II. In febribus chronicis, ut lenta, hectica, quæ ut plurimum ex labe vel corruptione quadam viscerum natales trahunt, & quando tussis aut hæmoptysis juncta est, ipsiq; pulmones, vitio laborant, non acida, sed nitrosa & diluentia, præsertim ex regno animalium petita, ut serum lactis, aqua & decoctum, nec non gelatina cornu cervi, in usum vocari debet. Ubi etiam diarrhœis, dysenteris, cholerae, calor febrilis associatur, identidem abstinendum ab acidis, refrigerantibus, & potius diluentibus, gelatinosis, mucilaginosi, adjecto pulveribus temperantibus & absorbentibus, uno vel altero nitri grano utendum. De quibus laudatissimis virtutibus pluribus videri potest, dissert. nostra de nitri usu, nec non ea, quæ observatio-

nes circa nitrum tradit.

§. X.

Intertia alterantium classe comprehenduntur INCIDENTIA sive ATTENUANTIA. Horum in censum veniunt radices: pimpinellæ albæ, ari, acori, asari, armoraciæ, enulæ, cichorii, tridis Florentinæ, ligilli Salomonis, vincetoxicis; herbar: arnica, beccabunga, cochlearia, nasturtium aquaticum & Indicum, piperitis, ros solis, fumaria, trifolium fibrinum, centaureum minus, hyssopus, scordium chærefolium, carduus benedictus, sedum minus, alliorum, porrorum & ceparum species: lignum guajacum & ejus cortex: aromata piper & zingiber; semina: sinapeos, co-

Incidentia.

chlea-

ehleariæ & nasturtii; gummata: ammoniacum, galbanum, sagapenum, opoponax, myrrha & benzoe; chymicæ & pharmaceuticæ confectæ: mercurius dulcis, æthiops mineralis, flores sulphuris, salia alcalia fixa & vegetabilium per incinerationem parata, speciatim sal tartari, absynthii, porro media, ut digestivum Sylvii, nostrum aperitivum, ammoniacum, polychrestum, Ebshamen se, Sedlicense, tartarus vitriolatus, terra foliata tartari, arcanum duplicatum, solutio oculorum cancri, nitrum & sal ammoniacum, volatilia, ut sal volatile salis ammoniaci, spiritus salis ammoniaci urinosus, oxy mei præterea squilliticum, tinctura antimonii acris, essentia gummi ammoniaci, piperis Indici, resina Guajacæ, sirupus nicotianæ, de erysimo, seculari aronis &c. Fontes quoque medicati, qui præter diluentem & aperitivam virtutem incidente etiam pollent, ut acidulæ Egranz, Sedlicenses, thermæ Carolinæ, nec non infusa theiformia, quæ propter copiosum aqueum elementum maxime vim suam attenuantem & coalescentes moleculas disjurgentem edunt, ac demum serum lactis dulce, quod ob dulce ac subtile quod custodit sal, deterfiva simulque ductus excretorios apertiente facultate splendet.

Theoremata.

Ex his nonnulla in fluidas, nonnulla in solidas corporis partes agunt. Quæ fluida immediato contactu afficiunt sunt perpaucas, idque non aliis quam diluentibus aqueis, quorum magna certe ad colliquandos glutinosos ac viscidos humores est efficacia, nec non salibus alcalinis fixis & volatilibus ac nitrosis, quæ præsertim in forma liquida aut humoribus spissis ac densatis admixta, eosdem vel ad oculum liquefaciunt atque attenuant, tribuendum. Reliqua omnia in solida operantur eorum tonum, robur, contractilitatem, vasorumque elasticitatem atque potentiam systolicam augendo, & intendendo, quo fit,

ut contentos succos validius premant, concutiant, motum progressivum citatiorem, & intestinum austiorem reddant, & fortius crebriusque sic trajecti per vasa capillaria tenaces & spisselcentes succi, in minores globulos, a quibus fluiditas pender, discerpantur ac dividantur. Hanc autem in solida actionem nonnulla sale acri fixiori exsequuntur, ut radices: ari, pimpinellæ albæ, asari, iridis Florentinæ, sigilli Salomonis: herbe: arnica, piperitis, ros solis, ipsumque piper & zingiber, quæ acuti quidem saporis, destillatæ autem cum aqua per vesicam, nec oleum volatile acre, nec aquam acris saporis largiuntur, sicque fixam suam testantur indolem. Vicissim alia effectum suum perficiunt sale acri subtili volatili, quorum e numero armoracia, enula, nasturtium, cochlearia, sinapi omniaque ceparum, alliorum & porrorum genera. Quædam agunt sale medio stimulantem, cujus indolis sunt salia illa neutra, quorum acrimonia & irritans facultas non solum sapore innotescit, sed etiam ex effectu, quo majori dosi oblata, alvum vel diuresin movent, patet. Alia sale acri multis particulis sulphureis imbuta, effectum edunt, quod obvium in gummi ammoniaco, sagapeno, opoponace, nec non guajaco & ejus resina: quæ præter sal acre, oleum quoque completi, destillatione, quo copiosum hoc fundunt, manifestatur. Aliqua demum sale penetranti subtiliori metallico operationem absolunt, uti est mercurius, inprimis dulcis, item æthiops mineralis.

Covollaria Practica.

I. Attenuantium, & incidentium virtus latissime patet, ut ob multiplicem quem præstant effectum, variis denominationibus passim insigniantur. Quod si enim tenaces & viscidum in corpore humores non modo in cavitatibus & vasorum alveis stagnant, sed & minimos vilcerum & emunctoriorum tubulos farciunt, & ob-

Q 4

struunt:

Arunt: hæc præsidia incidente & attenuante sua facultate impactos humores expediendo & obstructions reserando, apertientem præstant effectum, & ob id recte dici possunt apertientia. Merentur etiam nomen antiscorbuticorum, & sanguinem depurantium. Nam quia puritas & temperies succorum vitalium a legitima inutilium ac superfluum se, & excretionem dependet: hæc autem oppilatis ab humore spisso & viscido emunctioriorum & glandularum minimis canaliculis, intercipitur: facile patet, ea quæ lentos succos incidendi & obstructions removendi virtute polent, optima esse sanguinem depurantia, nec non adversus scorbutum præsidia, in quo humores maxime intemperati, & variis heterogeneis, viscidis, salis, sulphureis, acerbis particulis referti sunt. Quumque adeo diversum edant effectum, quæ cuique potissimum accommoda, sciendum.

II. In affectibus itaque ventriculi & primarum viarum, ad dissolvendas & incidendas viscidas cruditates egregie faciunt radix ari, pimpinellæ albe, calami aromatici, piper, zingiber, sal ammoniacum, depuratum, tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, sal digestivum Sylvii, nostrum aperitivum, sal absinthii, spiritus salis simplex, vel purificatus, nec non tinctura aperitiva Meibii. Et si per alvum simul crudi, & male cocti fusi, exturbandi, præstans utique virtus est salium mediogum, in primis salis Sedlicensis, Ebshamensis & polychrestii, pleniori dosi & cum sufficiens aqueo vehiculo propinatorum.

III. Ubi humores viscidi in pectoris affectibus resolvendi & per scripturam rejiciendi, commodissimam locavit opem, radix enulæ, iris Florentinæ, ros solis, hyssopus, scordium, capillus veneris, gummi ammoniacum, myrrha, benzoe, sulphur, balsamum Peruvianum, nitrum antimoniatum, terra foliata tartari, oxymel squillicum, solutio lapidum cancrorum

cum aceto destillato, sirupus nicotianæ, nec non de erysimo.

IV. Quando spissa & tenaci impuritate sanguis infectus ac inde emunctoria oppilata & dyscrasia falso-sulphurica scorbutica humores conspurcati, apprimè ex usu sunt, radix armo-raciæ, cochlearia, nasturtium aquaticum, Indicum, piperis, beccabunga, centaureum minus, trifolium fibrinum, carduus benedictus, fumaria, sedum minus, sinapi, gummi ammoniacum, sagapenum, myrrha, liquor nitri fixi, oleum tartari per deliquium, solutio nitri, elixir nostrum temperatum, tinctura antimonii, essentia lignorum, spiritus salis ammoniaci, sal absinthii cum succo citri, nec non ex aquis medicatis Sedlicensis & E-grana.

V. Quando sanguis congruatus post contusiones & suffusiones dissolvendus iterumque fundendus, eximia laudem meretur radix sigilli Salomonis, herba arnicæ, chæresfolii, acetum destillatum cum lapidibus cancrorum, terra foliata tartari, nitrum antimoniatum.

VI. In moechis ubi lymphæ spissitudinem contraxit, maximeque a misfmate venereo, palmam ferunt guajacum, saponaria, tinctura antimonii acris, mercurius dulcis & æthiops mineralis qui prudenter usurpatus, ad lentos in glandulis & hepate obhærescentes succos colliquandos, & resolvendos, luccus est longe præstantissimus.

§. XI.

Accedit quarta alterantium classis, continens EMOLLIENTIA & DEMULCENTIA. Hæc inter eminent radices: altheæ liliorum alborum, liquiritiæ, scorzonæræ, herbæ quinque emollientes, lactuca, branta ursina, parietariæ; flores: sambuci, meliloui, malvæ, verbasci, millefolii, chamomillæ vulgaris, liliorum alborum, borraginis, papaveris rheados, tiliæ, acaciæ, violarum & maxime omnipium crocus; semina lini, sænu gra-

Branta
ursina

ei, anisi, cydoniorum, psylli, papaveris albi, quatuor frigida majora & minora, siliqua, amygdalæ dulces, ficus, pineæ, pistacæ, gummi cerasorum, Arabicum, tragachantha, rasura cornu cervi & ejus gelatina, axungia humana, canis, canis, caponis, medullæ ossium, pinguedines circa omentum, ossa & mesenterium, olea nativa animalium, butyrum recens, lactis cremor, lac ipsum saccharum lactis, sperma ceti, mel, vitellus ovi, ejus albumen exsiccatum & in pulverem redactum. Ex præparatis oleum amygdalarum dulcium, lini, raparum, momordicæ, decoctum cornu cervi citratum & scorzonæ citratum, pitilana, serum lactis dulce, sirupus dialthæ Fernelii, unguentum dialthæ, emplastrum diachylon simplex, de meliloto, spermaris ranarum.

Theoremata.

Virtus horum remedium duplex est, solidis, vel fluidis dicata. In solidis quidem hanc ita exsequuntur, ut rigidas, duras ac tensas fibras laxent, molliant easque mobiles & flexiles reddant, simulque adductos per stricturas minimorum vasorum alveos amplient atque dilarent: in fluidis vero viscida sua mucilagine præstringunt, involvunt & quasi capsulæ includunt acies & spicula salium acrium rodentium, & sic quam optime demulcent. Exterius autem applicata, humorem vasorum alveis elapsam, nec amplius resolvendum, aut per lymphatica vasa resorbendum, in pus convertunt, ita quidem, ut dissecto per calorem temperatum subtilissimo liquido, remanens viscosa materia, obliteris blande poris, ne nimium humidum exhalet, & prolepto majore succi nutritii, ex quo pus maxime constatur, per relaxatos tubulos affluxu, ad coctionem & maturationem traducatur.

Corollaria præctica.

I. Maxime hæc demulcentia sunt efficacia, si venenum causticum af-

sumtum, & vix sane melior datur hic antidotus, ad pernicipalem toxicum ex animalium, vegetabilium & mineralium censu vim cicurandam & infringendam, lacte præsertim & pinguedinibus copiose ingurgitatis, quæ non modo acerrima venenorum spicula obtundunt atque involvunt, sed & contractas per virus a validissimo spatio membranas laxant, & hac ratione veneni evacuationem, sive per vomitum, sive fecesum, adjuvat.

II. In omnibus longis morbis & valentibus, præsertim qui ab acrimonia humorum ortum reahunt & nervis potissimum insident, simplicissima hæc emollientia in infusis & decoctis oblata, usum præstant longe saluberrimum. Sæpius certe convulsionibus infania stipatas & scorbuticas artuum tractiones cum acerbis ventris torminibus, curatas novi decoctis, ex radice pæoniarum, althææ, herba malvæ, parietariæ, branæ urinae, floribus verbasci, liliorum alborum, sambuci, borraginis, chamomillæ, papaveris rhæados, scibub & semine leniculi, cum aqua vel fero lactis paratis, largiori tamen ac diuturno usu, & adjecto interdum uno vel altero cochleari olei amygdalarum dulcium & interposito balneo ex aqua dulci cum lacte remixto.

III. Axungie & pinguedines animalium recentes, maximeque ossium medullæ, quæ subtilissimam recoidunt pinguedinem, in scorbutica acri humorum diathesi interne cum fructu usurpantur.

IV. In aridura partium & ubi articuli vix sine strepitu moveri possunt, nec non in doloribus arthriticis, eadem demulcentia, ut radix scorzonæ, flores sambuci, millefolium, chamomilla vulgaris, semina quatuor frigida majora, inprimis vero serum lactis dulce, pinguiculis cremoris partibus adhuc refertum, vel etiam pinguedines cum quodam alcali in lapidis texturam redactæ, mirabilem præstant effectum, sed opus est, ut pin-

pinguia hæc jejuno ventriculo, non adeo magnis, sed repetitis dosibus assumantur, superbibendo haustum calidum convenientem.

V. In exulceratione renum & missione cruenta, quæ ob acredinem humorum quandoque incidit in variorum morbum, gummi ceraforum, vel etiam tragacantha, aut albumen ovi siccatum, in fero lactis mista, præstabilem locant opem. In pectoris vero affectibus, ad acredinem tussis causam obtundendam & materiam ad evacuationem præparandam, specifica quasi virtute laudantur decoctum avenaceum, sperma ceti, liquiritia, oleum amygdalarum dulcium, siliqua dulcis, laccarum lactis, crocus, ficus, sirupus violarum, flores papaveris & sambuci.

VI. Hecticus jugis si affligit calor & succi dulces continua lenta febre acrimoniam falso-alcalinam contrahunt, in cremore lactis & butyro recenti, ob demulcentem effectum, egregia reconditur virtus.

VII. Pariter in cholera, dysenteria, scorbuto, atrophia scorbutica, phthisica & ubicunque acredo succorum in vitio est. decocta gelatinosa, carni, ossium, præsertim cornu cervi, item pedum vituli & vervecis, tam interius pota, quam exterius ano mediante clystere infusa, eximii sunt usus.

VIII. Quando intestina infesta detinet strictura, & alvus cum flatibus retinetur, egregium præstant effectum emollientia ac demulcentia, ut oleum amygdalarum dulcium, serum lactis, decoctum avenaceum, cornu cervi; non tam per os assumta, quam potius per clysterem inferius injecta.

IX. Flores & herbæ emollientes, si admixto croci momento decoquantur & vesicæ inclusæ dolente interna parte exterius applicantur, ut in pleuritide, hepatitide, colica, vel ano in dolore ex hæmorrhoidibus cæcis, conspiciunt torminum conciliant levamen.

X. Quando humor quidam extravasatus & impactus in pus convertendus, egregie inserviunt linimenta & cataplasmata ex pinguedinibus emollientibus & lacte parata, & maxime quidem floribus & foliis liliorum alborum, croco, ficubus, cepis tostis, farina fabarum, vitello ovi ac melle; abstinendum vero ab his, ubi in induratis & scirrholis partibus materia continetur ac in pus converti nequit, nisi funestam ciere velimus putredinem.

XI. Mucilagines, quæ ex semine cydoniorum & psyllii cum aqua rosarum vel spermatidis ranarum conficiuntur, in erosis atque exulceratis partibus, quibus dolor & ardor jungitur, ut aphthis ulcerosis faucium, cæcis & dolentibus hæmorrhoidibus, tenesmo, dysenteria, gonorrhœa, vel fluore albo erodente, præsentaneam sæpe ferant opem.

C A P U T V.

De evacuantibus.

§. I.

Evacuantium operatio occupatur maxime circa humores, qui copia in vitio sunt, eamque ob causam in sanitatis tutelam vel naturæ motibus, vel his non sufficientibus, aut plane deficientibus, artis ministerio, per congrua emunctoria expelli debent. Jam vero vitiosi succi non unius ejusdemque naturæ, crasseos atque texturæ, nec etiam excernicula per quorum emissaria quilibet exturbandus, ejusdem structuræ atque dispositionis sunt; ideoque etiam instrumenta quibuscum eorum expulsio adornatur, varia erunt ac multiplicia. Scilicet quæ stabulam in ventriculi & primorum intestinorum cavo vitiosam saburram superius per os eliminant, emetica, quæ ex inferiori canalibus alimentaris regione per ani secesum, laxantia aut purgantia, quæ per tubulosum cutis emunctorium, diaphoretica & sudorifera, per renale cri-

Evacuantes tam sunt, quam variæ.

cribrum & ufinarias vias, diuretica, per glandulas & ductus salivales, salivantia, per asperam arteriam ex thoracis cavo, expectorantia, per narium & faucium glandulosam substantiam, errhina, sternutatoria & apoplegmatica, ac denique quæ ipsum superfluum sanguinem evocant, emmenagoga & hæmorrhoides cientia vocantur. Sed de singulis jam seorsim.

§. II.

Primum inter evacuanda locum obtinent EMETICA sive VOMITIVA, quæ duplicis sunt generis, mitiora scilicet, vel fortiora. Lenioribus accensenda merito aqua simplex tepida, adjecto pauxillo salis & portione mellis, vel olei expressi aut pinguedinis, vel decocta cum semine vel cortice raphani rusticani, aut semine anethi, vel etiam aqua thermalis, simul & semel largis haustibus copiose ingurgitata. Validiorum in numero ex vegetabilium classe sunt folia & radix asari, helleborus albus, succus corticis medii sambuci, immo omnia cathartica validiora majori dosi data, nec non quæ ab exteris asportantur gummi guttæ & radix hypecuanhæ; ex metallorum mineralium familia, quæ veneræ prosapix, ut vitriolum cyprium, album, Gilla Paracelsi & Angeli Salæ, ex capite mortuo olei vitrioli Goslarientis, quod veneræ indolis, crystalli viridis æris, sal emetico-diaphoreticum Mœbii, ex vitriolo Goslarienti & nitro anaticis partibus paratum, nec non quæ ad regulinam stibii substantiam ortum referunt, ut tartarus emeticus, vitrum antimonii & ex eo parata aqua benedicta Rulandi, mercurius vitæ, maxime ex butyro antimonii rectificato cum præcipitatione aquæ simplicis, vel olei tartari per deliquium confectus, pulvis Monckii, ex duabus partibus reguli antimonii martialis & una nitri paratus, sulphur sic dictum auratum antimonii, idque correctum, panacea sic dicta Glaube-

riana, Conerdingiana, ad grana quinque vel sex oblata.

Theoremata.

I. Mitiora emetica & maxime digestica a Galeno & veteribus potissimum sunt usurpata, quippe quæ admodum secura & ut plurimum copia sua, nonsecus ac clysteres ex iisdem ingredientibus concinnati, intestina, ventriculum, in primis jam debilis & ad motum excretorium, teste nausea, ructibus, oris amaritie, anxietate, proclivis est, ad vomitum exsolicitant: sed non agunt ultra limites ventriculi, ex quo utique humores crudos, pituitosos & biliosos ex male ingestis & digestis collectos non sine fructu evacuant.

II. Emetica validiora tenuissima sua caustica salino-sulphurea acrimonia, exigua etiam dosi, non modo in tunicam ventriculi & intestinorum nerveam eam spasmodice convellendo agunt, sed & si paullo majori dosi præbentur, ultra stomachum, in ductus maxime nervosos bilarios, item in glandulas intestinorum, mesenterii, pancreaticas ipsæque hepares penetrant & proleptos ex his biliosos & salivales humores expellunt, quandoque vero, si universum genus nervosum afficiunt, hostiliter etiam agunt & gravissime nocent.

Corrolaria practica.

I. Veteres albo veratro, ceu summe drastico, emetico scopo utebantur, ut auctor est Celsus lib. 2. cap. 13. & quidem in comitiali morbo, in infania & in valentibus aliis morbis sine febre, sed idem perite monet, ut ante hujus pharmaci usum corpus probe humectetur. Nostro vero tempore, quo habemus feciora, merito a violento hoc medicamine abstinemus & ex supra recensitis tantum ea feligimus, quæ naturæ & nervosis partibus crali & textura sua non adeo inimica, nec cum ancipitis periculi metu propinquant. Hæc inter primo loco merito connumeranda radix illa Americana Ipecacuanha, ad drachmam

nam dimidium & ultra oblata, quæ præter salinum subtile acre principium, etiam balsamicum ac roborans custodit, & id peculiare plane servat, ut omnium celerrime operationem suam exsequatur, eaquepropter ubi periculum in mora & prompte vomitus ciendus quam optime adhibetur. Et quoniam vomitu invertitur in ventriculo motus peristalticus deorsum tendens, per consensum etiam in intestinis, si in diarrhæa vel dysenteria nimis intensus est, sufflaminatur & alvi fluxus ad tempus sinitur; unde *Celsus lib. 1. cap. 3.* recte perhibet: vomitum ventrem solutum comprimere, compressum solvere, Ipecacuanhæ commodissime substituitur asarum, cujus radix & folia pariter subtili, acri volatili, caustico elemento, quod coctione prompte exhalat, simul quoque roborante & balsamico possent, & in febre antiqua quartana, tertiana, hydrope, ictero egregium suppeditant auxilium. Ex antimonialibus præferendus tartarus emeticus, ex croco metallorum, non vitro antimonii, qui duplo validior, præparatus, qui vel solus ad tria aut quatuor grana, vel refracta dosi cum radice Ipecacuanhæ mixtus, egregie suum facit officium; & si qui effectum emetico-purgantem desideret, decocto mannæ duo vel tria tartari emetici grana adjici poterunt. Pariter usui esse potest panacea Glauberiana, ad quinque vel sex grana cum cremoris tartari scrupulo oblata, nec non in asthma pituitoso interdum oxymel squilliticum, ad duas vel tres uncias datum. Emeticis vero venereis, quorum vis constringens gravior & diutius exagitat nervos ventriculi & aliarum partium tunicas, item pulveribus istis regulinis antimonii, pulvere Monckii, vitro antimonii, mercurio vitæ, quæ infidæ operationis, & vel fortissime, vel insufficienter operantur, pro majori vel minori humorum in ventriculo dispositione, carere & tutius ab

his abstinere possumus In Medicinâ

II. Non modo utilis, sed & quandoque admodum necessarius est emeticorum paullo valentiorum usus, ad venena, præsertim quæ narcoticæ sunt indolis, item miasmata, quæ ex contagiosis & malignis morbis decumbentibus exhalant, in ventriculum descendunt, ibique humoribus fermentantibus sese insinuant, cito, ne ad penetralia serpant expellenda. Pari ratione ad humores ex commixtione heterogeneorum ingestorum, bilis humorumque fermentantium salivalium prodeuntes, corruptos & valde vitiatos, qui in ventriculi & intestinorum, præsertim duodeni, cavo stagnant, mora corrumpuntur & frequentissime febri lentæ quotidianæ, quartanæ, item tussi chronicæ, nec non gravioribus morbis capitis, melancholiz, hemictaniz, quandoque etiam comitiales, item apoplexiæ, ortum præbent, exturbandos, efficaciter agentia ex usu esse possunt.

III. In morbis qui a bile spissa, in gypseum sæpe & viscidum coagulatum abeunte & ductus biliaris obstruente oboriuntur, ut ictero tam flavo, quam nigro, cachexia aliisque, emetica non sine fructu, reliquis aliis nihil juvantibus, propinquantur, eosdemque, exturbata biliosa copiosa setina, felicissime abigunt.

IV. In anarcar, leucophlegmatia, tumoribus partium cedematosis & ascite curabili, emetica paullo majori etiam dosi data, vehementer quidem ex ductibus & glandulis intestinorum, mesenterii, pancreatis, hepate serum aquosum eliciunt ac per inferiora, rarius vero superiora, eiciunt.

V. In orani accessione & paroxysmo febrili, inflammatione ventriculi, vel ubi stomachus spasmodice afficitur, ut in cardialgia, item vehementi ira, in spasms hysterici, hypochondriaci & ubi ad hæmoptysin, nimium mensium vel hæmorrhoidum

Ruxum, dispositio præsto est, item ubi morbi a congestione humorum ad caput orti sunt, uti apoplexia, paralytis, auditus vel visus deperditus, vertigo, nec non ubi dolores atroces urgent, vomitoria plane exulcent, nec unquam etiam plethoricis, nisi plethora per sanguinis missionem soluta, nec quibus intestina fecibus infarta & alvus obserata, quam his prius expurgatis, exhibeantur.

VI. Præstat semper emetica ad faciliorem operationem in liquida forma, vel etiam cum sufficiente vehiculo humectante & relaxante pingui offerre; siquidem vomitio non tantum validiorem pylori & fundi ventriculi constrictionem, sed simul etiam relaxationem orificii superioris oesophagi, desiderat.

VII. Sub emeticorum operatione & post eam abstinendum ab omni refrigeratione, frigido potu, ab omni commotione animi, ab omni calidiori & stimulantе medicina, acri & salso cibo, ac porius demulcentibus cibisque boni succi & qui facile solvantur, utendum. Inprimis apprimè ex usu est lac asininum, si haberi potest, tres vel quatuor horis post ad aliquot uncias potare. Et quæ plura hanc in rem ex instituto tradidi in *disertatione de cauto & præstantissimo vomitoriiorum usu*.

§. III.

Al. Lo. Emeticis succedunt ea, quæ perin-
asilia. feriora vitiosam materiam eliminant, quæ pariter duplicis sunt generis, vel leniora, vel validiora. Inter ea vero quæ alvum clementer, tuto & sine stomachi & systematis nervosi læsione movent, & Latinis LENIENTIA & LAXANTIA, Græcis ecoprotica vocantur, præcipuum locum tenent, ex vegetabilibus manna, rhabarbarum, cassia; agaricus, tamarindi, folia fennæ, aloë, baccæ spinæ insectoriæ, passulæ minores, polypodium, flores persicorum, acaciæ, violarum earumque semen: ex salibus culinare, borax, & nitrum, item

ex fontibus mineralibus, ut Ebshamense, Egranum, Sedlicense, nec non ex Carolinis paratum: ex animantium regno lac, præsertim asininum, serum & saccharum lactis; ex præparatis chymicis terra foliata tartari, tartarus vitriolatus, cremor tartari, sal ex alumine & sale tartari concinnatum, sal essentiale acetosellæ, magnesia, sal polyehrestum, aurum fulminans, mercurius dulcis, si benzoës; nec non composita, ut pilulæ de succino Cratonis, aleocephalinæ, marocollinæ, tartareæ Schröderi, essentia, extractum & sirupus rhabarbari, sirupus rosarum solutivus, aqua laxativa Viennensis, elixir purgans Thomsoni.

Theoremata.

Laxantia hæc placide, sine magna commotione & labefactione motus peristaltici ventriculi & intestinorum non modo sordes alvinas, sed & quando liberalius propinantur, ex intestinorum glandulis serum satis largiter evehunt. Neque tamen sale acri subtili caustico, nervosis partibus inimico, ut purgantia, operationem suam perficiunt, sed substantia plane innocenti, quæ vero tenuissimæ salinæ stimulantis indolis est, & haud secus quam emeticorum & purgantium, diuturna coctione avolat & perit, ut patet exemplo mannæ, rhabarbari, aloës, foliorum fennæ, quæ ea propter rectius infunduntur, quam decoquantur. Sigillatim vero agunt hæc laxantia vel principio quodam salino stimulantе dulci, ut manna, cassia, passulæ, polypodium, vel sale quodam subtiliori sulphureo amaricante terreo, ut aloë & rhabarbaro; vel sale acido fibras vellicante, ut tamarindi, cremor tartari, sal acetosellæ; vel sale neutro, ut nitrum, borax, sal gemmæ, digestivum Sylvii, arcanum duplicatum, tartarus vitriolatus, salia ex medicatis aquis producta & herbarum essentialia; vel sale quodam calcario amaricante, ut Sedlicense, Ebshamense, Egranum; vel

vel denique terra calcarea, ut magnesia, quæ ab acido primarum viarum soluta, in sal neutrum acre & stimulanstrahit.

Corollaria practica.

I. Polychresta hæc & præstantissimè multis in morbis usus simulque tutissima laxantia medicamenta, quæ nonnullis ob id benedicta audiunt, Veteribus parum cognita fuerunt, in quorum monumentis aloes, rhabbari, tamarindorum, foliorum sennæ, agarici, nulla, quantum quidem novi, fit mentio, sed cassiæ tantum & polypodii ex mitioribus, ac primus *Dioscorides* aliquid de rhabbaro & aloë prodidit, ex quo deinde *Plinius* & *Galenus* quæ habent desumserunt, manna vero, tamarindi & folia sennæ, Arabibus & Egyptiis Medicis demum innotuerunt. Utut vero omnium laxativorum virtus in eo conveniat, quod sine noxa, impetu ac commotione alvum subducant: pro differentia tamen morborum, vel etiam individvorum, utique distinctio circa eorum usus utilis & necessaria est. Scilicet manna, cassia, passulæ, polypodium, in affectibus pectoris, tussi, hæmoptysi, pleuritide, phthisi, neque minus in morbis, quia sero falso, acri, scorbutico nascuntur, ut arthritides, rheumatismi, scabies, purpura, cum insigni fructu adhibentur aliisque merito præferri debent, quippe quæ non tantum alvinas fordes emovent, verum etiam simul acrimoniam salis temperant & corrigunt. Acidula, ut tamarindi, cremor tartari, sal acetosellæ, item salia essentialia ex herbis nitrosis, sal polychrestum, nitrum antimoniatum, in regionibus præcalidis, corporibus cholericis atque tempore æstivo, neque non in morbis ubi copiosa bilis delinquit & vehementior æstus præsto est, tertiana continua, duplici, æstiva, in casu, cum inexhausta siti, quam maxime conveniunt & aliis anteposenda, eo quod præter facultatem vacuantem,

motum quoque intestinum partium sulphurearum sanguinis & bilis serociam componunt & cicurant. In morbis qui ex defectu bilis & sulphuris in sanguine balsamici nascuntur, ut sunt cachexia & omnes fere chronicae passionis, in quibus succorum spiritusudo & viscerum infarctus adfuit, laxantia amara, ut rhabbarina, aloetica correctæ, omnibus utique palmam præripiunt. Ubi vero humores tenaces, visceri in vitio sunt & primam regionem occupant, ac inappetentiam, tensiones hypochondriorum, ructus, flatulentias causantur, salia omnia neutra, tam arte chymica præparata, quam nativa fontium medicatorum, si paulo majori in dosi & cum sufficienti liquido offeruntur, efficaciter alvum solvunt & recrementa spissa & viscida everrunt. Quando acidum, ut solet fieri in hypochondriacis, melancholicis & quartanariis, nimium redundat & omnium aliorum, etiam acriorum, purgantium virtutem infringit atque eludit, præter mannata, magnesia apprimè ex usu est, quæ sicuti a spiritu vitrioli ex toto solvitur, atque in sal neutrum amaricantis saporis & virtutis purgantis transit, eandem pariter, si in ventriculo offendit acidum, induit naturam atque efficaciam, contra ea deficiente in corpore solvente succo, parum vel nihil operatur, & plus incommodi, quam commodi creat.

II. Aurum fulminans & mercurius dulcis inter laxantia quidem referri solent, sed eorum usus certe non adeo tutus est. Nam si illud penitus edulcoratum fuerit, parca vel plane nulla ejus operatio; si vero salinonitrosis spiculis adhuc uberius referretur, quia ob gravitatem suam firmiter in hærescit parti ventriculi & intestinorum, alvum quidem movet, sed in sensibilibus subjectis atrociam tormina cum flatulentis, aliaque mala parit, quin magis nocet, ubi humorum acido-corrosivorum, vel bilis

cauſtica, in ventriculo aut duodeno copia hoſpitatur. Mercurius autem ſic dictus ductus, qui ſolus, niſi aſſocietur purgantibus, non facile purgantem exſert effectum, acceſſu vero bilis corrolivæ in duodeno, deleteriam facile rurfus induit indolem, ac generi nervoſo vim ac læſionem inſert. Et licet ad enecandos & expellendos vermes paſſim commendetur; nihilominus tamen quum infantibus mercurialis admodum ſint inimica, atque ego ſubinde gravem noxam & ingrem debilitatem ea attuliſſe obſerverim, non facile, niſi ſumma cautione & ſub certa methodo certoque regimine eorum uſum hoc quoque ſine ſuaſerim. Plures porro ad acuendam vim auri fulminantis purgantem admſcere ſolent ſalia neutra, ut arcanum duplicatum, tartarum vitriolatum, nec negandum ejuſmodi ſal ad drachmam dimidiam cum duobus granis auri fulminantis ſic contritum, metallicum quandam ſaporem nanciſci & quoque inreſtina ſtimulando ſedes movere, rariuſtamen ſine torminibus ſuccedat effectus. Longe magis vero cavendum, ne mercurius dulcis cum ſalibus, præſertim alcalino vel ammoniacali, attritu ſubigatur, eo quod hac ratione ejus vis corroſiva reſciſcitur, qua agit in glandularum & nervoſarum partium ſyſtema & moleſtiſſimam ſæpe movet ſalivationem.

III. Omnia ſalia, præſertim neutra & amaricantia ſuperius recensita, majori doſi ad unciam dimidiam, vel unam cum ſufficienti liquido ſoluta & exhibitæ, inſignem vim alvum vacuantem, ſine commotione ſanguinis, vel appetitus & virium proſtratione obtinent, & longe tutius, immo majori cum efficacia, iis utimur ac validioribus purgantibus ex regno vegetabilium; præſertim in morbis & corporibus ubi humorum ſpiſſorum & tenacium copia, vel in primis viis, vel in vaſis deſiſceſcit. Atque etiam fontes medicati, calidi & frigidi, qui

acidularum nomine veniunt, quorum magna certe in morbis longis & valentibus cum arcendis, tum depulſandis eſt efficacia, vim ſuam aperientem, deterſoriam purgantem, præter aqueum, ad ſalinum potiſſimum quod recondunt elementum reſerunt, uti id a me latius variis diſſertationibus in tom. 2. opusculor. phyſico-medicarum collectim editis, expoſitum eſt.

IV. Inter flores qui laxantè facultate pollent, acacie, perſicorum, violarum, roſarum eminent, ſed recentes ſint & tantummodo inſundantur, non coquantur. Optime hi exhibentur cum ſero lactis dulci, vel lacte aſinino, tempore præſertim verno, & ita quidem, ut per aliquot hebdomades medicata ejuſmodi porio mane ad meſuram dimidiam ad purificandum ſanguinem, inprimis li corpora teneriora & ſenſibilioris nature, potetur. Habet enim ſerum lactis & lac quoque aſininum jam tum vim quandam laxantem, ut etiam auctor eſt Celfus lib. 2. cap. 12. ita diſſerens: *ſunt valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit. Antiqui pergit paulo poſt, lac vel aſininum, vel bubulum, vel caprillum, ſumebant, eique ſalipauxillum adhibebant decoquebantque id, & ſublatis hiſ quæ coiverant, quod quaſi ſerum ſupererat, bibere cogeant.*

V. Ex aloë, ſive hepatica, ſive Socotrina, præparata laxativa magnè efficacia ſunt prædicta, ſi probe prius a principio ſulphureo volatili, valde peregrino & a reſina tenaciter inſeſſorum tuniciſ adhærente debita emchireli ipſa liberetur, & non in magna, ſed reſtracta & exigua doſi, cum extractis amaris & temperatis baſmâicis ingredientibus miſceatur: quo nomine utique pilule, caſu forſan a Becho inventæ, & ſecundum ejus methodum ex aprioribus concinnatæ ſpeciebus, utique commendationem merentur, ſine non ſolum blandiſſimum movendi, ſed & inſoſinorum

tonum, qui plurimis in morbis labe-
factus & a purgantibus etiam lædi-
tur, firmandi. Et ut tales pilule
in corporibus robustis & sanguine
abundantibus parum efficiant, eo præ-
sentior tamen earum virtus in natura
& a morbo infirmis, imbecilibus, in
puerperio & quando ex uteri vitio
menstrualis purgatio non recte succe-
dit. Conveniunt quoque ubi digestio
a morbo quocunque etiam convale-
scentibus vacillat, ad crudos succos
corrigendos & evacuandos, item in
hypochondriacis, quorum ventricu-
lus jugiter excludit cruditates acidas.
Contra ea aloetica incorrecta & ma-
jori dosi data magnopere commovent
sanguinem, eamque ob causam,
plethorici, sensibilibus naturæ & in
sanguinis excretiones proclives recte
ab iis penitus ablinent, quia id in-
commodum proprium servant aloeti-
ca præpostere data, quod hæmorrhoi-
des cæcas molestissimæ sensationis ex-
istent & sanguinem ad regionem lum-
barem & partes in pelvi contentas ur-
geant. Inter pilulas autem quæ aloem
cum aliis aptis ingredientibus habent,
præter Becherianas, tartareæ Schre-
deri, aleophanginæ, marocostinæ,
de succino Crationis, Solenandri, usu
& utilitate sua non defraudandæ.

§. IV.

Longe efficacius autem & validius
alvum vacuant PURGANTIA; eo-
que nomine ex vegetabilibus potissi-
mum innoverunt radices; mechoa-
canna alba & nigra, sive jalappa,
helleborus niger & albus, iris nostras,
bryonia, esula, herbæ soldanella,
gratiola, linum catharticum Angli-
canum, pomum colocynthidis, gra-
na tilli, semen cataputæ, turbitus
vegetabile, cortex medius sambuci,
pæc non gummi guttæ, elaterium &
scammonium, unacum iis, quæ ar-
tis pharmaceuticæ ministerio ex his
congiunguntur, trochisci althandæ, ex-
tractum colocynthidis, esule, pan-
chymagogum Crollii, resina jalap-
pæ, diagrydum sulphuratum, pul-

vis Cornachinus, sive Comitæ de
Warwich.

Theoremata.

Elementum quocumque drasticæ hæc
pharmaca operationem suam perfici-
unt, est utique virulentæ indolis ac
tenuissimum sal causticum inflammato-
rium, quod nervas non solum ven-
triculi & intestinorum, sed etiam
universi corporis membranas, exili
etiam dosi, haud secus ac venenum,
adoritur, in easdem cum violentia
agit & spasmodicas contrictiones, præ-
cordiorum anxietates, cardialgias,
ventris tormina, cum crebris deje-
ctionibus, singultus, ventriculi &
intestinorum inflammationes, cum
extremorum frigore, immo convul-
siones, excitare solet. Nam summæ
tenuitatis & activitatis esse ac in uni-
versam humorum massam suam vim
diffundere sal quod purgantia hæc
recondunt, ex eo patet, quod infans
ex lacte nutritus, quæ purgans assu-
mit purgetur, & iidem exterior tan-
tum applicatis, purgans validissimus
& perniciosus quandoque subsequatur
affectus. Sic Veteres pedes decocto
hellebori lavantes, se purgabant, ut
habet *Heurnius in comment. in aph.*
Hippocratis. Globulum ex helleboro
fonticulo ad mundificandum imposi-
tum & vomitum & sedes movisse au-
ctor est *Walsus de meth. med. pag.*
124. Unguentum quoque quod habet
colocynthidem umbilico illitum, pur-
gat non modo infantes, sed & adultos.
Caustica vero & inflammantis virtu-
tis catharticonum indoles ex eo claris-
sime patescit, quod exterior tantum
applicata, cutim instar velicatorii
adurant & vesicas excitant, lac esulæ
verrucae consumat, & essentia eo
purgantibus, ut jalappa, mechoacanna,
scammonio extracta & deglutita urat
& arrodit fauces cum œsophago,
aphthasque & pustulas ardentes pro-
ducit. Et certe virulentam ac vene-
ni æmulam drasticonum esse faculta-
tem, *Wepseri* experimenta uberrime
evincent, qui in tract. de cicuta

aqua-

agnatica memorat : se catellis varii generis purgantia certa dosi ingessisse, eoque facto, mox vomitus, convulsionem ac demum mortem successisse, factaque postea sectione, ventriculorum & tenuium intestina inflammata & maculis rubicundis, non secus ac arsenicum datum fuisset, conspersa comparuisse. Et quod memoratu dignum, eadem phenomena, eosdemque effectus, a resina jalappæ, cujus usus nostris temporibus frequens admodum est, observari, idem auctor concepris testatur verbis.

Corollaria practica.

I. Quum itaque tam vehemens, periculosa, quin damnosa acriorum & valiniorum catharticonum sit actio rectius omnino ab eorum usu prudens, rationalis & circumspexit Medicus penitus ferme abstinere. Certe experientia testimonio uberius constat : a quo per omnia secula pharmaco majorem perniciem, immo tam funestos effectus, productos fuisse, quam per minus provide data drastica, ut vel ego, ex quo a quadraginta quinque & quod excurrit annis medicinam exercui, innumera fere observavi exempla eorum, qui solis purgantibus fortioribus immedicabilem noxam sibi contraxerunt, vel plane occubuerunt. Neque etiam ullum aliud ex remedium pharmaceuticorum suppellectile tam celeriter ac potenter vires prostermit, pulsum immutat, stomacho infestum est ejusque & intestinorum naturale robur, & motum lædit atque pervertit, quam acre ejusmodi pharmacum. Plures novi, qui crebriori horum usu morbum cachecticum, hydropicum & hypochondriacum nacti sunt, qui lethalem inflammationem ventriculi cum febre, dysenteriam & cholericam passionem incurrerunt, quin paralytin dextri vel sinistri lateris experti sunt. Id quod tamen fufius jam evolvi & rationibus demonstravi exemplisque ex auctoribus collectis confirmavi in *differt. de purgantibus fortioribus* e foro

Tom. III.

medico ejiciendis. Veteres quidem, quibus clementia laxantia maxima ex parte uva cum salium usu erant ignota, frequentius his drastici usu sunt, impleque Hippocrates elaterio potissimum atque helleboro purgationes molitus est; sed si eorum scripta curatius perlustramus, nonnisi necessitate urgente ea propinarunt, & tum quidem provido certe consilio, & ante, & post elaterium, cui plurimum deserebant, lac potui præbuerunt, helleborum vero admixtione multum, olei, vel lactis cicuraverunt, medicam ipsos non promiscue eadem in usum traxisse, sed morbos curate distinguisse, & Hippocratem maxime lib. de purgant. in omni febre & inflammatione eorum ulum serio interdixisse. Quia peritissimos in arte priscos damna ex purgantibus neutrquam laqueasse, uberius testantur reperiunda passim in eorum monumentis præcepta atque effata. Luculentis certe verbis testatur hoc facit Sect. 2. aphor. 57. Ita habens: qui sunt sano corpore dum purgantur, celeriter exsolvantur, & Sect. 4. aphor. 16. purgationem periculosam pronunciat iis, qui sunt integra valetudine. Cujus aphorismi veritatem Heurnius demonstraturus addit: vidi sanos, quos in perniciem iraxit solum simplex apozema purgatorium ex summatia cum fenna solius, temere exhibitum. Neque minus Celsus lib. 1. cap. 3. inculcat: purgationes, ut interdum necessaria, sic ubi frequentes, periculum afferunt. Et lib. 2. cap. 12. ita scribit: *medicamenta, (intelligit purgantia) stomachum fere laedunt & hominem infirmant, & nunquam in adversa valetudine recte dantur, nisi morbus sine febre sit.* Eadem Dioscoridis est sententia, qui lib. 4. cap. 178. prodidit: quod stomachum offendant eademque supra modum adverstentur. Præ omnibus tamen graphice & copiose de purgantium venenata qualitate & noxa egit Campegus in peculiari libello: ut mittam Helmontium

R

ejus-

ejusque sequaces, nec non *Benetkoe*, purgantia mortifera plane appellasse, & *Montanum*, *Cratonem* & *Solenandrum*, peritissimos ac in arte versatissimos viros, eorum usum mirum reformidasse & pilulas ex extractis amaris, gummatibus & aloe in usu habuisse frequentissimo. Inprimis vero quam maxime perniciosa atque insensibilis est ejusmodi drastica corporibus infirmis, infantibus, senibus, a morbo vix convalescentibus, quique valde imbecillum stomachum ac ad motuum ataxiam proclive nervosarum partium systema obtinent. Neque etiam ulla infestior medicina reperitur in cholerica & sensibilibioris naturæ hominibus, post gravem iræ affectum, ut plures hac ratione sublatos viderim, inflammatione ventriculi unacum cholera subsequuta. Qui colica hæmorrhoidali & spasmus hypochondriacis atque hystericeis patient, omni etiam cura hæc drastica evitare debent, nisi grave damnum incurrere velint, de quo quidem plura tristia exempla enumeravi in *differt. de inflammatione ventriculi*. Et quam detrimentosa sint purgantia drastica infantibus, præsertim si simul dentitione difficili laborent, memorabilis utique est observatio, copiose admodum & solide certis de causis evoluta ac *tomo 1. Medicina consultat. Dec. 5. Cas. 8. p. 262. seqq.* inserta.

II. Ut ut vero magna & gravia damna ab usu purgantium drastico- rum metuenda; nihilominus quia venenum quoque diligenti circumspectione adhibitum transit in medicinam, uti mercurialium & emetico- rum antimonialium exemplo constat; sunt etiam utique calus, rariores tamen, ubi valida cathartica commodam locare possunt operam. Nimirum in hydrope anasarca, præsertim si is non ex induratione vel scirrhostitare viscerum & glandularum, sed subito ex stagnatione aquarum, ob menstrua vel hæmorrhoidalem sanguinis fluxum suppressum, aut ex ni-

mia voracitate in & post morbum, enatus, vidi nonnunquam cum fructu adhibitum fuisse succum iridis nostratis ad aliquot uncias, item gummi guttæ, elaterium extractum esulæ, cum mensura dimidia lactis, repetito etiam aliquoties usu. Mire enim inde funduntur aquæ non modo per alvum, sed & in feminis per uterum, quin bina memoria teneo exempla, ubi paucas quidem sedes hæc cathartica, sed largissimum & valde salutare urinæ stillicidium excitarunt. Hydropici quippe ob nimiam laxitatem & torporem fibrarum intestinalium commodius ejusmodi drastica ferre possunt, ac egent hæc omnino paulo validiori stimulo, quo ad motum excretorium animentur. Pariter aciora hæc purgantia utiliter in usum vocari possunt in paralytica membrorum resolutione, affectibus soporosis & ubi ob languorem efficaci medicina opus est, nec non in amebitia, ut veteri proverbio constat; quod etiam referendum *Celsi* effatum *lib. 2. cap. 12. veratrum nigrum*, inquentia, aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. Neque minus experientia compertum habeo, in acerbis ischii & coccygis dolore, ad femora per intervalla excurrente, ea quæ validius alvum ducunt suppetias tulisse, & exturbatis septem vel octo sedibus bilioforum & male coctorum succorum saburra, tormina conquiescisse.

III. Paulo robustioris etiam naturæ homines, qui septentrionales regiones inhabitant & durioris ac crassioris victus fruantur, purgandi scopo, si necessitas exigit, ea quæ fortiter alvum vacuant assumere possunt; hæc tamen, quam serio inculco cum cautela, ut refracta dosi, vel in pulvere unacum salibus, ut cremore tartari, vel tartaro vitriolato, adjectis aliquot antimonii diaphoretici granis, dentur, vel ut ipsa v. c. extractum hellebori nigri, trochisci al-

han-

handal, scammonium, resina jalapae aliaeque in formam pilularum redigantur, nupta iis, quae virulentam vim infringunt & castigant, ut sunt cinnabaris, vitriolum martis, crocus, castoreum, sal succini, succinum, myrrha, quibus si extractum panchymagogum Crolii, quod valde acria habet purgantia, convenienti dosi miscetur, pilulae utique emergunt, quae ubi stimulus admoveendus, egregie officio satisfaciunt. Nihilominus tamen memori nonquam non mente tenendum, quod si validiori evacuatione opus, longe magis e re sit, aucta leniorum dosi eandem proritare, quam acrioribus & virulentis argere.

§. VI.

Aliud evacuantium genus est, quod per cutis spiracula liberaliter & conspectius, vel leniter modoque minus sensibili, foedus subtiliores emoves. Quae largius id faciunt SUDORIFERA, Graecis dicta hydrotica, sunt remedia, quorum virtute sensibilis maior per cutis tubulos lymphaticoarteriosos fertur. Hac virtute ex vegetabilium prosapia eminent radices saporis admodum acris & penetrantis oleosi, angelicae, imperatoriae, ostruthii, petasidis, helenii, levistici, vincetoxici, dictamni, valerianae, contrayervae, serpentariae Virginianae, lignum: guaiacum & sassafras cum corticibus. Ex mineralium familia antimonii medicinalis, tinctura sulphuris volatilis, ex calce viva, sale ammoniaco & sulphure parata, sulphur antimonii correctum & fixatum, nec non mixtura simplex. Theriaca quoque, ejus essentia, spiritus & aqua, omnes spiritus & salia volatilia ex partibus animantium parata, praesertim cornu cervi, eboris & lambricorum terrestrium, spiritus Boslii, tartari, serici, fuliginis, essentia lignorum, item olea destillata fetida, ut oleum cornu cervi fetidum, in spiritu vini solutum.

Theoremata.

I. Famigeratissima haec ex sudoriferis remedia, non alio modo virtutem suam exercent, quam quod principio quo pollent cordis vim systolicam & arteriarum elasticitatem, quoad numerum & virtutem ictuum augeant, & majori facta circuli velocitate, ad cutis extimam & cribrosam substantiam, ex qua prodit sudor, adducant. Hanc vero exsequuntur vel subtili acriculo oleo, ut radices superius enumeratae, quae etiam vocantur alexipharmacae; vel sale volatili empyreumatico igne naturae, ut omnes spiritus, salia volatilia, & olea ex animantibus, vel sale acriori fixo plus minus resinoso, ut radix pimpinellae albae, guaiacum & ejus cortex, contrayerva, serpentaria Virginiana; vel denique actionem suam & quidem satis potenter edunt, sale & sulphure minerali tenuissimo, quo nervosas maxime fibrillas in motum vehementem cient, atque adeo in exili admodum dosi magnam vim possident, hinc uno grano mercurii nostri diaphoretici, item duobus vel tribus granis sulphuris antimonii fixati, sudor per universum corporis ambitum elicitur, qualem effectum etiam decoctum lignorum & antimonii crudum cum lignis, nec non regulus antimonii medicinalis, praestant.

Corollaria practica.

I. Valida haec sudorifera, licet in majori dosi offerantur, sudorem minime tamen eliciunt, nisi corpus sit dispositum; id est, nisi cutis tubulosa substantia satis patula sit & relaxata, nisi etiam sufficiente humoris quantitate sanguis sit dilutus. Quare si quis in morbis sanandis utilem judicat sudoris prolectionem, necesse est, ut quae recentissimus sudorifera, ad diluendum sanguinem cum sufficienti liquido sumantur, v. g. aqua calida, infusio theae, decocto hordei, atque ut ad cutis fibras remittendas in lectum & hypocaustum calidum, vel etiam balneum, praesertim vaporosum, concedat

cedat sudaturus, ac ita sudor satis largus manabit.

II. Sudorifera hæc activiora rarius locum inveniunt & cum insigni etiam prudentia adhibenda sunt. Etenim sudor in statu sano & naturali, nisi in motum extraordinarium cieatur sanguis, non profluit, nec eas propter subtilitatis indicium est, ut perspiratio insensibilis, cujus etiam materia, quæ blanda, lymphatica, nutritia, nullius fere saporis est & odoris, ac sudoris, quæ saporis salis, odoris fetidi & ad urinæ naturam accedit, admodum differt. Deinde sudorifera hæc in gentem commotionem & orgasmum efficiunt insignem, nec moderate, sed nimis celeriter agunt, inque sanguine vel fero impuro referitis corporibus majori impetu cruorem ad vasa minima & angustiora impellendo, periculosas acutas afflictiones, ex inflammatione & humorum congestionem oriundas concitare valent. Nocentissima vero sunt, ubi saburra vitioforum humorum primæ viæ repletæ, alvus contracta & si statim post iram propinquantur. Vidi non semel hac perverfa methodo, dolores arthriticos, rheumaticos, lentas quoque & hæcticas febres diutius non sine periculo assilgentes inductas.

III. In omnibus acutis morbis, febribus, inflammatoriis, etiam exanthematicis, sudoriferorum usus plane exulet, & non nisi quam maxime moderatus minusque creber admittatur. Nam sæpius certe ab essentia alexipharmaca promiscuo, ut jam mos invalescit, oblata, calorem, anxietatem & symptomatum atrociam increvisse, observavi. Dicuntur quidem hæc remedia alexipharmaca, ut & ipsa theriacalia, quasi venenis & malignitati humorum resisterent, adeoque in morbis contagiosis grassantibus ipsaque pelle, à Medicis mirifice commendantur; at vero plus valent ad horum morborum præservationem, quam curationem, præsertim si epidemii ejusmodi maligni morbi a tempe-

state nimis humida vappida, nebulosa diuturna, ventis ex euro & borea flantibus destituta, vel etiam a diluvio & inundatione aquarum graviiori originem suam trahunt: certius tamen & tutius etiam hoc sine, cum aceto vini aqua diluto propinquantur, vel radices alexipharmacæ cum aceto infunduntur, quod deinde alexipharmaca vi imbutum ad aliquot cochlearia cum sufficienti aqueo vehiculo propinandum, quo pertinet etiam eximius usus aquæ prophylacticæ Sylvii, eo nempe tempore, quo ejusmodi morbi grassantur.

IV. Sudor vero utiliter evocatur in iis morbis, qui a frigore externo & perspiratione prohibita, ut sunt catarrhi, rheumatismi, alvi fluxus, gravedines, tussis, tumores glandularum, oriuntur, item quando a frigido potu sudanti & calefacto corpori largius ingesto periculum metuendum: sed opus est, ut inter initia statim offerantur: ac tum quidem tinctura bezoardica, vel spiritus bezoardicus Bussii cum liquore nostro anodyno remixtus egregii usus. Neque minus suscepto morbi incipientis miasmate, statim post lene assumptum emeticum, sudoriferum conducit, & quidem acetum bezoardicum, vel pulvis bezoardicus, cum camphoræ, quæ princeps alexipharmacorum, momento.

V. In iis porro morbis, qui in tubulosa & fibrosa cutis substantia consistunt & ab acri viscida materia texturam cutis destruyente ac descedante, ut scabie etiam mali moris, herpes, lepra, pustulis & ulcibus venereis, sudor cum fructu accommodatis remediis liberalius movetur. Idem fit in arthriticis rheumaticisque omnium partium doloribus, dum serum viscidum stagnans acre & membranæ nervis inhaerescens, hac ratione discutitur ac eliminatur. Pari ratione in morbis omnibus sic dictis frigidis, anasarca, leucophlegmatia, scorbuto frigido, lue venerea, arthritide tixæ, malo ilchiadico, paralyti, ceteris

ris paribus, sudorifera magnæ sunt efficacie, quia elasticitatem & vim contractilem cordis & vasorum, quæ in ejusmodi affectibus admodum depressa est, intendunt, restituunt & sanguinis circuitum ad meliorem impurorum succorum sequestrationem efficaciter augent. Sed insilendum est aliquandiu hisce prædiis.

VI. Sudorifera semper meliorem operationem exerunt, si cum sufficienti & calido liquido assumuntur. *Celsus jam lib. 3. cap. 6.* hoc sine commendat potum calidum his verbis: *si nota est sudoris venturi, tum demum calidam aquam potui dare oportet, cujus salubris effectus est, si sudorem per omnia membra effundit.* Et idem uberius testatur facinor decocta lignorum, quorum usus in lue venerea aliisq; ue frigidis morbis sane laudatissimus. Vidi quoque febres intermittentes, tertianam, quartanam, in plebejis feliciter sublatis, si præmisso emetico, aliquot horis ante accessionem; sunt um sudoriferum, cum regimine, ex rob sambuci, sale tartari & piperis quibusdam granis, cum aliquot spiritus vini cochlearibus confectum.

§. VI.

Sudoriferis potentia agendi inferiora, sed salubri effectu longe superiora sunt DIAPHORETICA, quæ placide tantum augent & movent perspirationem. Ex his inter ea quæ vegetabilium regnum suggerit, præcipua sunt radix chinæ, sarsaparillæ, carlinæ, gentianæ; ex herbis: cardus benedictus totus, ejus semen omnisque ex eo parata; essentia, aquæ, extracta, sal, porro scordium, sambucus, isque humilis ebulus, ejusque flores, rob, aqua, item fumaria, scabiosa, crocus, flores calendulæ, opium quoque; ex regno animalium: omnia ossa, cornua ac dentes animalium, tam rassa, quam in cineres ulla & philosophice præparata, maxime omnia quæ cervus suggerit, lapides testæ & chelæ cancrorum: ex terreis: omnes terræ sigillatæ & mar-

garum species, bolus fabrilis; ex salibus: salia herbarum per incinerationem parata, item nitrum; ex pretiosis & exoticis: petra di porco, lapis bezoar orientalis & occidentalis; ex mineralibus & chymicis: flores & lac sulphuris, cinnabaris tam nativa, quam vulgaris & antimonii, antimonium diaphoreticum, cerussa antimonii, magisterium antimonii, sive materia perlata Crugneri, bezoardicum minerale, tinctura antimonii temperata, ex regalo & sale tartari, antisepticum Poterii; ex compositis: lapis de Goa, qui ex lapide bezoar orientali, tragacantha & ambra conficitur, pulvis bezoardicus Sennerti, Anglicanus, Pannonicus ruber, cordialis, Dorucellii, liquor noster anodynus mineralis, acetum quoque vini, vel etiam destillatum & floribus sambuci superinfusum, aut cum lapidibus cancrorum, pulvis noster polychrestus diaphoreticus, theriaca cœlestis, laudanum liquidum, pilulæ Wildegansii.

Theorematum.

Actio diaphoreticorum varia est & multiplex. Vel enim privative agunt & acidum primarum viarum, quod ad sanguinem delatum ejus spiritus ascentiam, fluiditatem & motum intestinum deprimit, absorbent atque invertunt, cujus indolis sunt omnia terrea alcalina naturæ: vel nimiam humiditatem imbibendo & remissas nimis fibras adducendo, ut terræ sigillatæ, boli & margæ, item ossa & cornua, tam usta, quam philosophice præparata, nec non unicornum fossilis: vel sulphure anodyno blando vaporoso stricturas superficiales cutis in dosoribus laxando & complacando, ut sunt sambucina, præfertim flores, crocus; ejus extractum, flores papaveris rhœados, liquor anodynus mineralis noster, emulsiva ex semine papaveris, opiata correctæ, potissimum theriaca cœlestis, pilulæ Wildegansii, laudanum liquidum Sydenhamii methodo paratum; vel motum inte-

linum sanguinis ferociorem componendo ac figendo, uti nitrosa, refracta dosi fixioribus diaphoreticis nupta, nec non spiritus nitri dulcis, emulsiones ex seminibus quatuor frigidis majoribus, acidulata, succus limonum ipsumque acetum, vel denique positive elemento subtili acri fibras & vasa languentia leniter exstimulando, prout carduus benedictus, scordium, fumaria, china, sarsaparilla, centaurium minus, scabiola, carlina & gentiana.

Corollaria practica.

I. Quemadmodum illa subtilissimarum sordium per cutis poros insensibili modo succedens evacuatio, omnium est saluberrima, eademque intercepta, plures succrescunt morbozæ afflictiones: ita diaphoreticorum, quæ cutaneam hæc excretionem eliciunt, usus certe est amplissimus, universalis & fere polychrestus, in omnibus ferme affectibus, etiam ex præsentibus signis nondum satis perspectis & cognitis, ut iis Medicus modo carere possit plane ullo. Circulus enim sanguinis & perspiratio auctior, solennia illa naturæ media sunt ac instrumenta, quibuscum materia, quæ in morbis in vitio est, corrigitur, digeritur, resolvitur, discutitur ipseque morbus tutissime sanatur. Potissimum tamen in omnibus morbis & febribus acutis, inflammationibus cujusque generis sint, sola hæc, pauca & continuata dosi, cum convenientibus vehiculis data, omne sanationis punctum absolvunt & revera optima sunt discurrentia & sanguinis massam depurantia.

II. Quia excessivus, præsertim tempore æstivo & in cholericis ac biliosis corporibus, æstus, nec non qui febribus cholericis & biliosis jungi solet, nimis exsiccet, humidum absumit & perspirationem impedit; acidula & nitrosa, ac inprimis lapides cancrorum cum nitro, exhibiti in julapio ex aquis diaphnoicis & cum sirupo acetositis citri condito, con-

temperando nimiam exæstuationem; cum bonis ægrorum rebus ex voto diaphoresin movent.

III. Ubi ob dolorum atrociam arida & exsucca cutis ejusque tubuli angustantur & coarctantur; præstat semper leniora anodyna & antispasmodica diaphoreticis jungere, qua virtute maxime splendet liquor noster anodynus mineralis, ad tres partes, cum una spiritus bezoardici Bussii parte remixtus, item pulvis diaphoreticus fixior; leniter nitrosus, cum cinnabari & uno vel altero pilularum Wildegansii grano, id quod etiam pluribus testatur *Estmull. in dissert. de virtute opii diaph.*

IV. Pulveres diaphoretici id servant peculiare, quod non solum perspirationis successum intendunt, sed etiam sæpe virtutem laxantem & insigniter diureticam exerant. Certe de pulvere nostro sic dicto bezoardico polychresto, multiplici experientia compertum habeo, eundem si mane vel post meridiem propinatur & prima in regione offendit acidos succos, quatuor vel quinque sedes movere, quod in senibus & hypochondriacis cum eximio sanitatis commodo succedit. Idem quando circa læsti introitum offertur, nec tamen cutis sudorem satis disposita, ut in principio catarrhorum, largum urinæ movere solet fluxum, ubi vero ad diagnosen cutis apta, largiter sæpe fluit sudor.

V. In morbis acutis & febribus, ubi parum acidj in primis viis præsto est, tutius & majori cum efficacia, fixa & terrea diaphoretica paullo minori dosi offeruntur, ac optime miscentur cum sirupo acetositis citri, nec non aceto vini, quippe solum acetum cum aqua non coagulat, sed sæpe resolvit & discutit sanguinem impactum, multo magis si diaphoreticis jungatur.

§. VII.

Sudoriferis ac diaphoreticis succedunt ea, quæ serum falsum, crassioribus terreis rebus rectementis refertum,

Pl. Diaphoretica

tum, per urinarias vias eliciunt, **DIURETICA** dicta. Horum apparatus *Gelsus lib. 2. cap. 31.* fittit: *urinam*, inquit, *movent quæcumque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocimum, mentha, hyssopus, anisum, coriandrum, nasturtium, cruca, fœniculum; præter hæc asparagus, capparis, nepetha, thymum, saturia, lampasana, pastinaca, sifer, cepa.* Nos quæ hunc in finem commendemus, habemus ex vegetabilium numero radices: petroselinum, feleri, asparagi, graminis, liquiritiæ, rubiæ tinctorum, pastinacæ, rannuculi, esculenti & quæ exteris debentur bareiæ bravæ & acmellæ; herbæ: petroselinum, hederæ terrestris, equisetum; chærefolium, urtica, omnesque porri & allii species; flores: genistiæ, cyani; semina: dauci, petroselinum, feleri, fœniculi, miliisolis, urticæ, violarum, semina quatuor frigida majora, lycopodii, fructus alkekengi; cynosbati, juniperi & fraga; lignum juniperinum, sassafras & ejus cortex; resinæ & balsama; mastix, succinum, balsamum de Mecca & de Copaiva; ex animalium familia, cantharides, millepedes, vermes majales, scorpiones, bufones, lumbrici terrestres, cochineillæ, nec non serum lactis: salia porro omnia alcalia per incinerationem parata, sal quoque succini, arcantum duplicatum, solutio oculorum caneri ipsumque nitrum; ex præparatis & compositis, lixivium benedictum Mynsichti, tinctura tartari, antimonii acris, terra foliata tartari, liquor silicum, lithonripticus Michælis, tartarus solubilis, spiritus terebinthinæ, mastichis, succini, balsamum sulphuris terebinthinatum, juniperinum, oleum juniperi, malvaticum juniperinum, sirupus dialthæ Fernelli, trochisci alkekengi.

Theoremata.

Quemadmodum parcius & immixtus, vel difficilis urinæ fluxus a varijs proficiscitur causis, & vel 1) ab

humidi in sanguine defectu; vel 2) a tenacibus pusillis urinariorum renum tubulos obstruentibus fuccis; vel 3) a vehementi canaliculorum renalium spasmio & strictura; vel denique 4) a nimia eorundem laxitate atque resolutione: ita etiam remedia, quæ debitum urinæ fluxum revocant & eliciunt, diversis ad has causas relatis modis effectum exsequuntur. Videlicet nonnulla fluidum sanguinem spissescienti infundendo, urinæ stillicidium augent, quæ inter connumeranda omnia diluentia aquea, largus aqueæ dalcis tam calidæ quam frigidæ, eo magis herbis diureticis infusæ, potus, ipsumque infusum theæ ac decoctum coffeæ. Hac quoque virtute splendent foteriæ aqueæ, tam calidæ, quam frigidæ, quippe quæ præter humoris copiam, qua sanguinem diluunt, eximia simul virtutē pollent, alcalino quod recondunt elemento, viscidos & tenaces humores dissolvendi & renale cribrum ab obstructione liberandi. Idem præstat lactis serum, pariter & aquoso largo & sale dalcis nitroso, abstergente blandeque stimulante elemento instructum. Alia humores lentos ac spissos renalis colotarii ductus farcientes ac oppilantes dissolvunt eisdemque secretioni aptos reddunt, qua quidem virtute conspicua sunt salia omnia fixa & ex iis parata lixivium, item tinctura tartari, antimonii acris, liquor silicum, terra foliata tartari, tartarus tartarisatus, arcantum duplicatum, solutio oculorum cancri, ipsaque magnesia alba, cum primæ regionis acido in sal aperiens degenerans, neque minus tinctura calcis vivæ, mater perlatum & corallia succo citri maritata, unacum salibus, quæ ex medicatis aquis exhalationis ope eliciuntur. Nonnulla spasticas in renali emunctorio stricturas debitam urinæ sequestrationem sufflaminantes & interceptantes mulcent, atque relaxant, eoque nomine laudem merentur præter nitrum, semina quatuor frigida majora, & ex

iis paratæ emulsiões, semen papaveris albi, dauci, milii solis, lycopodii, item fructus alkekengi & ex iis artificiose confecti trochisci. Eadem facultas inest liquori nostro anodyno minerali, tutissimo certe & tamen efficaci remedio, croco ejusque essentiz, nec non ob nitrosum sal succo graminis, decocto radices graminis, asparagi, & quod etiam egregie demulcet, oleo amygdalarum dulcium. Quædam remissum renaliscribi robur firmant atque adducunt, idque vel oleoso, tenui & subtili balsamico principio, ut mastix, succinum, balsamum de Mecca de Copaiva, terebinthina, juniperus, ejus lignum & baccæ, saffras, petroselinum, pastinaca, feniculum, anisum, ranunculus hortensis, seleri, & quæ ex his confici possunt olea, essentiz, spiritus, decocta & infusa; vel roborante quodam fixiori terreo sulphureo elemento, cujus generis sunt fructus cynosbati, rob juniperi & ex eo nivalaticum juniperinum, fraga exsiccata, baccæ brava, hederæ terrestres, cortex radices acaciæ, equisetum, veronica, chæresolium. Aliqua demum potenti stimulo efficaciam edunt in tubulos renales, quando eorundem robur propter debilitatem summam penitus exsolutum, ipsaque hinc eorundem functio cessat. Propria hæc est facultas insectis fere omnibus, præsertim cantharidibus, millepedibus, araneis, scorpionibus, vermibus Majalibus, bilonibus exsiccatis, nec non ex vegetabilium genere porri & alii speciebus.

Corollaria practica.

I. Quam itaque tam conspicua inter diuretica ratione principiorum & operationis intercedat differentia; discrepans quoque eorundem erit usus & cum exquisito discrimine pro circumstantiarum ratione administrandus. Quod si enim redundante in corpore sanguine, ante ejus imminutionem calculo laborantibus exhibere quis vellet calidiora, oleo subtili balsamico pectusa, ut terebinthina, succi-

nata, juniperina, vel balsamum de Mecca de Copaiva aut Peru; vel etiam acriora, caustico sale pollentia ex insectis, alio, cepis & porro: is profecto gravissime noceret & inflammationem renum induceret, vel calculorum generationem promoveret. Contra ea in corporibus humidioribus, minus sentientibus, plebejis, & qui crasso victu fruuntur, nec non in morbis, qui a copia feri impuri natales trahunt fluore seminarum albo, gonorrhæa, dispositione ad anasarcam & leucophlegmatiam, efficaciora hæc remedia magno sunt usui.

II. Multo magis vero acria & stimulantia detrimento sunt, si ob dolores, ut ex calculo, vel spasticas constrictiones, urinæ fluxus sufflaminatur, & tum quidem longe tutiora ac utiliora sunt, quæ strictiones relaxant & dolores leniunt, ut faciunt fructus alkekengi, semina dauci, lycopodii, papaveris albi, milii solis, quatuor frigida majora, emulsiva, trochisci alkekengi cum opio nitrum antimoniatum, depuratum, aquæ florum ulmariz, tiliz, acaciæ, oleum amygdalarum dulcium, spiritus nitri dulcis, liquor noster anodynus mineralis, serum lactis, nec non exterioris balnea, infusæ & fotes emollientes, quorum omnium tam egregia virtus est, ut placando dolorificos spasmos, non modo suppressum urinæ fluxum restituant, sed & ipsius calculi progressum per uterethes & exitum eximie facili- tent atque promoveant.

III. Quando feri salii, tartarei copia, quæ dolorum tam arthriticorum, quam rheumaticorum ut plurimum genitrix est, peccat, utiliter eadem per levia diuretica expurgatur atque subducitur, non vero calidiora, ne isdem salium spicula in inotum intensiorem abripiantur partesque quibus insident gravius exagitant. Commendari autem hunc in finem quam maxime merentur radix sarsaparillæ, pareiræ bravæ saffras, china, liquiritiz, asparagi, rubiæ tinctorum, cichorii,

chorii, sceniculi, petroselinii, graminis, lignum juniperinum & parata ex his cumbrodio carnis vel aqua decocta, nec non serum lactis, ac potissimum acidulae & theriacae temperatiores.

IV. Ubi vero vitiosi, visceri, ac tenaces humores in vesica urinaria haerent & cum primis calculi rudimentis excludi debent; acrioribus utique opus est magisque potentibus, cui scopo allium cum spiritu juniperi fumtum, pulvis millepedum, vermes Majales, essentia cantharidum, tinctura antimonii acris, liquor silicis cum tinctura calcis vivae satisfaciunt, quae pariter in gonorrhea virulenta, quando in prostratis, vesicae collo & urethra obhaerescens tenax materia per urinam educenda, prudenter adhibita ex usu sunt.

V. Omnium aplissima, tutissima & utilissima ad eliciendum urinofum laticem praedia, sunt salia, tam alcalia fixa, quam neutra omnis generis, quippe quae viscidos ac lentos succos siphunculos urinarios oppilantes dissolvunt, simulque blando stimulo excretionem proritant. Quo quidem effectu egregie splendent liquor salis tartari, cinerum clavellatorum, nitri fixi, tartarus vitriolatus, sal absinthii, arcanum duplicatum, solutio oculorum canceri, tartarus solubilis, terra foliata tartari, nitrum antimoniatum & sal polychrestum.

VI. Sed haec haecenus recensita remedia non tantum ad eliciendum deficientem urinae fluxum faciunt; verum etiam alios eximie utiles in morbis praestant effectus. Dum enim plura ex iis aperiente & incidente, alia corroborante, tonica & balsamica, nonnulla anodyna facultate pollent, in longis utique omnibus affectionibus, quae ab obstructione glandularum, viscerum & emunctoriorum incunabula ducunt, nec non quae ab impuritate & copia feri salis acris tartarei proficiunt, ex voto ferunt suppetias.

Et certe si ulla medicamenta ab haedrope, tumoribus cedematosis, calculosis concretionibus, podagra & arthritide defendunt; certe a prudenti diureticorum usu id erit expectandum. Cavendum tamen merito ab omnibus calidis, acris & causticis, & potius utendum lenioribus magisque diureticis, cujus generis sunt vinum Mosellanum tenue, acidulae Selteranae, & cerevisiae vel decocta quae diuresin blande movent.

§. VIII.

Ad salutares & criticas excretiones, quae ad vitae & sanitatis tutelam faciunt, pertinent etiam illae, quibus bonus & sincerus sanguis, si copia peccat, non solum in feminis post annum decimum quartum singulis mensibus per uterum atque etiam post partum & abortum emittitur; sed in viris etiam nimium cruore redundantibus per extimas ani venas, quae haemorrhoidales vocari solent, a natura per vices effunditur. Hae itaque sabuberrimae haemorrhagiae, quando modo, quantitate, vel tempore peccant, plane deficiunt, aut vi quadam cohibentur, aptis remediis revocandae iterumque in ordinem reducendae sunt, ne gravissima inde in valetudinem redundet noxa, vel etiam ut enatus jam morbus abigatur. Inter ea vero quae ad obtinendum hunc scopum ex usu sunt, connumeranda in primis ex vegetabili regno: radix aristolochiae, zedoariae & quinque aperientes; herbae artemisia, calamintha, matricaria, pulegium, melissa, fabina, polium montanum, ruta, majorana, rosmarinus, flores cheiri, crocus, baccharum lauri, juniperi, gummata bdellium, myrrha, galbanum, opoponax, sapsagnum, succinum, ex purgantibus aloë, rhubarbarum, bryonia, itemque aromata; nec non quae animalibus debentur salia volatilia cum castoreo & quae ex mineralibus & chymicis omnibus praefenda martialia.

Corollaria practica.

I. Quo major sanguinearum evacuation-

VII.
Menstru
& haemorrhoidales.
mensura.

purationum ad valetudinem tuendam utilitas est atque præstantia; eo magis utique, ut dudum fecit *Hippocrates*, optandum foret, quo suppetent certa & efficacia ejusmodi præsidia, quibuscum Medicus illas quotiescunque; e re est cum certo successu regere, evocare aut moderari, sicque tempestive plures graves ægitudines & præscindere & expugnare posset. Verum quia hæc sanguinis excretio maxime ipsius naturæ est opus, quod in feminis certæ temporis periodo, qua erumpit, succedit & definit, adstrictum, in viris autem nec omnibus solenne, nec adeo periodicum, ac præterea certam cruoris redundantis portionem, nec non vascula uteri & ani patula, laxa ad spontaneum fluxum disposita existit, pariterque a multiplicibus causis inflammari vel plane intercipi potest; in proclivi est judicare: arduum utique nec tam expeditum esse negotium, resitans vel deficiens cruoris profluvium iterum procurare, quin nunquam perficiendum, nisi causarum defectus ratio habeatur exquisitissima.

II. Posito verò quod sanguis supra proportionem & modum in corpore redundet, quod præcipua fluxus causa, posito etiam quod vascula uteri & ani ita disposita sint, ut ab affluente copioso sanguine distendi, & exitum ipsi præbere possint; neque tamen excretionis negotium rite succedere, vel propter vascula arteriolarum lateralia, quæ secundum naturam non vehunt sanguinem obstructa, aut spasmo contracta, vel etiam ob imminutam sanguinis spiritualescentiam & cordis atque arteriarum vim elasticam contractilem: tunc omnino quæ supra adduximus remedium generatim optatissimum ferunt opem. Ad vasa quippe minima referenda, & obstructions expediendas, egregie præter radices quinque aperientes, aristolochiam, rhabarbarum, bryoniam, flores cheiri, præsertim si in decocto cum salino stimulo, ut borrace, offeran-

tur, inprimis etiam conferunt gummata, cum aloë, & purgantibus in forma pilularum exhibita. Ad tubulos infesto spasmo contractos nimis & coarctatos adaperiendos, artemisia, quæ demulcet, millefolium, crocus, castoreum, plurimum valent. Et ad deficientem sanguinis spiritualescentiam resocillandam, robur solidis addendum & fibrarum vasorumque tonum firmandum, roborantia, quæ sale volatili oleoso tenui operationem suam exsequuntur, ex usu sunt, quo referenda omnia aromata, myrrha, bacchæ lauri & juniperi, rosmarinus, pulegium, melissa, satureja, sabina, flores cheiri, calamintha, succinum, limatura martis & tincture ex marte paratæ, item salia volatilia oleosa.

III. Quando nimia sanguinis copia, quæ elasticitati vasorum valde resistit, retardati, vel imminuti fluxus causa est, neutiquam emmenagoga jam dicta, præsertim calidiora, locum habent. Sanguis enim hisce vehementius commotus pessima sæpe concitat mala. Sed opus tunc est sanguinis missione, quæ per sectam in pede venam insitura, saluberrimum hoc & criticum profluvium, sola sæpe restituit.

IV. Neque etiam hæc quæ enumeravimus emmenagoga conducunt, ubi sanguinis & succorum benignorum est defectus, ut in iis, qui mox a morbo convalescunt, & quando primæ viæ fordibus viscidis faste, tunica villosa lento musco inviscata & bona digestio & chylicificatio vacillat. Tum potius id præcipue agere debet Medicus, ut tam deficientem bonum sanguinem nutrientibus gelatinosis, jusculis & quæ facile in succum & sanguinem convertuntur, denuo ingeneret, quam labefactam ciborum digestionem & chyli elaborationem congruis remediis, si opus est emeticis, vel lenioribus purgantibus, salinis aperitis, amaris stomachicis refarciat & debito ordini reddat.

V. Sæpe sanguinis effluxum impedit oppilatio ac infarctus vasculosæ colli uteri interni & exterius vaginæ, nec non in viris ani substantiæ, ut nulum sanguinem, quantumvis valde appulsus, admittat. Quod si contingerit, supervacanea & irrita sane sunt quæcunque pellementia, nisi prius per congrua auxilia relaxata & emollita fuerint, obspicata & indurata tubulorum compages. Quod quidem non meliori magisque præsentanea ratione perfici potest, quam balneis, vel fotibus, seu balneis vaporosis, ita parandis, ut vasculida aqua, cui herbx artemisiz, pulegii, flores chamomillæ infusæ, repletum, in hypocausto calido, tecto bene corpore, abdomini, quo vapor ad interiora uteri, & partium inferiorum ascendat ac penetret, supponatur, & ad calorem aliquandiu conservandum, subinde candentes silices aquæ injiciantur. Eundem quoque in finem multum conferunt frictions calidæ pedum usque ad inguinæ, præsertim mox a balneo aquæ dulcis cum pannis calidis institutæ.

VI. In iis autem malis, quæ a suppresso, deficiente, vel minus recte succedente, mensium, vel hemorrhoidum fluxu pendent, non certius, non securius, non efficacius præsidium deprehendi, prudenti aquarum mineralium, imprimis thermarum Carolinarum mitiorum interno, & Tœplicensis externo usu, qui omnibus medendi indicationibus apprime satisfacit. Potu quippe thermalis aquæ humores lenti inciduntur & evacuantur, obstructions minimorum tubulorum expediuntur, balneo vero aquæ Tœplicensis, quæ omnium levissima, constringente terreo principio orbara, stricture remittuntur, ipsaque vasa ampliuntur, ut sanguinem affluentem promte admittere, capere, iterumque eructare possint.

VII. Quemadmodum res admodum ardua & difficilis est in medendo, recte curare & procurare men-

sium in feminis profluvium; ita longe majoribus adhuc difficultatibus stipatus est excretionis hæmorrhoidalis successus, si copia sanguinis per venas ani exitum molitur, nec tamen ibi dispositionem ad exitum invenit. Nam licet ad ciendum sanguinis ex ani venis stillicidium pilulæ ex aloë paratæ singularem plane præ omnibus aliis possideant facultatem, dum non modoparticulis suis resinosis sulphureis, valde subtilibus, in universa sanguinis & humorum massa insignem orgasmum concitant, sed & tenaci viscosa ac resinosa sua parte intestini colli & recti tunicis firmius inhaerendo, continuo stimulo majorem sanguinis proritant affluxum; nihilominus tamen quando cruor ita exstuat, ac eo copiosius allectus, ob vascula perruptioni minus apta exitu præcluditur, partim extrema canalium ora cum exquisito dolore in ano tuberculorum instar protrudit, partim inter nerveas intestinorum tunicas stagnans easdemque premens, vehementes inflationes, spasmos & varia truculenta in abdomine pathemata, ingignit, quæ frequentissimæ certe sunt observationis nostro hoc ævo, quo omnes fere passionis ex fluxus hæmorrhoidalis anomalis, tanquam causa, repetere, clari etiam viri haud verentur, & pilularum ad mentem Beccheri concinnatarum crebrior nimisque liberalis usus, seu potius abusus invalescit, quarum alias prudens usus laudem meretur.

§. IX.

In evacuantium classe etiam ex loco obtinent, quæ lympham micidam in glandulis, vel potius glandulosis tunicis, ex arterioso sanguine secretam & in emunctoriis hærentem, evocant. In nullo vero corporis organo mucositatis copiosior succedit sequestratio, quam in interioribus canalis asperæ arteriæ ipsique pulmonum bronchiis, quæ interius tunica glandulosa obducta sunt, unde per tussim copiosa per sæpe serosa, piritola,

phl.
Expe-
riente.

tofa, viciida, interdum etiam purulenta materia, in morbis præsertim qui pulmonum compagem afficiunt, tam acutis, quam chronicis, rejicitur. Et nancethoracis cavo evacuationem quæ promovere solent, vocantur, **EXPECTORANTIA**, in quorum numero e vegetabilium familia sunt maxime radix helenii, ari, iris Florentinæ, liquiritiæ, veronica, chæresolii, scabiosæ, pilosellæ, scordii, hyssopi, dracunculi esculenti: flores violarum, crocus, malvæ, papaveris rhœados, semen anisi, sceniculi, cortex ligni sassafras; ex gummatibus resinosis gummi ammoniacum, benzoe; ex fructibus passulæ, ficus, jussubæ, nuclei pini, mel, succus liquiritiæ, oleum amygdalarum dulcium; ex animalibus: sperma ceti & pinguedines; ex mineralibus: sulphur, ejus flores & lac; ex compositis balsamum sulphuris anisatum, spiritus salis ammoniaci anisatus, lohochsanum & expertum, sirupus pulmonum vulpis, elixir nostrum pectorale, balsamum pectorale Meibomii, spiritus asthmaeticus Michaelis.

Theorema.

Quemadmodum omnia quæ excretionibus adjuvant, non uno eodemque modo suam edunt operationem, sed vel materiam mobilem reddunt & ad evacuandum præparant, vel vias emunctoriorum referant, ut a succorum nubio segregari possit, vel deuique vasa & canales ad motum excretorium exstimulant: ita ratione haud absimili etiam expectorantium agendi succedit modus. Nimirum si humor secretus est valde tenuis, acris & tubuli ac porii glandularum e quibus ejiciendus nimis constricti, aptissima sunt ea, quæ vias emolliunt, acrimoniam hebetant & nimis tenues & fluxiles coagulant; qua virtute ex jam nominatis splendent succus radicis liquiritiæ, crocus, sperma ceti, flores violarum, malvæ, papaveris rhœados, cremor lactis, oleum amygdalarum dulcium, axungie, si-

rupus pulmonum vulpis, violarum, papaveris albi, massa pilularum de stirace, præsertim, si cum liquido diluente, ut decoctum avenaceum, vel decocto ex rasura cornu cervi gelatiniformi, assumantur. Quocumque vero materia spissa & copiosa in bronchiis pulmonum hæret & respiratio obest, etque propter stimulo quodam ad expectorationem opus est, tunc tenacem, & viscidam materiam quam optime resolvunt infusa ex herba veronica, hyssopi, scabiosæ, scordii, terra quoque foliata tartari, solutio oculorum cancri & nitrum antimoniatum. Et tunicas bronchiorum nerveas principio quodam acri tenui oleoso, ad motum excretorium animant, gummi ammoniacum & ejus essentia, spiritus salis ammoniaci anisatus, myrrha, benzoe, pulvis radicis helenii, iris Florentinæ, sulphur stillatitium, ejus lac, balsamum sulphuris; aut ubi acrius adhuc calcar admovendum, ut in asthma pituitoso & catarrho suffocativo, oxymel squilliticum & spiritus asthmaeticus Michaelis, qui ex gummi ammoniaco, & crystallis viridis æris paratur, adhiberi poterunt.

Corollaria Practica.

I. In expectorantium usu, ob diversa quibus agunt principia ipsumque varium operandi modum, prudenti discrimine opus est, & qui promiscue nulla habita differentia temporis, vel materię peccantis, iisdem utitur, is certe plus damni, quam commodi inducit. Hinc quando in tussi epidemice grassante, vere vel autumno, antequam materia tenuis & acris attemperata, propinantur quæ stimulo agunt expectorantia, vel vicissim, ubi materia satis cocta, & præparata, emollientia & relaxantia offeruntur, præposterum utique & damnosum est molimen.

II. In tussi chronica, humida, asthma quoque pituitoso, in quo multum pituitæ in bronchia pulmonum

illabitur, dulcia, linctus, sirupi & oleosa ventriculum, qui in morbis jam tum languidus, & a tono dejectus est, plus labefactant, appetentiam, digestionem, & chylicationem minuunt ac non modo uberiori recrementorum proveniunt ipsiusque morbi incremento favent, sed & ad cachexiam, tumores oedematofos, immo hydropem disponunt. Præstat tunc potius uti medicamentis pectoralibus balsamicis, quæ grata simul ventriculo, ut elixirio nostro pectorali, essentia myrrhæ, guami ammoniaci, corticis saissasæ, nucitæ, spiritu salis ammoniaci anisato, y tinctura tartari alisque similibus.

III. Cautissimus quoque expectorantium debet esse usus in dispositione phthisica, vel hæmoptica, si tussis sicca, spiratio angusta & difficilis, dolor pectus comprimens, quæ potius a sanguinis congestione, quam materia expectoranda accidunt; quandoquidem sive emolliendo, sive stimulando agent, affluxum & congestionem sanguinis & humorum augeat, tantum abest ut removeant.

IV. In morbis acutis pectoris, ut plenitudo vera, & peripneumonia, provide pariter excretioni pectorali dicatis, præsertim in principio; utendum, ne stasis & stagnatio sanguinis inflammatoria inde augeatur; inclinante vero morbo & ubi maxima inflammationis pars discussa, ad materiam coctam lentoscentem ex fistulis pulmonum evocandam, commodum habent locum.

§. X.

Porro ad excretionem, sequestratè inobducta narium antris & duodecim cranii sinibus glandulosa pituitaria dicta tunica, mucida lymphæ, plurimum possunt ERRHINA, & STERNUTATORIA, quorum illa leviter, hæc vero validius, hæc exquiritiori sensu prædictæ tunicas stimulando, & ad motus excretorios sollicitando agunt. Inter leniora quidem errhina dicta, locum quam commode

tuentur, majorana, basilicum, thymus, hyssopus, satureia, marum Syriacum, origani sumnitrates, flores liliorum convallium benzoës, resina guaiaci, quæ ex decocto post inspissationem remanet, rasura tenuissima ligni aloës, sal volatile salis ammoniaci siccum, cum oleo majoranæ essentificatum; nec non vitriolum album; sternutamentum vero movent & quidem validissime euphorbium & pulvis hellebori albi, paulo mitius varæ species tabaci, mercurius præcipitatus, piper.

Theorema.

Sternutatoria non alia ratione humorem e narium tunicis eliciunt, quam purgantia ex tunicis intestinorum glandulosis, scilicet nemp tenui & cerrimo, tunicas hæc irritando & ad crispaturam adigendo. Sed uti acriorum purgantium, ita etiam sternutatoriorum, ratio debet esse usus, eo quod natura non facile in evacuationibus vult cogi, sed tantum duci. Errhina vero, sive ptarmica, naturæ & nervis magis amica, sale subtili acri volatili oleoso, tunicam pituitariam blande irritant, stimulant, & mucidum liquorem evocant, longèque sternutatoriis sunt tutiora, eo quod hæc motum quendam convulsivum in nervos & per consensum etiam totum pectus invehant, illa vero roborando potius nervos & nervosæ tunicas, officio suo defunguntur.

Corollaria practica.

I. Pulveres errhini, ex herbis cephalicis, præsertim majorana, maro Syriaco, floribus benzoës, liliorum convallium, rasura ligni aloës, grano uno vel altero ambre adjecto compositi, in capitis gravatibus doloribus, hemicrania, affectibus soporosis, memoriæ debilitate, gravedine, coryza, auditus difficultate, cephalalgia pituitosa, præsertim ea quæ in osthis frontis subsistit, & plerumque a coryza suppressa oritur, oculorum mucosa deluxione, somnolentia, vertigine si quippiam humores maligni a luovenera in narium membranæ hæret, egre-

egregii sunt usus, & præter evacuationem, vigorem quandam addunt actionibus animalibus. Neque minus hoc nomine laudem meretur sal volatile salis ammoniaci cum balsamo nostro mixtum, quod ad aliquot granaribus inditum, spectata est virtutis in auditus & visus difficultate, affectibus soporosis & in sensibilibus ibi mutationem ciet, sæpe proficuum, ubi motus in capite excitandi, in paralyticis & apoplecticis.

II. Nostris temporibus, ubi sumi tabaci, ita etiam pulveris pro sternutatione, luxurians abusus maxime invaluit, valetudini minus conducibilis. Etenim iugi hoc pulverum attritu, non modo odoratus, propter obstructas & quasi induratas inde papillas nervæ membranarum quæ ossa squamosa & nares inveliunt, caditur, sed & ob nimium infarctum ab affecto humore clara vox ravescit. Id quod pluribus inculcavi in *dissertatione, de usu & abusu sternutatoriorum*,

§. XI.

X. Apop-
plegia
mor-
tuæ.

Haud absurdè ratione ac errhina vellicando & irritando narium tunicas mucum ex ipsis eliciunt; APOPHLEGMATIZANTIA salivalem & mucosam materiam, ex tota faucium compage glandulosa, uvula & ductibus salivalibus evocant. Quin omnia, quæ errhina & prarmica facultate gaudent, ori, vel per masticationem, vel gargarisationem admota & indita, phlegma & liquorem salivalem evocant. Quippe tabacus in pulverem comminutus inter errhina, ac fumus ex ipso inter apophlegmatizantia, principem sibi vindicat locum. Præter nicotianam autem radix pyrethri, ostrutii, angelicæ, zedoariæ, pimpinellæ, galangæ, myrrha, masticata fundunt & egregie colliquant salivam. Usus masticatoriorum eximius ad arcenda miasmata, quæ in morbis contagio infectis inspiratio aeris hausta, facile se apponunt faucibus, salivæ immiscet & deglutita demum morbum invehunt, si quis

foras in locis infectis, & suspectis versetur, ubi etiam tabaci fumus conducit. Decocta vero ex radice pyrethri, pimpinellæ, caryophyllis, herba majurana, satorejæ, angelicæ, cum vino vel spiritu vini, qui solus etiam salivam fundit & fibras ductum stringit, confecta, in vitis, oris & linguae, dentium, gingivarum nec non aurium, difficili auditu, vel tinnitu, quando orificium tubæ Eustachianæ, quod in interioribus non procul ab uvula hiat, obstructum est, lenito mucosæ, egregiam locant operam, quæ non minus in uvulæ relaxatione, aphonia, paralyti linguae, addito sale ammoniaci, vel spiritu salis ammoniaci, apprime interveniunt.

§. XII.

XI. Saliva
vivacior.

Neque prætereunda in evacuationum enarratione sunt salagogæ, sive SALIVANTIA, quæ lymphaticum & salivalem latorem fortiter movent, & per os evacuant. Utur vero in regno vegetabilium plura sint, quæ ore assumpta, ut emetica, vel dentibus, ut modo meminimus, manducata, salivalem humorem e faucibus & glandulis evocant; vix tamen in tota rerum natura suppetunt, quæ tam vehementer totam lymphæ massam in motum concitant, atque in salivales glandulas & ductus tam fortiter agunt, ut non tantum per aliquot hebdomades, verum etiam menses, continuus satique largus succedat salivæ fluxus, quam quæ regnum minerale suppeditat pharmaca, & maxime quidem mercurialis & regulinæ propapie, arte chymica præparata. Nam argenti vivæ propria laus & peculiaris plane virtus est, & exterius inunctum, vel parva etiam dosi interius assumptum, liberalissime moveat salivationem, cujus, si recte administratur, beneficio, affectiones ceteroquin insanabiles & contumacissimæ, ex impuritate feri & lymphæ ortæ, lues venerea, herpes, scabies, maligna, ulcera cacoethica & serpentina, sanari funditusque expugnari possunt. Et

hac

hac singulari ac quasi propria facilitate; pollet non modo ipsum argentum vivum, cum saccharo probe contritum & cum conserva interius propinatum, sed & omnia ex officio confecta, ut mercurius dulcis, precipitatus ruber, albus, cum spiritu salis ammoniaci, ex solutione mercurii in aqua forti precipitatus, turpethum minerale, arcatum corallinum, mercurius diaphoreticus jovialis, solaris, ethiops mineralis ipsaque cinnabaris, tam nativa, quam antimonialis, vel communis, ex sulphure cum mercurio parata, nec non antiquarium Riverii. Ex iis verb, quæ ad regulinam antimonii substantiam ortum referunt, commemorari merentur, crocus metallorum, polvis Monckii, sulphur sic dictum auratum, vulgari modo per precipitationem cum æeto, vel solutione martis, vel etiam solis coëctum, vel singulari modo præcipitatum, ut panacea Glauberiana, in pharmatopœis Brunsvicensibus Conerdingiana vocata.

Theorematia practica.

I. Quæ jam memoravimus salivantia optime in duas classes possunt dispesci, mitiora scilicet, & fortiora. Ex mitioribus quidem & mercurialibus, ethiops mineralis & cinnabarina, modo in pleniore, & continuata dosi offerantur, etiam salivæ fluxum proritant, & humores lymphaticos in motum cient, atque cum fructu in iis morbis, qui ab obstructionibus glandularum, vel feri coagulo, aut extravasatione in capite oriuntur, resolvendo & fundendo coagulatos succos, usurpantur. Deinde quoque antimonialia, quia sulphur regulinæ in iis substantiæ quodammodo nuptum, etiam lenius agunt, nec ab iis tantæ turbæ & sæva symptomata timenda sunt, ac a plerisque mercurialibus chymica arte præparatis. Inter leniora quoque mercurium dulcem bene elotum & præparatum, item ipsum argentum vivum rite depuratum, in formam solidam, & pulverem arte

conversum, referimus, excepto mercurio vivo exteriori applicato, quippe qui cum unguentis in unguentum redactus, & partibus nervosis inferioribus pedum, poplitibus, genubus multo magis spinæ dorsali, illitus, validissime sepe & subito vix coercibile salivæ exprimit stillicidium.

II. Modus autem operandi ita evolvendus & concipiendus videtur. Videlicet argentum vivum 1.) omnium fluidorum est gravissimum corpus, ejus minimæ etiam particule solutæ & divise, specificam suam gravitatem, respectu omnium fluidorum superiorem, semper servant, & 2.) ipse mercurius ab omnibus salis menstruis solvi & inficere parvas, & subtiles moleculas redigi potest, quæ ob vim corrodentem & simul gravitatem specificam intima vasorum & pororum in corpore humano penetrant. Mirum etiam diffundi posse argenti vivi, & partes, & vires, ad oculum patet ex eo, quod sublimari mercurii unum tantum granum in aqua dissolutum, vel duas aquæ uncias conspiciuo non solum metallico irritante sapore possit inficere, sed etiam tam efficaciter virtute imbuere, ut mercurialis hæc aqua interbe & externe adhibita, excretionem per salivam, sudorem, alvum, immo vomitum, pro dispositione subsectorum & humorum, potenter moveat, & exterius adthorata, scabiem & omnes cutis descædationes repente hiccet ac reprimat. Quandoquocunque itaque mercurialia, vel exterius applicata per fumum, emplastrum aut unguentum, vel interius santra, ab humoribus corporis nostri bitibus alcalinis solvantur, sive in minimas partes dissepuntur, promte & efficaciter in nervos & nervosas maxime fibras glandularum conglorantur, & conglomeratarum, immo in ipsas tudicas lacteorum & lymphaticorum vim suam exercent, & eorum systolem atque contractionem augendo, motum lymphæ concitationem reddunt, quo intensiori factq, consistentes in gland-

glandulis & minimis vasis humorum obstructions, flagnationes & stases lymphę coagulatz tandem resolvuntur atque expediuntur.

III. Hac utique ratione lues venerea & qui cum hac affinem naturam habent morbi feliciter extirpantur, nec ea propter semper in curandis his cum Gallica lue morbis opus est salivatione, sed qui arcanum novit, dextro mercurialium, & antimonialium bene preparatorum usu & applicatione, sine salivatione, ut olim petuliari dissertatione adstruxi, has rebelles ac pertinaces affectiones sanare potest. Neque enim, quod omnes periti & usu exercitati Medici ultro confitebuntur, salivę fluxus causa est curationis luis venereę. sed potius illa subblata glandularum, & minimorum vasculorum obstructio & colloquatio humorum viscidorum ibi stabulitium, quam deinde per accidens sequitur largior salivalis humoris profusio.

IV. Sub salivatione mercurio excitata, ut sæpius observavi, exteriores, præsertim inferiores partes, ut pedes, ordinario frigent & contractę sunt, alvi etiam & urinę fluxus retinetur, sublato autem per hanc partium inferiorum stricturam libero lymphę & feri, nec non sanguinis in vasculis minimis circuitu, necesse est, ut humores serosi & lymphatici cum impetu ruant ad partes superiores, & maxime solennia in faucibus glandulosa conceptacula, e quibus qua data via jugi postea ferantur rivo, & cibum, & somnum impediende. Vidi quoque in iis, quos enormis & ad tres vel plures menses durans salivatio demum lipothymia & catarrho suffocativo e medio sustulit, partes externas tam frigidas fuisse, ut nullo auxilio, neque balneo, neque frictione, ad calorem reduci potuerint. Equabilem autem & liberum lymphę ipsiusque sanguinis per omnes corporis partes interceptum progressum, salivam movere, continua illa sputatio testatur, solennis hypochondriaci ac melan-

cholicis, in quibus pariter ob contractas partes inferiores, lymphę & saliva majori nisu fertur ad glandulosam faucium & oris compagem.

V. Quod vero profluens sub salivatione, præsertim iis qui impura venere infecti sunt, humor tam fetidum & putridum spirat odorem, hæc reddenda videtur ratio: quod mercurii tenuissimę partes, reliquos omnes humores gravitate superantes, ab illis in connubium susceptę, motu suo circumvolutorio, mixtionem, crassin atque texturam sanguinis, haud secus ac in putredine dissolvere incipiant, ut hanc ob causam fetor sulphureus, volatile quippiam spirans, exhalet & ipsi dentes nigredinem contrahant.

VI. Omnes magnopere a Chymica celebratz panaceę maximeque solares, quę potiore suę facultatis partem ad metallicum & mercuriale elementum referunt, si rite preparantur & dextre usurpantur, non defraudandę sunt sua laude, in morbis ubi cuneo & veste quasi opus est. Nam summa activitate pollent, ac in exili admodum dosi in systema partium nervosarum potenter agunt, magnosque effectus præstant. Quin innotuerunt mihi ejusmodi medicamenta, antimonialia inprimis, quę pro diversa dosi & regimine juncto, item pro diversa subsectorum ratione, in exigua mole, vomitum, alvum, immo salivam, movere possunt, sed perpauci Medici eorum rectum usum & peritam administrationem norunt.

C A P U T V I.

De roborantibus.

§. I.

Tertium nunc ex summis remediorum generibus sequitur, complectens ea, quę solidis dicata sunt, ita quidem, ut circa eorum vires ac potentias motrices, eisdem æsopiciando, firmando ac intendendo, oc-

cupentur, & defumta a robore generali denominatione, audiant ROBORANTIA. Horum pariter maxima in arte medica utilitas est atque necessitas; eo quod robore ac inde pendente motuum exercitio, vita omniumque actionum integritas & continetur, & absolvitur; eaque propter ubi lanitas offensam patitur, roboris maximum momentum ac nonnisi motu labefactarum functiones ad primum ordinem reducuntur. Jam vero plura, quoad vires & usum specialius distinguenda, huic censum subeunt, & primum merito locum obinent ANALEPTICA, quæ quidem nomine insigniuntur, quæ vires imminutas & depressas erigunt, restitunt & confortantem, uti vocant, vim habent, & passim etiam cordialia & cardiaca dici solent. Huic scopo obtinendo serviunt ex vegetabilibus: flores rosarum, citri, aurantiorum, jasmini, liliorum convallium; herbarum: melissa, origanum, marum, poma citri, Chinenfis recentia & ex aromatibus cinnamomum; ex resinosis ipsa ambra; ex animalibus moschus; & quæ ex his omnibus preparata possunt, ut oleum de cedro, melissæ Turcicæ, rosarum verum, canange, quod ex floribus tilia in Persia elicitur, pomorum Bergamotte, essentia ambrae rite preparata, oleum cinnamomi in elzofaccharum redactum, quod in pulvere sic dicto solari Cellenti præcipuum, aqua melissæ citrata, liliorum convallium, cinnamomi cydoniata. Refertur huc usque possunt fructus fragorum, rubi, rubi idæi, ceraforum eorumque nuclei, & ex iis recentibus paratæ aquæ, succus limonum & exinde confectus sirupus.

Theoremata.

Cordialia hæc fraganti suavissimo subtili oleo principio agunt & in nervos eorumque liquidum immediate fere penetrant, ipsique motum naturæ blandum & amicum insinuant. Etenim hæc incholes omnis substan-

Tom. III.

tiæ sulphureæ, tenuissimæ & halituosæ, ut interiora partium nervosarum promptissime pervadat, ac celeriter effectum edat, quod graveolentia ipsaque suaveolentia, si quis ex idiosyncrasia eadem ferre nequeat, planum faciunt testatumque. Hinc etiam solo odore, ut in animi deliquio & syncopeis, subito roborantem suam vim exerunt & vires erigunt, eo quod in nulla corporis parte, & nervorum, & vasculorum sanguineorum extremitates, tam nudæ minusque testæ, quam in narium amplo & cavernoso ductu occurrunt, & admota fragrantia expedite ibi nervos & spiritus afficere possunt.

Corollaria Practica.

I. Utut hisce dictis analepticis in refocillandis viribus non deneganda sit sua virtus, ea tamen valde restricta & limitata est. Optandum quidem esset, ut in rerum natura certæ ejusmodi virtutis prostrata remedia, quæ, ut vulgus putat & a medentibus etiam semper exigit, efficaciter vires in omni fere morbo, præsertim vero acutis & malignis, depressas & deficientes redintegrarent; sed quia in morbis vires non rectius & certius restituntur, quam causis morbificis, quæ eas frangunt, sublatis & noxiis robore corpore expulsi, nisi hoc exsequatur Medicus, omnis analepticorum usus erit frustraneus.

II. Neque etiam existimandum est, restaurationem virium veratæ & constantem tantum procurandam esse medicamentis, quæ motum in spiritibus & partibus solidis concitant. Nam in pluribus morbis, præsertim febribus & convulsionibus, magna quidem vis & potentia motrix cordi, arteriis & membranis nervosis inest, & tamen vires naturales sunt languidæ & valde infirmæ. Proinde potius verum virium naturalium robur maxima ex parte dependet a congruis alimentis, esculentis & potulentis, in bonos succos & sanguinem conversis, ex quibus postea tenuissimum illud,

S

quod

quod in cerebro separatur fluidum, & per nervos ad musculos & tunicas musculosas delatum, potissimum corpori & ejus partibus vigorem ac firmitudinem largitur, denique ingeneratur.

III. Optime igitur materiae nutritiva sunt optima analeptica, cujus generis sunt juscula ex carnibus gelatinosa, caponum, osibus & eorum medulla, per decoctionem cum aqua, paulillo vini, adjectis aliquot taleolis pomi citri, tantillo salis, pulveris macis & caryophyllorum, in clauso vase parata, item quae ex pane nigro VVestphalico, aqua & vino cum ovis conficiuntur, decoctum quoque succoladae, cum vel sine lacte, lac ipsum alinum: aqua panis grossioris cum corticibus citri destillatum, & vinum maxime Rhenanum generosum & annosum, item verum Hungaricum. Haec tamen praesidia alimentosa & nutritiva ad vires erigendas, non in ipso morbo, neque ubi tota massa sanguinis & humorum valde impura est, sed inclinat morbis & ubi a praecedenti morbo, vel animi affectu, diuturna vigilia, corporis & animi labore ac fatigatione, vel nimis haemorrhagiis, vires exhaustae sunt & attritae, optime conveniunt, quae etiam tunc perita adhibenda moderatio, eo quod celeriter admodum in sanguinem transeunt, ejusque copiam augent.

§. II.

II. De Analaptesicis in roborantium classe succedunt BALSAMICA, quae calidioris & acrioris sunt indolis. Comprehendunt haec medicamenta sic dicta cephalica, nervina, aut apoplectica, antiparalytica, cordialia spirituosae & hujus generis alia, & ex eorum censu quam maxime eminent lignum aloes, ejus resina, atque essentia, agallochum album, Santalum citrinum & ejus essentia, in balsamum liquidum concentrata, ambra grysea, liquidambra, opobalsamum, succinum, benzoe, styrax calamita & ejus resina, styrax alba, laudanum & ejus resina, balsamum Peruvianum, de Copaiva, A-

mericanum rubrum, Tolutanum, cortex Peruvianus verus, coltus amarus, chaccarilla, cinnamomum, caryophylli, cardamomum, cubebae, macis, nucis, saureja, thymus, ruta, ferpillum, lavendula, spica, origanum nostras & Creticum, majorana, melissa Turcia & nostra, chamomilla Romana, marum Syriacum, basilicum, abrotanum, spica Indica, schœnanthum, folia lauri, myrthi, & ex his destillata olea fragrantissima vera non adulterata. Ex compositis balsamum apoplecticum Croli, Cellense, Scherzeri, nostrum liquidum vitae, spiritus balsami Peruviani nostra methodo paratus, spiritus succini, mastiches, aqua apoplectica Sennerti, Anhalidina, essentia ambrae vera, spiritus volatiles, oleosi, cum oleo cinnamomi, macis, de cedro essentificati.

Theoremata.

Enarrata haec simplicia & ex iis praeparata tenui aethereo & subtili volatili oleo, naturae admodum blando & amico, in fluida non minus ac solida corporis nostri agunt virtutemque suam diffundunt, & partes sulphureas calidas & ethereas in sanguine & humoribus deficientes, restitunt, augent atque motum intestinum calidum & spiritaliscentiam vitalibus humoribus foenerant. Pollent vero etiam sale subtili acri balsamico, eodemque cordis, arteriarum & fibrarum musculosarum viem & potentiam elasticam intendendo, sanguinis & humorum progressum ac circulum egregie promovere, quo postea fit, ut humores crassi & viscosi attenuentur, obstructions solvantur & saluberrimum perspirationis negotium, quo optime morbi arcentur, integrum servetur ac illibatum.

Corollaria practica.

I. Igitur in omnibus morbis capitis, nervorum, spinalis medullae, stomachi & cordis, qui a causa secundum Veteres sic dicta frigida foventur, humorum nempe ipsistudine, condensatione

ne

II. De
balsami-
ca.

ne & ab atonia & nervosarum & musculorum partium, ut in apoplexia, paralyſi, ſupore & torpore ſenſuum, memorie debilitate, auditus difficultate, lipothymia, ingenti virium debilitate, provido, tam interno, quam externo uſu, ſuppetias ferunt exoptatiſſimas.

II. Stomachi quoque & inteſtinorum vitii, quæ ex atonia, copia cruditarum acido-ſciſidarum, depravata digeſtione, natales ducunt, ut inflationi, item diarrhææ, colicæ flatulentæ, vomitioni miſrice ſubveniunt, & maxime quidem conducunt etate ſenibus & omnibus imbecillis & debilitatis, nec non qui laxioris ſunt habitus & conſtitutionis phlegmaticæ.

III. Cum fructu etiam uſurpantur, ſi a diuturna anni conſtitutione præhumida & frigida, tempore præſertim autumnali & hiemali, ac inprimis in regionibus ſeptentrioni vicinis, tuſſes humidæ, diarrhææ, aſthmata pituitoſa, tumores œdematoſi, coryzæ, rheumatismi, intermittentes quoque febres & ſcorbutica impuritate provenientes ægritudines regnant, vel metuendæ ſunt, ſine potiſſimum præſervatorio.

IV. Cavendum vero ab eorum liberaliori doſi eſt, quando corpora ſuccis & ſanguine plena, alvinæ ſordes reſtant, juvenibus & cholericæ ſenſibilioris indolis ſubjectis.

V. Ego medicamentum liquidum baſſamicum, quod vulgo vocant baſſamum vitæ, ex optimis hiſ & maxime oleis veris non adulteratis conſlatum, per viginti & quod excurrit annos in uſu habui, cujus tam ſpectata virtus, ut reliquis omnibus roborantibus & baſſamicis quiſque facile carere poſſit, ſi unico hoc interne & externe recte uti norit. Et hoc ſua viſſimum efficaciſſimumque medicamentum, eximia roborante & reſtaurativa facultate toties totieſque nobilitatum, late quidem jam innotuit; ſunt vero, qui aſſimulatum huic ex adulteratis maxime oleis non tam concinnatum, quam conſuſum, nefario dolo

meo ſub nomine incautis venditant, quod tamen virtutem & famam ſuam neutiquam ſuſtineri poteſt.

§. III.

Sequuntur ſtomachi & inteſtinorum tonum roborantia, quæ ſimul carminativa complectuntur, eoque nomine laude digna ex radicibus: galanga, gentiana rubra, zedoaria, pimpinella, calamus aromaticus, arum; ex corticibus: canella alba, faſſaſtras, citri, aurantium & pomorum Chinenſium recentes, cortex Africanus, Vinteranus, chaccarilla; ex aromaticis: piper, zingiber, caryophylli, cinnamomum, cardamomum, macis; porro chamomilla Romana & vulgaris, abſynthium, mentha, cardus benedictus, ſemina quatuor carminativa; ex preparatis, oleum de cedro, aurantium per expreſſionem paratum, oleum chamomillæ vulgaris, dauci cretici, aniſi ſtellati, cymini & carvi verum, menthæ, abſynthii, ſpiritus ſalis, nitri dulcis; ex compoſitis, ſal volatile Sylvi, elixir ſtomachale noſtrum, Michaelis, eſſentia carminativa Wedelii, pulvis ſtomachicus BircKmanni, eſſentia corticum aurantium cum ſpiritu nitri dulci, tinctura tartari & oleo aurantium per expreſſionem parata, eſſentia compoſita abſynthii Conerdingii, aqua carminativa Dorncrellii, ſpirtus de tribus.

Theoremata practica.

Utut plurima ex adductis ſuperius cephalicis & nervinis, in morbis ventriculi & inteſtinorum, præſertim, qui a tono eorum deſecto, vel debilitato proveniunt, egregio etiam ſint præſidio; ſuppetunt tamen adhuc alia, quæ vitiiſ harum partium amovendis, pro paſſionum differentia, ſpecifica qualiſ efficacia ſunt accommodata. Scilicet ad appetitum, ob ſaburram viſcidorum & acidorum in ventriculo cruditarum vacillantem, redintegrandum, præter amara, ut radicem gentianæ rubræ, herbam abſynthii, cardus benedicti & aro-

III.
Stomachica

mata, radix maxime galangæ, pimpinellæ, canella alba, piper, zingiber, arum cum fructu usurpâri possunt. Ad nauseam, vomitionem & inversionem ventriculi compescendam, nil mentha, ejus aqua spirituosâ & oleo probe destillato, item mastiche & ejus spiritu, nec non qui ex balsamo Peruviano & sale tartari paratur, item liquore nostro anodyno minerali, præsentis & efficacius est. Ad doloris cardialgici, colici & torminum atrociam levandam, cortices aurantiorum recentes, & ex iis rite extracta essentia, aqua & oleum cymini Æthiopici, oleum non adulteratum florum chamomillæ vulgaris, spiritus nitridulcis bene præparatus, remedia sunt expeditissima. Ad intestinorum nimiam lævitatem & nimias dejectiones moderandas, cortex chaccarillæ peculiari splendet efficacia. In intestinorum inflatione ad elidendos flatus, aqua carminativa Dorncrellii, essentia carminativa VVedelii, item spiritus de tribus cum spiritu nitridulci nuptus, essentia & aqua zedoariæ, cardamomum, oleum carvi & cymini verum destillatum, omnibus facile palmam præcipiunt.

§. IV.

20. Vi- Proximum est ut roborantia VI-
sceralia SCERALIA, quæ nempe, visceribus sanguineis, ut hepati, lieni, utero, renibus, pulmonibus firmandis & roborandis, quo eo expeditius officio suo fungantur, dicata sunt, adeoque ad horum classem hepatica, splenetica, pneumonica, uterina, cachectica, antihydrotica, antiicterica, antihystERICA, antiphthistica commodè referri possunt. Sunt vero hunc in usum commendabiles radices: gentianæ rubræ, aristolochiæ longæ & rotundæ, cicorii, zedoariæ, filicis, rhabarbariveri & rhapontici, curcumæ, ononidis, cortex chinæ; chaccarillæ, VVinteranus, tamarici, fraxini, capparum, castia caryophyllata; herbæ: absynthium, centaureum minus, fumaria, carduus benedictus, trifolium

fibrinum, hepatica nobilis, melissa, pulmonaria maculosa, scolopendrium, agrimonia, marrubium, cuscuta, veronica, scabiosa, epithymum, capillus veneris, pilosella. Neque minus laudanda hac virtute ex gummatibus & resinosis fuccinum, myrrha, aloë, bdellium, gummi hedere, ammoniacum, olibanum, sagapenum, opoponax, asa foetida; ex mineralibus: sulphur commune purum stillatitium, limatura martis & omnia ex marte parata, & quæ Chymia suggerit varia præparata, ut salia herbarum per incinerationem parata, arcanum & terra foliata tartari, ejus cremor, sal polychrestum, nitrum antimoniatum, spiritus salis ammoniaci, tinctura martis, ex floribus salis ammoniaci cum hæmatite præparata, spiritu vini extracta, tinctura tartari, antimonii alcalisata, elixir proprietatis cum lixivio paratum, essentia fuliginis, elixir nostrum viscerale cum menstruo aqueo salino confectum, antimonium martiale cachecticum, massa pilularum Becherianarum & similia. Pertinent huc quoque fontes medicati sic dicti minerales, præsertim qui subtile quoddam martiale elementum custodiunt, ut Pyramontæ, Spadana & Schwalbacenses, multo magis qui largius martialiochra imputi sunt, ut Lauchstadienses, Radebergenses, Behranz & Freyenvaldenses.

Theoremata.

Balsamica hæc visceralia principio & elemento, partim sulphureo, balsamico & terreo, paulo fixioris naturæ, partim etiam sale alcalino sulphureo, sive saponaceo, item amaricante, operationem suam in viscera, quorum vasa humoribus tenacibus crassis infarctâ & obstituta sunt, edunt, succos lentos incidendo, dissolvendo & simul ipsis vasâ & fibrâ a robore & tono dejectis vim contractilem & elasticam conciliando; adeoque in omnibus iis morbis longis, qui ab horum viscerum labe nascuntur, tum

ad

ad præſervationem , tum ad curationem , polychreſta & certæ efficaciæ ſunt medicamenta .

Corollaria practica .

I. Licet omnia ſic dicta viſceralia in genere conveniant in eo , quod totum viſcerum roborent , & infarctus atque obſtructiones expediant ; nihilominus tamen pro viſcerum & morborum differentia , eorundem diſcrimen & ſelectum probe ſervare neceſſarium . Ita exempli gratia , ſi hepar laborat obſtructione , & inde morbi , ut icterus , cachexia & ſcorbutus , propullulant , quæ amaritæ quadam ſaponacea & deterſiva viſumque exerunt erunt efficacia , nominatim radices quinque aperientes , rhabarbarum , curcuma , opoponax , bdellium , ſapo Venetus , elixir proprietatis ſine acido , eſſentia rhabarbari cum ſale tartari parata , eſſentia triſcolii fibrini & omnia ex Marte bene præparata . Quando pulmonum nimia præſito eſt laxitas & infarctus , ac inde nati , vel naſcuntur morbi , myrrha , gummi amoniacum , ſulphur ſtillatitium , herba veronica , ſcabio ſæ , chæreſfolii , pulmonariæ , pilofellæ , marrubii , capilli veneris , magis ex uſo ſunt . Ubi lien magnus & ſanguine farctus gignendæ impuritati ſanguinis , ac præſertim cachexiæ , admodum velificatur , cortices tamarici , capparium , fumaria , ſcolopendrium , caſſia , epithymum , radix ononidis , ipſaque martialis aliis præferenda . Quum ex imbecilli & nimium remiſſo renum tono nephritis & calculi progignuntur , cortex radicis acaciæ & ejus infuſum , item rob cynosbati & juniperi , ſpecifica quadam activitate ſuccurrunt . Ex labefactato uteri ejusque vaſorum robore & retardatis in debito progreſſu ſanguine & humoribus , longæ & multiplices , præſertim poſt abortum , paſſiones pullulant , quibus utique ſingulari quadam efficacia medentur ariſtolochia , tam longa , quam rotunda , artemiſia , myrrha , matricaria , galbanum ,

Tom. III,

bdellium , opoponax , ſuccinum , maſſa pilularum Becherianarum & aliæ quoque ad earundem exemplar conſcinnaæ . Si inteſtina & quæ ſpectant ad ea , glandulæ & tubuli ſecretorii & excretorii , biliarii , pancreatici , laſtei , robore debito deſtituuntur , ut a copioſiori humorum decubitu fiant nimii alvi fluxus , vel ſubſiſtentes in vaſis humores moribus , inſultibus & paroxyſmis febrilibus , fomitem & occaſionem præbeant , rhabarbarum , cortex chinæ , VVinteranus , chaſcarillæ , martis tenuiſſimi croci atque eſſentiæ , præſtabant id , quod non facile aliis obtineri poterit .

II. Circa uſum tamen roborantium id in genere tenendum eſt : quod longe meliorem effectum atque utilitatem præſtent , quando non ſolum ante eorum oblationem ſanguis nimis redundans ſubtrahitur & congruis laxantibus primæ regionis recrementa eliminantur , ſed etiam ſi ipſa ad meliorem humorum fluxilitatem & mobilitatem conciliandam , in decocto , vel infuſo , propinantur , vel adhuc rectius , cum potu acidularum , thermaſum , aut ſeris lactis conjunguntur , quo certe horum roborantium , quæ adſtringentis naturæ , operatio egregie adjuvatur , atque intenditur , ad tollendos magnos chronicos & inveteratos morbos , inprimis quando paullo diutius continuantur & corpus ſimul convenienti motu , equitatione , vectura aut ambulatione exercetur .

§. V.

Excipiunt ADSTRINGENTIA & VULNERARIA , Græcis traumatica dicta , quæ fixiori quodam leniter conſtringente elemento laxas nimis , eliquatas , eroſas ac læſas partes & fibras adducunt , ſtringant , conſolidant & conglutinant . Atque ex horum cenſu præcipua ſunt radix caryophyllatæ , tormentillæ , biſſortæ , conſolidæ majoris , pentaphylli , plantaginis , rhaſpici : ex herbis : vinca per vinca , ſanícula , pyrola , conſolida major , media , Sagacenica , uva criſpa , agri-

S 3

mo-

Ad-
ſtrin-
gentia
& tra-
umatica .

monia, hypericum cum floribus, millefolium cum summitatibus, equisetum, veronica, fragaria, verberna, pilosella, teucrium, plantaginis species, folia quercus, botrys, melissa, mentha, betonica, urtica mortua, flores rosarum, balaustiorum, cortex chinae, granatorum, radices acaciae, succus acaciae, catechu, sanguis Draconis, fructus myrtillorum, cydoniorum, ex aromatibus nucifera, ex mineralibus haematites, alunien & omnes terrarum, & margarum species; ex chymicis flores salis ammoniaci martiales, liquor martialis ex capite mortuo florum salis ammoniaci martialium paratus: inter praeparata essentia traumatica Wedelii.

Theoremata.

Species quam jam recensuimus ex principio paullo fixiori terrestri cum acido juncto agendi facultatem habent, ac dum nimis relaxatas fibras paullo strictiores reddunt, a decubitu & stagnatione nimis liquidi eas liberant, simulque coeuntibus propius fibris soluti, consolidationem, & coalescentiam promovent. Differt tamen constrictiva in ipsis virtus gradus: siquidem in radice tormentillae, bistortae & ejus extracto, floribus balaustiorum, corticibus granatorum, salis quercus, alumine, liquore martiali, fructibus & cortice acaciae, fructibus cydoniorum, & bacis exsiccatis myrtillorum, longe eminentior est, quam in herbis sic dictis vulnerariis, quae subtiliori terreo alcalino principio, quod partibus sulphureis balsamicis fixioris indolis intermixtum, imbuta, lenius & tutius operantur, & multi ac praestantis in praxi medica sunt usus. Quod autem haec tam vulneraria, quam adstringentia, subtilis, solubile, terreum, constringentis facultatis elementum recondant, ex eo planius facile innotescit, quod insulum eorundem paullo saturatius, ad mixturam vitrioli martis, immo omnium liquorum martialium, non secus ac cum gallis sit, nigrum & a-

tramentosum colorem recipiat.

Corollaria practica.

I. Si ullus remedium usus cum prudentia & exquisita providentia instituentus, certe adstringentium. Nam quum vita & integritas totius corporis omniumque ejus partium in perpetuo & progressivo circulari motu humorum tenuium & fluidorum, per compagem corporis penitus ferme vasculosam & ex minimis prorsus tubulis coagmentatam, contineatur & absolvatur; constringentium vero ea vis atque facultas sit, ut fluidis mixta, ea incrassent, poros vero & tubulos solidorum coarctent atque angustent; in proclivi est, hujus virtutis remedia, naturae animantium & vitalibus motibus minus favere atque amica esse, adeoque nec satis fida, nec secura, nisi magna cum prudentia adhibeantur. Experientia jam indes docet, ab ejusmodi improvide datis constringentibus in compefcendis nimis sanguinis, vel alvi fluxibus, innumera damna & noxas induci, ac perquam facile inde aegrotantes lentas febres, cachexiam, tumores cedematosos, affectus spasmodicos, colicos & hypochondriacos inturrere. Et hoc etiam referendus imprudens corticis chinae usus, in profligandis intermittentium paroxysmis, quando hujus vi, idem tamen constringente, sordes viscidæ, biliosæ, salivales, quæ tubulis viscerum primæ sic dictæ regionis inhaerescunt & excerni debebant, retentæ, ibi diutius detinentur, & vel recidivam, vel novum & deteriorem morbum excludunt.

II. Si necessitas ejusmodi constrictiva postulat non simul & semel, sed successive atque in remissiori dosi & cum sufficienti liquido, subjuncto etiam corporis motu, propinari debent; id quod etiam perpetuo, quando cortex chinae, vel etiam martialia, in usum trahuntur, injungere soleo.

III. Infelix, intuta & periculi plena est cura, qua nimis vomitiones, mictio cruenta narium, uteri, aut a-

hæ.

hæmorrhagie nimie, item hæmoptysis, adstringentibus compescuntur, quod certe nunquam cum bonis egrorum rebus perficitur, nisi prius spasmus a quibus plerumque res causis proximi sanguinis fluxus pendet, complacati, nimia motuum ferocia sedata & humores copiosius affluentes ad alia loca derivati.

IV. Herbs sic dictæ traumaticæ, seu vulnerariæ, atque earum decocta, non modo in vulneribus, erosionibus & continuis solutionibus, sed & in quibusdam longis & valentibus morbis, ut phthisi, scorbuto, cachexia & calculosis passionibus, quando nempe a tono viscerum & glandularum dejecto & humorum hostili stagnatione vel stasi oboriuntur, insignem & commendabilem ferant opem. Semper tamen cavendum, ne ubi nimia vasorum obstructio, & fibrarum contractio, ac pulmones in phthisi tumoribus ac tuberculis duris obsessi, iis utamur. Alias certe vulnerariarum & leniter adstringentium usum infuso longè saluberrimus, ad præciscenda calculosa in renibus concrementa molissimissima, quæ ex nimia laxis vel exulceratis renibus potissimum natales ducunt, de quo lectu digna Cl. Hucherii dissertatio de adstringentium usu in calculo. Et hoc nomine infusum millefolii & ejus summitatum, veronice, hederæ terrestris, fragariæ, agrimonie, corticis radicis acacie, egregii usus. Pariter in involuntario urinæ stillicidio, tam in pueris, quam senibus a nimia laxitate sphincteris suborto, ejusmodi infusa expertæ & desideratæ virtutisprehendi, ad motum simul exterioris spiritus vini rectificato.

V. Efficacissime virtutis in externis lesis & vulneratis partibus traumaticum, quod sanguinis, & humorum fluxiones promptè compescit, est solus spiritus vini, probe rectificatus, quo certe nihil præstantius, si partes nervosæ, tendinosæ sensibiliores cum nimia sanguinis profusione fauciatæ. Nam spiritus vini non solum succos, ut

videmus in sanguine & lymphæ, coagulant, sed etiam nimium humidum absorbendo, fibras tenas & strictas reddunt, easdemque arctius adducendo, & sanguinis stasin atque stagnationem removendo, dolores atque inflammationes arcunt, atque avertunt. Nec ingloria est traumatica facultate nostro tempore aqua spirituosissima l'eau d'arquebouside dicta, quæ ex optimis herbis vulnerariis destillatione cum vino Rhenanò in balneo Mariæ paratur, cujus tamen virtus spiritui ac vino potius, quam herbis, quarum effectus in fixiori terreo elemento reconditur, quod alembicum non transceudit, tribuendus.

CAPUT VII.

De sedantibus.

§. I.

Consideravimus hæcenus succin- Sedantia sunt effusiva laquei.
cte ea remedium genera, quæ roborando agunt, ubi motus solidorum systaltici deficient, eorum tonus dejectus & partes nervosæ ac fibrosæ ipsæque vasa nimis resoluta & relaxata sunt: nunc transcendendum ad eorum classem, quæ nimis & effrenis solidorum & fluidorum motibus componendis, sistendis atque sedandis, & spasticis partium stricturis dolorificis remittendis & solvendis, virtute quæ gaudent dicata sunt. Quumque adeo multiplex & late patens sit effectus, ad hanc classem referenda quam optime paregorica, quæ laxant blande & demulcent rigidas fibras simulque acrimoniam obrundunt, anodyna, quæ dolorum ferociam levant, antispasmodica, quæ spasticas stricturas leniunt ac solvunt, antepileptica, quæ motus convulsivos sistunt, hypnotica, quæ somnum conciliant, & narcotica, quæ conspicuum sensationibus stuporem ac motibus torporem inferunt.

§. II.

Hæc itaque sedativa generali & specialia facultate præsent radices: paeo- Appoi- valis.

S 4 niz,

nię, valerianę, artemisię : herbe :
 horminum, basilicum, solanum, pa-
 ris; flores : salvię, fraxinellę, aca-
 cię, ulmarie, sambuci, tilie, poro-
 nię, papaveris rheados, chamomillę
 vulgaris, millefolii, rosarum, mal-
 vez, liliorum convallium, primulę
 veris, liliorum alborum, & omnia ex
 planta papaveris, semen, cortices, flo-
 res, succus, opium & ex hyoscyamo
 albo ejus semen, semen anethi, pœo-
 niz; cortex quoque sambuci, tilie &
 thymiamatis; ex aromatibus: crocus,
 nucista, macis; ex fructibus nuclei
 ceraforum, persicorum, amygdalę
 amarę nux vomica. Porro asa fetida,
 camphora, nitrum depuratum & ar-
 tificiale, cinnabarine, nec non ex
 animalibus depropta, castoreum,
 moscus, zibethum, axungia canis,
 humana, taxi, vulpis, lac, cremor
 lactis, vitellus ovi, lumbrici terre-
 stres, rasurę ossium, ut cornu cervi,
 dentis hippopotami, ungulę aleis,
 unicorru animalis, eboris, lapidis
 manati, corii humani. Ex chymicis
 denique & preparatis: liquor noster
 anodynus mineralis, spiritus nitri
 dulcis, tinctura sulphuris volatilis, lau-
 danum opiatum Sydenhami, cydonia-
 tum, hystericum, theriaca, diafascordium
 Fracastorii, theriaca cœlestis, massa
 pilularum de cynoglossa, de styrace,
 pilulę VVildegansii, Starckii, sirupus
 papaveris, rheados, albi, extractum
 croci, florum papaveris rheados, cha-
 momillę, millefolii, oleum hyoscy-
 ami, lumbricorum terrestrium, pulvis
 antepilepticus Dresdenensis, cujus basis
 carbo tilie, item, artemisię, specifi-
 cum cephalicum Michaelis, pulvis
 Marchionis, aqua antepileptica Lan-
 gii & aque ex floribus superius recen-
 sitis destillatę, nec non unguentum
 populeonis.

Theoremata.

Sedantia hæc variis modis effica-
 ciam suam tam in fluida, quam soli-
 da perficiunt. Paregorica quidem blan-
 dis mucosis, sulphureis, tenuibus parti-

bus, fibras a spasmo duras & strictas;
 ipso contactu relaxant, spicula velli-
 cantia involvunt, atque obtundunt,
 adeoque in doloribus, tumoribus do-
 lentibus, acribus fluxionibus, in cata-
 plasmate, emplastro, vel unguento ap-
 prime ex usu sunt, ut crocus: flores
 chamomillę vulgaris, meliori, lilio-
 rum alborum, sambuci, malvę, papave-
 ris, folia hyoscyami, lac, cremor la-
 ctis, vitellus ovi, unguentum populeo-
 nis, ad ambusta, quod optime paratur
 ex malva, cortice arboris tilie, sambu-
 ci, oleo lini, cerę.

Antispasmodica, quia plurimi mor-
 bi & symptomata, ut in sectione pri-
 ma pluribus ostendimus, a spasticis
 stricturis & crispaturis vasorum & fi-
 brarum nervearum tanquam causa
 proxima gignuntur, amplissimi in ar-
 te usus sunt, non vero una eademque
 ratione munere suo defunguntur, vel
 enim ipsas fibras tensas, duras & con-
 strictas immediato contactu molliunt
 atque remittunt, ut lac, præsertim
 asininum, oleum amygdalarum dul-
 cium, emulsiones ex seminibus qua-
 tuor frigidis, amygdalis, pinguedines
 animantium, cremor lactis: vel blan-
 do sulphure vaporoso fluidi in neryis
 motum ferociore complacant, qua
 virtute imbutę aque ex floribus salvię,
 fraxinellę, acacię, tilie, sambuci,
 ulmarie, persicorum, liliorum al-
 borum; chamomillę vulgaris, pri-
 mulę veris, millefolii, nucleis persi-
 corum, ceraforum, malorum Armeni-
 acorum, cum aqua pluviali vel rore
 Majali destillatę, quę oh vim antispas-
 modicam, in convulsivis & epilepti-
 cis insultibus cum fructu adhibentur.
 Vel etiam quędam antispasmodica
 sulphure quodam tenui vaporoso ex
 regno animali, adeoque magis amio-
 co, effectum exsequuntur, ut lumbrici
 terrestres, castoreum, pulvis secundinę
 humanę, intestini lupi, viperarum,
 rasura corii & crani humani, ungu-
 lę aleis, dentis hippopotami, lapidis
 manati, nec non moschus & zibe-
 thum, quę in convulsivis & epilepticis
 mo-

motibus ac in ipsa etiam chronica epilepsia insigni cum fructu usurpantur.

Anodyna & ad dolores leniendos somnumque inferendum accommodata facultate instructa sunt papaveracea & quæ ex opio & croco, nec non cynoglossa parantur, quæ vaporosa sulphurea exhalatione nervorum & membranarum tubulos pervadendo, impetuosum fluidi nervi motum compescunt, & sic non modo in parte affecta, sed & universo corpore motus cordis quoque & arteriarum sedatores faciunt. Nam uti sub nimio motu & agitatione membranarum cerebri & nervosarum partium vigilia præsto est; ita sub earum quietiori & pacatiori statu somnus obrepit.

Narcotica vero, quæ torporem & stuporem sensibus ac profundiores somnum inferunt, vapore sulphureo ingrato & adverso, quo motus fluidi nervi fere extinguitur, minus amice operantur, adeo ut in imbecillis lethalem somnum, in aliis etiam insaniam excitent. Infamata hoc sunt nomine omnia, quæ ex hyoscyamo tam nigro, quam albo, stramonio & ejus specie datura, solano ipsiusque pomis concinnantur.

Nonnulla etiam ex sedativis spasmos & dolores sopiunt somnumque conciliant, causas impediētes aufereudo, qua virtute eminent quam maxime nitrum, purificatum vel artificiale, item cinnabarina & camphora. Nitrofa quippe tum æstum, tum motum intestinorum calidum partium sulphurearum in sanguine, componunt, solidas partes humectant, motusque in iis exorbitantes quietiores reddunt, adeoque virtutem possident, refrigerantem, humectantem, anodynam & antispasmodicam egregiam. Cinnabarina dextre usurpata in compescendis motibus epilepticis & convulsivis, qui a lymphâ subsistente viscida in cerebro & ejus membranis spinalis medullæ oriuntur, egregii

usus, quia eandem longiori usu potenter liquant. Camphora, præsertim cum nitro mixta, egregie discutit inflammationes, quibus semper vigiliæ, dolores, quandoque etiam deliria juncta sunt, & sic virtutem antispasmodicam & sedativam exerie. Alia denique fortida & sagapenum, quæ gummata graveolentem spirant vaporem, in spasmodicis intestinorum sedandis, qui feminas in malo sic dicto hysterico mire excruciant & affligunt, duplici modo suam efficaciam exerunt, partim quod spasmos, ac dolores sopiant, partim etiam quod saponaceo gummoso acri sale humores tenaces resolvant & obstructions glandularum & minimorum tubulorum referent.

Corollaria practica.

I. Magna igitur sunt efficaciar hæc sedativa, quæ subito etiam in exili mole sua perficiunt, ob agilissimum elementum, dum sulphurea vaporosa exhalatione, penitus in interiores poros & partium solidarum tubulos pervadunt & insignem in mobilissima, quæ sensum & motum partibus generat lymphâ, mutationem, ad motus effrænes complacandos, efficiunt. Sed uti in omni remedium genere, leniora & mitiora, seu securiora & naturæ magis amica, fortioribus magisque activis præferenda sunt: ita eadem cautio in antispasmodicorum, anodynorum & sedantium usu sollicitè tenenda & serio inculcanda; nec unquam facile ad validiora, ut opiata, descendendum est, ubi leniora, aquæ ex floribus suaveolentibus hypnoticæ, vel emulsiva ex semine papaveris, vel etiam nitrofa, cinnabarina & castorina sufficiunt.

II. Et licet opiata per adjecta purgantia & balsamica, ut in pilulis Starkey, Wildegansii, vel per alexipharmata, ut in theriaca celesti, diascordio Fracastorii, vel per analeptica, ut in laudano liquido Sydenhamii, correctâ, cum prudentia adhibita, virtute & usu eximio non destituantur;

tur; attamen si alia suppetunt securiori modo operantia præsidia, quibuscum idem effectus obtineri potest, præstat ab illis abstinere, præsertim ubi debilia corpora, ætas senilis, infantilis & vires variis de causis prostratæ. Longe autem magis ab his cavendum, quibus narcotica admixta, ut sunt pilulæ de cynoglossa, præter opium etiam semen hyoscyami habentes, quibus tamen nostro tempore frequentius utuntur, quibus opiata alias mirum exosa; ego vero non semel etiam ab harum ulu pessimum notavi effectum.

III. Ut ut olim opiatis correctis ipse quoque frequentius usus sim; ex quo tamen divina benignitas mihi concessit inventionem liquoris penetrantis & fragrantis aromatici saporis & odoris, ex ipsius vitrioli portione sulphurea, quæ etiam a veteribus Chymicis pro anodyna habita est, singulari quadam chymica encheiresi præparandi, ab omnibus aliis tuto abstini. Hic quippe spiritus, quem liquoris anodyni mineralis nomine insignire soleo, totus sulphureus est, subito & flagrantissime ardet atque absumitur & ocyssime a flamma candelæ, etiam tribus adhuc digitis remotus, flammam concipit, atque in calido conclavi subito in auras avolat; tactu tamen instar glaciæ est frigidissimus, ac probe destillatus & rectificatus, omniæque instar olei supernat. Usus vero huius remedii amplissimus est & virtus multiplex, dolores quippe egregie levat & somnum conciliat, unde summocum fructu in atrocibus colicæ, calculi, cardialgiæ & podagræ, capitis & dentium doloribus usurpatur. Sudorem quoque movet, ac licet ipse sit calidissimus, non tamen sanguinem commovet. Nullum præterea torporem nullamque debilitatem in capite relinquit, eamque ob causam omnibus imbecillis, ubi vires summe prostratæ, ut in hectica febre, non sine fructu, & quod mirum, virium incremento,

dari potest. Et quia ejus actio prima & præcipua in stomachum, in omnibus ventriculi morbis, nausea, inflatione hypochondriaca, asthmatica, cardialgia, incomparabilem statibus exitum parando, edit virtutem.

C A P U T VIII.

Specificæ quorundam remedium in certis morbis efficacia.

§. I.

Recensuimus hæcenus omnis generis quæ ad præservandum & curandum faciunt remedia selecta & optima, eaque succincte in certas classes ratione virium quas exerunt & elementorum, quibus agunt in genere redeimus. Quum vero attenta in artis exercitio observatione compertum habeamus, nonnulla sanitatis præsidia peculiarem, specialem, sive specificam præ aliis in certis affectibus possidere facultatem, eaque propter etiam usu & utilitate reliquis jam notis merito esse præferenda: utilem & gratum me præstiturum laborem judicavi, si ea, quæ longo usu exploratæ & in certorum morborum curatione spectatæ virtutis auxilia, enumerem & paullo specialius evolam. Non autem, ut vulgi Medicorum opinio fert, specificæ nobis audiunt ea remedium genera, quæ semper in omnibus subjectis certo & indubitato salutarem in morbis exerunt effectum, & nunquam medentis spem eludunt. Ejusmodi enim virtutis medicamenta nullibi sunt reperiunda, & falsa utique est persuasio, quasi operationes atque effectus formaliter insint pharmacis & ab his. tantummodo perficerentur, qui demum ex actione medicaminis, & reactione sive synergia ipsius corporis, resultant. Omnia quippe medicamenta agunt non tantum secundum spheram activitatis suæ, verum etiam receptivitatem subjecti, ut, si idem remedium, eodem morbo decumbentibus

*Dantur
specificæ
en.*

bus decem personis obtuleris, alius atque alius & differens in singulis consequatur effectus.

§. II.

Quæ
sensu
intelligenda.

Fallax igitur, inanis & dubia est vulgaris illa de panaceis, arcanis & specificis contra hunc vel illum morbum præfidiis dolosa jactatio: & potius per specifica sic dicta medicamenta nulla alia intelligenda esse inculcamus, ac ea, quæ ejusmodi agendi viribus instructa, ut ad hunc vel illum morbum sanandum efficaciora sint magisque proficua. Nonnulla quippe ejus indolis elementa complectuntur, quorum singula ad expugnandum morbi causam aliquid conferunt, ut ex iis mixtum pluribus simul in morbo curandi indicationibus satisfaciat. Exemplo sit rhabarbarum, quod aliis laxantibus omnibus in diarrhoeis palmarum præcipit, eo quod non modo evacuat, sed & amaritie balsamica acidos & causticos succoscicurat atque contemperat, ac demum cessante purgatione, tonum intestinorum laxum nimis atque remissum, ob terreas subadstringentes, quas recondit particulas, firmat iterumque adducit. Pariter manna in pectoris affectibus & tussi stomachali, quæ a cruditatibus acidis ortum trahit, ad repurgandam primam regionem, ob insitam, præter laxantem virtutem, ipsi dulcedinem copiosam, corrosivos, acidos & acres humores obrundentem ac demulcentem, omnia alia alvum subducentia longe antecellit. Alia remediorum hanc ob causam dicuntur specifica, quod eorum virtus in certo morbo ad certum edendum effectum, longa experientia innotuit & abunde confirmata est. Hinc cortex chinæ specificum in sistendis intermittentium paroxysmis, opium in doloribus levandis, mercurialia in expugnanda lue veneræ. Quædam specificorum nomen gerunt, quia partibus morbo affectis magis amica sunt eademque virtute lue quam maxime efficiunt. Sic partes nervosæ & mem-

branaceæ cum ipsis nervis medicamenta subtili, aromatico, fragrante oleo imbuta quam optime ferunt, minus vero narcotica, opiata & constringentia. Ventriculus acidis delectatur, ut iis perfusus melius appetat & digerat: contra eo pulmonum bronchia ab iis offenduntur & ad spasmos extimulantur. Cantharides & insecta sale volatili caustico prædita, nec ventriculum, nec intestina afficiunt; renum autem tubuli urinarii, ureteres cum vesica ipsaque urethra, ab iisdem vellicantur & spasticis agitantur stricturis.

§. III.

Sic concipienda virtus specificorum, quorum usus Medico frequens & in pretio esse debet; jam specialius paullo quæ ex ipsis his vel illis vitiis dicata sint & magis appropriata dispicimus. Et ad febres quidem intermittentes, maximeque earum paroxysmos compescendos, cortex chinæ nostro adhuc tempore quam maxime celebratur, hanc ob rationem, quia præter adstringentem & febriles motus sistentem virtutem, quam cum aliis pluribus, ut vitriolaceis, aluminosis, radice tormentillæ ac bistortæ, communem habet, ob amaricans balsamicum elementum, morbificam materiam corrigente & solida languentia firmante efficacia, splendet. Potest autem hic cortex vel in substantia propinari, vel in essentiam aut electuarium redigi, vel etiam, quod optimum, vino Rhenano infundi & leniter decoqui. Pariter ad specifica intermittentium referri solent flores chamomillæ vulgaris, a *Baglivo* mirum dilaudati, dum ob insitam amaritiam & oleum, & vim antispasmodicam in febris quæ maxime proficua, & leniter etiam constringentem tonicam obtinent. Quod si vero pertinaces sunt hæ febres, & mirum refractariæ in causa plerumque magnæ illius glandulæ pancreaticæ obstructio, ad quam tollendam mercurio dulci, regulo antimonii

In febribus intermittentes.

Contra: manna.

monii medicinali & sulphure antimoniali correcto, dextre ac prudenter usurpatis, nihil efficacies.

§. IV.

Quarta Speciatim in quartana peculiari quadam efficacia splendet essentia rhabarbari & gentianæ, cum lixivio salis tartari & spiritu salis ammoniaci vinoso parata. Etenim in hac febre hepar & ejus vasa sanguine crasso, ductus biliarii spissæ & lentescente bile, ac primæ viæ cruditatibus acidis eminentius confertæ sunt, eaque propter hoc medicamentum dum acidus succos contemperat & quasi dulcificat, stagnantem cruorem cum lentescente bile resolvit atque attenuat, inertem quoque bilem debita balsamica indole imbuat & simul blande alvum vacuat, omnibus aliis merito anteponendum. Quando autem hæc febris adeo obfirmata & contumax est, ut omnia alia remedia eludat, mercurius dulcis, vel diaphoreticus, rite præparatus, efficacissimæ virtutis medium, nec non antiquarium Riverii, quod pariter mercurio virtutem debet. Ac licet mercurialia exhibita etiam salivationem moveant, eadem tamen non pertimescenda, aut periculosa est, sed potius ipsa succedente febris sæpe conquiescit.

§. V.

Inflam- Inflammationibus omnibus, quæ *materia-* semper febre stipantur, nunquam periculo carent & plerumque in partibus nervoso-membraneis consistunt, ut cerebri & ventriculi membranæ, pleura, bronchii pulmonum, singulari quadam efficacia medentur nitrum purificatum cum momento camphoræ permixtum, demulcentia, leniter anodyna, emulsiva & diaphoretica fixiora. Inprimis nitrum in omni æstu febrili restinguendo omnia alia antecellit, eo quod præter virtutem, qua motum intestinum partium sulphurearum in sanguine figit ac complacat, obhærescentem quoque in valorum angustiis spissescentem sanguinem ac lympham

solvit & fluxilem reddit & simul fibras rigidas & tensas humectando relaxat, adeoque antispasmodicam exserit virtutem.

§. VI.

Ubi maligna, hoc est in putredinem prona, humoribus inest dispositio, vel etiam per contagium ejusmodi miasmata illata, quæ ad inducendam corporis succis putridam corruptionem aptissima, in acutis non minus, quam chronicis, ego quidem camphora, præsertim nitro nupta, nihil deprehendi præstantius. Hæc quippe balsamica sua vi, crasin & mixtionem conservat, atque tuerur, vim fermenti infringit, & perspirationem sine sanguinis exaltatione intendendo, eliminationem fordium per cutis spiracula egregie promover. Quod si febris vel inflammatione malignitati complicata, camphora nunquam sola, sed semper nitro remixta exhibenda. Ad vires autem in omnibus fere, ac potissimum malignæ indolis morbis, penitus prostratas, refocillandas, cortice citri oboleum quod complectitur, vix datur præstabilius, nec non cinnamomo ejusque aqua, non tamen spiritibus, sed cum succis fragrantibus, ut fragorum, rubi idæi & ceraforum, destillata. Ubi febris abest, oleum cinnamomi & cum eo artificiose confectum elæosaccharum, ad reparandas vires egregii usus. In ipsa peste, morborum maxime maligno, summum alexiterium dici meretur acetum, vel simplex, vel cum radicibus alexipharmacis & cordialibus artificiose præparatum. Succus quoque limonum, item pomorum citri, sirupus acetositaris citri, cum oleo de cedro conditus, ut acida, potenter resistunt putredini, cujus matrix & fomentum est principium alcalino-sulphureum exaltatum, ad humorum & proportionis mixturæ iam dissoluitionem corruptivam tendens.

§. VII.

Accedunt dolores, quid ex spastici

Maligna.

ipsa peste.

ea strictura oboriuntur, ut cardialgia colica & ex calculo, liquor noster anodynus mineralis omnibus palmam præripit, utpote qui non solum blandæ anodynæ & discutientem, sed etiam, quod aliis sedantibus plane negatam, roborantem egregiam facultatem custodit. Ubi flatus restagnant & incarceratis iis nervæ ventriculi & intestinorum tunicæ cum exquisitis torminibus distenduntur, corticibus aurantiorum, floribus chamomillæ, carvo & cymino, salubri discutiente effectu nihil superius, eo quod propter subtile vaporosum quod recondunt oleum, anodynum & mitigantem, ac propter amarum, aromaticum, acre, fragrans elementum, roborantem & tonicum effectum exsequuntur, quo fit, ut postea flatuum causa & minera, cruditates scilicet, commodissime possint ejici.

§. VIII.

Neque etiam in aliis dolorum generibus probatissimæ virtutis auxilia deficiunt. Sic cruciatus artuum scorbuticos rheumatismos, arthritidem vagam egregie levant lumbrici terrestres, vel succus ex ipsis expressus, vel pulvis illorum, præsertim cum absorbentibus, cinnabari & nitro remixtus, ac cum lacte asinino, vel sero lactis, largius & diutius usurpatus. Pulvere quoque antimonii crudi, si successe a minori ad majorem dosin ascendendo, a granis circiter decem ad drachmæ dimidiæ pondus, quotidie assumatur, interposito leniori ex temperatis signis decocto, diuturnas rheumaticas passiones & tractiones artuum molestissimas vidi sanatas. Ad podagram porro expugnandam commendabilis quam maxime lactis asinini usus, præcis etiam teste Plinio. & Dioscoride frequentissimus. Neque minus podagricos egregie solatur decoctum ex radice artemisii, scorzonæræ, sarsaparillæ, chioæ, liquiritiæ, polypodii & hermodactylis, liberalius & aliquandiu haustum. In odontalgia rob sambuci interius ad

unciam unam cum jusculo ad diaphoresin prorandam assumtum, & exterius in cerevisia solutum, qua cum os subinde colluitur, specificam certe & præsentaneam opem vexatis confert.

§. IX.

Pathemata hypochondriacæ & hysterica multum affinitatis alunt, & atrociam suam exerunt maxime inflando & spasmodice contrahendo intestina ac demum universum nervorum systema in consensum pertrahendo: habent tamen spectata & experta, quibus complacantur, præsidia. Hæc inter præter thermas & acidulas, cum balneis & motu corporis, tanquam potissima, connumeranda etiam gummata & medicamenta inficeti odoris, ut asa foetida, sagapenum, opoponax & castoreum, quæ vel sola in pilularum formam compacta, vel melius cum purgantibus, ut aloë correctæ, extracto rhabarbari, hellebori nigri, myrrhæ & croco remixta, & crebrius, moderate tamen, usurpata, miscebre obvios spasmos complacant, tonum nervearum partium firmant & simul viscidos, tenaces humores colliquant & blande evehunt.

§. X.

In affectibus capitis & maxime nervorum, qui ex imbecillitate cerebri & totius systematis nervosi viriumque languore ortum trahunt, in hemiplegia scilicet, paralyti, sensuum immutatione, torpore & stupore actionum animalium, auditus difficultate, aurium tinnitu, syncope, vertigine, ventriculi & intestinorum debilitate, nec non diarrhæa & vomitu, nullum certe præstantius & præsentius mihi innotuit remedium, quam quod ex oleis cephalicis & aromaticis genuinis concinnatur balsamum liquidum, vitæ dictum, usu tam interno, quam externo, longe spectatissimæ facultatis.

§. XI.

Præterea insanæ, tam furibundæ, quam melancholicæ, præter languis

Pathe
matibus
& hypo
chondri
acæ
& hys
tericis.

In affe
ctibus
capitis
& nerv
orum.

Insanæ

nisi mitiones acidularum & thermarum usum nec non emetica, nonnulla speciali quadam efficacia dicata celebrantur. Prisci ipseque *Hippocrates* hunc in finem utebantur quam maxime helleboro albo, cuius virulentiam, *Alpino lib. de method.* teste, ita cicubant, ut eundem cum oleo vel etiam oxymelite decoquerent & antequam propinarent lac largius potui præberent: sed exolevit jam penitus hic helleborismus, hanc forsitan ob causam, quod recentiores helleborum colligendi & exhibendi genuinum modum ignorarint, de quo videatur *Schulzii dissertatio de helleborismo Veterum*. Neque tamen negandum, quod in helleboro lateat adversus deliria ipsamque insaniam virtus, inprimis si ejus usus venæsectione & balneis ex aqua dulci, in omni amentia proficius, secundetur. In ea vero mentis emorione, quæ potius ab animi affectuum vehementia, quam hypochondriorum obstructione oborta, lac aspinum, nitrum & sanguis aspinus, in pulvere tritus, eximiam demulcentem, effrenes nervearum fibrarum stricturæ sedantem possident facultatem, & inter initia saluberrimam præstant opem, eo certiorum, si clima mutetur & occasiones ad animum exasnuandum sollicitè evitentur.

§. XII.

Epilep-
sia.

Epilepticum malum quo truculentius & vel aspectu horribilius, eo magis medentes solliciti fuerunt de præsidis ad abigendum illud. Et certe quamplurima passim quidem circumferuntur specifica antepileptica; sed ad meliora ac certiora suppetant pulvere lumbricorum terrestrium, cinabari, pulvere secundinæ humanæ, rasura cranii humani, ungula aleis & corio humano, ego quidem vix crediderim. Hæc autem sicuti in epilepsia idiopathica & chronica conducunt; ita in symptomatica, palmam utique fert liquor noster anodynus minera-

lis, epilepticos egregie componens insultus.

§. XIII.

Ubi vesicularis & vasculosa pulmonum compages crassa, tenaci pituita firmiter inhaerescens farcta & obstituta in asthma, gummi ammoniacum, balsamus Peruvianus, crocus, opoponax, vel in pilularum consistentiam: vel cum tinctura tartari in essentiam redacta, usum atque utilitatem præstant incomparabilem. Quando autem pulmones phthisica labe affecti, si qua salutis spes, eadem quam maxime a lacte asinino, vel solo, vel fonti Selterano, qui idem talem pulmonum vitii apprimè proficius, confuso, expectanda. Neque minus huiusmodi commendationem meretur sulphur stillaticium purum, inprimis si cum pinguedine animantium, ut axungia humana, vel pinguedine canis recenti, item spermate ceti dissolvatur, & ad stomachum roborandum aliquot balsami de Copaiya, olei ligni sassafras & foeniculi guttulæ, adjiciantur. Ea quippe sulphuris facultas, ut non modo partibus languentibus robur addat, sed simul dissolvat & discutiat spissescentes succos, qua certe in pulmonum affectibus exulcerationibus, tuberculis, vomitis, ex stasi & condensatione viscosi & caseosi mucilaginosi, ex chylo præcipitati succi, obortis, egregie opitulatur.

§. XIV.

Præter phthisin hydropes difficilissimis & fere insanabilibus morbis annumerantur, si tamen sanationem adhuc admittunt, elaterium certe apud Veteres magnæ fanæ medicamen, quod per superiora & inferiora, si rectè adhibeatur, aquas educit, & corpore prius rite præparato humoribusque fluidis redditus, præmissis quoque & sub ejus usu exhibitis emollientibus ac oleosis, vix efficacia par obtinet. Quia vero etiam urinæ fluxu hydropicus tumor abscuritur atque abigitur; pulvis cantharidum cum sale tartari

Et du-
mor-
rhor-
idit.

Dys-
enteria.

Sym-
pta.
Sua.

mixtus, additis aliquot ad arcendam inflammationem nitri depurati gravis & uno camphoræ, diureti movendæ largissimæ apprimè infervit, modo humores ad hanc dispositi sunt excretionem. Icterus quoque malum sæpe valde contumax est, sed præter emetica, quæ efficaciter in ductus bilarios agunt, congrua dosi & opportune adhibita, rhabarbarum, radix curcumæ & robis tinctorum, præsertim si in aqua & vino, adjecto nitro & sale tartari, decoquantur, in regio morbo singularem prorsus edunt effectum, quem etiam insulum corticis medii sambuci, nisi corpus nimis debilitatum, viscidam bilem colligendo & calculos ex canalium biliariorum alveis eliciendo, exsequitur.

§. XV.

In calculosa renum dispositione speciatissima insuli summitatum millefolii est facultas, quando quis eo crebrius & diutius utatur. Nec eximia deneganda virtus fragis exsiccatis, fructibus alkekengi, cynosbati, semini dauci, ac potissimum cortici radicis acaciæ, si vel cum insulo ex aqua, vel cum spiritu juniperi temperiori, sumantur. Inest enim ipsi virtus quædam traumatica, leniter balsamica & subadstringens, qua remissum tubulorum renalium tonum egregie firmant, substantiam renum exulceratam & ex parte dissolutam conglutinant atque percurant. Amygdalis autem amaris, ob anodynum oleum, nec non oleo amygdalarum dulcium, sub ipso cruciatuum paroxysmo demulcens & mitigans longe eximia inest virtus.

§. XVI.

Affectus sequiori sexui solemnes, ex uteri & maxime mentium vel lochiorum vitio, præter aloen correctam, myrrhæ, croci, succino, castoreo & aristolochia rotunda, debita ratione in pilularem formam redactis, optime excipiuntur, eamque ob causam in iisdem nostro jam tempore maximam hoc nomine adeptæ sunt

samam pilulæ Becherianæ & omnes ad earum exemplar paratæ. In virili autem sexu ad corrigenda hæmorrhoidum vitia, post mannâ, insulum vel decoctum summitatum millefolii saluberrimi effectus; eo quod hæc planta subtilè, spasmos leniens atque demulcens oleum recondit, quod multum ratione saporis, odoris & maxime coloris cærulei, convenientiæ alit cum oleo chamomillæ.

§. XVII.

Intestinorum canalem graviter excitat ipsumque corpus innumeris pene sedibus terme exhaurit dysentericus morbus, contagio infectus & ingentem sæpe stragem edens, qui pariter non quibuscvis in alvi fluxibus proficuis, sed singularibus plane abigitur penitusque extirpatur auxiliis. Nimirum radix illa Americana ipecacuanha, experientia teste maximum antidysentericum, si modo initiant adhuc morbo, iusta dosi, semel, vel bis, aut ter exhibeatur. Postea vero præter alia acrimoniam obtundentia, blanda diaphoretica & temperantia interne & externe adhibita, itemque rhabarbarum, seu optimum laxans, cortici chaccarillæ certissima flaccidas intestinorum fibras roborandi & motus essenes sedandi inest efficacia.

§. XVIII.

In intestinis quoque vermes variis ludunt tragœdias & horrenda sæpe excitant symptomata, quibus existipandis nonnulla peculiari quadam dicata sunt virtute, Græcis ob id anthelmintica vocata. Sed licet horum eximius circumferatur apparatus, non omnia tamen æque expectationi respondent, & nulla magis probatæ efficaciz sunt ipsa asæ foetida & sagapeno, præsertim si hæc cum purgantibus, ut mercurio dulci & extracto rhabarbari in pilularum forma dentur, hac cum cautione, quo ante & post hujus virtutis pilularum usum aliquot cochlearia olei olivarum, vel amygdalarum dulcium ingerantur, quod certe vermibus; ut omnia oleo-

fa,

Itæra-
Calculo

Itæra-
fiam.

sa, quam maxime infensum, & fibras intestinales a vermium erosione spastica strictura affectas egregias mulcet, ac efficit, ut verminosa progenies per anilecesum exturbetur. Asa quippe foetida & sagapenum nidore suo quem dispergunt adverso, vermes fugant, haud secus ac de alio domesticis & agrestibus experimentis constat. Semen autem cinæ, item santonici & herba tanacetii, utiliter etiam contra vermes quidem usurpantur, sed non aliter agunt, quam quod putredinosa colluviei, quæ vires frangit lentumque infert calorem & languorem, resistent & simul tonum intestinorum firmando expulsiorem faciliunt ac juvent.

§. XXIX.

Nimis
hemor-
rhagici;

Quando nimium sanguinis, ubicunque sit, ex apertis vasorum oculis effunditur, prompta ope & præsentaneis remediis opus est, ne graves insequantur passionēs. Ac tum quidem ad compeſcendum cruoris stillidium nitro in aqua communi soluto, & successive oblato, nec ad arcendam novam hæmorrhagiam, pulvere dentis hippopotami, repetitis maxime vicibus, vix quicquam præstabilis. Prodest tamen etiam massa pilularum decynoglossa, ad grana sex vel octo, quæ ob cynoglossam, opium & semen hyoscyami narcotica virtute pollet, ac sensum solidorum exquisitiorem obtundendo, efficit, quo minus per spasmos sanguis impetuose ad certum quandam locum urgeat, ibique exprimitur. In feminis fluxu, præsertim virulento, vix melius & præsentius suppetit præsidium terebinthina Veneta ejusque oleo æthereo, vel loco hujus balsamo de Copaiva aut Mecca, quæ si cum vel sine camphora, in emulsione ex feminibus quatuor frigidis, lacte vel sero lactis, post congruorum purgantium, præsertim mercurialium ulum, propinantur, incomparabilem præstiant efficaciam.

emulsi-
ones.

§. XX.

Excipiunt morbi ex humorum impuritate oriundi, quæ maxima in scorbuto. Est hoc malum maxime endemium, a pravo victu, sub cælo frigido & humido, prognatum, & a vita sedentaria atque mœrore maxime exacerbatur; longa tamen experientia comprobata adversus illud remedia sunt sic dicta antiscorbutica, trifolium fibrinum, cochlearia, beccabunga, nasturtium, radix armoracæ, quorum effectus eo magis exoptatus certusque, si succus ex ipsa expressus cum sero lactis ex nostra præparatione dulci, vel etiam lacte caprillo, disposito prius corpore, assumitur. Quod si scorbutus jam inveteraverit & doloribus stipetur, strobilos pini in sero lactis decoctos, addita medulla & pinguedine ex ossibus boum & vitulorum, continuato aliquandiu usu, eximie suppetias tulisse novi.

Scorbutus.

§. XXI.

Truculentus ille luis venereæ nomine, qui insignitur morbus, vix funditus ex interioribus, quibus insidet partium latibulis eradicari poterit, nisi admissis specificis, inter quæ argentum vivum, lignum guajacum cum cortice, ipsumque antimonium rite præparatum primas tenent. Nul- lum in toto rerum naturalium censu suppetit pharmacum quod tam potenter universam lymphæ & humorum massam in motum cieat & largissimum salivæ ad aliquot interdum hebdomades durantem fluxum cieat, quam ipse mercurius, qui corpus subiens, ob specificam in minimis corporis moleculis omnibus succis superiorem gravitatem, ad intima corporis pervadit & per angustias tubulorum strenue eluctans, obstructions in ipsis solvit, simul quoque humorum corporis crasin penitus immutat, eisdemque intestino quodam motu putredinosam quasi inducit colliquationem, & hac ratione, licet non sine summa molestia & quandoque etiam periculo, gra-
vidi.

Luis venereæ.

visissimum hunc morbum aliasq; chronicas contumaces, ex feri spurcitie ortas passiones, expugnat. Tutissimum autem ex mercurialibus salivandi scopo usitatus est ipse mercurius dulcis, si absorbentibus nuptus, per aliquot dies exhibeatur, ascendendo a minori, ut quinque granorum dosi, ad maiorem, duodecim scilicet granorum, donec saliva liberaliter fluere incipiat, observato simul convenienti dietetico regimine. Guaiacum sale subtili acri resinoso, quo aquam, cui incoquitur imbuit, fibras valorum & tunicas vellicando, totam humorum & lymphæ massam ad auctiorem progressum adigit, quo tenaces succi resolvuntur & obstructions referantur.

§. XXII.

Ad lepram, herpetem & scabiem mali moris, nec non alias cutis defecationes & ulcerationes, optimum auxilium ex viperis earumque decocto, nec non antimonio, ac præcipue ejus sulphure diaphoretico, peculiari enchusæ confecto, sperandum. Plica quæque sic dicta Polonica, resistens aut præpostere abscessa, gravia invenit pathemata, ad quæ abigenda laudata virtus decocti herbæ & seminis lycopodii, quo caput sæpius tepide abluendum; quandoquidem hac ratione serum illud viscidum excrementitium, cerebrum & caput moleste afficiens, per cutis qua caput tegitur, tubulos ipsosque crines salutariter ejicitur. Oculos si infestat salsa & calida defluxio, cui rubedo juncta, in sic dicta epiphora, & noctu præsertim palpebræ a viscoso humore conglutinantur, paucillum, & vel unum granum, vitrioli albi, cum butyro recenti subactum & orbitæ oculi majori inditum, admirabilem fert opem & promte vitium abigit. Pelliculam vitium interceptientem recens viperarum pinguedo oculo instillata promte abstergit; & gutta: serenanti incipientem egregie discutit sulphur antimonii interius assumptum.

§. XXIII.

Quando partes contractura & rigiditate afficiuntur, nihil præsentius est, quam membra afflicta crebrius in animalia recenter dissecta & adhuc calentia immittere, quo blando, oleoso & naturali calido vapore foveantur fibræ tensæ & molliantur. Ubi post lapsum aut gravem contusionem ac percussione partium externarum, stagnantes & coeunt humores & sanguis varia creant incommoda, decoctum vel infusum arnicæ omne fere curationis punctum absolvit, ob singularem, qua pollet incidentem, resolutivam & discutientem efficaciam.

§. XXIV.

Ultimo loco dum de specificis sermo est, non prætermittendum laudatissimum illud & admirandum prorsus ad valetudinem tuendam & longevitatem consequendam præsidium dieteticum, Veteribus tantopere celebratum, lac asininum. De hujus efficacia longe saluberrima peculiari egi dissertatione de mirabili lactis asinini usu in medendo, in qua pluribus, quibus morbis debellandis ejus potus proficius sit atque accommodus, & rationibus & exemplis exposui. Quam singulari autem virtute ad prolongandam vitam polleat, luculentum est Patini testimonium *tom. 2. epist. pag. 213.* & dignum quod totum verbis latine readitis transcribatur: *precor, sit, Sum nam Numen, velis conjugis tua perfectam largiri sanitatem. Elapso decennio, lac asininum erit admodum salubre, quod ut ipsi ex voto proficiat, opto. Si ipsam ad sanitatem reducere possem, cras statim Lugdunum properarem; quod vero nimis procul remotum. Galenus quidem ad Stabiam montem agrotus suus ablegabat, unde sani rediunt, id quod confirmatum habeo nummo Imperatoris Geta, quem Carolus meus asseruat, signato imagine vacæ, qua hujus montis acrolæ lactis præstantiam indicare volebant. Suppetit etiam nobis Lætie lac asininum optima nota. Socrus mea, quæ vito.*

T

gesti

gesimo quarto anno apoplexia interit, hoc per integros sexaginta annos usa est. Pariter a vigesimo secundo etatis anno hoc lac putavit Domini consilarii Laurentii mater, elapso anno, octogesimo septimo anno denata. Huius soror, vidua Andreas Laurentii, Anatomici, idem fecit & ad octogesium quintum annum pervixit. Et certe apud nos egregiam præstet opem, vere maxime & autumno, imprimis ad arcendos morbos. Ego tamen ejus usum nemini suadeo, nisi viscera elementis & accommodata purgatione depurata prius fuerint ac præparata.

Specific-
a non
promi-
scue in-
uant.

§. XXV.

Atque hæc sunt selectissima & usu comprobata ex omni remediumum censu. Monendum tamen, quod quum hæc ipsa, ut supra jam inculcavimus, neutiquam viribus polleant absolutis, sed relativis & certis conditionibus ac circumstantiis limitatis, in eorum usu harum imprimis exquisita habenda sit ratio, quo speratus respondeat effectus. Deinceps singularis efficacitæ hæc quidem recte usurpata sunt remedia, sed nihil certe juvant, nisi prius corpus probe fuerit præparatum, & obstacula, quæ virtutem infringere aut impedire possunt, remota. Hinc quando sanguis in venis redundat & primæ viæ seutina sordium obfusa, necesse est, ut sanguis prius subtrahatur, & prima corporis regio a crudorum, biliosorum & recrementitiorum succorum saburra repurgetur ac depleatur.

Et cor-
pus præ-
paran-
dum.

§. XXVI.

Neque etiam exillimandum, specificis usurpatis, nullis plane aliis internis vel externis mediis, ad corrigendam humorum vitiosam qualitatem & evacuationem destinatis, opus esse. Etenim hæc specificæ virtutis medicamina, efficacia sua non tam materiam quæ in vitio est, quam potius ipsum motum afficiunt eumque ad naturalem successum redocendo juvant, quod tum demum quam optime perficitur, quando causæ morbi-

Materia
vitiosa
corri-
genda.

fice materiales sublata, & præmissis, quæ temperando, resolvendo, discutendo & obstructions expediendo humorum corrigunt vitia, appropriata debita proportionem, opportuno tempore & modo convenienti in usum vocantur. Imprimis cura dirigenda, quo primæ viæ vacuæ sint succis viscidis impuris, quibus oblati medicamenti vis quam maxime obtunditur, vel plane suffocatur, quum his expurgatis, integra & salva sua textura ex voto agat & in ventriculi ac intestinorum lubilitatem nervosam virtutem suam edat, eodem modo ac de emeticis, purgantibus, opiat, anæleptis omnibusque, quæ exili mole niagnum edunt effectum, constat.

Prima
via re-
purgan-
da.

§. XXVII.

Denique in specificorum usu accommodanda servanda methodus, ita quidem, ut artifex non solum tempus, dosin ac regimen teneat, sed etiam quamdiu isdem insistendum, & quæ victus ac vivendi ratio simul injungenda, exacte calleat. Etenim methodus medendi specialissima, quæ unice in medentis prudentia, judicio, diligenti attentione, meditatione & observatione naturæ ægrotantis consistit, tanti ad ipsum effectum est momenti, ut ipsis specificis & appropriatis solis longe sit anteposenda, & sine ea remedia, quantumvis egregia, alienæ & instructuossæ sint operationis, nec quicquam solidi in arte præstari queat. Et hæc quicumque studiosè observat omnia, is certe desiderato potietur fine, quantum scilicet malo plus valet ars nostra salutaris.

Et com-
modo
servan-
da me-
tho-
dos ser-
vanda.

CAPUT IX.

De venæsectione aliisque sanguinem subtrahendi modis.

§. I.

Posteaquam igitur plura & selecta remedia, quæ interno usu, cum in præcavendis, tum sanandis morbis, rite adhibita egregium præstant usum

usum atque utilitatem, fulius exposuimus: ordo rerum dicendarum exigere videtur, ut jam etiam de illis agamus præsidis, quorum usus legitimus externus plurimum in medendo valet. Inter hæc vero primum atque præcipuum locum jure obtinet sanguinis substractio, siue per venam sectam, siue alios modos facta. Ex venæsectionis quidem tanta certe est efficacia atque utilitas, ut si effectum celerem & egregium quem præstat, spectemus, revera omnia interna in morbis, tam avertendis, quam sanandis, longissime exasperet. Neque ullum remedium genus est, quod & operationis celeritate & tolerantia facilitate se ita commendat, & quod a primis fere Medicinæ incunabulis tam frequentis & laudati fuerit usus, quam sanguinis per venam sectam evacuatio. Antiquissimus artis nostræ parens Hippocrates, eam nullo fere in morbo intermisit, & Veteres fere omnes æque ac recentiores Medici, qui non vanis & idanibus in praxi præceptis innutriti, ea carere nequeunt, ut adeo merito inter heroica, & summæ virtutis remedia locum præcipuum mereatur. Sed quemadmodum nullum efficax remedium, nisi provide & dextre usurpetur juvat, imprudenter vero administratum nocet: ita etiam hoc ipsum auxilium cautionem, observationem & prudentiam in usu exigit atque desiderat. Quare et re utique erit, ut quæ tam de venæsectionis, quam reliquarum sanguinis missionum, genuino ac salutari usutenda, edideramus, & quidem concisus theorematibus, per subjecta scholia illustratis.

Theorema I.

Non excellentius, non præsentius, ad plurimos morbos, & acutos & longos, arcendos, suppetit auxilium, ipsa sanguinis prudenter instituta missio.

Scholion.

I. In priori jam sectione ex instituto docuimus, quam graves & periculosa passionis, ex nimia sanguinis

redundantia, item ex evacuationibus ejus criticis, quæ fiunt in seminis per uterum, & in utroque sexu, maxime virili, per venas hæmorrhoidales, deficientibus, vel etiam suppressis, proveniant. Evidenter namque deduximus, quod plethora, tum ad vasa, tum ad vires, liberum & æquabilem sanguinis circumulum retardando & impediendo, ad colligendas impuritates humorum, ad hostiles stagnationes, infarctus, obstructions & funestas stases, immo extravasationes & vasorum:ruptiones, occasionem & causam præbeat, efficacissimam. Scilicet dum sanguis copia sua virtute contractili & elastice cordis, arteriarum & reliquorum vasorum fortiter obnititur, non modo progressum per universum corpus motum remorando, ut cruor spissus & ad infarctus, obstructions, fecundas morborum chronicorum matrices, aptissimus evadat, efficit; sed & in sensibilibus subjectis atque in locis valde nervosis, spasticas ciendo stricturas, inæqualitatem in sanguinis progressu & magnas ac impetuosas congestiones ad has vel illas nobiles partes causatur, quæ gravissimos in pectore, capite & præcordiis morbos inducunt. Hæc igitur omnes accipites afflictiones venæsectio, tempestive & prudenter instituta, in iis præsertim corporibus, quæ sanguine abundant, vasa plena & amplâ habent, ex quibus sanguis nec per hæmorrhoides, nec menses fertur, præsentissime prævertit. Quumque copia collecti sanguinis vere, & quidem circa tempus æquinoctiale, ubi ob solis propiorem ad nostrum clima situm, aertenuior & rarior majorem in sanguine expansionem efficit, quam maxime periculum minetur, & morbos a plethora oriundos, teste etiam Hippocrate, proferat, utique convenientissimum est, ante illud tempus decenti sanguinis emissioni ipsius redundantiæ imminuere & sic futuris imminuentibus morbis opportune occurrere.

zere eodemque præscindere. Neque vero semper opus est, ut adeo accurate illud æquinoctiale tempus observemus. Nam quando congesti sanguinis copia curiorem & celeriozem vacationem desiderat, vel quando mor sub finem Februarii & initium Martii ferenum & tepidum cælum expansionem ac turgescientiam sanguini, motui progressivo insensam, infert, non adeo rigoroze constitutus æquinoctii terminus expectandus, sed præstat tum anticipare eundem. Aliquot mihi nota sunt exempla eorum, qui ne a recepto discederent more ad æquinoctium usque distulerunt hoc auxilii genus, sed incrementum nimis plethora, apoplectico insultu ante illud tempus perierunt. Neque etiam audiendi sunt illi, qui vel lunam decrecentem, vel certam siderum constellationem, ut plurimum fallacissimam, quoad tranquillos & salutaris in aere effectus, operiuntur, sed mittendus est sanguis, urgente plethora quocunque tempore, maxime si cælum ferenum & tranquillum, sub quacunque lunæ phasi, vel siderum conjunctione. Pariratione pro valetudine eorum, qui sanguinem copiosum in venis alunt, est, ut circa æquinoctium autumnale iterum sanguinis detractionem admittant, ne cruor, accedente frigida hiemali aura, nimis spissescat & excretionum successu ob aeris varietatem & inclementiam seriatim, sordeat, morbusque ex humorum impuritate & stagnatione oriundis occasio suppeditetur. Quin nonnullis eminentius sanguine repletis conducit, quo ter quotannis venam incidere patiantur, initiatæ, scilicet Martio, adulto Maio & Septembri, & sic corpus a morbis defendant.

Theorema II.

Uti copia sanguinis ejus detractionem exigit; ita ejus inopia & virium defectus eam interdicit.

Scholia.

I. Sanguinis copiam valorum repletio pulsuumque magnitudo, victus solennis laetus & vinosus, quietum & tranquillum vitæ genus, & intermissio vel naturalis criticæ aut artificialis consuetæ evacuationis luculenter produnt; & hæc ubi præstosunt, tuto & confidenter sanguinis detraçtio admitti potest. Contra ea quando corpus infirmum, emaciatum, pulsus debilis, ex inopia maxime sanguinis & virium, penitus est interdicienda, nisi præsentaneam noxam inferre velimus. Nam pulsuum in arteriis robur dependet maxime a copiosiori & vegetiori sanguinis ex sinistro cordis ventriculo in magnum arteriosum tubum impulsu; robur vero illud cordis ad expulsionem, a libero & sufficienti sanguinis per vasa coronaria in cordis substantiam, nec non fluidi nervi in fibras cordis influxu, profuscitur; ideoque ubi pulsus parvus, debilis ac languidus ex fluidi nervi sanguinisque boni parciore influxu & ex ventriculi in arterias impulsu, nocentissimum est venam pertendere in quocunque subiecto & morbo, quia plus sanguinis & virium, quæ tamen jam tum deficiunt, exhaurit atque absumit.

II. Peccant subinde in eo Medici, qui vel in morborum declinatione, vel si morbis præcedentibus, ut febribus, aut enormibus hæmorrhagiis, alii morbi supervenient, promte ad sanguinem emittendum, sunt. Nil frequentius occurrit in praxi, quam quod feminis, superato quæ sanguinem, nec non vires consumis morbo, mensium fluxus subsistat; quibus certe pessime consulunt, qui ad eum provocandum, vel pellentia, vel sanguinis evacuationes administrant; quum potius in id incumbendum sit, quo & analeptici, & lautiori dicta, sanguis & laudabiles humores prius de novo ingenerentur.

III. Virium defectio quandoque non a defectu, sed nimia copia sanguinis fit. Observamus sæpius in plethoricis juvenibus & viris pulsum, qui antea fuerunt celeres, tarditatem & debilitatem; videmus quoque universi corporis & animi languorem infuerum & somni defectum, sub magna tamen arteriarum expansione. Hæc autem ubi subest causa, superfluum & arteriarum systolen ac motum mole sua impediendem cruorem subtrahere omnino expedit, & hoc facto, pulsus illico crebrius atque validius micat. Sed prudentis utique & periti est Medici, talem virium oppressionem a copia sanguinis, etiam morbo præsentem, probe discernere ab ea, quæ virium & sanguinis inopiz ortum debet.

Theorema III.

Post venæsectionem, sæpe excretiones salutare sanguinis, imo alvi, sudoris, urinae vacationes melius & liberior quam ante eam succedunt.

Scholia.

I. Quia salutiferæ omnis generis excretiones sanguinis circulum, pro ut ille celerior vel tardior, vegetior vel languidior est, sequuntur; facile patet, si ob nimiam sanguinis copiam ipsius motus progressivus una cum excretionibus fuerit retardatus, immutata vasorum plenitudine, augeri sanguinis circulum, ipsum hac ratione reddi fluidiorem, excretoriarum & coloratorum vias ab obstructionibus liberari, & cruorem liberior & largius ad emunctoria pro subeundis excretionibus appellari.

II. Hinc sæpissime annotavi, suppressum in feminis mensium fluxum, brevi post venam in pede sectam sponte repetiisse. Plura etiam mihi nota sunt exempla, pertusa paullo ante vena sanguinem ex ani venis profluxisse, qui antea vel plane nunquam prodierat, vel per longum tempus restiterat.

III. Frequenti porro observatione compertum est, in plethoricis non

Tom. III.

modo, sed & iis qui passicis detinentur affectibus, urinam difficulter reddi valdeque aquosam & limpida mingi, sed protinus post emissum sanguinem, urinofum laticem copiosiorum stillare magisque tinctum. Idem jam pridem notavit antiquissimus *Cour Sect. 6. aph. 36.* iniquens: *difficultatem urina phlebotomia solvit, secare vero oportet interiores*; id quod etiam confirmat *Riverius, Cent. 1. obs. 1. item obs. 45. & 89.* fidem faciens: admissa venæsectione, urinas, quæ antea prorsus aqueæ, reditas fuisse coloratioras.

IV. Neque minus experientia aliquoties edoctus sum, in hypochondriacis, quibus alvus solenniter tarda atque compressa, post sanguinis missionem, eandem esse solutam & ad officium rediisse. Ratio hujus effectus procul dubio hæc est: in passione sic dicta hypochondriaca ob difficultatem sanguinis per mesenterium & hepatis transitum, vasa nimium cruore replentur, ob distensionem in eorum tunica fit spasmus & motus peristalticus læditur, quo læso nec flatus, nec excrementa, per alvum rite fecundant ac evehuntur; a vena autem tempestive in pede pertusa, vel etiam quod non semel, sed sæpius observavi, evocato per hirudines ex ani venis cruore, restituto inde libero per tunicarum intestinalium vasa transitu & progressu, & reddito intestinis debito motu ac robore, melius alvina quoque succedit evacuatio.

Theorema IV.

Venæsectio sæpius senibus utilissima, imo ad longævam vitam confert.

Scholia.

I. Communis, sed pessimus error est, ætatem senilem plane non ferre sanguinis subtractiones, quasi vero in grandævis non redundaret sanguineus latex, ut potius ejus & virium defectu laborarent. Jam lubens equidem concedo non omnes senes esse plethoricos, & hinc sanguinis detractione indigere, nec etiam ætas per

T 3 se

se ad repletionem vasorum quicquam conferunt. Verum sunt utique senes valentes, sani, firmi, valis capacioribus instructi, qui bene appetunt, comedunt, & non tantum concoctum faciles, sed & difficiles cibos probe ferre & digerere possunt; ideoque neutiquam etiam dubitandum, quin ex bene concoctis alimentis copiosum chylum & copiosum sanguinem gignant & colligant, cujus florida facies & vasa sanguine turgida luculenti sunt indices. Accedit quod non modo in virili, sed & in extrema ætate constituti, non raro modicum sanguinis per sedis venas profluvium cum constanti virium duratione commodissime ferant, ac ipse aliquot octogenarios novi, qui copiosum mictu sanguinem sine notabili virium decremento emiserunt. Quin potius quum senectus non adeo ad labores, exercitia & motus corporis apta sit & proclivis, eaque propter non æquali mensura & proportionem egesta ingestis respondeant, sanguisque motu & calore minus consumatur, necessario nimia humorum succrescit abundantia; viscerum infarctus vasorumque plerumque, quæ, nisi mature solvatur, morbos senibus familiares secundo gignit germine, marasmos, tussis, corizæ, raucedines, artuum dolores, renum & vesicæ calculos, paralyses, urinæ difficultates, pruritus, scabiem siccam, quæ afflictiones, utut proxime non a copioso sanguine, sed potius ab impuritate feri proveniant, hæc ipsa tamen a succorum copia, qua excretionibus impuritatem intercipiuntur, natales trahit.

II. Complura certe memoria tenet exempla senum, qui ad nonagesimum annum fere, salvi, incolumes & a morbis ætate proVectis familiaribus immunes vixerunt, solo venæsectionis remedio, bis per annum admissis. Et quod senectuti non adversa sit sanguinis per venam evacuatio, univèrsa Helveticorum gens testatur, qui vel octogeparii, immo nonage-

narii, singulis adhuc annis venæsectionem patiuntur: quam in rem *Wepferus lib. de apoplexia* legi potest. *Primerosius etiam lib. 4. de vulg. error. cap. 23.* venæsectionem senibus plurimum commendat, & *Derbeque obs. 1.* tribus exemplis confirmat, quod senes 80. annorum sanguinis e venâ missionem commodè ferre possint, in gravibus, tam ab internis, quam ab externis causis pendentibus vitiis, id quod etiam a me in peculiari dissertatione, *de magno venæsectionis ad vitam sanam & longam remedio*, insertum est ac demonstratum. Neutiquam tamen ex his elicendum: senibus debilibus & languentibus, qui appetentia ciborum carent magnaque debilitate ventriculi & intestinorum laborant, suadendam vel commendandam esse venæsectionem, minime omnium vero, si cum morbo diuturno chronico consistantur.

Theorema V.

Venæsectio in febribus continuis & acutis ut plurimum & necessaria & utilis admodum est.

Scholia.

I. Miror sane haud exigui nominis viros venæsectioni alias eximie patrocinantes, confidentius tamen asserere; eandem in omnibus febribus acutis, benignis & malignis, exanthematicis, vel minus talibus, nunquam esse necessariam, sed semper sere noxiam, unica tantum synocha excepta, nec in hac etiam absolutam, sed tum demum, quando eminens plethora orgasmo stipata eandem exposcant. Dicunt quidem, frequentius observatum esse, admissa sub initium hujus febris sanguinis missione, periculosas circa statum sanguinis metastases & congestiones ad caput esse consequutas, lethalem phrenicidem cum convulsionibus inducentes. Autumant quoque, naturam corporis humani æconomiam magna semper cum sapientia regentem, his in febribus non sanguinis mole peccantis evacuationem, sed potius ejusdem per intentionem.

tensiosem calorem in serum excrementitium resolutionem cum materiz noxiz sequestratione, intendere; eaque propter contra naturæ institutionem ac finem sanguinis educationem adornari, & naturam in saluberrimo secretionis negotio turbari. At vero & ratio & constans experientia huic asserto refragatur. Plures certe novi juvenilis & virilis ætatis vegetos & sanguine plenos hisce febribus correptos, qui omnia venæsectione, intra paucos dies phrenitide, inflammatione ventriculi, faucium, vel etiam peripneumonia obierunt; ubi post mortem totum corpus mirum intumuit & ipse ichor sanguineus largiter e naribus manavit, fœtor quoque mox gravissimus cum putredine successit, nullam aliam ob causam, quam ob inflammatoriam sanguinis in partibus stasim. Vicissim multiplici observatione confirmatum habeo, unicam vel etiam repetitam sanguinis in acute febrilibus missionem, non modo anxietates, sed & alia sæva symptomata imminuisse, vel plane sustulisse. Ut taceam Gallorum morem, qui in omnibus febribus non semel, sed bis vel aliquoties, venam cum bonis ægrorum rebus pertundunt. Metastases vero sanguinis ad caput circa tempora critica venæsectionem ciere, fallacia causæ ut causæ videtur. Nam licet phrenitides & convulsiones malo successu febre acuta laborantibus sæpe accidant, eodem tamen modo, immo frequentius id evenit, ubi venæsectio omissa, quam ubi admissa. Et quum omnes sere in febribus acutis, phrenitide & convulsione pereant; certe si venæsectio horum causa, intermissa eadem, non facile quemquam acute febricitantem interire, prona fuit consequentia.

II. Ego potius neutiquam asseverare dubito, sanguinis missionem in febribus acutis sapientissime utilem esse admodum ac necessariam. Etenim qui acutis corripiuntur, omnes plus sanguinis & humorum abundantia,

quam defectu laborant. Jam vero in comperto est, febris essentiam maxime in intensione toni & spastica quadam constrictione universi generis vasorum & fibrarum, a qua etiam & progressus sanguinis & caloris accessus incrementum dependet, consistere; notum porro est, spasmum vasorum alveos angustari, calore autem succos expandi, majusque spatium affectare, ideoque redundans & exstilians cruor libero per sanguifera vasa transitu, exclusus, non potest non impetuose huc & illuc agi & ad vasa minoris diametri, quæ sanguinem, secundum naturam non admittunt, tanquam loca incongrua pelli, inque eorum angustis obhærescere ac stasim concipere, unde periculose inflammationes, non nisi tempestiva sanguinis detractioe felicissime præcindendæ. Uberius hoc patet peritissimorum in arte viro- rum testimoniis. Ipse artis parens Hippocrates de vici. acut. §. 5. in acutis sanguinis missionem serio commendat. Quin Veteres in ejusmodi præcipitis periculi morbis sanguinem ad animi usque deliquium subtrahebant, uti potissimum auctor est Galenus lib. 1. de rat. vici. perhibens: hujuscemodi missionem sanguinis non tentandam esse nisi in acutissimis morbis, iisque, in quibus robustæ vires, florens ætas, plurimus sanguis, regio, aer & anni tempus bene temperata, quales morbi existunt, febres ardentissimæ, dolores sævissimi, maximæ viscerum inflammationes, carbunculi, synochus, lassitudo phlegmonosa, dolores articularum vehementissimi. In his enim omnibus multo sanguine semel vacuato, statim quiescit calor, quibusdam alvus cietur, aut sudores moventur, & ita solvitur, aut saltem minuitur morbus, teste Hollerio *Comment. ad aph. 3. sect. 1. Hippocr.*

Theorema VI.

• In febribus etiam exanthematicis, petechialibus, purpuratis, variolis, morbillis, quin ipsa peste, venæsectio non propterea iniuta, sed prædenter

adhibita, magno interdum præsidio.

Scholion.

I. Haud levis momenti inter Medicos viget dissensus: an in his febribus, ubi pernicialis materia ad cutis superficiem appellitur, sanguis utiliter possit subtrahi? Complures affirmant, alii prorsus pernegant, utrique experientiam in partes advocant. Sed distinctio utique facienda & circumstantiarum rationi hujus remedii usus accommodandus. Nimirum ubi succi deficiunt, vires statim in principio elanguescunt, pulsus debilis, durus & parvus, vasa copiosa, sed angusta, vel etiam robur per animi afflictionem dejectum: verbo: ubi malignitas humorum, ut cum scholis loquar, præsto est, damnosum magisq; ad perniciem, quam salutem egri vergens molimen est, sanguinem evocare. Etenim ad materiam non tam mole gravem, quam causticam, subtilem & virulentam, nervosis partibus infusam, eliminandam, valida cordis & arteriarum motrix vis requiritur, quæ a sufficienti sanguinis & fluidi nervi influxu expectanda. Deinde ipsa hæc pernicialis materia expellenda non nisi beneficio sanguinis & humorum ad superficiem corporis advehitur, ubi vasa minoris diametri sunt, facile concidunt & non nisi vegeto appulsu replentur. Quod si igitur quis succos & sanguinem, ubi jam deficiunt, & robur languet adhuc subtrahere vellet: is certe grave afferret damnum, & nihil aliud efficeret, quam ut materia hostilis intus remanens instar veneni solidorum & fluidorum motum perverteret ipsamque mortem inferret.

II. Longe alia ratio est ob nimiam sanguinis copiam ejusque ab æstu febrili rarefactionem, cordis & arteriarum tunice tam vehementer distenduntur, ut systoles earum imminuatur ac sufflaminetur, eaque propter sanguis non vegeto ac libere ad minimos cutis tubulos appellitur, ibique materia quæ in vitio est excerni queat. Tunc utique ipsa ratio dictitat, evocata quadam sanguinis portione, residuo ad

validiorem circuitum viam pandi, resistentiam tunicarum succorum impulsui æquabilem ipsumq; systolicum & diastolicum reciprocum motum revocari, quo fit, ut sequestratio & evacuatio noxii quam optime & ex voto succedat: Obvium hoc est sæpissime in corpore juvenili & plethorico, sanguine constitutionis, sub diæta lauta & vinosa, tranquillo etiam & quieto vitæ genere, aut ubi etiam ob intemperantiam animi affectuum excretiones imminutæ succorum abundantiam genuerunt. Hujus habitudinis corpora, quando purpura, petechiis, catarrhali benigna aut maligna febris, vel etiam variolarum morbo laborant, intermissa venesectione certo in discrimen adducuntur; contra ea omnia ex voto succedunt, si plethora demta, liberior sanguini conciliatur progressus.

Theorema VII.

Non perniciofa, sed quandoque admodum proficua est sanguinis missio in febribus, apparentibus jam in cute exanthematibus.

Scholion.

I. Per manus quasi tradita est opinio: efflorescentibus jam in corporis cortice petechiis, purpura, variolis & morbillis, nec sanguinem mittendum, nec alvum subducendam esse, ne maligna ad habitum corporis relegata materia irreparabili cum damno ad interiora retrahatur. Quamvis vero hæc observatio non exigui sit momenti ipsaque experientia nitatur, non tentandam esse sanguinis subtractionem, ubi natura, ut sic dicam, in opere excretionis occupata, & ubi exanthemata non longam & fixam sedem in cute habuerunt: nihilominus tamen dantur casus, ubi venesectio comparentibus etiam efflorescentiis utilis est ac necessaria. Observavi enim in his, qui purpura, sive primarius, sive secundarius morbus fuerit, variolis vel morbillis perierunt, vehementes spasmos, tam in artubus & partibus extremis, quam etiam abdomine, quos ob cutim contractam, non modo exanthema-

tum

tum retrocessio, sed & summa anxietas, corporis jactatio & sæpius delirium cum animi deliquio fuerunt insequuta; quæ omnia lethifera symptomata non tam, ut vulgaris fert sententia, a materia exanthematica interiora repetente; quam potius a sanguinis impetu & congeitione ad cor ac cerebrum facta, accesserunt. Hinc sola ratione ductus, quatuor intra anni spatium puerperas, purpura laborantes, ednclamatis propemodum rebus, sola sanguinis e vena brachii emissionem, per DEI gratiam a præsentaneo mortis periculo vindicavi. Simulac enim sanguini exitus concessus, protinus præcordiorum anxietas, animiq; defectio evanuerunt & melius sese habuerunt ægotantes, summa cum Chirurgi & adstantium, mortem sub ipsa operatione præfagientium, admiratione. Eadem ratione in juvene periculose variolis laborante, cum imminens delirium & ingens præcordiorum angustia mortem prænunciarent, venæsectionem in brachio summo cum sanitatis emolumento institui jussi. Neque hæc assertio clarissimorum Medicorum destituitur consensu, quos inter primo loco memorandus summus venæsectionis patronus, *Boissallus*, qui *lib. de venæsect. pag. 150. seq.* testatur: se in bubonibus pestilentialibus, & aliis exanthematibus, si febris non remiserit, summo cum fructu sanguinis missionem suavisse; ut *Muralium*, qui *Dec. 2. Ann. 7. obs. 115. M. N. C.* venæsectionem in febre epidemia, papulis per corpus sparsis, salutarem annotavit, aliosque prætereamus.

Theorema VIII.

In morborum & febrium paroxysmis atq; exacerbationibus venæsectio non sine periculo, die autem intercalari vacuo utiliter, instituitur.

Scholion.

I. In paroxysmis febrium intermittentium, in epileptico, hysterico, nec non hypochondriaco insultu, & quomodocunque extrema frigent, vel interni calores & anxietates egrum exagitant,

admissa venæsectio symptomatum vehementiam non modo acuit, sed & mortis periculum accessit. Ratio huius phænomeni in proclivi. Etenim morborum & symptomatum exacerbationes nunquam non spasmus partium, præsertim externarum, ventriculi quoque & intestinorum comitantur, quibus sanguinis liber cursus intercipitur isque majori impetu ad vasa majora, pectus præsertim & cor, urgetur. Si quis itaque in brachio, vel pedibus, ubi omnia spasmo contracta sunt, sanguinem evacuare instituat, is certe vehementiam spasmorum his in partibus augebit. Nam quo largius atq; uberior sanguis his partibus subtrahitur, eo plus incrementi capit spastica fibrarum contractio; quum nihil sit, quod spasticæ huic crispaturæ & regurgitationi sanguinis ad interiora magis resistat, quam validus cordis & arteriarum impulsus & liberalis sanguinis renitentis ad partes affluxus. Hinc utiq; differre oportet sanguinis subtractionem in diè intermissionis, vel remissionis, quo spasmus conquievit & liberior sanguinis ad partes affluxus restitutus. Est tamen ubi etiam ipso in paroxysmo spastico venam aperire insigniter conducit, non quidem in partibus spasmo affectis, sed iis ad quas sanguis maximo impetu grassatur. Sic sæpissime contingit, ut a spasmo partium abdominis, immo pedum, qui frigore horrent, ob incussum terrorem, ut aliam causam, sanguis ad pectus & caput impetuosè agatur, ipsamque apoplexiam vel suffocationem minetur; quo in casu utilissime & cum præsentaneo levamine vena non partium inferiorum, sed superiorum in brachio, pertunditur.

Theorema IX.

Datur levior apoplexiæ species, quam sola tempestiva sanguinis missio discutit.

Scholion.

I. Quando vel ex vehementiori animi affectu, præsertim terrore, vel graviore inferiorum partium spasmo, sanguis cum impetu ad caput latus, vasa mem-

membrarum cerebri arteriosa copia sua ita distendit, ut motus eorum systolicus sufflaminetur, species fit apoplexiæ levioris. Est hic affectus feminis sic dictis hysteriis, sanguine plenis & sensibilibus corporis ac animi admodum familiaris, & a vulgo & imperitis Medicis pro animi deliquio venditur, a quo tamen longe multumque differt. Etenim sub animi defectione cordis & artiarum pulsus silet, facies pallida est & spiritus plane interclusus: in apoplectico autem hoc leviori insultu, omnis sensuum tam internorum, quam externorum usus perit, membra immota jacent, cor vehementi palpitatione concutitur, pulsus magnus & celer micat & facies intumescit ac rubore suffunditur. Neque tamen mitior hæc apoplexia oritur a disruptis vasis, quod incurabile malum, neque a feri secessu, qui in paralyin terminatur, sed a sola stagnatione sanguinis in canalium nimis distentorum alveis subnascitur. Compertum enim ex anatomicis est, arterias carotides, & vertebrales etiam, quamprimum calvariam subeunt & per cerebri membranas excurrunt, crassiores suas tunicas, quibus alias in toto corpore arteriosa vasa vestita sunt, deponere; & eaque propter non mirum est, a copia & impetu sanguinis ad cerebrum delati, vim eorum contractilem elasticam, cujus beneficio sanguinis ulterius in venosus capitis sinus protruditur, minui & solvi, sicque sublata carotidum systole, cruorem in vasis membranarum cerebri plexuque carotideo nimium distentis stagnare, & hinc sequstrationem atque influxum liquidi nervorum, a quo motus & sensus, intercipi, istudque in motu sisti. Quæ quum ita sint, jam facile liquet ad restituendam systolen, sanguinis per caput liberum progressum & liquidi in nervos influxum revocandum, vix præstantius & aptius dari auxilium, sanguinis sufficiente, & ex aperta amplo foramine brachii vena, detractione; ita enim intra breve temporis

spatium mens, sensus, motusque corporis ad officium redeunt.

II. Perperam autem ægotantium ita affectorum rebus & saluti consulunt, qui ob minus periculas hujus mali causas, venam in extremitatibus inferioribus aperire suadent, quia hæc partes plerumque in ejusmodi accessione spasmus constrictæ, frigide & a loco affecto nimis remotæ sunt, quo ipso impeditur, quo minus sanguis commode derivari queat. Quin aliquoties observavi, in corporibus, ubi totum nervorum systema ad spasticas contractiones valde proclive & extrema semper erant frigida, a venesectione, eaque pariori, intra aliquot horarum decursum vehementiam spasmodum in inferioribus magis increvisse; qua postea sanguis ad caput impetuosè propulsus, insultum quem descripsimus apoplecticum peperit, adeo subinde invalescentem, ut nisi tempestiva sanguinis missione fuerit discussus, egrum jugularit, aut minimum paralyti memorieque debilitate affecerit.

Theorema X.

Morbi capitis a sanguinis congestionem vasorumque distensione oborti exigunt venæsectionem, in vicinis tamen partibus instituendam.

Scholium.

I. Vehemens & contumax capitis dolor, narium frequens stillicidium, insania, melancholia, vertigo, ophthalmia, capitis erysipelas, nec non laryngis & pharyngis inflammationes, sepius ortum trahunt a spasmis, nimia sanguinis ad superiora congestionem & gravi vasorum distensione, præsertim in hypochondriacis, vel ubi ventriculus cum intestinis flatibus & scybalis turgent, vel spasticis constrictionibus laborant, quibus liber & æquabilis sanguinis circuitus interceptur, ut magna copia & impetu ad alias partes, maximeque caput ruat, ibidemque morbos hos inducat. Et tum quidem ad derivandum sanguinis impetum omnique arcendum periculum, in loco capiti vicino, fronte scilicet, temporibus, sub

lin.

lingua, item in collo, secare expedit.

II. In gravi quidem cephalalgia, ophthalmia, angina, venesectionio sub lingua semper utilissima; in phrenitide vero, melancholia & capitis a causa interna dolore, vena jugularis externa commodissime aperitur, aut si hæc ab imperito Chirurgus inveniri non potest, vena secundum longitudinem frontis exprorecta, quæ jugularis externæ ramus, collo prius submento constricto & spiritu retento, pertundenda. Solent jam fuit hujus frontalis venæ incisionis antiquissimis temporibus, teste Hippocr. Sect. 5. aph. 68. sic perhibente: *parti capitis posteriore laboranti in fronte excurrere vena incisa prodest*. Confirmat hoc Hollerius *comm. in h. a.* constat, inquit, experientia, quod hæc phlebotomia multi derepente a capitis dolore liberentur. Alexander quoque Trallianus l. 1. c. 13. mirifice in phrenitide sanguinis e vena frontis missionem commendat, eademque phreniticum momento securasse testatur; & c. 16. de melancholia scribit: *si humoris sanguinei materia cerebro impacta fuerit, tunc audacter vena in fronte secatur: nam ob totius corporis vacuationem, si loco jam remedia adhibeas, nihil nocet*.

III. Licet sectio venarum capitis, in fronte, pone aures, jugularis externæ, sublingualis, in morbis qui caput gravius offendunt, experientia teste, eximiam conferat opem; id tamen non universale est, neque omnibus omni tempore convenit, sed simul consideranda est ipsius corporis constitutio. Nam si ejusmodi capitis morbis magna vasorum plenitudo junctâ, vel etiam ipsam vehementiores in inferioribus, sanguinem eductum & cum impetu ad caput urgent, verendum est, ne dato per apertam ibi venam vacuo spatio, major cruoris copia eo invitetur. Quapropter Veterum peritissimi, unanimi suffragio ut vena simul in brachio vel pede solvatur, suadent. Sic Trallianus l. 1. c. 16. si, præcipit, circa caput aliquid moliri cogere, priusquam totum corpus

recrementis liberum reddideris, offendas magis, quam juvabis, copiosorem materiam ad locum affectum attrahens. Neque minus Hollerius comment. in alleg. aphorism. si dolor est, ait, in capite cum corporis plenitudine, oportet primum cubiti venam aperire, deinde secare venam frontis; si nulla adest plenitudo, tuto venam frontis statim secabimus; si quo dolor capitis est per consensum; v. g. a suppressis mensibus, primum secanda est vena malleoli, deinde cubiti, tum frontis; si experit dolor a diaphragmate, aut hepate, aperienda vena cubiti, postea veniendum ad frontem; & quamplures adhuc de incisione ipsa tenendas cautiones subjicit.

IV. Ad sectionem venarum, quæ linguæ substratæ sunt, in angina, quod attinet; pariter notandum & eandem cum periculo in corpore plethorico tentari, nisi plethora prius per apertionem venæ in brachio soluta fuerit. Obsequendum itaque est consilio Tralliani, quod l. 4. c. 1. de angina, proponit: ego inquit, sane novi, cum usus valde urgeret, me venam cubiti mane aperuisse, diluculo lingua subiectas secuisse, & vesperi ex cremore pisana lacrimam scammonii exhibuisse, atque ita anginam procuravi. Petgit deinde: novi etiam jugulares venas a me sectas esse, cum lingua subiectas non invenirem, ac plurimum adjuvisse.

Theorema XI.

In morbis pectoris, ut pleuritis vera & peripneumonia, incisioni venæ in brachio sæpe summe est necessaria.

Scholion.

I. Utut pleuritis spuria, quæ rheumatismi, sive doloris arthritici species est, a sero acri intra membranam pleuræ, costas cingente suborta, non semper sanguinis missionem possit, sed sæpe sola diaphoresi felicissime tollatur; longe tamen alia ratio est pleuritis veræ & peripneumoniæ, quarum illa nonnisi levior, hæc profundior pulmonum inflammatio est, a tali sanguinis firmius impacti pulmonum vas

pro-

prognata. In his enim utique sanguinis subtractione, quin non una, sed quandoque si corpus sanguine diffuit & plethora urget, reiterata opus est, ad incrementum inflammationis impediendum, quod fit, quando sanguis nimium in vasis congestus, stagnans & progressu libero exclusus, per proximum locum ad meliorem derivationem ex incisa vena evocatur, & quidem facta paullo ampliori incisione, quo eo citius & promptius impetu acquisito descendere & a pulmonibus derivari possit.

Theorema XII.

Triplex venæsectionis eximius usus, evacuatorius nempe, revulsorius, & derivatorius.

Scholium.

I. Evacuatorius venæsectionis usus dicatus est minuendæ sanguinis plenitudini, & hoc proposito, nihil interest ex quacunque parte ipsum detraxeris. Derivatio ex usu est ad sanguinis fluxum ex parte affecta in alia loca opportuna adducendum & invitandum, quo ibi evacuetur. Sic in affectibus, quæ abdomen excruciant spasticis, flatulentis & qui a fluxu mensium & hæmorrhoidum impedito vel suppresso eveniunt, tutius secatur vena pedis, quam brachii, ad derivationem. Hinc recte Hippocrates lib. de nat. hum. §. 20. inculcat: oportet venæsectionem in doloribus dorsii & coxædici in popliti bus & malleolis efficere. Et Severinus de effectibus Medic. c. 26. pag. 62. tradit: in dolore nephritico præcavendo, in promovendis hæmorrhoidibus, purgatione lochiorum, in ani inflammatione & prolapsu, in sanguinis vomitu, in ischiaticæ venæ pedis secari quam felicissime. Contra ea in affectibus capitis, apoplexia, lethargo, mania, melancholia, phrenitide, catarrho suffocativo, asthma sanguineo, hæmoptysi, pleuritide, peripneumonia, inflammatione hepatis spuria, sanguis mole & inflexu peccans ac cito derivandus feliciter & utilius ex proximiori loco, brachio nempe exantlatur.

Revulsio vero, seu potius avulsio fit, quando sanguinis impetus ex partibus inferioribus ad superiores, sursum quasi retrahitur, sive revolvitur. Ita in nimio mensium vel hæmorrhoidum fluxu utiliter vena secatur in brachio. Idem commode fit in gravidis ad abortum præcavendum, si vasa uterina a sanguine nimium infarsita & distenta sunt, ut pondus uteri deorsum tendentis, inferioribus quodammodo molestum fiat & onerosum.

II. Usus venæsectionis derivatorius & revulsorius caute atque prudenter administrandus. Nam si obstructions vasorum a sanguine impactu submovendæ, non adeo largam, sed parciorem ex loco vicino portionem subtrahere expedit, quo reliquis ad partem laborantem majori impetu ruat, & obhærescentem in minimis vasculis elidat; eo quod a parciore sanguinis missione resistens in venis majorem a celeritate vim acquirit. Hinc est, quod a pertio venæ saphenæ non raro mensium fluxum in momento restituit, & hæmorrhoidale stillicidium in sanguis incisione venæ in pede promoveatur & expeditius reddatur; quum contra subtractione in manu vel etiam in pede nimio sanguine, sepe effectus obtinendi deficient. Si morbus vero est inveteratus, & ista vasorum obstructio, ut tolli nequeatur in corpore plethorico a pertio saphenæ plus nocet, quam prodest, quia sanguinem versus uterum uberius attrahit, ut major vasorum obstructio inde nascatur. Neque in hemicrania, seu capitis dolore contumaci, vertigine chronica, melancholia, venæ sectio in fronte quippiam adjumenti afferre potest, quia major inde sanguinis ad caput affluxus proritat & vasa membranarum cerebri obstructa magis infarciuntur, sed præstat tunc sanguinem ex inferioribus ducere. In malo ischiadico recenti venæsectio in pede præsentaneum saepe conciliat levamen, in diuturno vero malo neutiquam, sed incremento favet. Tutius itaque, si corpus succis, & sanguine farsito, cum

Hol-

Hallerio Comentar. in Sect. IV. aph. 36. primum venam secamus in brachio, deinde ischiadicam, ut non in uno, sed in diversis locis sanguis revellatur. Ac ibidem apprimere ad veritatem hic auctor scribit: quod in dysuria, si sit ab infarctu renum a sanguine, item in inflammatione vesicæ, primum incidenda sit vena brachii; deinde etiam statim subiungenda saphæna: in malleolo, aut poplite. Ex quibus omnibus pleuius innotescit: in loco admodum vicino sectionem fieri posse, si morbus est recens & causa mobilis, neque adeo magna vasorum plenitudo; ubi vero diutius traxit ægrum, vel corpus nimium sanguine repleat, tum prius in remotioribus partibus, deinde in vicinis, venas aperire convenit.

Theorema XIII.

Multum interest ut iusta sanguinis quantitas evacuetur & quandoque reiterata venesectione opus est.

Scholia.

I. Ætate adolescentis, & teneioris texture homines vasisque tenuioribus præditi, & femina, quæ facile incidunt in animi deliquium ob largiorem sanguinis missionem. Abstinere ab ea debent; sed potius, si venesectione opus angustiore foramine, neque simul & semel, sed plaga aliquoties digitis compressa, gradatim sanguis mittendus hic est. Femina vero post annum quinquagesimum, quo ordinario mensium fluxus desinit, largiorem postulant sanguinis extractionem, quo etiam valet in viris robustis; qui magna habeant vasa, & ubi sub lauto vitæ genere consuetus hæmorrhoidum fluxus cessare incipit. Vernali tempore, præsertim Maio, corpora largiorem sanguinis e vena fluxum ferro possunt, quam tempore æstivo, vel autumnali: parcius vero sanguis vanis eximendus est, in nimis hæmorrhagiis, ut hæmoptysi, in enormi mensium vel hæmorrhoidum fluxu, neque etiam ante mensium ordinarium. tempus multo sanguine corpus. spoliare consuevit,

ne subsequatur fluxus, vel plane cesset, vel imminuat.

II. In febribus omnibus inflammatoriis, item exanthematicis, si ob nimiam sanguinis copiam opus est ejus missione, curatius paulo circumspiciendum est, ut iusta emitatur quantitas. Nam si sub nimia ejus abundantia tantum parva portio educitur, ad unam vel alteram unciam, expansione sanguinis organica inde magis sepe incrementum, nihil juvat, ut potius plus oblit, inflammatio inde augetur & exanthematum eruptio minime promoveatur, si vero supra modum & magis quam par est sanguis e vena hauritur, tunc pariter plus detrimenti, quam emolumenti affert; siquidem expulsio exanthematum, quæ per sanguinem ad summam cutim delatum fieri debet, impeditur, ut materia corrupta summa cum pernicie intus maneat. In peripneumonia & pleuritide nimia sanguinis detractio impedit expectorationem & discussionem inflammationis, quæ etiam mediantie sanguine fieri debet. In rheumatismis, erysipellate, doloribus arthriticis vagis & fixis, etiâ hæc observatio, ut iusta sanguinis quantitas ad morbum curandum relinquatur, necessaria; id est, ne vel nimium vel adeo exiguum evacuetur.

III. Si plethora, tam ad vasa, quæ ad vires, nimis urget, magna sepe sanguinis portio, interdum ad libram unam medicam, ex venis exantlanda est, si vero parum extrahitur, sanguine majus spatium inveniunt, plus ejus elater intenditur, magis expanditur, & sæpe majori cum impetu in affectam partem irruit. Observantur adhuc animo nostro exempla, ubi in eminenti plethora per parvum foramen duabus tantum circiter unciaseductis, intra paucas horas insultus apoplecticus sequutus fuit, qui largiori venesectione in brachio, ad vacuas octo, feliciter sublat. Memini quoque a fluxu hæmorrhoidali, vehementia frigoris oppresso, in Principe plethorico summas præcordiorum anxietates fuisse subortas.

ubi

ubi fecla fuit vena in pede, qua non ultra quatuor uncias sanguinis emiffum, confequente fymptomatum exacerbatone, anxietatis fcilicet præcordiorum, vigiliarum, inquietudinis, fpæudi angultiz, quæ tamen omnia repetita ad feptem uncias sanguinis miffione, & quidem in altero pede, protinus conquieverunt.

Theorema XIV.

Rheumatismos, catarrhos, coryzam, tuffim, venæfeclio improvida fæpe gignit; tempeftive autem admiffa egregie arceat.

Scholia.

I. Obfervatio in praxi medica attentæ fæpius nos docuit, a vena fecla, præfertim vere & autumnò, tempeftate non adeo placida & ferena, complures poft aliquot dies in graves catarrhos, coryzas, tuffes, pafliones rheumaticas & febres catarrhales incidiffe, idque familiariffime, fi non probe veftiti, corpus autæ frigidiori & humidiori, maxime vefpertinæ, objecerunt. Id enim fere perpetuum eft, fub paullo largiori sanguinis miffione perfpirationem minui, adeoque humores per tubulofum cutis corticem fub forma vaporis, evehi folitos in interioribus quodammodo remanere, id quod frequentius evenit, fi corpora funt fpongiofiora & vafis exilioribus prædita. Neque ratio hujus effectus adeo latet. Nam detracta notabili sanguinis portione, vafcula, præfertim minora & extrema, antea fanguine diftenta, nunc detumefcere & vacua fieri incipiunt. Et quum exquisitus admodum & fenfibilis tonus in fubcutaneo integumento vigeat, fit, ut fub auræ frigidioris accelfu, fibræ cutis elasticæ contrahantur ipfique tubuli fudoriferi fic occludantur, undecrementa fudoris non modo in corpore remanent, fed & ab exterioribus ad interiora, præfertim faucium & bræchiorum loca glandulofa, vel etiam ad articulorum glandulas mucilaginosas, vel ad eorum ligamenta glandulofa, feruntur, ubi færum valde acre, falum, ftagnans, mo-

leffas irritationes, vaforumque conftrictiones efficiens, curfum liberum impedit, unde feccelliones feri, dolores, ardores & copiofi humoris affluxus fufcitantur.

II. Quemadmodum vero ex improvida, vel nimia sanguinis emiffione catarrhorum fons & origo promanat, ita e ebriori obfervata conitat, venæfeclionem prudenter vere & autumnò inflitutam & quotannis repetitam, complures a coryza, gravædine & tuffi univerfaria liberat; maxime eos, quæ antea sanguinis copia laborarunt, nunquam tamen venæfeclioneum admiffuerunt. Vernali enim tempore ob majorem aeris rarefactionem & elasticitatem, turgent maxima vafcula fanguinem a fubtilioris ætheris accelfu magis expanfum. Si itaque omittitur sanguinis, vel a natura, vel arte facta vacuatio, sanguinis & humorum in locis maxime hæis, mollioribus, glandulofis promptè ac faciles funt ftagnationes, decubitus & feri feccelliones; quæ omnia mala per opportunam sanguinis ventilationem præfcindi poffunt.

Theorema XV.

Colica flatulenta uti a venæfeclione nonnunquam exacerbatur; ita convulfiva & hæmorrhoidalis eadem fæpe levatur & abigitur.

Scholia.

I. Origo flatuum, qui interina obfidet atque molefte diftendunt, pendet frequentiffime ab inteftinorum atonia, live labefactato eorundem periftaltico motu. Nam ficut vigore hujus motus, & flatus, & alia in inteftinis contenta, inferiora verfus pelluntur; ita imminuto, vel detructo eo, ingens flatuum, præfertim in flexuris coli, circa hypochondria, proventus fit atque ftagnatio. Hæc vero inteftinalis atonia maxime originem fuam ducit a defectu laudabilis fluidi nervi & sanguinei, quare fenes itemque a morbo convalefcentes, vel affectu animi diuturno debilitati, nec non homines phlegmate abundantes, & infrigidantibus ad-

admodum citis vefcentes, colica frequentiffime laborant, quæ non sanguinis imminutione, fed medicamentis carminativis, balfamico & aromatico elemento inſtructis, quam feliciter fanatur. Alia vero ratio eſt colicæ ſic dictæ ſpaſmodicæ, ſive convulſivæ, quæ a ſanguine inter tunicas intelligentes ligente eademque cum vehementia diſtendente naſcitur, ubi ſanguinis tempeſtiva e pede miſſio, non modo ab hoc calamitoſo malo præſervat, ſed & illud ipſam præſentiſſime mitigat, quod etiam *Riverius* jam *Genſ.* 1. obſ. 44. recte annotavit.

Theorema XVI.

Tam ante, quam poſt venæſectionem quædam utiles tenendæ cautiones.

Scholia.

I. Non facile, niſi ſumma neceſſitate urgente, in ipſo æquinoctio vel ſolſtitio, in plenilunio etiam & novilunio, vel die pluvioſo & turbido, venarum ſectio celebranda eſt; ſed conſultius eſt, aliquot dies ante hæc tempora & die ſereno præſervationis cauſa hoc inſtitutum perficere, tunc maxime ob rationem, quia circa hæc tempora menſium fluxus ordinario incidunt & plures ex morbis ſpaſmodicis, paroxyſmæpileptici & qui hypochondriacis & melancholicis ſunt familiares, redire ſolent, ante quorum acceſſionem corpus a ſuperfluo ſanguinis ſedundantia per venæſectionem liberare præſtat.

II. Conſultius ſemper eſt, præſertim ſi quis facile animo deficiat, non ventriculo vacuo, ſed juſculo ſumto, factoque paullo anguſtiori foramine, venæſectionem adminiſtrare.

III. Poſt ſanguinis per ſectam venam deceſſum, nec potu, nec cibo onerare ventriculum oportet, multo minus ſeinebriare, aut corpus frigidum, vel humido aeri objicere. Crebra enim docuit experientia, plures hac ratione, Martio præſertim & Octobri, inprimis ſi corporis habitus fuit ſpongioſus, in coryzas, tuſſes,

rheumatifmos, febres catarrhales & pleuritidem ſpuriam incidiffe; utpote per ſanguinis miſſionem eamque largam, perſpiratio non parum minuitur, eo quod ad ſubcutaneos & ſudoriferos tubulos fluidum eximie exhauſtum tanta mole non amplius accedens, eos non ita patulos atque apertos ut antea ſervat. Hinc aer frigidus accedens eos facile claudendo, humorumque curſum a ſuperficie corporis ad interiora refleſtendo, jam memoratos morboſos inducit.

IV. Magis pro ſanitate eſt, primas vias ipſumque ventriculum a cruditate copia & ſentina humorum, non per forte purgans, ſed laxativum, ante uſum venæſectionis liberare. Cavendum vero maxime in plethoricis a fortibus purgantibus tanquam veneno, eo quod operationem ſuam vehementiori intelhinorum ſpaſmo exſerunt, eoque libioreſem ſanguinis progreſſum valde turbando, pernicioſas congeſtiones hinc inde in partibus ſæpe efficiunt.

V. In feminis ob menſium fluxum, & viris hæmorrhoidum ſillicidio obnoxiiſ, præſtat ſemper venam pedis aperire, ne ſanguis ab iſis emunctoriis divertatur: viri vero hæmorrhoidibus vacui, venæſectioni in pede non in totum aſſueſcant. Non ſemel enim obſervavimus hæmorrhoides inde coctas ſine fluxu fuiſſe proritas, ad quas removendas venæſectio in brachio deſuiſſet inſtitui.

VI. A miſſo ſanguine exquiſitior victus ratio tenenda eſt, neque protinus eger ad priſtinam dietam, peridde ut canis ad vomitum, redeat. Hinc majorem in modum detellandus eſt mos Germanorum, qui nunquam lautius edunt ac bibunt, quam ubi venæſectione perſuncti ſunt.

Theorema XVII.

Cucurbitulæ cum ſcarificatione vicariam ſæpe præſtant venæſectionis operam.

Scholion.

1. Placet in ſignem locum ex ipſo

Col.

Celsol. 2. c. 10. de usu cucurbitularum cum ferro adducere, sic habentem: usus cucurbitula precipuus est, ubi non in toto corpore, sed in aliqua parte vitium est, quum exhauriri ad confirmandam valetudinem satire est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, qua jam laesa est, mitendum; quod nemo cucurbitulam diversa parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eo avertit, sed ei ipsi, qua delicti, quaeque liberanda est. Quare in rheumatismis, praesertim quae dorsum, scapulas & brachia occupant, in doloribus quoque artuum utiliter scarificatio fit sat profunda, & ubi dolor pretiorius & constrictorius frigidus occupat, sed quod notabile est, parcius semper sanguinis quantitas ex laesa, quam ex sana parte educitur. Ad dolores podagrarum avertendos, nonnulli singulis mensibus non sine utilitate scarificationem in planta vel dorso pedis admittunt. In efflorescentiis & deformitate faciei etiam utiles sunt scarificationes cum cucurbitulis, ad eliciendum & derivandum sanguinem a facie. In cutis defecationibus, scabie, non inutiliter in obesit & spongioso corporis habitu praedixit, idem tamen adhibentur.

Theorema XVIII.

In acutis, ubi vires non patiuntur sectionem venae & celerem sanguinis emissionem, praestat paulatim & successively eum, si opus est, per scarificationes & cucurbitulas evacuare.

Scholion.

I. Praeclara sunt hanc in rem monita apud Celsum qui l. 2. c. 11. opus est, inquit, cucurbitula in acutis quibusdam, si levare corpus debet & ex vena sanguinem mitti vires non patiuntur. Idque auxilium, ut minus vehementer, ita magis tutum, nec unquam periculosum, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibeatur; ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena praeceptum periculum est, aut nobis in parte corporis vitium

est, etiam huc potius confugiendum est; eum eo tamen, ut sciamus, hic, ut nullum periculum, ita levius praesidium esse, nec posse vehementi malo, nisi aequae vehementis auxilium succurrere. Ego in experientia fundatum quum maxime egregium hoc Celsi monitum deprehendi. Non semel enim, sed saepius observatum a me est, morbos capitis, ut epilepsiam, vertiginem, inflamam, motus artuum convulsivos, a secta vena ac celeriori & paulo largiore sanguinis emissionis, incrementum cepisse, & paroxysmos frequentes graviores redditos; idque maxime annotavi in sensibilibus corporibus, juvenibus; contra vero educationem sanguinis per cucurbitulas quam optime ferre potuerunt, & cum levamine malorum. Ratio mihi haec videtur: quod vehementia spasmodum in partibus affectis, cui valde sanguis interius in vasis resistit, increseat, si subito ipsis detrahatur. In acutis febribus, quando a congestione sanguinis in capite metuenda est phrenitis; consultius etiam est per cucurbitulas occipiti appositae sanguinem detraxe- re, quam per venam cubiti sectam. Aegyptiis Medicis olim, ut refert *Alpinus de Medic. Aegypti* pag. 79. frequenter in more positum erat, in omnibus acutis febribus, capitis doloribus & inflammationibus, item in putridis febribus, ubi ex rubore in facie, assiduis vigiliis, phrenitidem metuebant, venas intra nares scarificare, maxime in diebus criticis atque ab his tepido aequae ductis balneo educi. Ubi vero in morbis celerior opus est auxilio & derivatione sanguinis a parte laborante, v.g. in insultu apoplectico, peripneumonia, inflammatione uteri, lyncope cordiaca, quae ab infarctu sanguinis in corde fit, aut suffocationis periculo, parum opis praestant cucurbitulae, sed potius circa locum affectum propius intelligenda est plaga paulo amplior & sanguis celeriter educendus.

Theorema XIX.

Cucurbitulae locum habent; ubi sanguine vel sero in parte quadam ex-

terna stagnante dolores, tumores, inflammationes, vel alia vitia fiunt.

Scholion.

I. Hanc veritatem quoque egregie confirmat *Celsus* l.c. dum ait: *usus cucurbitulae praecipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhausti ad confirmandam valetudinem satis est.* Usus enim scarificationis duplex est, vel evacuatorius, vel derivatorius, ille ad minuendam plethoram, hic vero ad extrahendam materiam corruptam & infixam utilis. Multi ex Veteribus & praecipue Aegyptii negabant, cucurbitularum usum ad solvendam plethoram aptum esse remedium, sed certis tantum locis, & partibus afflictis imponebant cucurbitulas. Verum quando illae ipsae omnium regionum partibus, dorso, brachiis, femoribus, cruribus apponuntur, & paulo profundiores ac repetitae fiunt incisiones, ad uncias saepe duodecim educi potest sanguis, ejusdem ponderis, consistentiae, quam qui e vena extrahitur. Nam aliquoties fecimus experimentum siccando sanguinem per cucurbitulas elicatum, & invenimus tres partes ut in sanguine per venam effuso fluidi, ad unam partem solidi, ut adeo vulgaribus in Medicina erroribus id accedendum sit, sanguinem tenuiorem per cucurbitulas, crassiores autem per venas evacuari. Interim ad exhauriendam & divertendam materiam vitiosam, cucurbitulae praevenerunt eziomorem habent usum. In mentem mihi veniunt aliquot exempla, ubi in dolore vehementi scapularum, in oculorum doloribus & fluxionibus acerbis, gutta rosacea, tumore capitis erysipelaceo, venesectione impede, vel brachio admissa, nihil profuit, scarificatio vero in collo, occipite & pone aures, item apposito cucurbitularum in dorso, egregium attulit levamen. Aegyptii in capitis, oculorum, aurium doloribus & fluxione, ophthalmia, lippitudine, item ad procurandum somnum, occipiti, collo & pone aures cucurbitulas applicabant, & profundioribus scarificationibus sa-

Tom. III.

guinem eliciebant, ut refert *Alpinus* l.c. sed prius semper venam cubiti jufferunt aperiri; quod consilium utique in plethoricis non spernendum, sed magni aestimandum, etiam tunc ubi venae faciei aut narium scarificandae, in capitis vehementibus doloribus, vel infania, ne scilicet major dato spatio ad has partes proritetur affluxus. Ad dolores podagricos avertendos scarificatio singulis mensibus in planta pedum egregie ex usu est, ut vel ipsa podagra scarificationis utilitate *Cardanus lib. de art. parv. pag. 113. & Platerus lib. 2. prax. med. pag. 717.* aliquot historiis curatorum confirmet. Ceterum ad sphacelum abigendum, ne ulterius ferpat, ulcera quoque pessime curanda, quam optime aditruit *Severinus de eschac. Medic. l. 1.* scarificationis usum. In mensibus, & haemorrhoidibus supprellis, etiam crurum scarificationes *Galenus de sanguin. mission.* plurimum commendat, quae locum habere possunt in iis, qui avertantur venesectione, vel ob vires cordis languidas, dispositionem ad liphthymiam, & tenebrositatem aetatis, sanguinis celerem ex aperta vena extractionem ferre non possunt.

Theorema XX.

Alius adhuc datur sanguinem extrahendi modus per hirudines, sive sanguisugas, a quibusdam Medicis mirum aestimatus.

Scholion.

I. Antiquissimus Medicorum hic sanguinem per hirudines evocandi modus minus cognitus fuisse videtur; meminit tamen ipsius *Plinius hist. nat. l. 32. cap. 10. diversus*, inquit, *hirudinum, quas sanguisugas vocant, ad extrahendum sanguinem usus est, quippe eadem ratio eorum, quam cucurbitularum medicinalium, ad corpora levanda sanguine, spiramenta laxanda judicantur.* Ex Arabibus quoque *Rhasi* sanguisugarum usus annotuit, & ex superioris aevi Medicis *Zacutus maxime Lusitanus*, nec non *Amatus Lusitanus*, & *Mercatus* earundem appo-

sitione.

V

sitionem mire collaudarunt, inprimis in morbis qui caput infestare solent, ut gutta rosacea, pustulis faciei, capitis doloribus, præcipue rheumaticis, in vertigine, melancholia, angina & dentium dolore, in quibus eandem occipiti, collo & pone aures apposuerunt. Neque etiam ipse de salubritate evacuationis sanguinis per hirudines dubito, sed an maior ab his, quam cucurbitulis scarificatis expectanda sit utilitas, ego quidem non sine ratione dubito.

Theorema XXI.

Hirudinum applicatio orificio ani in hæmorrhoidibus suppressis ac inde pullulantibus morbis, valde commendari solet.

Scholia.

I. Hic modus sanguinem eliciendi ex venis ani per appositionem hirudinum, aliis mittendi sanguinem methodis in morbis, qui ab hæmorrhoidibus suppressis proveniunt, ut pathematibus hypochondriacis & quos secundum Hippocratem hæmorrhoidum fluxus solvit, ut phreneticis, melancholicis, hypochondriacis, nephriticis, ischiadicis, hisa quibusdam præfertur de causis, quod hi morbi a stagnante in vasis intestinorum, quorum exitus est in hæmorrhoidalibus, oboriantur sanguine, qui longe facilius & propinquius evacuari possit & pars affecta liberari & levari per hirudinum ex ani venis ductum, ac si sanguis in aliis locis mittatur. Neque etiam ego negaverim, quod hirudines dictis in morbis præstiterint quendam usum, præsertim si *Zacuti Lusitani*, nec non *Amati Lusitani* & *Mercati* observationibus fides habenda; an vero a sanguisugis effectus præstantior expectari possit, quam vena secta in pede, vel scarificationibus profundis in cruribus, ego experientia destitutus certa fide asseverare nequeo. Nam vidi multoties in vehementibus & inveteratis hypochondriorum spasmodis, hirudines sine effectu applicatas, vidi easdem levamen tantum ad tempus attulisse, vidi quoque ab earum

appositione ad hæmorrhoides coæcæ mali moris ulcera & fistulas procreatas. Deinde ingens ratio dubitandi, quod ex parte affecta sanguinem hauriant hirudines hæc est: quod ipsæ ex hæmorrhoidalibus externis, quum internæ lateant, fugant, quæ equum, vel plane nullum commercium cum vasis intestinalibus, mæsaraicis & portæ ramis, in quibus tamen sedes pathematum spasmodicorum & hypochondriacorum, habent: in fluxu vero hæmorrhoidali, hæmorrhoides internæ sanguinem stillant & ob id convenienti modo & tempore fluunt, vitis ex stagnatione in ramis venæ portæ oriundis, apprime opitulantur.

C A P U T X.

De balnearum, pediluviorum & clysterum usu medico.

§. I.

Tanta est divini Numinis in procuranda hominum afflictorum salute benignitas, ut inter alia innumera, quæ in auxilium prompta sunt remedia, simplicissima & ubivis fere obvia proleant, quæ securitate, & efficacia, tum in morbis avertendis, tum expugnandis, aliis pretiosis, rarioris, arte etiam chymica operose elaboratis arcanis, longe superiora sunt; id quod omnes ingeniis & periti in arte nostra viri ultro confitebuntur. Exemplo sit aqua communis. Hæc certe pura, omnis etiam materię salinæ vel terræ expers, longe magis quam ullum aliud medicinæ universalis meretur nomen, utpote quæ in omnibus individuis, omnibus morbofis afflictionibus, tam internis, quam externis, acutis & chronicis, tam incomparabilem affert opem, ut nulla alia medicina huic æquiparari possit. Ipsi fontes calidi & frigidi salutiferi, quos provida & benigna natura nobis sponte largitur laudatissimam suam quam exerunt in morbis, præsertim chronicis, debellandis, efficaciam, hu-

Aqua simplicem optimam medicam.

mo-

moris aquei bonitati, subtilitati & largiori hujus potui potissimum debent. Illa vero varii generis salia, quæ in sinu suo recondunt, tam neutra, quam alcalia, cum tenuissimo martis principio, vix aliud quippiam efficiunt, quam ut stimulum addant solidis corporis nostri partibus & tubulis. quo liquidum ingelstum expeditius per vasa mioima & excretoria ferri, humores tenaces, spissos dissolvere & excrementitias impuras salino-sulphureas partes temperare, diluere & e corpore evehere possit. Infusa quoque theiformia ex appropriatis pro ratione morbi speciebus confecta, quæ nostro tempore familiaris usus sunt, nec non lignorum & radicum decocta ex aqua, quæ in expugnandis longis & rebellibus morbis plurimum valent, præcipuam certe suam efficaciam ad fluidum illud aquæ elementum referunt, eo quod nec radices, herbæ & ligna in pulvere vel sub alia forma assumta, nec ipsa decocta, nisi dilota satis & diutius usurpata, salutarem exerunt effectum. Pariter pisanæ, quas olim Hippocrates maximi fecit in morbis acutis, & lactis vel feri lactis cura in iis morbis, qui ex acrimonia succorum proveniunt, egregii omnino sunt usus; præcipuam autem suam virtutem a diluente suo humore unice mutuant.

§. II.

Quod quidem quemadmodum de interno aquæ usu in propatulo est; ita eadem hæc aqua non minus externe etiam adhibita mirabiles plane & maxime salutaris exserit effectus. Testatur id faciunt balnea & pediluvia, quorum præcipuum ingrediens & basis est simplex quidem aqua; nihilominus tamen hæc sola, sine ullo alio additamento, modo aqua sit pura & levis, medicioalem longe saluberrimam præstant virtutem. Et certe balnearum aquæ dulcis usus in morbis præcipue internis & gravissimis, præcis jam tum temporibus fuit quam maxime solennis, ut ex Hippocratis, Galeni, Celsi, Aureliani, Aretæi,

Celsi & Tralliani scriptis luculenter patet. Potissimum in gravissimis capitis morbis, ut insania, live cum tristitia, live cum furore juncta, in atroci capitis dolore. Veteres summo cum fructu his utebantur balneis. Et Alexander quidem Trallianus lib. 1. pag. 107. sic prodidit: aquarum dulcium balneum, si quid aliud, melancholicis opiculatur, sed diutius in eo morentur atque desideant, si etiam æstus fuerit. Idem confirmat Aretæus lib. 7. pag. 134. qui melancholicos in aquis sponte calidis sæpe commemorari jubet, hanc subjungens rationem, quia raræ & molles carnes ad hujus ægritudinis remissionem maxime faciunt, quæ tamen siccæ & tensæ in melancholia laborantibus sunt. Celsus quoque Aurelianus lib. 1. de morbis chronicis pag. 134. maniacis aquarum naturalium ulum plurimum commendat. Et Prosper Alpinus de Medicina Ægyptiorum pag. 115. commemorat: melancholicos plurimos tepidis balneis perfecte sanatos esse. Pariter in renum calculo Alexander Trallianus pag. 343. 347. it. Aretæus pag. 118. si dolores valde urgeat, infusus ad umbilicum usque mirifice commendat.

§. III.

Ipse etiam multiplici experientia edoctus, plena testari possum fide, quod in morbis capitis gravissimis debellandis, ut mania, melancholia, mentis stupore & torpore, somno inquieto cum terrificis insomniis, in hemiplegia, vertigine, scotamia, dentium quoque atroci dolore & in graviorebus aliarum nervosarum partium doloribus, ut ventriculi cardialgicis, intestinorum iliacis & colicis, & qui a calculo renali proveniunt, balnea aquarum Teplicensium, item infusus in aquam puram temperate calidam, etiam sub ipso paroxysmo & pathematum afflictione, præsentissimum attulerint levamen. Tam efficax enim balnearum in complacandis doloribus & relaxandis spasticis stricturnis est efficacia, ut quamdiu infusus

Et omnia
floris
in partibus
utilia.

Ob vires
tamen
spasmodicas
relaxant
item.

Etiam
interne
uso.

Piscium
testimo-
nio.

dem afflictis insident, omnes cruciatus & spasmi sileant, relictis autem illis, iterum accedant. Neque minus Veteres, teste *Crispo*, & *Ægyptii* teste *Alpino* l. c. pag. 114. in omnibus febribus, jam continuis, quam intermittentibus, exceptis pestilentibus, familiariter & uuliter adhibuerunt balnea, non tamen in principio & statu, sed declinante imperio. Ipse quoque in quartana senum, diebus vacuis emollientibus & nervinis balneis non semel sine fructu usus sum.

§. IV.

*Humori
regi de-
signant
Respi-
ratori
nem mo-
vent*

Præter hanc autem fibras rigidas, tensas & spasmo contractas emollientem & humorum ac sanguinis motum a capite & partibus superioribus ad alia loca determinantem & derivantem virtutem, balnea aquæ dulcis etiam egregie circulum sanguinis, & humorum atque perspirationem per summam cutim promouent. Nam humiditate relaxant fibras & poros cutis & calore suo expandunt sanguinem, majorem quoque cordis & arteriarum distensionem, quam in eadem proportionem & gradu sequitur systoles, efficiunt, unde pulsuum & magnitudo & celeritas crescit & circuitus humorum acceleratur, hoc aucto, sanguis fluxilior fit & tenuior, ad extremos tubulos corporis, summamque cutim prompte fertur & diffusio, atque exhalatio subtilissimarum sordium promovetur, quæ adhuc largior succedit, si quis statim a balneo concedit in lectum; eo quod circumfusæ aquæ gravitate vapores per spiracula exiuri in balneo quodammodo coercentur ac reprimuntur, hæc autem remota & absterfa in lecto exapertis atque expansis tubulis magna feri copia prorepat, ut universum lege corpus sudore perfundatur.

§. V.

*Et bal-
neorum
operam
stomachum
faciunt*

Porro balnea sive femicupia in eo peculiare sibi vindicant efficaciam, quod usum & virtutem medicamentorum sic dictorum generosorum, in persanandis gravibus morbis, mirifice secundant. Notissimum enim est,

thermarum, acidularum vel aliarum aquarum salubrium in longis, & valentibus morbis potum, longe feliciorem effectum & successum lequitur, quando interposito usu balnearum, quam si solus instituitur. Non minus, mirabilis thermarum Carolinarum & acidularum Egranarum indies conspicitur in affectibus, præcipue spasmotico-hypochondriaciis, & ubi systema nervorum valde imbecille & afflictum est efficacia, quando finito potu, in thermas Treptenenses laborantes concedunt, & us temperaturis convenienti modo & tempore utuntur. Sunt enim hæc valde leves subiles & puræ, quod partim per explorationem cum instrumendo statico, partim etiam per evaporationem, qua nihil fere solidi relinquatur, innorescit, eaque propter oblitam hanc puritatem atque subtilitatem, magnam vim penetrandi in intima solidarum partium, & fibrarum, quæ tensæ & contractæ sunt, habent, easdemque relaxando, & emolliendo ad naturalem statum reducunt.

§. VI.

In atroci lue Gallica ejusque immanibus symptomatibus abigendis, præparatio prius per venesectionem, laxantia & sanguine edulcorantia corpore, ex mercurio bene præparata, & dextæ applicata medicamenta, sive ad salivæ fluxum, sive ad sudorem movendum data, miræ sunt efficaciar, quando sub eorum usu laborantes in balneum aquæ dulcis indies fere descendunt, postea lecto se committunt, & sudorem expectant. Decocta etiam radicum, lignorum, & sanguinem depurantium ex aqua, in morbis cutaneis, doloribus, exulcerationibus, & qui ab enormi humorum acrimonia oriuntur, longe felicius, & citius desideratam exhibent operationem, si balneis interpolantur. Et certe dici vix potest, quam copiosas, crassas, pingues aquæ innascentes sordes mali odoris sæpe numero balnea ex intimis cutis tubulis eliciant. Si validioribus forsitan etiam opus est purgantibus,

*Ue
mercurio
valid.*

*Deco-
ctionum
sordium
ferentia.*

*Purgan-
tium.*

*Dolores
in a-
qua
simpli-
et quo-
modo*

*Si em-
stora.*

bus, vel etiam acrioribus urinam cientibus, tutius omnia illa præmissis balneis usurpantur. Veteres quidem in rebellibus admodum morbis multum hellebori albi usu præstitisse constat, sed nunquam eum facile adhibuerunt, nisi prius in balneum corpus fuisset demissum. Hoc enim modo non solum succi fluidiores & magis mobiles sunt, tubulique excretorii relaxantur, ut eo melius & minori cum molestia peccans materia educatur, sed etiam remissis solidiorum fibris, omnis noxa drastici ejusmodi vehementes spasmos & stricturas inducentis pharmaci arceatur. Idem ex usu est assumptis vomitoriis, quibus Egyptii, teste *Alpino de med. meth.* singulis mensibus ad præseruationem, sed non nisi in balneo, utebantur.

§. VII.

*Uteri-
norum.*

Quandò morbi ex uterivirio & ejus vasorum nimia atonia ac distensione orti curadi sunt, ut fluor albus, vel præcavendus abortus, vel concrementa carnea, polyppum referentia, vel mole, quæ crebrioris abortus causæ sunt, expelli debent, vel etiam si menses non sufficienter fluunt; ideoque in ordine m reducendi, certe ego nunquam non congruis internis remediis uterinis, emmenagogis, balsamicis & purgantibus, frequentem balneorum jungendum usum suadeo, cum exoptato semper successu. Medicamenta ex marte dextre præparata, liquida præsertim, item chinæ cortex, in infuso, vel decocto cum vino, leni sua balsamica adstrictione, tonum partium roborando in cachexia, in inveteratis intermittentibus febribus, malo hypochondriaco, si ex motus peristaltici intestinorum debilitate provenit, eximium & saluberrimum præstat effectum; longe tamenturior, longe felicius ab iis expectanda erit operatio, quâdo corpus sub eorum usu movetur, aut crebrius balneo immisum mulcetur. Et hæc omnia multiplici experientia edoctus scribo.

§. VIII.

Ad ejusmodi vero balnea non adhi-

Tom. III.

bandæ fontanæ, asperæ, graves & calcaræ terræ omulæ, sed leves, subtiles aquæ, cujus indolis est pluvialis, nec non fluvialis, post imbres maxime hausta. Optime quoque ad instruenda balnea aquæ censendæ, quæ prompte sub lotura maculas ex linteis abstergunt, ex quibus legumina & olera facile penitusque mollita coquuntur, quæ parum vel nihil materie post evaporationem relinquunt, & herbæ theæ aliisque fervide infusæ easdem expedite recludunt & extrahunt. Quod si vero tales haberi nequeunt, utique artes illas corrigere & inolles efficere oportet, id quod optime fit, adjecta portione lixivii, vel saponis Veneti aut affusa quantitate lactis, aut quando decoctum fursurum triticeorum, item florum chamomillæ, nec non soliorum, florum & radicum liliorum alborum, ipsis commiscetur. Veteres uti patet ex *Cælio Aureliano pag. 575.* olea adiciebant, & ad sopiendos dolores, item ad ischuriam curandam, quæ sit a spasmio & strictura orificii sphincteris vesicæ, ejusmodi balneis utebantur. Et sic concinnata emollientia balnea egregiam profecto opem ad faciendum partum, præsertim in primiparis, ætatis paulisper adultæ & siccioribus, ultimis gestationis mensibus adhibita, conferunt. Pariter in atrophia dorsali infantum, item in rhachitide eximia splendent facultate, eo quod, tubulos partium obstructos, & contractos aperiant, succum nutritium fluidiorem ac ut ejus æqualis & liberior sit ubique dispensatio, efficiunt.

§. IX.

Alia illorum naturalium balneorum est ratio, quæ ob principium martiale subtile quod recondunt, non emolliunt, sed potius partes roborant ac firmant. Innotescunt jam passim in Germania ejusmodi martiatæ aquæ, eoque nomine haud exiguum celebratam hæc sunt Freyenvaldenses in Marchia, Bebranz in Thuringia, Radebergenses, & a nobis detectæ Lauchstädienses in Misnia, Eppancæ

*De bal-
neis
natur-
alibus
mar-
tialibus*

tes & VVeissenburgenses in Franconia. Omnes hi fontes levem quidem atque subtilem aquam vehunt, ob tenuissimum tamen martis sulphureum crocum, quem etiam si diutius quiescunt deponunt & cum quo lineæ in balneis, nec non injecta ova, flavo colore imbuunt, saporis sunt paullo adstrictivi & interne etiam in iis morbis, in quibus martialia locum inveniunt, a perito Medico cum fructu possunt usurpari. Longe tamen magis externus eorum usus in balneo celebratur, quam maxime proficius iis; qui corpora habent phlegmaticæ constitutionis, spongiosi fibrarum sunt habitus, valaque copiosa & exiliagerunt. Sunt quoque ex usu ubi humores ob lentiores sanguinis cursum facile pissefcunt, fordescunt & scorbuticam impuritatem contrahunt, unde languores, dolores rheumatici, arthritici, item tumores œdematosi, contracturæ quoque, & imbecillitates ac refrigerationes artuum, secundo pullulant germine, quibus omnibus hæc roborantia balnea, ob principium tenue sulphureum martis, quo tonum ac robor languentibus partibus addunt, & fibras laxas nimis adducunt, egregie opitulantur. Et licet ea adstringentium horum martialium balnearum natura sit atque conditio, ut non nisi tepida, & admodum temperata adhiberi debeant, & calore intensiori corpus mirum offendant, sanguinem commoveant & dolores capitis partiumque languores inferant; nihilominus quando corpus post tepidum ejusmodi lavacrum, in quo superior ejus pars plus friget, quam calet, illico lecto committitur, incalescit, pulsus validius vibrat & sæpe ex toto corpore, cum insigni virium incremento & eternarum partium robore, sudor diffluere solet.

De bal-
neis ro-
boran-
tibus
artifi-
ciali-
bus.

§. X.

Accedunt balnea mitius roborantia artificialia, quæ nempe injectis & incoctis aquæ levi ac puræ speciebus cephalicis, & nervis amicis concin-

nantur & pariter eximia splendent efficacia. Usurpantur ad hæc balnea conficienda, imprimis folia lauri, herba melissæ, abrotani, majoranæ, origani, serpilli, thymi, rosmarini, hyssopi, hormini, menthæ crispæ, nepethæ, pullegii, matricariæ, flores chamomillæ vulgaris & Romanæ, quæ omnia sacculo inclusa, adjectis aliquot salis communis & cinorum clavellatorum manipulis, cum aqua leniter decoquantur. Medicata ejusmodi corporis in folio lavacra saluberrima sunt in affectibus paralyticis, impotentia atque imbecillitate artuum, corporibus imbecillioribus, cachecticis, frigidis, senibus, ubi vires a morbis fractæ & nervi, & ligamenta artuum quadam laborant atonia. Neque minus insigni cum fructu usurpantur in omnibus uteri morbis, qui post abortum, partum difficilem vel etiam puerperium impetunt, nec non quando uterina compages nimia humiditate disluit, vel plane liquor viscidus albus ex muliebri sinu stillat, & inde sterilitas est; promovent quoque egregie cohibitum mensem, & in viris hæmorrhoidum fluxum.

§. XI.

Et va-
porosis.

Aliud genus balnearum est, quæ audiunt vaporosa, sive Laconica. In his vapores, sive sicci calidi, ex acenso vini spiritu halantes, sive calidi humidi, ex decoctis herbarum cum vino vel aqua surgentes, immediate ad universum corpus, vel ad certas duntaxat ipsius partes, admittuntur. Est autem calidorum ejusmodi halituum maxima vis ad eliciendum sudorem, tubulos subcutaneos aperiendos, partes duras; emolliendas rigidasque ac tensas laxandas, nec non tenaces viscidos humores dissolvendos, & solis calidis aquis tantum vaporibus durissima animantium ossa, & cornua emolliiri posse, vel coquis & pharmacopeis notum est. Hinc vaporosorum balnearum usus longe eximius in frigidis morbis, analarca, tumoribus œdematosis, mem-

membris paralyti tactis, atque etiam loca sic dicta Gallica, item in tumore testium, ad prolapsum uteri, vel anni reprimendum, & pro diverso morbi statu & conditione ex variis coniciuntur speciebus. In molestissimo illo dysenteriz fere perpetuo comite, tenesmo, vapores ex lacte & floribus sambuci presentaneum afferunt levamen. Utiles quoque sunt ejusmodi vapores seu lotus ad hemorrhoidum fluxum proritandum; ante hirudinum appositionem necessarij. Et quia egregie orificia venarum uterinorum mucro obfessa expediunt, ubi menses difficulter exfolvantur. summo cum fructu adhibentur.

§. XII.

Quomodo vero unumquodque, quantumvis prestans remedium imprudenter minusque circumspiciente usurpatum, salubri destituitur effectu; ita etiam balneorum improvidus & sine exquisita cautione administratus usus, plus nocet, quam prodest. *Galenus*, quidem tria hanc ob causam in balneis observanda precipit, ne qui balneantur aliquo pacto horreant, ne ullū viscus imbecille habeant & ne multitudo crudorum humorū in primis viis adsit. Potiora autem in balneorum usu tenenda momenta hinc redeunt. Nimirum antequam eadem administrantur, semper prius solvenda est plethora alvūque; libera reddenda; alias ab istsu lavacri gravia damna a congestionibus sanguinis ac humorum ad pectus & caput inde metuenda. Deinde cavendum maxime, ne nimio lavacri calore corpora adeo exsiccantur & quasi elixentur, ut sudores proflus disfluant; hoc enim factū, ingruit animi deliquium; capitis dolor, lassitudo totius corporis, mentis torpor, oris siccatas & sitis, quam si quis frigida potione restinguere velit, facile gravius malum tibi poterit accessere. Tempus balneo commodissimum est matutinum post somnum, concoctione perfecta & vacuo ventriculo, praesertim si alvus ante soluta. Expedit etiam corpus in balneum

non statim totum immittere, sed successive, primo pedes, deinde femora; postea abdomen usque ad cordis scrobiculum, augendo etiam paulatim aquae calorem. Neque nimis diu in balneo calido, praesertim martiali, commorandum est, ne vires debilitentur. Post balneum corpus committendum est lecto, quo sudor proluciat, qui cum junculo, vel decocto, aut infuso appropriato promoveri potest. In balneis vero nativis temperatis, ut sunt in Misnia a V Volckensteinenses & Wilsenbadenses, per aliquot saepe horas desidendum est; praesertim si morbus est gravis, & contumax ex vicio nervosorum partium spasmus constitutus, si mens ex hypochondriorum vel uteri vitio laborat, si contracturae adfunt partium, ex nimia rigiditate ligamentorum & nervorum.

§. XIII.

A balneis caveant, quibus caput debile, qui catarrhis & coryza affliguntur, qui ad asthmata & ad animi deliquia proni, vel lento hecticō calore tabescunt, tanto magis a vaporosis, praesertim quae cum spiritu vini accenso apparantur, quippe quae valde commovent sanguinem & plethoricis atque cacochymicis insensibilissima sunt, ac ut experientia constat; imprudenti usu morbos capitis, affectus soporosos, apoplexiam, epilepsiam, scotomiam, guttam serenam inducunt. Similiratione detrimentosa sunt balnea iis, qui ita graviter exanderunt, & ipse aliquot memoria teneo exempla, quod usurparis tum iis, febres hecticæ, immedicabiles partium dolores & paralytes accesserint. Et quia dolor colicus saepe a sanguinis per aenas exitum molientis intra intestinorum tunicas stagnatione oboritur, saepe etiam sub immanibus a calculo doloribus praesto est plethora, hoc casu, cautissime utique mercandum est cum ejusmodi calefacientibus balneis; quae nonnisi plenitudine subtracta, adhibenda sunt.

Ad balneis quibus cavendum?

§. XIV.

De pe-
diluvio.
eorumque
aperta-
tione.

Balnea univerſi corporis ſequuntur pediluvia, quorum quoad ingredien-
tia eadem ratio, minor apparatus &
ob id frequentior uſus & balnearum
vicarius. Velenim ex ſola aqua levi
& pura, ſine aliorum additamento
magnoque apparatu, parantur, vel
ad corrigendum aquarum gravium &
aſperarum vitium, lixivium, aut fur-
fures triticei & chamomilæ flores ad-
jiciuntur, vel etiam lac ipſis confun-
ditur. Licet autem pediluvia tantum
in firmis & extremis corporis partibus
admoveantur, eorum tamen virtus
longe lateque ſe diffundit & graves in
remotis etiam partibus morbos levat.
Dum enim humore illo calido fovetur
pedes, nervoſæ tendinoſæ ac muſ-
culoſæ in iis fibræ, ex quibus inter-
currentibus vafis coagmentati ſunt,
laxantur, remittuntur, pori & tu-
buli antea conſtricti ampliuntur, ſan-
guini aditus humoribuſque debitus
reſtituitur commeatui, quo fit, ut im-
petus aliis partibus incumbens diver-
tatur ac cum inſigni levamine ad in-
feriora derivetur. Deinceps pediluvia
etiam temperato ſua calore agunt in
ſanguinem & humores ſub eorum uſu
per pedum vaſa tranſeunt, eoſdem-
que tenuiores ac dilutiores reddunt,
quo longe expeditius per omnis gene-
ris in corpore tubulos curſum conſi-
ciant & quaquaverſum promptius ex-
currant, quo etiam fit, ut ſi paullo
calidiora adhibeantur, arteriarum
pulſum augeant & ſudorem per uni-
verſum corpus eliciant. Ad hæc in-
gens eſt pedum, ceu partium exquiſi-
tæ ſenſationis nervoſo-tendinoſarum,
cum omnibus nervoſis univerſi corpo-
ris, maximeque in inferiore ventre
ſitis partibus, conſenſus, adeo con-
ſpicuus, ut ſitantum perfrigerentur,
illico dolores colici exoriantur, alvus
ſtringatur, cutis horreat, perſpira-
tio interceptiatur & menſium ac hæ-
morrhoidum fluxus ſiſtatur. Quare
non dubitandum, quin, ſi tepido hu-

more mulceantur & ſpaſtica in iis ſtri-
ctura tollatur, ſalubris effectus ad
remotiora ipſis annuentia organa pro-
pagetur, ibidemque ſeſe exerat.

§. XV.

Et certe pediluvia laudatiſſimi ad
derivationem uſus ſunt in morbis, qui
a congeſtionibus ad caput & pectus,
per ſpaſmos inferiorum maximeque
hypochoſteriorum factis, ſubnaſcuntur,
ut præter ſaporofos affectus om-
nes fere capitis morbi ſunt, inſania,
mania, melancholia, cephalæa, hæ-
micrania, clavus hyſtericus, verti-
go, odontalgia, oralgia, gutta ro-
ſacea, ophthalmia, deſluxiones ocu-
lorum falſæ, narium hæmorrhagia
nimix & diuturnæ vigiliæ, nec non
quæ pectus affligunt aſthmata convul-
ſiva, dyſpnœa a copia ſanguinis, cor-
dis palpitaciones, tuſſes ſiccæ, hæ-
moptiſis. Porro ob inſignem qua pol-
lent ſpaſmos remittentem ac ſolven-
tem efficaciam, egregie opitulantur
in morbis ſpaſmodicis convulſivis &
doloribus, in cardialgia, dolore co-
lico, præſertim hæmorrhoidali, tor-
minibus ex calculo, ventriculi infla-
tione cum præcordiorum anxietate.
Præterea etiam excretiones ſaluberrimas,
perſpirationis nempe, urinæ,
& alvi & ſanguinis quoque ſinceræ, per-
menſes & ſedis venas efficaciter pedi-
luvia promovent, ſanguini liberum
commeatum conciliando, eundem
attenuando & ad excretoriorum tu-
bulos alliciendo. Neque minus graves
capitis pectoriſque affectus arcent
& præſcindunt, maximeque eos, qui
per periodos accedunt, quin quoti-
dianum eorum uſum truces periodice
cephalalgias abegiffe, ipſe expertus
novi. Sunt quoque qui in febris inter-
mittentibus pediluviorum uſum
ſuadent, dic quidem intercalari va-
cua, nec ſine ſalubri effectu, ut pa-
tet ex *Obſ. 144. Dec. 2. An. 6. Miſc. nat.*
curiaſ. de quartana pediluvio ſanata,
& quæ *Kozaek de ſalib. Seſſ. 12. c. 10.*
plura hanc in rem habet.

Quibus
conſe-
quuntur

§. XVI.

§. XVI.

*Constituta res aff-
tum usa* Monendum tamen, quod longeseculicis succedat pediluviorum operatio, si plenitudo sanguinis per venæsectionem in pede prius imminuitur, si circa tempus somni administrantur, nec pedes post eorum usum refrigerantur, sed calidi servantur & in lectum transferuntur, eoque facto, auctior per universum corporis ambitum redditur perspiratio. Cavendum vero est, ne pedes lavacro immittantur eo tempore, quo mensium fluxus imminet, aut jam exsolvitur, eo quod divertendo ab utero & ad inferiora invitando sanguinis appulsus, ut ipsum profluvium vel sistatur, vel intercipiatur, efficiunt; contra ea aliquot antestitam menstruum periodum dies, ad promovendum fluxum egregio faciunt, præsertim si temperata emmenagoga, vel pilulæ ad mentem Becheri paratæ, simul in usum trahuntur. Abstinendum quoque quam maxime a pediluviiis contrahentibus, aluminosis, sulphureis, ad resiccandum moluitum pedum sudorem, edemata discutienda, ulcera abigenda, item si doloribus podagricis pedes exercentur; siquidem iisdem non sine periculo materia illa virulenta ad interiores nobiliores partes retropellitur. Et quoniam communis servidus in Carolinis fons, vulgo *der Prudel*, virtutem quam maxime repellentem possidet; providus utique lavacri ex eo usus esse debet, in omnibus passionibus, ubi materia vitiosa externo corporis cortici incumbit, ac præsertim in doloribus arthriticis & podagricis.

§. XVII.

*Clysteres aff-
nes bal-
nea* Inter remedia externa, domestica & facile parabilia connumeranda etiam clysmata, sive cœmata, quæ nihil aliud sunt, quam decocta ex certis speciebus confecta & per Syringam ano pro vario scopo & usu injecta. Habent hæc multum cum balneis affinis atque commune. Balnea quippe lavacra sunt partium externarum,

clysteres vero intestinorum, quæ crassa vocantur, quæ eluunt, abstergunt & a contentis repurgant. Balnea vel emollientia sunt, vel roborantia, clysmata pariter pro varia ingredientium ratione, solidas, rigidas, tensas & strictas partes molliunt & laxant vel flaccidas & a tono dejectas firmant atque adducunt. Deinceps sicuti balnea sola applicatione externa toti sanguinis & humorum massæ virtutem insinuant, ut liberiores & expeditiores eorum progressum faciant simulque salutare excretiones facili- tent: ita etiam enematum operatio non solum in sanguinis & humorum circuitum ex immutatione pulsus, sed etiam ad excretionem movendas, præter alvi subductionem ex perspirationis & urinæ uberiori successu, luculenter patet. Balnea porro vi pol- lent insigni antispasmodica eandem- que in distitas spargunt partes: clysteres non minus hæc pollere virtute, quæ artis exercitia tractant quam optime- norunt. Et denique quemadmodum immisso in lavacrum corpore, congesti præter naturam & non sine periculo in certa loca humores ad alias externas & inferiores partes derivantur, quo æquabilis ipsis reddatur ubique commensus: sic etiam clysmata ad divertendas a pectore & capite sanguinis congestiones, gravium pathematum genitrices, insigni & laudatissimo usu plurimum valent.

§. XVIII.

Et jam Solent vero clysteres pro diverso medicationis scopo ex variis concinari speciebus. Et sicuti indicationes in medendo ad quatuor potissimum fines directæ sunt, alterantem nempe, evacuantem, roborantem & sedativum: ita eadem etiam clysterum ratio, ut iisdem vel indurata stercora emolliantur, aut qualitate infesta acris, acida & salsa recrementa attemperentur, vel contenta in crasso- rum canali evacuentur, vel languentes intestinorum fibræ & delatatus peristalticus in vis motus roborentur, vel

314. Sect. II. Cap. X. De balnearum, pediluviorum,

vel denique spasma tunicarum intestinalium remittantur & fibræ strictæ mitentur. Quod si igitur intentio sit clysteres de materia arida humida aut viscosa faccos acres, salios, biliosos, & biliosos in clysteres emollientes obtundendi, clysteres optime parantur ex emollientibus & demulcentibus, ejus generis sunt lac animantium, decoctum rursu cornu cervi, pedum vervecinorum & virulinorum, avenaceum, juscula carniū pinguiū, pinguedines animantium, butyrum insullum, decoctum ficum, mel, manna, faccharum, decoctum radicis altheæ, liq. alborum, seminis lini, fœnu græci, florum chamomillæ, verbasci, meliloti. Quæ quidem ingredientia, quum simul eximiam spasmus relaxandi virtutem obtineant, in omnibus affectibus spasmodicis, doloribus, febribus, sanguinis congestionibus, & ubi alvus sive propter spasmus obstricta, sive stercora indurata obstructa, commodam & utilissimam locant operam.

§. XIX.

Ubi alvum, simul evacuare & feces atque humores stagnantes subducere constitutum est, salia ejusmodi decoctis adjecta omne ferunt punctum, ut sunt sal commune germæ, Ebzhamense, Sedlicense, digestivum Sylvii, nec non ammoniacum. Et certe dimidia salis uncia clysteri adjecta in evacuando majoris efficaciz est, quam aliquot unciz electuariorum, ex purgantibus & laxantibus concinnatorum. Celsus jam hunc in finem muriam alio infundendam suadet, id quod etiam cum nostra muria, quæ & pota & per clysterem injecta potenter, purgat, nec non cum Sedlicensi aqua optime succedit. Huc quoque referenda enemata, quæ ex urina humana, vel animantium parari solent ad educendas alvo viscidos ac lentos succos. Neque minus sapo Venetus solutus egregie pro clysteribus, inservit, tum maxime, quando acida, viridis

& corrosiva bilis tenellorum adhuc lactantium infantum intestinagravius exagitat. Quando vero sortiori stimulo opus est, tutius emetica, quam drastica & aciora cathartica clysteribus commiscantur, eamque ob causam *Derbaque, in observ.* vinum emeticum clysmatibus in hydrope & apoplexia indendum commendat.

§. XX.

Roborantes clysteres virtute sua non modo intestinis, sed & aliis partibus atonia laborantibus dicata sunt, & ob id varia etiam recipiunt. Quum quidem tunica intestinalium languentes roborandæ, carminativa sic dicta, ex usu sunt, quæ status discutit & recrementorum evacuationem secundant, & ex his maxime semina quatuor carminativa majora & parata ex ipsis olea, baccæ lauræ & junperi. In gravioribus capitis morbis, ut apoplexia, paralyti, affectibus soporosis, auditus & visus debilitate, uniliter herba rutæ, majoranæ, rorismarini, saturejæ, thymi, salviæ, flores lavendulæ, spicæ adijciuntur. Ubi passionibus ex uteri vitio, maximeque ejus atonia oriundæ, assilunt, ob peculiarem & specificam quasi facultatem cum fructu adhibentur herbæ pulegii, artemisæ, matricariæ, sabinz, menthæ, flores cheiri, calendulæ, radices aristolochiæ, nec non myrrha & galbanum, & ex his concinnati clysteres crebrius injecti in restituendo mensium fluxu, & expellendis molis eximia pollent efficacia.

§. XXI.

Ego quoque experientia edoctus in chronicis ex succorum impuritate, viscerum prava constitutione, infarctu, humorumque stagnatione, affectibus, præsertim cachexia, scorbuto, malo hypochondriaco, mensium vel hæmorrhoidum suppressione, maximi facere soleo clysteres, quibus admixta amara & balsamica, cujus generis sunt trifolium fibrinum, summitates centaurei minoris, carduus benedictus, radix gentianæ, scolopendrium,

drium, rhabarbarum, essentia rhabarbari, elixir proprietatis, essentia fuliginis alcalifata, spiritus cornu cervi & massa pilularum balsamicarum. Et solo ejusmodi clysterum usu, desperatos senes sanitatem reduxisse hypochondriacos testatur *Hercules Saxonia lib. 1. prax. cap. 16.* Neque minus roborantia apprimè proficua clysmata confici possunt ex vino, quibus etiam ubi vires admodum languidæ, nec corpus nimis sensibile, addi potest balsamum nostrum vitæ dictum. Hinc *Act. Anglic. pag. 398.* mentio injicitur clysteris ex vino Hispanico, pipere & vitello ovi, egregiæ virtutis, quod tota nocte retentum, viscera calefaciat & aliquot horis post sudorem moveat. Quin tam conspicua clysmatum ad corroborandum universum nervorum systema est virtus, ut ipsos febriles in intermittentibus insultus compestant. Etenim *Helvetius* in peculiari tractatu de methodo febres sine interno medicamentorum usu curandi, perhibet; febres sola clysterum injectione ex decocto corticis chinæ cum aqua, vel etiam addito tantillo vini, optime posse peranari, id quod etiam *Abreht in Misc. nat. cur. Dec. 3. An. 3. obs. 127.* quinq; confirmat exemplis. Et *Ægyptii* in quartana pro secreto habent clysterem ex decocti majoranæ libra una & tribus olei laurini uncis, uti auctor est *Alpinus de Medic. method. pag. 189.* addens: hoc clystere, & in ipso olim quartana vexato summa cum utilitate usus sum, & nonnullis tribus solummodo hisce clysteribus usos, sanatos fuisse, vidi.

§. XXII.

¶ si frigiditate.

Superfluum denique clysteres sedantes, doloribus complacendis & spasms solvendis intervinientes. Horum in numero sunt clysteres ex meris oleis, pinguedine animantium & butyro insulso conflati, qui ubi tunica coli a vehementi spasmo obsidentur, ut ipsius cavum angustetur, flatus retineantur & dira oboriantur tormina, uti obvium est in colica convulsiva

spasmodica, præsertim hæmorrhoidali, & quæ ab inhzrente acri caustica a superficie corporis repulsa materia suscitatur, laudatissimæ sunt virtutis. De his magnifice admodum ex Veteribus sentit *Actius*, qui *lib. 9. cap. de colica* clysterem antispasmodicum parari jubet, ex butyro recenti, adipe anserina, gallinacea, medulla cervina, adipe ursina, cumino, foliis rutæ, nardo Celtica, castoreo & oleo rutaceo, addito hoc præcepto: utere hoc ipso in vehementibus doloribus evacuatione tamen prius per alium clysterem facta, & post hora spatium mensuram unam mediocris poculi repetitum infunde & jube quiescere, ac aliquandiu pharmacum retinere, atque ita iterum ejus videbis facultatem. Quod si vero spasms nimius ætus sanguinisque orgasmus jungitur, ut in doloribus capitis, articulorum, hæmorrhagiis, clysteres cum sero lactis, vel lacte ex emollientibus & anodynis quam optime injiciuntur, floribus scilicet chamomillæ vulgaris, sambuci, verbasci, meliloti, nec non croco, nitro depurato & oleo amygdalarum dulcium. Non minus in pathematibus spasmodicis, epilepticis & convulsivis motibus, ut specificæ addantur ex usu est. In hysteris quidem pathematibus sagapenum, asa foetida & castoreum accommodata sunt. In epileptico & convulsivo insultu, radix, semen & flores pœoniæ, succus lumbricorum terrestrum, liquor cornu cervi succinatus, utiliter commiscuntur; cujus generis clystere ex antilepticis & tinctura castorei parato primum epilepsia tentata egregie esse levatam testatur *Harderus in Misc. nat. cur. Dec. 3. A. 1. obs. 100.*

§. XXII.

Hi itaque clysteres pro varia mentis intentione amplissimi in praxi medica sunt usus, quem *Celsus lib. 2. cap. 12.* sic in compendio sistit: alius ductio per losiones semel vel summum bis non omittatur, si capus gravis est, si oculi caligant, si morbus majoris insti-

*Clysterum
non
sunt
vires*

defini est, quod Græci *κίς* nominant; si in imo ventre aut in coxa dolores sunt, si in stomachum quadam biliosa concurrunt, vel etiam pituitosa eo se, humorve aliquis aqua similis confert; si spiritus difficulius redditur: si nihil per se venter exernit; utique si juxta quoque stercus est & intus remanet, aut si stercoris odorem nihil deiciens eger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excernitur; aut si prima incidia febrem non sustulit; aut si sanguinem mittit, quantum opus sit vires non patiuntur, tempusve ejus rei præterit; aut si multum ante morbum aliquis potavit; aut si is, qui saepe, vel sponte aut casu purgatus est, subito habet alvum suppressam. Præter ea autem quæ in superioribus de enematum in variis morbis utilitate passim inferui, tenendum adhuc, quod in genere quam maxime conducant his, quibus venter ægrius descendit & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia sustinere nequit. Pariter in febribus continuis & exanthematicis præstat semper clysteribus & venesectione, si opus est, curationem auspicari, & sub eadem etiam si alvus clausa, clysteribus insistendum. Christianus quoque Langius in *Misc. nat. aur.* omnibus vulneratis serio commendat clysmatum usum, ut alvi suppressio inflammationes, vel sanguinis stagnationes augeat. Possunt etiam clysteres aliis adhuc quorum meminimus usibus, pro varia morbi ejusque causæ conditione, adaptari, quo imprimis referendi illi, qui in diarrhæis, dysenteris & intestinorum erosione, tam ad acrem humorem contemperandum, quam exosas partes consolidandas summo injiciuntur cum fructu, consicienda ex decocto pedum vitulinorum, vitello ovi, sevo hircino, bolo Armena, tragacantha, succo cancerorum fluviatili, spermate ceti, balsamo de Copaiva & sulphuris terebinthinato.

§. XXIV.

Et licet clysteres efficacia sua pro-

xime afficiant intestina & in substantia & materia crassorum limites non transcendant; nihilominus tamen eorum virtus, non modo ex intestinis tanquam partibus nervosis & quæ cum reliquis nervosis corporis partibus exquisitum consensui alunt, ad alias & remotas etiam propagatur, sed & ipsi sanguini & lymphæ insinuantur. Prius ex eo patescit, quod clysmata, si nimis æria, teste *Avv. cenna cam. med. lib. 1. Sect. 4. cap. 17.* febrem accendant, emetici imbuta vomitum moveant & dolores vel in suprema corporis regione complacent; posterius vero nutriendi, confortans & stupefaciens eorundem facultas testatum facit, & quod, ut quidem fidem faciunt *Art. Angl. pag. 598.* spiritus vini per inferius os injectus, longe magis inebriet & infatuat, ac si eadem mensura per œsophagum ingurgitetur. Potissimum tamen conspicuus est clysterum in intestinis tenuibus doloribus & spasticis constrictionibus laborantibus effectus, hanc maxime ob causam, quod illud crassorum amplissimum colon tenuia cingat, iidemque ubique sit circumvolutum, eaque propter infusum eidem emolliens & paregoricum clyisma, blando tepore suo, contigua tenuia simul afficiat; & penetrante per tunicarum poros vapore, iidem facultatem inlinuet, haud secus ac vesica decocto emolliente repleta extrinsecus apposita, in magnis internarum partium doloribus, spasmis & inflammationibus levamen affert præstantissimum.

§. XXV.

Ut autem saluberrimus clysterum effectus eo certius obtineatur, utique in eorum, haud secus quam in aliorum sanitatis præsidiorum usu, circumscriptio adhibenda & necessaria quædam cautiones tenendæ. Nimirum sunt quidam adeo sensibilibus naturæ, ut intestina clysteres plane ferre nequeant, & ipse viderim, colicos aliosque dolores eo magis increvisse,

si lare
patens
vires

Cautio
in ipso
rum ap.
plican
dione
servan
dæ.

quo plura clysmata injecta, qui potest solo interno convenienti laxante eximie levati. Et sicuti in his clysterum injectio non urgenda; ita etiam acres non statim applicandi, quando alvi excrementa diutius retenta, ne plus trahant ad infarcta intestina & obstructionem obfirmant, sed potius præmittenda his enemata, quæ laxant, lubricant, stercorea emolliunt & evacuationi viam pandunt, uti peritæ monet *Mercatus lib. 1. pag. 64.* Post partum quoque clysterum usus intempertivus minusque proficius, eo quod ciborum concoctionem atque digestionem inturbat; chyli elaborationem & extractionem impedit ac nimis celere ingestorum evacuationem præcipitat.

§. XXVI.

Neque etiam alvum crebro nimis & jugiter clysteribus sollicitare expedit; tum quia virtutem intestinorum expultricem sequiorem reddunt, ac ut natura iis assuefacta officiis spontaneæ excretionis obliviscatur faciunt, tum etiam, quod subita & repetita crebrius liquoris clysmatici vel nimis calidi, vel perfrigerati infusione, ordinata illa & naturalis fibrarum inte-

stinalium tensio lædatur & inordinati motus provocentur, ac quum nullum enema applicari possit, quocum non simul flatus intrudatur, flatum metuendus sit proventus. Præterea quia intestina etiam crassa partes sunt admodum nervosæ, omnia quæ nervis sunt inimica, frigida scilicet, acida, austera, drastica virulenta & falsa acriora, opiata, narcotica, item adstringentia, penitus ex clysteribus debent excludi, ne motus intestinalium peristalticus inde lædatur, vel destruat, quo salvo, ciborum digestio cum saluberrimis secretionibus & excretionibus ex voto succedit, quo destructo, intestina spasmis, flatibus & fecibus multis cum molestiis obidentur. Quibus denique addi etiam merentur præclara Celsi l. c. monita servanda, inquentis, illa sunt, ne ducatur ulla cruditate substantia; ne in corpore infirmo, diuque in adversa valetudine exhausto; neve in eo, cui satis alvus reddit quotidie, quæ eam liquidam habet; neve in ipso accessione impetu, quia quod tum insusum est, alvo continetur, regestumque in caput, multo gravius periculum efficit.

I N D E X

RERUM LOCUPLETISSIMUS.

A *Abortus* non sine convulsione succedit 42. ex utero aronia 31. post abortum & puerperium. 121. præcaverit venæsectione in brachio. 197
Abcessus differt ab ulcere. 78. interni signa. 75. in abdominis integumentis quandoque subsistit. *ibid.* in thorace. *ibid.* post variolas. 76. in mesenterio. *ibid.* musculorum dorsu. *ibid.* uteri. *ib.* renum. 77. in parotidibus. *ibid.* sinibus frontis. *ibid.* pulmonum facile recidivari. 130. interni rupri mortis causæ. 194
Abstergentia veteribus ignota. 245. cornu apparatus. 244. differentia. 245. amplissima nullitas. *ib.* correctioni materię dicata. 244. cum acido in tertio cedunt. *ib.* præmittenda purgantibus. 245. naturæ opus juvant. 217. quædam adstringunt. 260. cur alvum ducant. 166
Accum specificum in peste. 284
Acicula deglutita atrociter ciet pathemat. 32
Acida temperant. 245. pulsus mutant. 136. sanguinem coagulant. 148. optima alexiteria. 284. insensa humorum progressui. 245. nitrosis postponenda. 246. clysteribus non indenda. 317
Acuta febris in quo consistat. 207. plenumque inflammatione stipatur. *ibid.* cur recidiver. 130. a natura sanatur. 256. quomodo per artem. 207. venæsectionem pollet. 295. / 399. symptomatice malæ. 214
Acuti morbi quomodo differant a chronicis. 212. / 39. caute tractandi. 199. funesti signa. 179. / 399. causa mortis in iis sphacelus ventriculi & intestinum. 197. / 39.
Adstringentia quæ sint. 277. / 39. quomodo agant. 278. qua methodo exhibenda. *ib.* infecura. *ibid.* debilibus noxia. 109. hydropem gignunt. 123. / 39. nocent in alvi fluxibus. *ibid.* hæmorrhoidibus. 121. intermittentibus. 124. hæmorrhagiis. 109. gonorrhœa. 123. clysteribus non indenda. 317. calculum præsciunt. 278

Æquinoctium venæsectioni cur opportunum? 292
Aer mutat corporis functiones. 15. pulsus. 138. / 39. excretiones. 159. morborum epidemiorum causa. 15. 92. purus & temperatus salubris. 6. crassior impurus insalubris. *ibid.* perspirationem mutat 9. 92. frigidi effectus. *ibid.* humidi. *ibid.* calidi. *ibid.* frigido humidus perspirationi obest. *ibid.*
Ætus quos gignat morbos. 92. qualis in eo pulsus. 138
Eiat in historiis morborum necessaria. 4. / 39. ad morbos facit. 45. / 39. 117. pulsus mutat. 138
Alcalina sanguinem fluidiorem reddunt. 148. terrea absorbens. 245. non soluta stomachum gravant. *ibid.* non penitus ab acido solvuntur. *ibid.*
Alia celerrime solvantur. 244. / 39. soluta in tertium degenerant. 245
Alexipharmaca in malignis minus proficua. 260
Alimenta nocent in morbis spasmodicis 67. valentis materię debilibus noxia. 231. superato morbo parce danda. *ib.*
Alia hæmorrhoides mover. 107
Alostica quibus & quando conveniunt. 255
Alterantia materię correctioni dicata. 242. quadruplicis generis. 244. pro materia corrigenda variant. *ibid.*
Alterantia a natura non perficiunt. 217
Alvina excretio in morbis consideranda. 7. 11. 166. multum ad sanitatem facit. 7. 165. motus intestinorum index. 168. / 39. quæ evehar. 147. sub doloribus & spasmodis supprimuntur. 66. nec non in capitis & nervorum morbis. 169. sine noxa aliquandiu supprimuntur. 165. in morbis prudenter movenda. 169. tarda ex bilis defectu. 166. mala. 168. suppressa morbos inducunt. 7. involuntaria unde. 43. nimia & inordinata quid indicet. 168. nimia quomodo compescenda. 170. 171. v. Purgatio.
Alvi obstructio a spasmo intestinorum. 37.

37. succos inquinat. 48. varia pathemata inducit. 37. in febris noxia. 129. cur aliquandiu indemnis. 165
Amygdalarum oleum in doloribus & spasmis utile. 63
Analeptica quæ fiat. 583. quomodo agant. 273. limitatæ virtutis. *ibid.* pulsum mutant. 339. motum resocillant. 68. optima nutrientia. 330
Anasarca ex asthma gignitur. 123. balneis vaporosis discutitur. 311. purgantibus curatur. 316
Agria ejus species. 28. 39. quomodo gignatur. 35. spasmis debetur. 34. suffocatione perimit. 236. venæsectione sub lingua levatur. 299
Anima non est Medicinæ principium. 32. perperam dicitur natura. 213. 39.
Animi pathemata proxime afficiunt nervos partesque nervosas. 48. effectus metæ corporis præstant. *ibid.* eorum effectus. 6. functiones corporis turbant. 49. morbos pariunt. 6. mutant pulsum. 39. vires debilitant. 117. humores corrumpunt. 65. ventriculum afficiunt. *ibid.* excretionem criticam sistunt. 1. ad colicam faciunt. 27. curationi obsunt. 6. nocent in morbis exanthematicis. 38. nec non inter & post partum. 65. post eum motus infalubris. 215
Animus in morbis considerandus. 5. conspirat cum corpore. *ibid.* ejus inclinationes a corporis structura. *ib.* & progressu humorum per caput. 39. nimis fatigatus ventriculum debilitat. 34. stupidus ex apoplexia unde? 117. ejus morbi hæmorrhoidibus solvuntur. 107
Anodyna quæ sint. 281. quomodo agant. *ib.* quomodo utiliter adhibenda. 213. diaphoreticis in doloribus miscenda. 262
Anodynus liquor celeriter operatur. 62. optimum sedans. 282. in doloribus maxime. 200. specificum in epilepsia symptomatice. 286
Anorexia unde. 43
Anthelmintica quæ optima. 287
Antidotus optima oleosa. 53. & pinguis. 242
Antimonium crudum specificum in passionibus rheumaticis. 285
 — *sulphur* in acerbis falsis defluxionibus utile. 63. specificum contumacium intermittenrium. 389. & guttæ

serenæ. 282
 — *regulus medicinalis* acres & falsas defluxiones arceat. 63. specificum in contumacia intermittenrium. 289
Antispasmodica quæ sint. 281. quomodo agant. *ibid.* 39. hæmorrhagias sistunt. 224. non sola curant malum hypochondriacum. 62
Anus prolapsus balneis reprimatur. 281. resolutus involuntariam facit excretionem. 43
Aphonia a spasmis nervorum linguarum. 40. & paralyti. 48. in verminantibus obvia. 40
Aphixæ differt ab angina. 23
Apoplegia mixta quæ fiat & quando adhibenda. 270
Apoplexia vera vel spuria. 28. 34. hæreditatis morbus. 117. facile recidivari. 130. in paralytin transit. 29. a spasmis ducit matris. 40. differt a catalepsi. 29. syncopæ. 34. stuporem animi gignit. 119. ex scabie repulsa. 96. podagra emanante. 101. suppressione mensium. 104. lochiorum. 105. hæmorrhoidum. 31. narium hæmorrhagiæ. 114. qualis in ea pulsus. 442. lethale in ea signum thoracis convulsio. 41. spasmis stipatur. 34. causa mortis in ea. 187. clysteribus sanatur. 313
 — *vera* causa extravasatio. 30
 — *spuria* causa stagnatio. 30. vitam non admittit. *ibid.* hysterici familiaris. *ib.* venæsectione discutitur. 294
Appetitus quibus revocandus. 275
Aqua simplex optima medicina. 306. ad balnea quæ optima. 345. quomodo emendanda. *ibid.*
Aqua mineralis infarctus & obstructions tollunt. 69. excretionem promovet. 64. succos depurant. 69. specificum in hypochondriaca & hysterica passione. 284. continuato usu juvant. 235. porissimam facultatem aquæ debent. 307. balneis socianda. 308. ingredientia ab auctore detecta. 240
 — *martia* interius & exterius proficua. 310
Arcana non semper effectus præstant. 11
Ardens febris qualis in ea pulsus. 342. sanguis. 165 39.
Arida quibus tractanda. 249
Arnica specificum ad sanguinem congestum. 289
Artemisia externe applicata nocet. 49

Arteria systaltico motu gaudent. 11. venis continuæ. *ibid.*
Arteria aspera spasmus patitur. 39. causa opprressionis pectoris. *ibid.*
Arthritica fibres unde. 209. methodus sanandi eas. 210
Arthritis differt a rheumatismo. 27. hæreditarius morbus. 118. ejus signa causa & sedes. 27. quomodo gignatur. 35. facile recidivat. 130. spasmi stipatur. 35. topicis exacerbatur. 28. curatu cur difficilis. 27. hieme magis affligit. 94. transit in calculum. 100. hæmorrhoidibus præservatur & solvitur. 108. retrocedens necat. 185. balneis marialis levatur. 311
 - *vage* specificum lumbrici. 305
Articularum morbi quomodo gignantur. 35. a spasmiis ligamentorum. 36. topicis perperam tractantur. 99. diureticis accensus. 265. scarificatione levantur. 217
Aryns imbecilles balneis firmantur. 311. eorum dolor singularis epidemice grassans. 28. ab arthritide distinctus. *ib.*
Asa fusida duplici nomine in hystericis salutaris. 212. specificum anthelminthicum. 288. clysteribus utiliter commiscetur. 316
Ascarides crassa incolunt. 27. eorum indicia. *ibid.*
Asthma ejus varieg species. 28. causa mortis in eo. 190. ex retropulsa scabie. 96. arthritide & podagra. 99. suppressis mensibus. 104. hæmorrhoidibus. 106. a tumore & scirrhefcentia tunice bronchiorum. 38. specifica ejus. 216
 - *strenuientia* quid & unde. 28. hypochondriacis familiare. *ibid.*
 - *tenuissimum* differt a sanguineo & humoralis. 28. a catarrho suffocativo. *ib.*
 a polypo. *ibid.* hydropem thoracis. *ibid.*
 ex repulsis favis & achoribus. 95. variis causis. 183. hydropem gignit. 61. qualis in eo pulsus. 142. funesta in eo signa. 183. suffocationem perimit. *ib.*
 - *pneumofum* a pulmonum atonia. 43
 - *spasmodicum* a spasmo diaphragmatis. 39. quomodo hydropem & edemata pariat. *ibid.*
Asthmatici balneis læduntur. 312
Atonia quid sit. 42. sequitur paroxysmos. 10. spasmo deterior. 44. spasmus ingignit. *ibid.* multorum morborum causa. 42. humores corrumpit. 66. no-

vorum paroxysmorum causa. 68. balneis emendatur. 311

Astrophia ex scirrho hepatis. 22. induratione pancreatis. 81. nimis hæmorrhagiis. 118 male curati alvi fluxibus 123. balneis curatur. 310

Attenuantia quæ sint. 246. quomodo agant. *ibid.* varieg virtutis sunt. 247 cautiones in eorum usu. 244

Audiri difficilis clysteribus revocatur. 314

Aurum fulminans intutum laxans. 288

Aurum quos gignat morbos? 90. qualis in eo pulsus? 118

B

Balnea pulsum mutant. 146. post iram noxia. 226. cautiones in eorum usu. 311

- *Aqua dulcis* quomodo paranda. 310. spasmos laxant. 308. humores derivant. *ibid.* perspirationem secundant. *ibid.* insaniam percurant. 307 partum faciunt. 310. heroicorum operationem secundant. 308. in thachitide profunt. 310

- *nativa roborantia maytalia* quæ & ubi profunt. *ibid.*

- *artificialia roborantia* eorumque usus 311

- *vaporosa* quæ & quando utilia. 311. 99.

Balsamica quæ sint. 275. quomodo agant. 276. varieg usus. *ibid.*

Balsamum vite præcipuum ex balsamicis. 275. vires egregie refocillat. 62. specificum in affectibus ex debilitate cerebri nervorumque. 285

Bergardica utilia in exanthematicis. 208 præferenda sudoriferis. 227

Biliarii ductus motu gaudent systaltico. 38. spasmo affecti morbos gignant. *ibid.* consentiunt cum ventriculo. 66. convulsi diarrhæ & cholerae causa. 43

Bilis ætate copiose generatur. 166. ab acidis nigrescit. *ibid.* coloris & sætoris excrementorum causa. *ib.* 99.

Bili absorbens. 244. adstringunt simul. *ibid.*

Bubones ex calidioribus tractata gonorrhæa. 102. repulsi gravia inferunt mala. 101. pestilenciales retrocedentes necant. 185

C

Cachexia ex atonia hepatis & lienis. 43. 67. suppressis mensibus. 104. nimis hæmorrhagiis. 124. puerperio. 119.

asthma.

- asthmate 123. alvi fluxibus male tracta-
tis 124. qualis in ea sanguis 156. pul-
sus 143. funesta signa 184. ejus lethalis
causa 194
- Cacochymia** cur hypochondriaco & hyste-
rico malo accedat 66. quomodo induca-
tur a plethora 67
- Calum** quod salubre 6. ejus constitutio fa-
cit ad morbos 17
- Calculus** hereditarius morbus 118. ex ar-
thritica materia 31. hæmorrhoidum &
menstrui suppressione 118. uretheribus
impactus facit dolores 41. urgente
dolore non expellendus 224. diureticis
præcaveatur 265. curatur 264. specifica
in eo 287. causa mortis in eo plerum-
que renum corruptio 195. nonnun-
quam ventriculi & intestinorum spha-
celus *ibid.*
- Calculus renum** ex atonia eorum 45. ejus
signa 86. ex rene pulsus dolorem facit
ibid. quomodo vomitum colica iterum
& vesicæ calculum gignat 124
- **vesicæ** ex ipsius atonia 44. ejus signa 86.
ex renali quomodo fiat 125
- **vesicæ felleæ** signa 87. quæ patiat sym-
ptomata 56. per ductus biliarios trans-
cuntur signa 87
- Calculus dolor** differt a colica 25. 86. cum
colica cur sæpe complicitur 26. 86. nec
non vomitur 57. a spasmo uretherum
37. in consensum rapit ventriculum .
57. a refrigeratione abdominis irrita-
tur. 58. accedunt demum inflamma-
tiones lethales. 183. specificum ejus
liquor anodynus 284. funesta ejus si-
gna 183
- Calculus peralvi excreti** 87
- Calculosi** cur frequenter fiant icterici .
125. colicæ & flatibus cur pateant .
ibid.
- Camphora** quandoque antispasmodicum
282. cum nitro specificum in inflam-
matione 284. in malignis *ibid.*
- Cancer** exulceratus quando funestus .
184
- Cancerum ebula & lapides** absorbens 244
diuresin simul movent 24. cum acido
sanguinem resolvunt *ibid.*
- Cantharides** specificum in hydropse 286
- Capillamentum** incaute demum capitis
morbos gignit 184
- Caput** consentit cum ventriculo 54 de
bile morborum infantiolum 45. & im-
puritatis succorum causa 68
- Carbunculi** pestilenciales retrocedentes
necant 185
- Cardialgia** quid 25. distinguenda ab in-
flammatione & inflatione ventriculi
ibid. 21. ejus variæ causæ 24. a spas-
mo ventriculi 36. ex præpostero topo-
rum usu in morbis articolorum 168.
menstrui emanatione 105. feminis fami-
liaris 25. quibus levanda 25 specificum
ejus liquor anodynus 284. in ea hæmor-
rhoides salutaris 31
- Carminativa** quando clysteribus adden-
di 35
- Cero** plus fluidi quam solidi habet 14
- Carolina** utilissima ad hæmorrhagias pro-
movenas 267. in calculo obsunt . 159.
cur in balneo gignant febres 94
- Catalepsi** ejus signa 29. ab apoplexia dif-
fert *ibid.*
- Catarracta** incipiens ex ventriculo 35
- Catarrhalis febris** distinguenda a maligna
19. ejus origo 18. ex subita mutatione
aeris 94. criles servat 175. qualem ha-
beat pulsus 142. methodus naturæ &
artis sananda ipsa 210
- Catarrhi** ex subita mutatione aeris & per-
spiratione suppressa 94. venæsectione
quandoque gignantur 302. & accretur
ibid. balnea non ferunt 312. sæpe salu-
tates 210. suppressi nocent 191
- Catarrhus suffocativus** distinguendus ab
asthmate 28. ejus signa & symptomata
ibid. quibus familiaris *ibid.* a paraly-
si nervorum pneumonicorum 45. a poly-
pis vasorum pulmonalium 84. post
morbillos variolas 128. suffocatione
perimit 183. funesta ejus signa 215.
causa mortis in eo 191
- Causæ morborum** quæ sint 205. simplices
& manifestæ 237. rebus externis maxi-
me continentur 14. plerumque ignoran-
tur 70. in nervosas maxime partes agunt
45 sectione patefunt 11. 71. plures con-
currunt ad proximam 14. quorundam
ineptæ 70. non confundendæ cum causis
mortis 11. Medico nocendæ 187.
in prognosi distinguendæ *ibid.* certa
auxiliorum genera indicant 70. diffi-
ciliter cognoscuntur *ibid.* cognitæ non
sufficiunt ad curandum 71. faciunt
ad famam Medici *ibid.* remouentur
motu solidorum & fluidorum 204.
in earum remotione methodus im-
medendi posita *ibid.* ex præcipuis imbe-
cillitas 116

§. XIV.

De pe-
diluvio
corum
aperta-
tione.

Balnea univerſi corporis ſequuntur pediluvia, quorum quoad ingredi-
entia eadem ratio, minor apparatus &
ob id frequentior uſus & balnearum
vicarius. Velenim ex ſola aqua levi
& pura, ſine aliorum additamento
magnoque apparatu, parantur, vel
ad corrigendum aquarum gravium &
aſperarum vitium, lixivium, aut fur-
fures triticeæ & chamomillæ flores ad-
jiciuntur, vel etiam lac iſtis confun-
ditur. Licet autem pediluvia tantum
in firmis & extremis corporis partibus
admoveantur, eorum tamen virtus
longe lateque ſe diſſundit & graves in
remotis etiam partibus morbos levat.
Dum enim humore illo calido fovetur
pedes, nervoſæ tendinoſæ ac mu-
ſculoſæ in iis fibræ, ex quibus inter-
currentibus vaſis coagmentati ſunt,
laxantur, remittuntur, pori & tu-
buli antea conſtriſti ampliantur, ſan-
guini aditus humoribusque debitus
redditur commœatus, quo fit, ut im-
petus aliis partibus incumbens diver-
tatur ac cum inſigni levamine ad in-
feriora derivetur. Deinceps pediluvia
etiam temperato ſuo calore agunt in
ſanguinem & humores ſub eorum uſu
per pedum vaſa tranſeunt, eoſdem-
que tenuiores ac dilutiores reddunt,
quo longe expeditius per omnis gene-
ris in corpore tubulos curſum conſi-
ciant & quaquaverſum promptius ex-
currant, quo etiam fit, ut ſi paullo
calidiora adhibeantur, arteriarum
pulſum augeant & ſudorem per uni-
verſum corpus eliciant. Ad hæc in-
gens eſt pedum, ceu partium exquisi-
tæ ſenſationis nervoſo-tendinoſarum,
cum omnibus nervolis univerſi corpo-
ris, maximeque in inferiore ventre
ſitis partibus, conſenſus, adeo con-
ſpicuus, ut ſituntum perfrigerentur,
illico dolores colici exoriantur, alvus
ſtringatur, cutis horreat, perſpira-
tio interceptiatur & menſium ac hæ-
morrhoidum fluxus ſiſtatur. Quare
non dubitandum, quin, ſi tepido hu-

more mulceantur & ſpaſtica in iis ſtri-
ctura tollatur, ſalubris effectus ad
remotiora iſtis annuentia organa pro-
pagetur, ibidemque ſefe exerat.

§. XV.

Et certe pediluvia laudatiſſimi ad *Quibus-
dam mor-
bis*
derivationem uſus ſunt in morbis, qui
a congeſtionibus ad caput & peſtus,
per ſpaſmos inferiorum maximeque
hypochoſteriorum factis, ſubnaſcuntur,
ut præter ſaporofos affectus om-
nes fere capitis morbi ſunt, inſania,
mania, melancholia, cephalæa, hæ-
micrania, clavus hystericus, verti-
go, odontalgia, otalgia, gutta ro-
ſacea, ophthalmia, deſluxiones oculo-
rum falſæ, narium hæmorrhagiæ
nimiz & diuturnæ vigilæ, nec non
quæ peſtus aſſigunt aſthmata convul-
ſiva, dyſpnœæ a copia ſanguinis, cor-
dis palpitaciones, tuſſes hæcæ, hæ-
moptylis. Porro ob inſignem qua pol-
lent ſpaſmos remittentem ac ſolven-
tem efficaciam, egregie opitulantur
in morbis ſpaſmodicis convulſivis &
doloribus, in cardinali, dolore co-
lico, præſertim hæmorrhoidali, tor-
minibus ex calculo, ventriculi infla-
tione cum præcordiorum anxietate.
Præterea etiam excretiones ſaluberrimas,
perſpirationis nempe, urinæ,
& alvi & ſanguinis quoque ſinceræ, per-
menſes & ſedis venas efficaciter pedi-
luvia promovent, ſanguini liberum
commœatum conciliando, eundem
attenuando & ad excretorium tu-
bulos alliciendo. Neque minus graves
capitis peſtoris quoque affectus arcent
& præſcindunt, maximeque eos, qui
per periodos accedunt, quin quoti-
dianum eorum uſum truces periodicas
cephalalgias abegiſſe, ipſe expertus
novi. Sunt quoque qui in febris in-
termittentibus pediluviorum uſum
ſuadent, die quidem intercalari va-
cuo, nec ſine ſalubri effectu, ut pa-
tet ex *Obſ. 144. Dec. 2. An. 6. Miſc. nat.
curioſ. de quartana pediluvio ſanata,
& quæ Koſack de ſalib. Seſſ. 12. c. 10.*
plura hanc in rem habet.

§. XVI.

§. XVI.

*Caustic
in co-
rum usu*

Monendum tamen, quod longe felicius succedat pediluviorum operatio, si plenitudo sanguinis per venæsectionem in pede prius imminuitur, si circa tempus somni administrantur, nec pedes post eorum usum refrigerantur, sed calidi servantur & in lectum transferuntur, eoque facto, auctior per universum corporis ambitum redditur perspiratio. Cavendum vero est, ne pedes lavacro immittantur eo tempore, quo mensium fluxus imminet, aut jam exsolvitur, eo quod divertendo ab utero & ad inferiora invitando sanguinis appulsus, ut ipsum profluvium circumsistatur, vel intercipiatur, efficiunt; contra ea aliquot antestitam menstruum periodum dies, ad promovendum fluxum egregie faciunt, præsertim si temperata emmenagoga, vel pilulæ ad mentem Becheri paratæ, simul in usum trahuntur. Abstinendum quoque quam maxime a pediluviiis constringentibus, aluminosis, sulphureis, ad resiccandum mollestitum pedum sudorem, edemata discutienda, ulcera abigenda, item si doloribus podagricis pedes exercentur; siquidem iisdem non sine periculo materia illa virulenta ad interiores nobiliores partes retropellitur. Et quoniam communis servidus in Carolinis fons, vulgo *der Prudel*, virtutem quam maxime repellentem possidet; providus utique lavacri ex eo usus esse debet, in omnibus passionibus, ubi materia vitiosa externo corporis cortici incumbit, ac præsertim in doloribus arthriticis & podagricis.

§. XVII.

*Clysteres
res offi-
nes bal-
neis.*

Inter remedia externa, domestica & facile parabilia connumeranda etiam clysmata, sive enemata, quæ nihil aliud sunt, quam decocta ex certis speciebus confecta & per syringam ano pro vario scopo & usu injecta. Habent hæc multum cum balneis affinis atque commune. Balnea quippe lavacra sunt partium externarum,

clysteres vero intestinorum, quæ crassa vocantur, quæ eluunt, abstergunt & a contentis purgant. Balnea vel emollientia sunt, vel roborantia, clysmata pariter pro varia ingredientium ratione, solidas, rigidas, tensas & strictas partes molliunt & laxant vel flaccidas & a tono dejectas firmant atque adducunt. Deinceps sicuti balnea sola applicatione externa toti sanguinis & humorum massæ virtutem insinuant, ut liberiores & expeditiores eorum progressum faciant simulque salutares excretiones facilitent: ita etiam enematum operatio non solum in sanguinis & humorum circuitum ex immutatione pulsus, sed etiam ad excretionem movendas, præter alvi subductionem ex perspirationis & urinæ uberiori successu, luculenter patet. Balnea porro vi polleant insigni antispasmodica eandemque in dissitas spargunt partes: clysteres non minus hæc pollere virtute, quæ artus exercitia tractant quam optime norunt. Et denique quemadmodum immisso in lavacrum corpore, congesti præter naturam & non sine periculo in certa loca humores ad alias externas & inferiores partes derivantur, quo æquabilis ipsis reddatur ubique commensus: sic etiam clysmata ad divertendas a pectore & capite sanguinis congectiones, gravium pathematum genitrices, insigni & laudatissimo usu plurimum valent.

§. XVIII.

Et sunt:

Solent vero clysteres pro diverso medicationis scopo ex variis concinari speciebus. Et sicuti indicationes in medendo ad quatuor potissimum fines directæ sunt, alterantem nempe, evacuantem, roborantem & sedativum: ita eadem etiam clysterum ratio, ut iisdem vel indurata stercora emolliantur, aut qualitate infesta æria, acida & salsa recrementa attemperantur, vel contenta in crassorum canali evacuentur, vel languentes intestinorum fibræ & delatatus peristalticus in vis morus roborentur, vel

vel denique spasma tunicarum intestinalium remittantur & fibræ strictæ mitentur. Quod si igitur intentio sit ad frigores & alicuiora arida humida autem sunt tunc fucos acres, salios, & tunc gelidos, biliosos in quibus frigentes obtundendi, clysteres optime parantur ex emollientibus & demulcentibus, cujus generis sunt lac animantium, decoctum rasuræ cornu cervi, pedum vervecinorum & vitulinorum, avenaceum, juscula carnium pinguis, pinguedines animantium, butyrum insullum, decoctum ficuum, mel, manna, saccharum, decoctum radicis althææ, liliorum alborum, seminis lini, foenu græci, florum chamomillæ, verbasci, meliloti. Quæ quidem ingredientia, quom simul eximiam spasmos relaxandi virtutem obtineant, in omnibus affectibus spasmodicis, doloribus, febris, sanguinis congestionibus, & ubi alvus live propter spasmos obstipata, sive stercora indurata obstruata, commodam & utilissimam locant operam.

§. XIX.

Ubi alvum, simul evacuare & fæces atque humores stagnantes subducere constitutum est, salia ejusmodi decoctis adjecta omne, serunt punctum, ut sunt sal commune gemmæ, Ebzhamense, Sedlicense, digestivum Sylvii, nec non ammoniacum. Et certe dimidia salis uncia clysteri adjecta in evacuando majoris efficacæ est, quam aliquot uncie electuarius ex purgantibus & laxantibus concinnatorum. Celsus jam hunc in finem, muriam alvo infundendam suadet, id quod etiam cum nostra muria, quæ & pota & per clysterem injecta potenter, purgat, nec non cum Sedlicensi aqua optime succedit. Huc quoque referenda enemata, quæ ex urina humana, vel animantium parari solent ad educendas alvo viscidas ac lentos fucos. Neque minus sapo Venetus solutus egregie pro clysteribus inservit, tum maxime, quando acida, viridis

& corrosiva bilis tenellorum adhuc lactantium infantum intestina gravius exagitat. Quando vero fortiori stimulo opus est, tutius emetica, quam drastica & aciora cathartica clysteribus commiscantur, eamque ob causam *Derbague, in observ.* vinum emeticum clysmatibus in hydrope & apoplexia indendum commendat.

§. XX.

Roborantes clysteres virtute sua non modo intestinis, sed & aliis partibus atonia laborantibus dicata sunt, & ob id varia etiam recipiunt. Quom quidem tunicae intestinorum languentes roborandæ, carminativa sic dicta ex usu sunt, quæ status discutunt & recrementorum evacuationem secundant, & ex his maxime semina quatuor carminativa majora & parata ex ipsis olea, baccæ lauricæ juniperi. In gravioribus capitis morbis, ut apoplexia, paralyti, affectibus soporosis, auditus & visus debilitate, utiliter herba rutæ, majoranæ, rosmarinis, saturejæ, thymi, salviz, flores lavendulæ, spicæ adjiciuntur. Ubi passionibus ex uteri vitio, maximeque ejus atonia oriundæ, affligunt, ob peculiarem & specificam quasi facultatem cum fructu adhibentur herbæ pulegii, artemisiz, matricariæ, sabinz, menthæ, flores cheiri, calendulæ, radices aristolochiæ, nec non myrrha & galbanum, & ex his concinnati clysteres crebrius injecti in restituendo mensium fluxu, & expellendis molis eximia pollent efficaciam.

§. XXI.

Ego quoque experientia edoctus in chronicis ex succorum impuritate, viscerum prava constitutione, infarctu, humorumque stagnatione, affectibus, præsertim cachexia, scorbuto, malo hypochondriaco, mensium vel hæmorrhoidum suppressione, maximi facere soleo clysteres, quibus admixta amara & balsamica, cujus generis sunt trifolium fibrinum, fumitantes centaurii minoris, carduus benedictus, radix gentianæ, scolopendrium,

vel rem-
boran-
tes.

Part II.
Generis.

drium, rhabbarum, essentia rhabbari, elixir proprietatis, essentia fuliginis alcalifata, spiritus cornu cervi & massa pilularum balsamicarum. Et solo ejusmodi clysterum usu, desperatos se ad sanitatem reduxisse hypochondriacos testatur *Hercules Saxonia lib. 1. prax. cap. 16.* Neque minus roborantia apprimè proficua clysmata confici possunt ex vino, quibus etiam ubi vires admodum languidæ, nec corpus nimis sensibile, addi potest balsamum nostrum vitæ dictum. Hinc *Al. Anglic. pag. 598.* mentio injicitur clysteris ex vino Hispanico, pipere & vitello ovi, egregiæ virtutis, quod tota nocte retentum, viscera calefaciat & aliquot horis post sudorem moveat. Quin tam conspicua clysmatum ad corroborandum universum nervorum systema est virtus, ut ipsos febriles in intermittentes insultus compescant. Etenim *Helvetius* in peculiari tractatu de methodo febres sine interno medicamentorum usu curandi, perhibet; febres sola clysterum injectione ex decocto corticis chinæ cum aqua, vel etiam addito tantillo vini, optime posse perlanari, id quod etiam *Abrecht. in Misc. nat. cur. Dec. 3. An. 3. obs. 127.* quinq; confirmat exemplis. Et *Ægyptii* in quartana pro secreto habent clysterem ex decocti majoranæ libra una & tribus olei laurini uncis, uti auctor est *Alpinus de Medic. method. pag. 189.* addens: hoc clystere, & in meipso olim quartana vexato summa cum utilitate usus sum, & nonnullis tribus solummodo hisce clysteribus usos, sanatos fuisse, vidi.

§. XXII.

Vel sedentes,

Superfluum denique clysteres sedentes, doloribus complacandis & spasmis solvendis intervenientes. Horum in numero sunt clysteres ex meris oleis, pinguedine animantium & butyro insulso constati, qui ubi tonicæ coli a vehementi spasmò obidentur, ut ipsius cavum angulsetur, status retineantur & dira oboriantur tormina, uti obvium est in colica convulsiva

spasmodica, præsertim hæmorrhoidali, & quæ ab inhzrente acri caustica a superficie corporis repulsa materia suscitatur, laudatissimæ sunt virtutis. De his magnifice admodum ex Veteribus sentit *Actius*, qui *lib. 9. cap. de colica clysterem antispasmodicum parari jubet*, ex butyro recenti, adipe anserina, gallinacea, medulla cervina, adipe urina, cumino, foliis rutæ, nardo Celtica, castoreo & oleo rutaceo, addito hoc præcepto: *utere hoc ipso in vehementibus doloribus evacuatione tamen prius per alium clysterem facta, & post horæ spatium mensuram unam medicis poculi tepescant infunde & jube quiescere, ac aliquandiu pharmacum retinere, atque ita drinam ejus videbis facilem.* Quod si vero spasmi nimis æstus sanguinisque orgasmus jungitur, ut in doloribus capitis, articularum, hæmorrhagiis, clysteres cum sero lactis, vel lacte ex mollioribus & anodynis quam optime injiciuntur, floribus scilicet chamomillæ vulgaris, sambuci, verbasci, meliloti, nec non croci, nitro depurato & oleo amygdalarum dulcium. Non minus in pathematibus spasmodicis, epilepticis & convulsivis motibus, ut specifica addantur ex usu est. In hysteriis quidem pathematibus sagapenum, asa foetida & castoreum accommoda sunt. In epileptico & convulsivo insultu, radix, semen & flores pœoniæ, succus lumbricorum terrestrium, liquor cornu cervi succinatus, utiliter commiscuntur; cujus generis clystere ex antilepticis & timctura castorei parato primiparæ epilepsia tentatam egregie esse levatam testatur *Hardeus in Misc. nat. cur. Dec. 3. A. 1. obs. 100.*

§. XXII.

Hi itaque clysteres pro varia medendi intentione amplissimi in praxi medica sunt usus, quem *Celsus lib. 2. cap. 12.* sic in compendio sistit: *alvus ductio per lotiones semel vel sumum bis non omittatur, si caput grave est, si oculi caligant, si morbus majoris insti-*

*clyde-
non b-
for va-
riat,*

*æstini est, quod Græci κίρας nominant; si in imo ventre aut in coxa dolores sunt, si in stomachum quadam biliosa concurrunt, veletiam pituitosa eo se, humorve aliquis aqua similis confert; si spiritus difficilis redditur: si nihil per se venter exernit; utique si iuxta quæque stercurest & intus remanet, aut si stercoris odorem nihil deiciens eger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excernitur; aut si prima inedia febrem non sustulit; aut si sanguinem mittit, quum opus sit vires non patiuntur, tempusque ejus rei præterit; aut si multum ante morbum aliquis potavit; aut si is, qui sape, vel sponte aut casu purgatus est, subito habet alvum suppressam. Præter ea autem quæ in superioribus de enematum in variis morbis utilitate passim inferui, tenendum adhuc, quod in genere quam maxime conducant his, quibus venter ægrius descendit & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia suslinere nequit. Pariter in febribus continuis & exanthematicis præstat semper clysteribus & venæsectione, si opus est, curationem auspicari, & sub eadem etiam si alvus clausa, clysteribus insistendum. Christianus quoque Langius in *Misc. nat. aur.* omnibus vulneratis serio commendat clysmatum usum, ne alvi suppressio inflammationes, vel sanguinis stagnationes augeat. Possunt etiam clysteres aliis adhuc quorum meminimus usibus, pro varia morbi ejusque causæ conditione, adaptari, quo imprimis referendi illi, qui in diarrhæis, dysenteris & intestinorum erosionem, tam ad acrem humorem contemperandum, quam exosas partes consolidandas summo injiciuntur cum fructu, concilianda ex decocto pedum vitulinorum, vitello ovi, sevo hircino, bolo Armena, tragacantha, succo cancerorum fluviatilihum, spermate ceti, balsamo de Copaiva & sulphuris terebinthinato.*

§. XXIV.

Et licet clysteres efficacia sua pro-

xime afficiant intestina & in substantia & materia crassorum limites non transcendant; nihilominus tamen eorum virtus, non modo ex intestinis tanquam partibus nervosis & quæ cum reliquis nervosis corporis partibus exquisitum consensum alunt, ad alias & remotas etiam propagatur, sed & ipsi sanguini & lymphæ insinuantur. Prius ex eo patescit, quod clysmata, si nimis acria, teste *Avvicenna can. med. lib. 1. Secl. 4. cap. 17.* febrem accendant, emeticis imbuta vomitum moveant & dolores vel in suprema corporis regione complacent; posterius vero nutriendi, confortandi & stupefaciendi eorundem facultas testatum facit, & quod, ut quidem fidem faciunt *Act. Angl. pag. 598.* spiritus vini per inferius os injectus, longe magis inebriet & infatuat, ac si eadem mensura per oesophagum ingurgitetur. Potissimum tamen conspicuus est clysterum in intestinis tenuibus doloribus & spasticis constrictionibus laborantibus effectus, hæc maxime ob causam, quod illud crassorum amplissimum colon tenuia cingat iisdemque ubique sit circumvolutum, eaque propter infusum eidem emolliens & paregoricum clyisma, blando secore suo, contigua tenuia simul afficiat; & penetrante per tunicarum poros vapore, iisdem facultatem inlinuet, haud secus ac vesica decocto emolliente repleta extrinsecus apposita, in magnis internarum partium doloribus, spasmis & inflammationibus levamen affert præstantissimum.

§. XXV.

Ut autem saluberrimus clysterum effectus eo certius obtineatur, utique in eorum, haud secus quam in aliorum sanitatis præsidiorum usu, circumspectio adhibenda & necessaria quædam cautiones tenendæ. Nimirum sunt quidam adeo sensibilis naturæ, ut intestina clysteres plane ferre nequeant, & ipse viderim, colicos aliosque dolores eo magis increvisse,

Et tunc
patere
vires;

Constat
in ipso
sum ap-
plico
tione
servan-
dum.

quo plura clysmata injecta, qui postea solo interno convenienti laxante eximie levati. Et sicuti in his clysterum injectio non urgenda; ita etiam acres non statim applicandi, quando alvi excrementa diutius retenta, ne plus trahant ad infarcta intestina & obstructionem obfirmant, sed potius præmittenda his enemata, quæ laxant, lubricant, stercora emolliunt & evacuationi viam pandunt, uti perite monet *Mercatus lib. 1. pag. 63.* Post pastum quoque clysterum usus intemptivus minusque proficuum, eo quod ciborum concoctionem atque digestionem interturbat; chyli elaborationem & extractionem impedit ac nimis celerem ingestorum evacuationem præcipitat.

§. XXVI.

Neque etiam alvum crebro nimis & jugiter clysteribus sollicitare expedit; tum quia virtutem intestinorum expultricem sequiorem reddunt, ac ut natura iis assuescens officiis spontaneæ excretionis obliviscatur faciunt, tum etiam, quod subita & repetita crebrius liquoris clysmatici vel nimis calidi, vel perfrigerati infusione, ordinata illa & naturalis fibrarum inte-

stinalium tensio lædatur & inordinati motus provocentur, ac quum nullum enema applicari possit, quocum non simul status intrudatur, statuum metuendus sit proventus. Præterea quia intestina etiam crassa partes sunt admodum nervosæ, omnia quæ nervis sunt inimica, frigida scilicet, acida, austera, drastica virulenta & salia acriora, opiata, narcotica, item adstringentia, penitus ex clysteribus debent excludi, ne motus intestinorum peristalticus inde lædatur, vel destruat, quo salvo, ciborum digestio cum saluberrimis secretionibus & excretionibus ex voto succedit, quo destructo, intestina spasms, flatibus & fecibus multis cum molestiis obidentur. Quibus denique addi etiam merentur præclara *Celsi l. c.* monita servanda, inquit, illa sunt, ne ducatur ulla cruditate substante; ne in corpore infirmo, diuque in adversa valetudine exhausto; neve in eo, cui satis alvus reddit quotidie, quive eam liquidam habet, neve in ipso accessione impetu, quia quod tum infusum est, alvo continetur, regestumque in caput, multo gravius periculum efficit.

Et nota.

I N D E X

RERUM LOCUPLETISSIMUS.

A *Abortus* non sine convulsione succedit 44. ex uteri atonia 31. post abortum & puerperium. 121. præcavetur venæsectione in brachio. 297
Abcessus diſſect ab ulcere. 78. interni ſigna. 75. in abdominis integumentis quandoque ſubſiſtit. *ibid.* in thorace. *ibid.* poſt variolas. 76. in meſenterio. *ibid.* muſculorum doſti. *ibid.* uteri. *ib.* renum. 77. in parotidibus. *ibid.* ſinubus frontis. *ibid.* pulmonum facile recidivāt. 130. interni rupti mortis cauſæ. 194
Absorbentia veteribus ignota. 245. eorum apparatus. 244. differentię. 245. ampliffimæ nutritiæ. *ib.* correctioni materię dicata. 244. cum acido in terriū cedunt. *ib.* præmittenda purgantibus. 245. naturę opus juvant. 217. quædam addiſtingūt. 260. cui alvum ducant. 166
Accus ſpecificum in peſte. 284
Acicula deglutita atrociter ciet pathemata. 52
Acida temperant. 245. pulſum mutant. 156. ſanguinem coagulant. 148. optima alexiteria. 284. infeſa humorum progreſſui. 245. nitroſis poſtponenda. 246. clyſteribus non indenda. 317
Acuta febris in quo conſiſtat. 207. plerumque inflammatione ſtipatur. *ibid.* cui recidiver. 130. a natura ſanatur. 256. quomodo per artem. 207. venæſectionem poſcit. 295. ſq. ſymptomaticæ malæ. 214
Acuti morbi quomodo differant a chronicis. 122. ſq. caute tractandi. 199. ſuſpecti ſigna. 179. ſq. cauſa mortis in iis ſphacelus ventriculi & inteſtinorum. 197. ſq.
Adſtringentia quæ ſint. 277. ſq. quomodo agant. 278. qua methodo exhibenda. *ib.* infeſtura. *ibid.* debilibus noxia. 109. hydropem gignunt. 123. ſq. nocent in alvi fluxibus. *ibid.* hæmorrhoidis. 121. intermittentibus. 124. hæmorrhagiis. 109. gonorrhœa. 125 clyſteribus non indenda. 317. calculum præſcindunt. 278

Æquinoctium venæſectioni cor opportunitum? 292
Aer mutat corporis functiones. 15. pulſum. 138. ſq. excretiones. 159. morborum epidemiorum cauſa. 15. 92. purus & temperatus ſalubris. 6. craſſior impurus inſalubris. *ibid.* perſpirationem mutat 9. 92. frigidi effectus. *ibid.* humidit. *ibid.* calidit. *ibid.* frigido humidus perſpirationi obeſt. *ibid.*
Æſus quos gignat morbos. 92. qualis in eo pulſus. 138
Ætas in hiſtoriis morborum neceſſaria. 4. ſq. ad morbos facit. 45. ſq. 117. pulſum mutat. 138
Alcalina ſanguinem fluidiorem reddunt. 148. *terreæ* abſorbent. 245. non ſoluta ſtomachum gravant. *ibid.* non penitus ab acido ſolvuntur. *ibid.*
Alia celerrime ſolvuntur. 244. ſq. ſoluta in terrium degenerant. 245
Alexipharmaca in malignis minus proſicua. 260
Alimenta nocent in morbis ſpaſmodicis 67. valentis materię debilibus noxia. 231. ſuperato morbo paſce danda. *ib.*
Aloë hæmorrhoides movet. 107
Aloëtica quibus & quando conveniunt. 255
Alterantia materię correctioni dicata. 242. quadruplicis generis. 244. pro materia corrigenda variant. *ibid.*
Alterantia a natura non perfectiunt. 217
Alvina excretio in morbis conſideranda. 7. 11. 166. multum ad ſanitatem facit. 7. 165. motus inteſtinorum index. 168. ſq. quæ erechat. 147. ſub doloribus & ſpaſmis ſupprimitur. 66. nec non in capitis & nervorum morbis. 169. ſine noxa aliquandiu ſupprimitur. 165. in morbis prædenter movenda. 169. tarda ex bilis defeſtu. 166. mala. 168. ſuppreſſa morbos inducit. 7. involuntaria unde. 43. nimia & inordinata quid indicet. 168. nimia quomodo compenſanda. 170. 171. v.
Purgatio.
Alvi obſtruſſio a ſpaſmo inteſtinorum. 37.

17. succo inquinat. 48. varia pathemata inducit. 37. in febribus noxia. 129. cur aliquandiu indemnis. 165
Amygdalarum oleum in doloribus & spasmis utile. 63
Analeptica quæ sint. 183. quomodo agant. 273. limitatæ virtutis. *ibid.* pulsum mutant. 139. motum resocillant. 68. optima nutrientia. 130
Anasarca ex asthma gignitur. 123. balneis vaporosis discutitur. 311. purgantibus cutatur. 316
Agria ejus species. 21. 39. quomodo gignatur. 35. spasmis debetur. 34. suffocatione perimit. 336. venæsectione sub lingua levatur. 399
Anima non est Medicinæ principium. 32. perperam dicitur natura. 213. 39.
Animi pathemata proxime afficiunt nervos partesque nervosas. 48. effectus merè corporales præstant. *ibid.* eorum effectus. 6. functiones corporis turbant. 49. morbos pariunt. 6. mutant pulsum. 139. vires debilitant. 117. humores corrumpunt. 65. ventriculum afficiunt. 8. excretionem criticas sistunt. 8. ad colicam faciunt. 27. curarationi obfunt. 6. nocent in morbis exanthematicis. 38. nec non inter & post partum. 65. post eos motus insalubris. 215
Animus in morbis considerandus. 5. conspirat cum corpore. *ibid.* ejus inclinationes a corporis structura. *ib.* & progressu humorum per caput. 39. nimis fatigatus ventriculum debilitat. 54. stupidas ex a poplexia unde? 117. ejus morbi hæmorrhoidibus solvuntur. 107
Anodyna quæ sint. 281. quomodo agant. *ib.* quomodo utantur adhibenda. 283. diaphoreticis in doloribus miscenda. 262
Anodynum liquor celeriter operatur. 62. optimum sedans. 282. in doloribus maxime. 200. specificum in epilepsia symptomatice. 286
Anorexia unde. 43
Anthelmintica quæ optima. 287
Antidotum optima oleosa. 53. & pinguis. 242
Antimonium crudum specificum in passionibus rheumaticis. 285
 — *sulphur* in acerbis falsis defluxionibus utile. 63. specificum contumacium intermittenrium. 389. & guttæ

serenæ. 282
 — *regulus medicinalis* acres & salas defluxiones arceat. 63. specificum in contumacia intermittenrium. 283
Antispasmodica quæ sint. 281. quomodo agant. *ibid.* 39. hæmorrhagias sistunt. 224. non sola curant malum hypochondriacum. 62
Anus prolapsus balneis reprimatur. 281. resolutus involuntariam facit excretionem. 43
Aphonia a spasmis nervorum linguarum. 40. & paralyti. 48. in verminantibus obvia. 40
Aphise differt ab angina. 28
Asphlegmatizantia quæ sint & quando adhibenda. 270
Apoplexia vera vel spuria. 28. 34. hæreditarius morbus. 117. facile recidit. 130. in paralyfin transit. 29. a spasmis duræ matris. 40. differt a catalepsi. 29. syncope. 34. stuporem animi gignit. 119. ex scabie repulsa. 96. podagra emanente. 101. suppressione mensium. 104. lochiorum. 105. hæmorrhoidum. 11. narium hæmorrhagiæ. 114. qualis in ea pulsus. 142. lethale in ea signum thoracis convulsio. 41. spasmis stipatur. 34. causa mortis in ea. 287. clysteribus sanatur. 313
 — *vera causa* extravasatio. 30
 — *spuria causa* stagnatio. 30. vitam non adimit. *ibid.* hystericiis familiaris. *ib.* venæsectione discutitur. 294
Appetitus quibus revocandus. 275
Aqua simplex optima medicina. 306. ad balnea quæ optima. 345. quomodo emendanda. *ibid.*
Aqua mineralis infarctus & obstructions tollunt. 69. excretionem promoven. 64. succos depurant. 69. specificum in hypochondriaci & hysterici passione. 284. continuato usu juvant. 235. potissimum facultarem aquæ debent. 307. balneis socianda. 308. ingredientia ab auctore directæ. 240
 — *maritima* interius & exterius proficua. 310
Arcana non semper effectus præstant. 11
Ardens febris qualis in ea pulsus. 142. sanguis. 165 39.
Aridura quibus tractanda. 249
Arnica specificum ad sanguinem congestum. 289
Arsenicum externe applicatum nocet. 49

- asthmate 123. alvi fluxibus male tractatis 124. qualis in ea sanguis 136. pulsus 143. funesta signa 184. ejus lethalis causa 194
- Cacochymia* cur hypochondriaco & hysterico malo accedat 66. quomodo inducatur a plethora 67
- Calum* quod salubre 6. ejus consuetudo facit ad morbos 17
- Calculus* hereditarius morbus 118. ex arthritica materia 41. hæmorrhoidum & mensium suppressione 118. urteribus impactus facit dolores . 41. urgente dolore non expellendus 224. diuercis præcaveretur 265. curatur 264. specifica in eo 287. causa moris in eo plerumque renem corruptio 195. nonnunquam ventriculi & intestinorum sphacellus *ibid.*
- Calculus renum* ex atonia eorum 45. ejus signa 86. ex rene pulsus dolorem facit *ibid.* q. uo modo vomitum colica iterum & vesicæ calculum gignat 124
- *vesica* ex ipsius atonia 44. ejus signa 86. ex renali quomodo fiat 125
- *vesica fellea* signa 87. quæ pariat symptomata 56. per ductus biliarios transcurrentis signa 87
- Calculi dolor* differt a colica 25. 86. cum colica cur sæpe complicitur 26. 86. nec non vomitu 57. a spasmo uretherum 37. in consensum rapit ventriculum . 57. a refrigeratione abdominis irritatur. 58. accedunt demum inflammationes lethales. 183. specificum ejus liquor anodynus 284. funesta ejus signa 183
- Calculi per alvum excreti* 87
- Calculi* cur frequententer sunt iterici . 125. colicæ & flatibus cur paucant . *ibid.*
- Camphora* quandoque antispasmodicum 282. cum nitro specificum in inflammatione 284. in malignis *ibid.*
- Cancer* exulceratus quando funestus . 184
- Cancerum ebula & lapides* absorbens 244. diuresin simul movent 24 . cum acido sanguinem resolvunt *ibid.*
- Cantharides* specificum in hydropse 216
- Capillamentum* incaute demum capitis morbos gignit 184
- Cepus* consentit cum ventriculo 54. de bile morborum infantilium 45. & impuritatis succorum causa 68
- Carbunculi* pestilenciales retrocedentes necant 185
- Cardalgia* quid 25. distinguenda ab inflammatione & inflatione ventriculi *ibid.* 21. ejus variæ causæ 24. a spasmo ventriculi 36. ex præpostero topico- rum usu in morbis articulorum 168. mensium emissionem 105. feminis familiaris 25. quibus levanda 25. specificum ejus liquor anodynus 284. in ea hæmorrhoides saluatos 31
- Carminativa* quando clysteribus addendi 35
- Cero* plus fluidi quam solidi habet 14
- Carolina* utilissima ad hæmorrhagias promovendas 267. in calculo obfunt . 159. cur in balneo gignant febres 94
- Catalepsis* ejus signa 29. ab apoplexia differt *ibid.*
- Catarralla* incipiens ex ventriculo 55
- Catarrhalis febris* distinguenda a maligna 19. ejus origo 18. ex subita mutatione aeris 94. crises servat 173. qualem habeat pulsus 142. methodus naturæ & artis sananda ipsa 210
- Catarrhi* ex subita mutatione aeris & perspiratione suppressa 94. ventrecione quandoque gignuntur 302. & arcentur *ibid.* balnea non ferunt 312. sæpe saluantes 210. suppressi nocent 193
- Catarrhus suffocativus* distinguendus ab asthmate 28. ejus signa & symptomata *ibid.* quibus familiaris *ibid.* a paralyssi . nervorum pneumonicorum 43. a poly- pis vasorum pulmonalium 84. post morbillos variolas 128. suffocatione perimit 183. funesta ejus signa 215. causa moris in eo 191
- Causa morborum* quæ sint 205. simplices & manifestæ 237. rebus externis maxime continentur 14. plerumque ignorantur 70. in nervosas maxime partes agnunt 45. sectione patescunt 11. 71. plures concurrent ad proximam 14. quorundam ineptæ 70. non confundenda cum causa muris 11. Medico noscenda 187. in prognosi distinguenda *ibid.* certa auxiliorum genera indicant 70. difficiliter recognoscuntur *ibid.* cogniti non sufficiunt ad curandum 71. faciunt ad famam Medici *ibid.* remouent motu solidorum & fluidorum 204. in eorum remotione methodus mendi posita *ibid.* ex præcipuis imbecillitas 116

Causse mortis Medico noscendæ. 187. sectione patefcunt. 188. non confundendæ cum causis morbi 198. quæ sint in genere 187. in variis morbis *ibid.*
Casus ejus signa 18. differt a tertiana continua 18. in ea crisis fit 143
Causfica in nervosis partibus atrocia crient pathemara 49
Cautela in therapia necessitatem 3
Cephalalgia spasmi pericranii debetur 36. ejus variz causæ. 24. ex abscessu in sinibus frontalibus 77. vino in ventriculo 55. polypo sinuum cerebri 24. coryza per frigus suppressa 102. menstruum suppressione 104. narium hæmorrhagia. 113. ventriculorum per consensum afficit. 55. narium stillicidio miterfcit 113
Cephalica spirituosa in affectibus capitis ex resolutione pedibus applicanda 64
Cerebrum consensit cum ventriculo & intestinis. 6. cum corde. 10. ejus dispositio in morbis & quomodo cognoscenda. *ibid.* extravasatio in eo cur lethalis 120
Cerevisia insalubris 6
Chamæmilla flores peculiaris virtutis 233. sustinet febriles morus 62
China china pulsum mutat. 139. febriles motus sistit. 62. cur aliis antifebrilibus præferenda 233. quando proficit in febris. 159. continuato usu tollit febres. 236. specificum intermittentium. 283. quas inducat mutationes 69. balneis secundatur 310
Chiragra a spasmo ligamentorum. 37
Choledechus ductus spasmo corripitur 38. unde icterus *ibid.*
Cholera quid. 42. ex bile caustica. 59. convulsiva affectione ductum biliarium & intestinorum 42. genus nervosum in consensum trahit. 59. funestæ signa. 182
Chronici morbi causæ eorum frequentissimæ obstructions. 212. quæ ad generationem ipsorum faciunt. 199. quomodo arcenti. *ibid.* a sola natura non erantur. 212. optima eos sanandi methodus. *ibid.* continuato medicamento- rum usu tolluntur. 233
Chymica quando periculum in mora profunt 234
Cibi multum faciunt ad sanitatem 6. in-

gesti mutant pulsum 146. viscosi inflationem ventriculi 23. flatulenti colicam. *ibid.* avidius ingelli recidivas patiunt 9
Cinnabaris arcanum antiepilepticum 236
Cinnabarina quomodo antispasmodica 281
Circulus sanguinis totius Medicinæ fundamentum 144. quoties hora succedat 137. creber cur necessarius *ibid.*
Clavus periculose excinditur 50
 — *hystericus* a spasmo pericranii 36
Clysteres quatuoruplices 313. affines balneis. *ibid.* varii quomodo parandi. 314. tenuia potissimum afficiunt. 316. late vim diffundunt 316. quidam fere nequeunt 317. post partum minus proficua *ibidem* varii in morbis usus 316. in febris utiles 128. nervis inimica non capiunt 317. acres non statim applicandi. 316. antifebriles. 315. ex urina 113
Cacinas ex repulsa tinea capitis 96. scabie. *ibid.* consolidatis antiquis ulceribus 97. ex epilepsia 119
Cogitationes limitatam habent vim in actiones mechanicas 203
Colica differt a dolore calculi, & hypochondriorum 25. a spasmo intestinorum 36. ex arthritide præpostere tractata 100. suppressis mensibus 112. hæmorrhoidibus *ibidem*. calculosis cur familiaris 125. nonnunquam nephritica 25. parit icterum 57. facile recidivat 130. parcin relinquit 128. sphacelo necat 200. venæsectione sæpe tollitur 110. quibus levanda 276. anodynus primum excipienda 224. ejus specificum liquor anodynus 284
 — *flatulenta* quæ & unde 25. 88. venæsectione exacerbatur 301
 — *hæmorrhoidalis* 26
 — *biliosa* 36. a spasmo ilei 37
 — *hysterica* 29
 — *convulsiva*. 26. consensus intestinorum testis. 59. venæsectione curatur. 303
 — *spasmodica* metallurgis solennis. 59. vehementissima 26. ejus signa & causæ *ibidem*. levatur clysteribus oleosis 316. in ea coalescunt quandoque intestina 198
Colon flatibus sæpe distenditur. 89
Composita veterum incondita 234. non omnia spernenda 235. virtus simplicium *ex*

ex iis non patefcit. 240
Concha abforbent. 175. fubadstringunt. 245
Confortantia fpirituofa debilibus non proficua 231
Confenfus partium magni momenti. 47. non fabula 64. ex partium nexu 46. a nervorum diftributione. 47. inter quas partes maxime vigeat *ibidem*. fymptomatum fuggere rationes. 46. ex medicamentorum operatione patet. 62. fqq. ex principii vitalis concurfu non petendus. 52. nullus inter nervofas partes & fanguinea vifcera. 60
Confuetudo in morbis exploranda 7
Continua febris ex repulfa crufta lactea 95. febrile. 96. reftagnante fanguine lochiali 105. malus in ea pulfus 142. in ea profunt clyfteres 316. corruptionis vifcerum comes 75. fqq.
Contractura balneis maritatis tollitur 310. fpecificum ejus 239
Convulfiones differunt ab epilepfia 29. fedes in fpinali medulla. *ibid.* earum figna *ibid.* minus falutares naturæ mortis. 214. varias partes quatunt 41. a fpafmo membranarum fpinalis medullæ 39. mixte ex vermibus 87. prodeunte menfium fluxu ceffant 210. accedente febre folvantur quandoque. 212. fcarificationem melius quam venæfectionem ferunt 304. clyfteribus placantur 316. ceræ infantibus propterea ex ventriculo 56
Convulfivi motus in quo confiftant. 41. in quibus morbis obviæ *ibid.* eorum origo & fedes *ibid.*
Cor perpetuum mobile 131. ipfius fiftole quomodo contingat. 134. pulfus caufa *ibid.* imbecillis hypothyriam 42. ad tempus intercepta. fyncope parit *ibid.* ipfius motus unde 135. fqq. pulfui refpondet *ibid.*
Coralia abforbent 244. fubadstringunt 245
Corpora res magnam vim in corpus habent 240
Corpus humanum machina. artificiofiffima. 45. hydraulice & vafculofæ ftructuræ. *ibid.* vivum & phyficum gratis distinguitur 239. ex quo confiftat vere fenfit Hippocrates 30. in morbis confiderandum. 9. in prognofis 187. & medicamentorum oblatione div-

stinguendum 231. partes ipfius confpirant 46. ad confervationem vitæ conftructum 216. impurum periculofius a febribus prehenditur 65
Corruptio vifcerum quomodo arcenda 199. ex mortis cauffis 187
Coryza falutaris fæpe excretio 8. 211. fpafmis ftipatur 35. folvit quofdam morbos 211. venæfectione arceatur 210. quandoque adducitur 202. fuppreffa a frigore nocet 116. purgantibus exacerbat *ibid.*
Crisis ad prognofin fpectat. 170. ipfius figna. 35. fpafmo remittente fequitur *ibid.* fit per excretionem 171. quid fit veteribus 170. feptenario & femi-feptenario numero computanda *ibid.* extra feptenos etiam dies contingit. 174. quibus folennis *ibid.* unde repetenda 176. quomodo rationaliter applicanda 177. non turbanda *ibidem*. melius fuccedit ordinatis temporibus 174. auctorum variz de ea fententiz 171. fqq. quæ fit in acutis 173. & chronicis morbis 176. in purpura non obvia 175. per imprudentem medicationem turbatur 174. præ circumftantiarum ratione diftinguenda *ibid.* non omnis larga evacuatione & fymptomatum remiffio crifis. 175
Cruditates non funt prima mali hypochondriaci cauffa 67. vifcidas quæ diffolvant 247
Crufta lactea repulfa febrem facit continuam. 95
Cucurbitula vicariz venæfectionis 304.
Cuius fuphurearum fordium excretorium. 161. elastica. 162. confentit cum ventriculo 58. ad fudoris fecellum facit 192. fpafmo affecta perfpirationem cohibet 37. mala gignit *ibidem*. peffimi ominis in acutis arida. 180. refoluta imbecillitatem prodit. 43. fudoris frigidi & colliqnativi cauffa. *ibid.*
Cynanche anginz fpecies 26. differt a fpafmo faucium 22. quid ? 23. figna ejus. 21. funefta 183. fuffocatione perimit *ibid.*
Cynicus fpafmus poft podagram 58
Cyfici duntaxat fpafmi affecti diarrhœas & vomitus biliofos movent 35

D

Debiles qui sint 196. quomodo dignoscendi 116. *seq.* medicina egent *ibid.* fortia medicamenta non ferunt 231. nec valentia alimenta *ibid.*
Decussa continuato usu juvant. 236. lenientia profunt in exanthematicis. 208. sudorifera balneis nupta juvant. 109
Defecationes *catis* cum salute sæpe sunt 211. specifica in iis 389
Deglutitio difficilis unde? 43
Demulcentia materiz correctioni dicata 244. eorum suppellex 248. operandi ratio 249. usus in variis casibus *ibid.* externus & internus *ibid.*
Dentitio ejus symptomata unde 56
Desiderium ventriculo nocet. 55
Diabetes ex atonia rerum 44
Diana sanationi servit 233. a priscis optime commendata *ibid.*
Diagnosis seiru necessaria 16. ex observationibus haurienda 18. nitor signis. *ibid.* plerumque negligitur 17. ad eam referendus pulsus 130. *seq.* erronea Medicum ludibrio exponit 17
Diaphoresis movetur. quandoque acidulis & nitrosis 262
Diaphoretica polychresta 262. sudoriferis præferenda. 261. ipsorum apparatus *ibid.* *seq.* modus agendi 262. usus in morbis *ibid.* in pulvere alvum sæpe movent. *ibid.* in doloribus anodynus miscenda *ibid.* fixa ubi acidum deest parce danda 263
Diaphragma spasmi pater 39. consentit cum ventriculo 57. convellitur quandoque 41. in sternutatione per consensum afficitur *ibid.* titillatione commotum cachinnos movet *ibid.* spastice affectum asthma *ibidem*. & hepatis obstructionem causatur *ibidem*. convulsivum asthma & singultus causa *ibid.*
Diarrhea quomodo succedat. 168. per spasmos 35. sæpe salutatis excretio. *ibidem*. in febris etiam malignis 169. critica quandoque. 171. solvit morbos 222. inprimis capitis. 169. convulsiva affectione ductum biliorum intestinorum *ibid.* pedum refrigeratione 58. a villosa obstructa 167. quandoque minus salutatis naturæ mo-

tus 214. sphacelo intestinorum necat 197. intestina debilitat 229. suppressa nocet 8. inprimis per adstringentia 96. clysteribus levatur 316. post eam robustantibus mendum 229. symptomatica noxia 214. *seq.* quomodo compescenda. in febris 170. biliosa diuturna nocet 166. ex purgantium usu in catarrhis incompetibilis 102
Diafole lyctolen sequitur & proritat 132
Dianetica evacuantium genus 236. eorum apparatus *ibid.* modus agendi 262. *seq.* usus pro ratione circumstantiarum discrepans *ibid.* in doloribus arthriticis & rheumaticis proficuum 264. quæ optimæ *ibid.* in compluribus morbis proficua *ibid.*
calidiora profunt humidioribus 219. *seq.* & ubi viscidæ sordes in renibus. 264. nocent plethoricis *ibid.* renibus debilitatis 124. & ubi dolores adsunt 265.
Dolores variz species 22. *seq.* spasma in nervosa parte debentur *ibid.* pro locorum differentia variant *ibid.* succos inquinant 65. excretiones cohibent 66. partes tono privant 126. cruxie quandoque solvuntur 177. levantur liquore anodyno 62. oleo amygdalarum dulcium 62. balnei 300. fortibus emollientibus 214. specifica in iis 284. *inestromum*. vido *colica-capitis* vide *cephalgia* &c.
Dundennum, ventriculus succenturiatus 43. sedes morborum multorum. *ibid.* atonia affectum quæ pariat mala *ibid.* inflammati & sphacelati signa 75. et ossi indicia 89. siccit in eo signa & effectus 82.
Dura. mater membranarum nervosarum origo 39. motu tonico gaudet *ibid.* sanguinis progressum per caput moderatur *ibid.* spasmos patitur *ibid.* consensum alit cum omnibus membranis 41. ad ejus spasma mentis & capitis morbi. 39. epilepsia 41. ejus atonia gravium cerebri morborum causa 42
Dysenteria minus salutatis naturæ motus 214. rubra & alba 24. distinguenda ab hæmorrhoidibus *ibid.* ex scabie retro pulsata 96. solvit quandoque morbos 211. inflammatione & sphacelo afficit intestina 73. genus nervosum afficit universum 60. excrementa in ea 166. qualia in ea pulsus 143. sphacelo necat 188. ad-

stinu-

fringentibus perperam censetur 123.
functis signa 183. laudanum prodest in
ea 62. levatur foribus 311. clysteribus
316. ejus specifica 287. post eam intesti-
na roboranda 229

E

Elaeterium quomodo aquas hydropicorum
crehat 59. Veteribus specificum ad hy-
dropem 286

Emetica duplicis generis 251. eorum ap-
paratus *ibid.* modus agendi *ibid.* icterum
gignunt 37. post iram noxia 55. pulsus
mutant 159. ad morbos præsciendos
in principio optima 219. melius in for-
ma liquida 254. & pauciori dosi pro-
pianant 134. quando noceant 253.
in hydropicis per inferiora agunt *ibid.*
balneis utiliter sociantur 310. clysteri-
bus in apoplexia & hydrope indenda
314. tempore paroxysmi non danda
226. in erysipelate data inflammatio-
nem ventriculi gignunt 98. necantia
que habeant signa 182. *seq.* valentiora
quando conducant 221

Emmenagogæ quæ sint 260. quomodo peti-
te adhibenda *ibid.* non nisi præparatis viis
& humoribus offerenda 220

Emollientia quæ sint 248. quomodo agent
249. usus internus & externus *ibid.*

Euphyria differt a rationali Medicina 237.
ei favet sententia de principio interno
activo 240

Emplastrum Strobilbergeri paroxysmos
intermittentium sistit 63

— *anodynum* capitis dolores & vomitus
placat *ibid.*

Euphyema ex pleuritide quomodo 121. faci-
lius generatur ex pleuritide quam peri-
pneumonia *ibid.* ex imprudenti venæse-
ctione in pleuritide *ibid.*

Endemii morbi aeris vitio debentur 93

Ephemera ejus signa 18. in ea crisis in-
cedit 169

Epidemii morbi quibus causis debeantur
15. ab aeris subitanis mutationibus
oriuntur 92. quomodo observationes de
iis instituendæ 15

Epilepsia universalis convulsio 41. differt a
convulsione 59. ejus signa *ibid.* minus
salutaris naturæ motus 214. spasmi
stipatur 35. sedes in cerebri membra-
nis 29. a spasmo potissimum duræ ma-

Tom. III.

tris 41. 206. ex repulsa crassa lactea
113. scabie 42. consolidatis ulceribus
96. podagra præponere tractata 99.
retentis menibus 104. suppreffa na-
rium hæmorrhagia 113. *seq.* post atro-
ces dolores curariatur 126. hædidi-
rarius morbus 117. facile recidivat
130. per crisis quandoque discedit 177.
febre nonnunquam solvitur 211. men-
sium fluxu prodeunte sæpe cessat 210.
ex pollice pedis sæpe ortum sumit .
35. qualis in ea pulsus 142. cur in-
ducatur oculorum vitia 119. *seq.* scarifi-
cationem melius quam venæsectio-
nem fert 104. clysteribus abigitur 315.
seq. specifica ipsius 286. causa in ea
180

Euphonia ejus specificum 289

Erbina quæ sint 269. quomodo agant in
usus & noxa 270

Erysipalata febris ex mensium emanatio-
ne 105

Erysipelat, quibus cognoscatur signis .
23. quomodo gignatur 35. differt a
phlegmone 23. spasmi stipatur 35. re-
pulsus notat 96. retrocedens necat .
186

Evacuans varii generis 251. operantur
ratione circumstantiarum 238. præpara-
ta materia 220. in principio & fine mor-
bi ostendenda 219. *seq.*

Evacuatio per congrua loca 221. brevissi-
ma via 219. & præparata materia sus-
cipienda 220. non impetuose urgen-
da 223

Exanthemata sudoriferis non expellen-
da . 216. venæsectionem non semper
interdicunt 296. *seq.* repelluntur per
spasmos 35. refrigerationem 97. *seq.*
purgantia & emetica 222. sub situ ere-
cto disparent 97. *seq.* repulsa perniciofa
ibid. faciunt oppressionem pectoris 38.
critice solvunt quandoque capitis &
nervorum morbos 177

Exanthematica febris naturæ & ætatis pro-
cessus in sanandis iis 208. clysteres fo-
runt 224. nec non venæsectionem 291.
sed iustam 301

Exanthematica materia repulsa veneni-
vim habet 95. cur tam graviter no-
ceat 97. facit oppressionem pectoris
39. resistans quæ pariat symptomata
23

Excrementa alvi inspicienda in morbis 165.
signa ex iis 166. unde viridia 86.

X 3 alba

alba ex bilis defectu . 66. fusca & bruna
ex bilis copia . 165. nigra a sanguine . 168.
sq. liquida copiosa ex obstructione villosa .
167. unde mucida . *ibid.* dura nimis . *ibid.*
sanguinolenta . 168
Exereta indicia præbent . 148. sq. respon-
dere debent ingestis . 7. 90
Excretiones ad sanitatem necessariz . 7. 89.
sq. a Medico considerandz . 15. 95. va-
riaz . 90. sq. in morbis salutares . 206. per-
spiratio . 92. sq. evacuationibus turbau-
rur . 115. sq. natura deficiente promoven-
dæ . *ibid.* suppressæ nocent . 104. *ibid.* &
movendæ . 116
-- *criticæ* salutares . 8 duplici modo . 228.
septenario numero adstrictæ . *ibid.* non
intereipiendæ . *ibid.* sq. etiam si fuerint
nimis . *ibidem* sq. suppressæ nocent .
8. 175. sq.
Expectorantia quæ sint . 267. sq. quomodo
agent . 268. cum discrimine usurpanda .
ibid. sq.
Experientia effectum remedium docet .
240. non tamen una sufficit . *ib.* sq.
Explicatio arcanum in Medicina . 219
Extravasatio lethalis in capite quomodo
arcenda . 198. sq. sanguinis inter fibra-
rum intersitia commentum . 132. ex
choroideo plexu apoplexiæ causa . 74.
ovariorum ex vasis . 79. ex liene disruptio . 80.
feri . *ib.* sanguinis vel feri quomodo ne-
cet . 180

F

Facies color ipsius ad historiam morbi . 5.
indicia ex florido . *ibid.* livido . *ibid.*
Hippocratica quæ & unde . 180
Fallacia causa ut causa frequens in Medi-
cina . 218. sqq.
Fames canina a scirrho pancreatis . 81
Fævi repulsi asthma gignunt . 95
Febriles morbi sedem habent in spinali me-
dulla . 41. quibus sistantur . 62
Febrii quid sit ? 141. denominatio multis
communis . 18. ipsius species distinguen-
dæ . *ibid.* formalis ratio spasmo continetur .
33. sqq. spasmus universalis . 205.
duplici motu absolvitur . 34. 206. sæpe
perniciosa . 213. sq. per se non salutatis .
36. succos vitales corrumpit . 65. vires
destruit . *ibid.* ad chronicas passiones dis-
ponit . *ibid.* in corpore impuro pejor .
ibid. ex cohibito fluere albo . 102. ex ver-
mibus . 87. ex refrigeratione post itam

& calorem . 94. soluto spasmo remittit .
34. in Carolinis ex tempore gignatur
quomodo . 94. convulsiones & epilep-
siam solvit . 211. ejus signum pathogno-
monicum pulsus frequens . 123. sq. pul-
sum habet durum . 230. mala signa . 179.
naturæ & artis methodus in sananda ip-
sa . 207. in principio optime fere laxan-
tia vel emetica . 219. clysteribus sistitur .
315
Femina viris imbecilliores . 5. morbis ma-
gis obnoxia . 117. peculiaribus etiam
6. qualem habeant pulsus . 117. ex-
periuntur quandoque hæmorrhoides .
106
Fistula ex variolarum reliquiis . 128
-- *ant* consolidata apoplexiæ gignit .
113
Flatus quomodo generentur . 88. a cibis
viscoli . 25. intestina & abdomen di-
stendunt . 88. sq. colon læpissime ob-
sident . *ibid.* causa atrocium pathema-
tum . *ibid.* sq. inflationis ventriculi .
ibidem doloris in sinistro hypochond-
rio . *ibid.* pulsus quandoque suspen-
dunt . *ibid.* cum calculosis familiares .
125
Fluida corporis humani solida quantita-
te superant . 136. ex solidis vitium
capiunt . 64. depravantur in febribus .
65. animi affectibus . *ibidem* dolori
ibid. sq.
Fluxus albus a suppressis menses . 105. ex
puerperio . 119. post abortum . & puer-
perium . 125. præpostere cohibitus no-
cet . 128
Fonsiculi sæpe salutari serviunt excretio-
ni . 115. oclusi obfunt . 97
Fors profunt in dysenteria . 350. ad eli-
ciendas hæmorrhoides . *ib.*
Frisio fa . 11 ad progressum sanguinis . 69.
in syncope utilis . 63
Frigus post calorem noxium . 94. excre-
tiones criticas sistit . 8. exanthemata re-
pellit . 35. colicæ causæ . 25. in febribus
spasmo cutis . 33. sq.
Frontalis vena utiliter in capitis mor-
bis secatur . 299. non tamen semper .
301.
Functiones triplices in homine . 203. in
morbis læduntur . 10. mechanicæ me-
dicinæ objectum . 203. læsæ quomodo
explorandæ . 50

G.

- Quilms* nimis multas finxit pulsum spec-
cies 131
Gangrena quid. 23. differt a phlegmo-
ne *ibid.*
Genu nervosum in morbis omnibus affe-
ctum. 45. *seq.* a causticis & venenis ad-
anomalos motus abripitur. *ibid.* *seq.*
universali spasmo affectum, mali ominis.
186
Glandula spasmo afficiuntur. 38. *seq.*
-- *mammam* spasmo affectæ secretionem
lactis impediunt. 39. tumores & ulcera
gignunt. *ibid.*
-- *sanctum & palati* contractæ sitis. *ibid.*
iterato strictæ & laxæ salivationis
causæ. *ibid.*
Gonagra a spasmis figamentorum. 36
Gonorrhæa, adstringentibus perperam tra-
ctatur. 125. *seq.* cohibita & calidiori-
bus excepta luem veneream gignit. 101
seq. ex malè curata scitris prostrata-
rum 82. qualem habeat urinam 137. ip-
sius specifica. 288
-- *benigna* ab atonia vesicalarum, semina-
lium. 44
-- *virulenta* diuretica fert. 212
Gravida hæmorrhoides salutariter ferunt
106
Graviditas a scirrho mesenterii quomodo
distingueda. 82
Gravolentia specificum, in hysterica pas-
sione 283
Gnæacum specificum in lue venerea 289
Gustus cum odore sympathiam alit. 40.
a spasmo, tunicæ pirituatiæ, impeditur
ibid.
Gutta serena ex paralyti oervi optici 42.
seq. consolidaris antiquis ulceribus.
188. ex epilepsia quomodo. 119. *seq.*
ejus specificum sulphur antimonii 389

H.

- Habitus corporis* qui morbosus, qui sanus?
3. facit ad pulsum. 137. in historiis mor-
borum exponendus. 5
Hæmoptysis ejus differentia & signa. 23. *seq.*
quomodo succedat. 33. hæreditarius
morbus. 117. spasmis debetur. 34. a po-
lypis valorum pulmonalium. 84. men-
sium suppressione. 101. ingignit phthisin
120. præcipue in feminis. 103. causæ
mortis in ea *seq.*

Hæmorrhagia earum differentia. 23. *seq.*
salutares. 8. quomodo succedant. 33. de-
bentur spasmis. *ibid.* considerandæ. 8.
solvunt morbos. 210. si deficiunt, promo-
vendæ. 209. qualis ante & post eas pul-
sus. 142. quibus prædiis & quomodo
movendæ 265. antispasmodicis rectius
sistuntur quam stipticis. 224. & adstring-
entibus. 279. earum specifica. 288. pi-
lulis de cynogl. & martiali liquore com-
pescuntur. 62. criticæ quandoque. 171.
a spasmis supprimuntur. 35. supptellæ
nocent. 8. non tamen omnium morbo-
rum causæ. 92. nimis debilitant. 118.
exitiosæ. *ibid.* funesta signa. 185. ex in-
congruis locis suppressis mensibus. 102.
ex præputio rariores observantur. 23. vid.
narium & uteri hæmorrhagia.

Hæmorrhoidales vena internæ lethalem ru-
pturam passæ 79. a sanguisugis non eva-
cuantur. 306

Hæmorrhoides præternaturales quid. *ibid.*
salutaris excretio *ib.* earum signa 24. di-
stinguendæ a dysenteria. 23. quomodo
erumpant. 33. spasmis debentur. *ibid.*
inprimis hypochondriorum. 111. hære-
ditaria. 107. quibus solennes. 106.
feminis quandoque accidunt. *ibid.* gra-
vidis quoque. *ibid.* mensibus suppressis
sæpe manant. *ibid.* nonnunquam cum lo-
chiis fluunt. *ibid.* cur adeo familiares.
107. solvunt multos morbos. 110. mentis
morbos solvunt & præservant. 107. ne-
phritidem curant. *ibid.* præservant ab
hæmoptysi. 108. arthritide. *ibid.* pleuri-
tide. 107. curis desædatione. *ibid.* hypo-
chondriaco malo. *ibid.* scorbuto. *ibid.*
scorbutia. 108. in morbis earum suppres-
sione aperiendæ. 109. certa ad revocan-
das ipsas non dantur remedia. 112. in-
tempestive pulsæ nocent 113. nonnisi
præmissis præparantibus pellendæ. 220.
quibus prædiis. & quomodo movendæ
265. fortibus revocantur. 310. specifica in
vitiis earum. 278. spasmis supprimun-
tur. 36. nunquam vi comprimendæ. 109.
earum dolor a spasmo. 36

-- *alba* quid & unde 105
-- *suppressa* 8. colicæ causa. 26. in ipsis
quomodo sanguis mittendus. 300

Hæreditaria dispositio multum facit ad mor-
bos. 5. morbos difficiles gignit. *ibid.* in
historiis morborum recensenda. *ibid.*

Hæreditarii morbi qui sunt 117. a solidiorum
vitio pendunt. *ibid.* difficiles sanari. 5.

- Relicta febris differt a lenta* 19. *signa. ibid.*
 nunquam salutaris. 235. a viscerum cor-
 ruptione fovetur 72. ex suppressione
 mensium 104. loquiorum. 106. nimis hæ-
 morrhagiis. 118. sudor largus in ea unde
 164. causa mortis abscessus ruptus 194
Helleborus specificum Veteribus ad insa-
niam. 285
 — *albus Veterum emeticum.* 251
Hemicrania quid 37. a spasmo pericranii
ibid. ex mensium suppressione 104. puer-
 perio 119. facile recidivat. 130
Hemiplexia quid & unde. 44. pulsus in ipsa
 161. causa mortis 188
Hepar non alit consensum cum nervosis
partibus 61. ad anoriam cur proum 43
 atonia laborans multorum morborum
 causa 67. scirrho facile afficitur 83. ma-
 xime affectum in scorbuto 156. ejus con-
 sistitio in morbis consideranda 9. unde
 cognoscenda 9. lethalis corruptionis
 signa. 184. labæ affectum quibus curan-
 dum 277
Hepatici delictus spasmo correpti diarrhæas
 & vomitus biliosos causantur 38
Hepatitis distinguenda ab inflammatione
 ventriculi 21. ejus signa 25. differen-
 tiæ 23
Herpes sæpe annua & salutaris 115
Hippocrates optima jecit. artis fundamenta
a posteris relicta. 21. periora & præstan-
 tiora ipsius dogmata 39. parum meminit
 signorum ex pulsibus. 130
Hirudines evacuationi sanguinis. serviunt
 306 non plus quam scarificatio vel ven-
 sectio præstant *ibid.*
Hysteria morborum therapie fundamentum
2. perfectæ. sint 3. quomodo consignan-
 da 4. ad hypotheses examinandas uti-
 les 13
Hæmo triplices in eo actus obvi 203
Hæmores propositio elementorum 6. quan-
titas 131. non extravantur inter fibra-
 rum interstitia. *ibid.* cur tam varii ex
 sanguine 163. ad crassiorum facit po-
 tui 6
Hungarica febris a qualitate coli derivan-
da 93
Hydrocephalus quid sit 80
Hydrophobia ejus signa 21. differt a phreni-
 tide *ibid.*
Hydrops a scirrho mesenterii. distinguen-
dos 82. ex atonia hepatis & lienis. 43.
 suppressis mensibus 104. hæmorrhoidi-
 bus 108. uteri vitio 193. quartana. 123.
- nimis hæmorrhagiis* 118. obstructione
 hepatis, viscerum & glandularum 194.
 pulsus in eo. qualis 143. funesta. ipsius
 signa 184. causa mortis 193. facile reci-
 divat 130. ex. asthma quomodo gi-
 gnatur 39. intra duplicatam perico-
 nxi paracanthosia admittit 78. diure-
 tici optime arceat 265. ejus specifi-
 ca. 287. uteri fluxu sponte loquatus
 212
 — *subitanus ex ruptis tumoribus serosis*
in abdomine 78
 — *saccatus lapsu curatus.* 213
 — *uteri a. polypis.* 84. ex suppressione
 mensium 104
 — *perforis ejus signa* 89. quibus solennia
ibid. a polypis vasorum pulmosalium
 84. ex suppressis mensibus 104. asthma
 quomodo 123. uteri fluxu sponte quan-
 doque sanatur 212
Hypochondriacum malum affectio. generis
nervosi 62. imbecillis nature proles 111.
 in quo consistat 122. differt a colicis 55. si-
 gna 36. radix & sedes in ventriculo 53. va-
 rix causa 111. causa prima non crudi-
 tates 62. nec unica stagnatio sanguinis
 in vasis ventris portæ 110. ex animi par-
 temate 54. potu frigido postitum 55. san-
 guinis stagnatione in visceribus abdo-
 minis 62. ex hæmorrhoidibus suppressis
 106. male curata intermitente 122. alvi
 fluxu 123. hæreditarius morbus 117.
 fluentibus hæmorrhoidibus affligit. 123.
 hæmorrhoidalia molimina gignit. *ibid.*
 hæmorrhoidibus levatur. 198. efflore-
 scere purpura quandoque discedit 211.
 clysteribus levatur 314. cura fundamen-
 talis 62. specifica in eo præsidia 285
Hypotheses multe in Medicina 43. quomo-
 do examinande *ibid.*
Hysterica cur suarvolentia ferro nequeant
40. apoplexia leviori corripuntur. 28
Hysterica passio hæreditarius morbus. 118.
 sedes non in utero, sed ventriculo & in-
 testinis. 60. non a nervis sed sanguine
 restante derivanda *ibid.* ex puerperio
 119. atonia uteri 44. mensium defectu 60.
 cohibito fluore albo 102. restante
 sanguine lochiali 106. levatur laudato
 62. clysteribus 316. quæ præstent 61. spe-
 cifica in ea. 285

I.

Jalappe resina cum atrociam ciet pathemata .

59

Icterus flavus & niger unde 156. a spasmō officii choledochi 38. ex atroxia hepatis 48. spasmō ventriculi 36. purgantibus ib. venenis ib. vomitoriis ib. retento mœconio ib. colica ib. ita ib. febre intermittente ib. retentis mensibus 104. calculosis cur familiaris 103. & colicis 126. qualis in eo urina 136. specifica in eo . 197

Ileon intestinorum tenuissimum & maxime sensibile 38. lumbricorum nidus 90. spasmō affectum causa doloris . circa umbilicum 36. & colicæ bilio . 38

Iliaca passio ab inverso peristaltico motu 37. funestæ signa 183. sphacelo intestinorum necat . 192.

Imbecillitas ex principis morborum causis 116. seq. quibus inducatur 118. quibus cognoscatur signis 116. seq. 232. ipsius specificæ . 203

Impetigo annua & sæpe salutaris . 115

Inappetentia cum malum in cachecticis & hydropicis signum . 74

Incidentia materiæ correctioni dicata 245. quæ sint 246. quomodo agant ibid. & usurpanda 247. seq. appetiunt 248. sanguinem deputant . ibid.

Indusia in morbis exanthematicis non mutanda 58. a sudore tinguntur 161. pondere incrementum . 160

Infantes cur difficultate sudent . 162

Infantum morbi quæ signa eorum 186. quæ causa mortis 193

Inflammationes quomodo gignantur 34. aliis superveniunt lethales 180. in sphacelū demum concedunt 182. periculosiores quandoque miriora adsunt symptomata 181. in principio quomodo discutiendæ . 193. venesectione discutiuntur 207. seq. nimia exacerbantur ib. eorū specifica 284.

Inflammatoria febres eorum species & differentia 21. seq. ex suppressis mensibus 106. recidant quandoque 130. medicatio eorum 207. qualis in iis pulsus 142. nimia venesectione exacerbantur 207. seq. iusta levantur . 301

Infusa vinosa laxantia præferenda purgantibus 223. diapnoica præferenda sudorificis; ibid. thelosmia potissimam facultatem aquæ debent . 307

Infantia hereditaria malum 112. perperam promiscue ab hæmorrhoid. repositur ibid.

ex suppressa narium hæmorrhagia 114 facile recidivæ 130. hæmorrhoid. solvitur & præservatur 106. seq. balneis levatur 287. seq. scarificationem melius quam venesectionem fert 304. specifica ipsius . 285

Intermittens febris minera prima in regione 54. unde symptomata eorum ibid. quandoque salutares 209. quandoque exitiosa 212. seq. etiam habet crisiū 176. recta curationis ratio 209. & sinistra ibid. optime præscinditur emetico vel laxante 219. specifica ad curandam ipsam 283. male curata gignit hypochondriacum malum 122. seq. contumacia sines 209. & specifica . 283

Intestina in morbis maxime debilitant 118. consensum alunt cum ventriculo 36. seq. cum membranis universi corporis 59. flaribus obducuntur & distenduntur 88. seq. coalescunt quandoque in colica convulsiva 197. seq. quid patiantur a spasmō 37. in inflammatione & sphacelo. eorripuntur in dysenteria 74. eorum atonia quæ paritæ mala 43. quibus submoveatur 277. ab eorum convulsiva affectione diarrhœa & cholera 104. erosionis eorum quæ signa 89. labem patiuntur male tractatis alvi fluxibus 123. spasms eorum quibus tollendus 250. eorum inflatio quibus curanda 275. languentia clysteribus firmantur 313. crota clysteribus consolidantur . 326

— *crassa* ascaridum habitaculum . 8
— *serenium* inflammationis & sphaceli signa . 73

— *restitutum* a dolore . ex hæmorrhoidibus sphacelū patitur . ibid

Ipecacuanha specificum in dysenteria 287 ejus virtus & prærogativa . 252

Ira effectus ipsius in corpus 6. facit ad colicam . 27. ad cardiagiam 65. ad vomitum ibid. ad iterum 57. seq. ad febres biliosas cholericas 65. atrociam ciet pathemata sit calculus in cystide fellea . 87. quæ post eam demonstrat quæ utilitas . 221. seq.

Isthmicum malum quomodo gignatur 35. a spasms oritur 37. spasms stipatur 35. ex mensium emissionem 105. differt a nephritide 22. ex hæmorrhoidum suppressione venesectione levatur 110. repulsus nocet 99. seq. quando in eo venesectio instituenda . 303

Jugularis vena in melancholia & phrenitide incidenda . 299

Juvencus quid peculiare seruet, 5. quibus morbis pareat 45. qualis in ea pulsus 138

L

Laber mutat pulsus 158. Vid. *motus*.
Lac optima antidotus 249. a spasmi secretionis ipsius interceptur 38. quando in status explicetur 25. coaceretur venenum emulatur 53. inflammationem ventriculi causatur 25. vide *serum lactis aspinum* specificum in podag. 285. in phthisi 284. ad longevitatem 289.
Lactiferi ductus spasmi patiuntur 38. spasmo affecti intercepte lactis secretionis & tumorum causae. ibid. seq.
Lesiones extrenae lethales quae sint 200. earum ratio intercepta humorum circulo. ibid.
Larynx spasmo afficitur 39. spasmo affectu constituti in gula sensus causa. ibid. irritata facit tussim serinam. 49
Landanum liquidum prodest in dysenteria & hysterica passione 62. in febre ardente mortis iterum. 227
Laxantia Veneribus minus cognita 254. qualis sint 253. quomodo agant 254. praefrenda purgantibus 223. pro ratione circumstantiarum in usum vocanda 254. profunt in principio morborum 221. ad praevendendum aborrum utilia. 125. in tussi cur conducant. 59
Lenta febris signa ipsius 20. differt ab hectica ibid. ex debilitate ventriculi 68. nimis haemorrhagiis 118. alvi fluxibus male tractatis 123. suppressis criticis evacuationibus 175. quomodo statim praescindenda 219. quae in ea profunt 249. causa mortis in ea 194.
Letsargus ex erysipelate repulso 98. cephalalgia & scorbutu lethali supervenit eventus. 188. qualis in eo pulsus 142. causa mortis in eo. 188
Lien melancholiz sedes 79. non alit. consensus cum nervosis partibus 61. labem contrahit ex tristitia 79. atonia laborans quos pariat morbos 44. ei perpetam dolores in latere sinistro tribuuntur 62. post yomitus cruentum magnus & putridus reperitur 105. scirrhi in eo signa 83. labem affectus quibus tractandus 276. ejus ruptura lethalis. 80
Lypothymia atoniae debetur 42. ex imbecillitate cordis sytole ibid. ex praepostero topico- rum usu in morbis articulatorum 99. restan- gnanse sanguine lechiali. 103

Lera multum faciunt ad morbos endemios 1. & epidemios 15. altiora salubria 6. humi- lia insalubria. ibid.
Lechia non nisi praemissis praeparantibus pel- lenda 220. a spasmi suppressuntur 35. suppressio eorum. cur adeo noxia ib. quae inducat parthemara. 105.
Longevitas ejus praesidia. 289.
Lumbrici in ileo hospitantur 87. eorum in- dicia ib. pulsus reddunt inaequalem 140. pleuritidem mentiuntur. 87.
 — *terrestres* specificum in dolotibus artu- um scorbuticis. 285.
Luna ad venesectionem nihil facit. 292.
Lycopodium specificum in plica Polonica. 289.
Lympha spissa quibus dissolvatur. 249.

M.

Magnesia absorbens 244. hypochondriacis a- silis 243. ab acido soluta fit laxans. ib.
Maligna febris differt ab aliis 18. xxi. & xxi. quae ibid. qualis in ea pulsus 142. qui ma- lus ibid. in ea sanguis quandoque roseus 147. sudor largus in ea malus 164. causa mortis spheclus. 197
Malignitas viribus intensissima 73. ejus signa 10. non ex fictis terminis exponenda 73. ejus causa putredo 74. Medicis saepe im- ponit. 92
Mamma spasmi experiantur 38. tumores & abscessus earum unde. ibid.
Mandibula piscium, absorbens. 244.
Mania hereditarius morbus 118. seq. a spas- mo durae matris 39. ejus signa & differen- tia 21. ex mensum 104. & haemorrhoi- dum suppressione 108. cui sepe melancholia excipiat. 40
Manna triplici gaudet virtute. 234
Marasmus senibus familiaris 74. seq. ejus signa ib. viscerum corruptione nititur. ib.
Mars limatus absorbens 244. adstringit si- mul 245. ejus liquor compescit haemor- rhagias 62. ejus crocus sistit febriles mo- tus. ibid.
Martialis pulsus mutans 21. balnearum u- su seceduntur. 309
Massigatoria ad arcendum miasma profunt. 270.
Materia morbi indoles ipsius ex quo cognos- cenda 10. coctae signa. 16.
Mechanismus corporis ejus. notitia funda- mentum therapiae. 2.
Medendi leges. 218.
 — *methodus a medico tenenda* 2. consilium in

in remotione caussarum 204. naturę optima 207. *seq.* quę sit in variis morbis 206. in specificorum usu servanda. 291
Medica menta scienda 241. quę fortia 274. quę lenia ibid. pauca & selecta usurpanda 231. *seq.* aliquamdiu continuanda 235 in eorum usu corpora distinguenda 230. Veterum annalia 235. in eorum usu corpora distinguenda 230. vites eorum non una experientia cognoscuntur ib. ægrius a priori perspicuntur 239. a Medico noscendę 256. plerumque tamen ignorantur ib. multitudo eorum causę ignorantiz virium 237. *seq.* arti noxia. ib. Vid. *remedia.*
Meditatio in morbis tempestive instituenda 219. imprudens morborum causa. 10
Medicina ob circumstantiarum differentiam difficilis 217. iudicio opus habet. 144. naturam juvat 216. naturę errores emendat 218. *seq.* hypothefibus & opinionibus referta 13. ejus partes sunt connexę 2. ejus obiectum actus in corpore mechanici 203. ejus principium non est anima 32. neque spiritus ib. fed natura corporis 4b. teste ab Hippocrate definita 30. ejus incrementa quę retardant 31. rationalis quomodo differat ab empirica. 237
Medicus ejus officium 207. naturam imitari debet ib. 215. naturas distinguat 144. ib. iudicio excolat 2. in morborum principio & fine opem ferat 227. in semioticis caute se gerat 144. felix qui 216. prognostic estimationem consequitur. 16
Meditationes nimiz sanitatem labefaciunt 7. corpus debilitant 217. ad capitis morbos disponunt. 76
Medulla spinalis ejus membranę sedes motuum febrilium 14. convulsionem ibid. resolutę cum nervis suis hemiplexię & paręsis causa. 44
Melancholia hæreditarius morbus 177. ejus differentię & signa 21. a spasmo durę matris quomodo 40. ex suppressis mensibus 304. hæmorrhoidibus 107. ex puerperio 218. cur in maniam transeat sæpe. 114.
Membrana spasmī patet 33. nervosę spasmō affectę dolorem faciunt 36. capitis externę cephalalgia sedes ib. cerebri spasmō affectę melancholię manię apoplexię & epilepsię sedes 41. sensorii auditum susursum & tinnitum gignunt 40. spinalis medullę sedes moruū febrilium ib. convulsionem. 41
Menstris abolita ob atoniam durę matris

42. ex apoplexia quomodo. 119
Menses salutaris excretio 8. spasmis debentur 33. eorum mechanica ratio 103. solvunt convulsionem 210. quomodo movendi & quibus 265. nonnulli premissis præparantibus pellendi 220. specifica in vitiis eorum 287. a spasmis supprimuntur 36. eorum loco fluunt sæpe hæmorrhoides. 106.
 - *suppressi* nocent 9. & cur 35. quę symptomata inducant ib. per incongrua loca exitum molibantur 103. causantur vomitum & mictum cruentum ib. foribus revocantur 318. & clysteribus 314. quomodo venæsectione ferant. 100
Menses nimium fluentes unde 44. ex hepatis & lienis vicio 65. venæsectione in brachio sistuntur. 100
 - *emanantes ob ætatis rationem*, quę gignant mala. 105
Mentha cur optimum in vomitu. 249
Mercurialia quomodo salivationem moveant 272. secundantur balnei 309. in detrititionis difficultate noxia 56. minus teste parata & data nocentissima. 53
Mercurius diaphoreticus singularis. 63
 - *dulcis* tuitissimum salivans 289. sed minus tutum laxans 288. specificum in contumacibus intermittentibus 283. non cum salibus miscendus. 288
Mesenteria febris distinguenda a malignis 19. ejus signa ib.
Mesenterium scirrhis tumoribus afficitur 82. abscessus patitur 76. scirrhus ejus differt a graviditate, mola, hydropse 82. ex ejus induratione atrophia ib. abscessus in eo contenti signa. 76.
Misericordia ratione caussarum distinguendus 23. spasmis debetur 34. differt a stillicidio ex præputio 23. quandoque ex velle venis 158. renum hæmorrhoides recte dicitur 23. suisibus familiaris 108. ex hepatis & lienis vicio 67. ex mensium suppressione 104. emansione 105 hæmorrhoidum suppressione 107. maxime in senibus 108. quandoque menstrualis 104. & periodicus 108. qualis in eo urina 156. præsidia in eo 251. perperam adstringentibus cohibetur. 279
Millefolium specificum in calculosa renum dispositione 287. in hæmorrhoidum vitiis ibid.
Morconium retentum icterum facit. 57
Moror ejus effectus in corpore 6. lienis maxime noxam afficit 79. largum pedum sudorem facit. 165. *seq.*
 Mola

- ole unde 144. earum indicia 85. distinguendæ a scirrho mesenterii 83. a polyptosis concretione differunt 85. clysteribus ejiuntur. 115
- Morbi** omnes generis nervosi affectibus. 46. eorum quatuor genera 33. debentur spasmis *ibid.* moribus convulsivis 38. probe discernendis 16. variant ratione subjecti 4. ætatis 5. sexus 5. habitus corporis 5. climatis *ib.* vitæ generis 6. temperatum, constitutionis 92. per hæreditatem propagantur 5. vid. *hæreditarii morbi* recidunt: vide *recidivæ*, sæpe complicantur 9. affinitatem alunt 16. habent sensibiles remissiones 10. per observationes dignoscuntur 13. per se non sunt salutaræ 36. seq. sæpe sine sanguinis vitio accidunt 146. a læsione motuum in corpore pendunt 32. ex perversa medicatione 1. egri incuria *ib.* morborum reliquiis 126. ex nimis hæmorrhagiis frigidis 128. a solidorum vitio maximeque imbecillitate 116. eorum fundamentum ex mente Hippocratis 39. remittente spasmu solvuntur 36. spontaneus ipforum decursus observandus 11. remota morborum in prognosi distinguenda 196. eorum effectus medicamentis sæpe tribuitur. 238. per morbos quandoque curantur 211. iis tempestive occurrendum 219. vide *causæ morborum*.
- *acutum* eorum fundamentum. 70
- *anni temporum*. 92
- *contagiosi* optime emeticis præcinduntur 219.
- *maligni* Medicis sæpe imponunt 181. quibus signis cognoscantur *ib.* funesta in iis signa *ib.* causæ mortis in iis 196. vid. *malignitas*.
- *periculosi & feræles* a putredine interna. 72. Vide *acutis*, *chronici morbi*, *morborum origo*.
- Morbilli** distinguendi ab aliis exanthematibus 18. eorum signa *ib.* maligni & benigni *ib.* crises servant 173. oborto spasmus recedunt 35. qualis ante & post eruptionem pulsus 142. in principio requiritur emetica vel laxantia 219. reliquæ eorum gignunt morbos 127. hinc curate submovendæ 229. inprimis alvi subtractione. 127
- Morborum origo** non tam a fluidis quam solidis repetenda 145. ex observationibus addiscenda 14. cognita utilis ad præfectionem *ib.* & curationem. 32

- Morbus niger** spasmis debetur 34. quomodo succedat. *ibid*
- Mors** quid sit 187. consistit in plenaria motuum extinctione 42. ejus signa ex motibus morbosus sumenda 36. quæ sint *ibid.* 479. ejus causæ adæquate sciendæ 187. non cum morbi causâ confundendæ 198. quæ sint in genere 187. & variis morbis *ibid.* anatome deteguntur 188. quomodo præciendæ 198. ex veneno quomodo 42. ex ventriculi abscessu 79. ruptura tumoris seroso-lymphatici in pedore 77. seq. vasorum sanguineorum in capite 79. hæmorrhoidalium internorum 80. ruptura lienis 81. vide *causæ mortis*.
- Mors naturalis** unde 206. quomodo diu accendat. *ibid.*
- *subita* ex suppressis hæmorrhoidibus. 109.
- Motus** partium structura 46. sine sanguinis & liquidi nervi affluxu persistere nequeunt 32. solidorum & fluidorum æconomia natura 203. & Medicinæ principium 32. ejus causæ remotæ non referendæ ad Medicinam *ib.* quæ proximæ *ib.* solidorum. systalticus 203. fluidorum a centro ad peripheriâ salutaris 33. a peripheria ad centrum morbosus *ib.* solidorum. & fluidorum. auctor facit, & solvit morbos 205. ab iisdem pendet sanitas 32. hæsis morbi 33. quadruplici modo læduntur. *ibid.* non valide sustendi 227. sub eorum impetu non movendum. 224
- *mechanici* Medici & Medicinæ objectum 202.
- *morbis* in nervosis partibus sedem faciunt 44. eorum quatuor genera 33. per se non salutaræ 36. quo sensu salutaræ 97. in solidis, & fluidis damnosi 117. ad prognosin scitu necessarii 2. quandoque sustendi 224
- Mors corporis** ad progressivum sanguinis motum facit 69. pulsus mutat 137
- Mucilagines** ubi prosint? 250
- Mucus** salutariter excernitur 114. pellucidus per alvum secedens unde? 167
- Muria** purgat, & clysteribus admiscetur. 314.
- Musculi** abdominis abscissum quandoque continent 75. item dorso. 76

N

- Narcotica** quæ sunt, & quomodo agant. pulsum mutant 139. cur vires deiciant

rel dejectant 140
Narium hamorrhagia spasnis debetur 34.
 quibus solennis 113. salutatis excretio ib.
 suppressa nocet ib. solvit in juvenibus
 capitis morbos. 210
Nasura quid sit 32. secundum Veteres quid
 202. non est anima 203. verum Medicinæ
 principium 42. quidei tribuet Hippo-
 crates 30. sola sæpe sanar morbos 21.
 quo sensu morborum medicatrix 36.
 sæpe minus salutaris motus adonat.
 213. optimam servat medendi ratio-
 nem 204. non omnibus morbis expu-
 gnanis sufficit 212. Medici opem non
 excludit 216. obstacula removere ne-
 quit 217. succos viriosos alterare non
 potest ibid. sæpe non sufficienter emo-
 vet ibid. externis in sanando impedi-
 tur ibid. ejus pugna cum morbo quid
 36. ejus methodus in variis morbis.
 192. effectus ipsius quandoque perpe-
 ram medicamento tribuitur 239. una
 ab altera distinguenda 215. seq. quæ de-
 bilis, quæ robusta? ib.
Navigatio unde pathemata inisuetis. 48.
Nausea quibus abigenda. 275
Nephritis differe a malo ischiadico 22. quo-
 modo gignatur 34. spasms stipatur ib.
 ex mensium emanatione 105. & suppres-
 sione 110. maxime in senibus 108. ex
 atonia renum quibus tractanda 277. eam
 prohibent hæmorrhoides. 108
 — *simplex* quid 22. ejus signa & differen-
 tia. ib.
 — *calculosa* quid 22. ejus signa ib.
Nervi causa motus partium 47 consensu
 48. nullam violentiam ferre possunt ib.
 ab animi pathemate proxime afficiuntur
 ib. eorum distributio scitu necessaria.
 46. constitutio in morbis consideranda.
 20. distinctio in acutis periculosa 180. læ-
 si atrocita cienti pathemata 50. eorum
 principium commotum atrocium pathe-
 matum causa 44. præcordiales spasmi
 affecti, quæ patiunt mala 180. pneumo-
 niaci spasmo coriepti respirationem fa-
 ciunt difficilem. ib.
Nervina clysteribus quando indenda 314
Nervosa pars consensum alunt 64. nullam
 ferunt læsionem 50. a minimis molis ma-
 teriis præter naturam motus efficiunt.
 49. ab animi pathematibus proxime af-
 ficiuntur 48. in morbis potissimum pa-
 tiuntur 45. in eas maxime agunt morbo-
 rum causæ, & medicamenta. ib. eatum

constitutio ex urina patescit 158. Vid.
genus nervosum.
Nisum fixum absorbens 244. optimum
 temperans 246. præferendum acidis ib.
 quos præter effectus 62. calorem extin-
 guat 69. pulsum mutat 139. sanguinem
 fluidiorem & rubicundiorum reddit 148.
 specificum in nimis hæmorrhagiis 288.
 commode miscetur absorbentibus 234.
 quomodo sit antispasmodicum 281. cum
 camphora specificum in inflammationi-
 bus. 284.
Nonnaturales res morbos ingignunt 232. ad
 morbos sanandos egregii usus 233
Noctalgia qualis morbus. 55
Nourientia analeptica optima. 273

O.

Obesi cur difficulter sudant. 162
Oblivis obliuata a suppressis mensibus 39.
 Vid. memoria.
Observationes eorum usus amplissimus 11.
 ad perspicendas remediorum vires pro-
 ficua ib. de morborum spontaneo decur-
 su utiles. 13
Oculi defluxionem & morbos experiuntur a
 suppressa narium hæmorrhagia. 113. &
 mucæ excretionem. 114
Odontalgia quid 35. a spasmo ligamen-
 torum dentium ibid. ejus specificum.
 285.
Oder cur peteat 43. a spasmo unicæ pi-
 tuitariæ impeditur 40. erethinorum a-
 busu læditur 296. cum gustu alit sym-
 pathiam. 40
 — *suavescentium* cur hysterici infestus 40.
 unde pathemata ex eo. 49
Oedemata a spasmo diaphragmatis quomo-
 do? 39. ex scabie repulsa 96. suppressis
 mensibus 104. nimis hæmorrhagiis 120.
 asthmate lenro 124. balneis martiatis a-
 biguntur 130. nec non vaporosis. ibid.
 spasmo exterioribus inducto disparent.
 36. repulsa graviter nocent 121. suffoca-
 tionis causa. 136
Oesophagus consentit cum ventriculo.
 74.
Ophthalmia quomodo gignatur 34. spasms
 debetur. ibid.
Opata ex hæroicorum numero 227. tutius
 omittuntur 282. debilibus exitiosa 110.
 in calculo mortifera 277. nec non febre
 ardente ibid. non offerenda ubi motus
 languent ibidem 112. perperam sistuntur
 hæ-

hæmorrhagiæ 109. in colica gignunt pa-
ralyticos affectus 130. clysteribus non in-
denda 316. *Laudannum*.
Opium quibus utiliter societur. *ibid.*
Osæ dimidiam fluidi partem habent. 137
— *calcinata* absorbeant 244. diaphoretin si-
mul movent. 243
Osteocella absorbens. 244
Otalgia quid & unde 36
Quarum vasa in eo disrupta mortis causa
79.
Quorum *testa* absorbens. 244

P

Palpitatio cordis minus salutaris naturæ
motus 214. convulsionis species 41. ex
suppressis mensibus 104. causæ mortis in
eo polypus 191. qualis in ipsa pulsus 142
Panacea recte usurpatæ admittendæ. 183.
Pancreas scirrho obsidetur in hypochon-
driacis & diuturna quartana. 81
Paracentesis in hydrope saccato proficua 78
in ascite noxia. 80
Paracynanche quid sit 21. distinguenda ab
aliis faucium inflammationibus. *ibid.*
Paralysis atoniz gravior species 42. vera
vel spuria 29. utriusque signa & sedes
ib. spasms stipatur 35. quomodo gigna-
tur *ibid.* sæpe oritur a sanguinis res-
tagnatione 29. ex lochiorum suppressione
105. ex apoplexia quomodo 119. post do-
lores atroces 125. post colicam *ibid.* ce-
phalalgis & scorbuto lethali eventu
supervenit 180. facile recidivat 130. leva-
tur balneis toborantibus 282. & vaporo-
sis *ibid.* nec non clysteribus 314. causa
mortis in ea 188. *nervi optici* guræ serene
causa 42. *nerverum pneumonicorum*
catarrhi suffocativi causa. 43
— *nerverum causticorum* surditatis causa.
42.
— *nerverum lingualium* aphoniz causa.
43.
Parasynanche quid 21. distinguenda ab aliis
faucium inflammationibus. *ib.*
Paragrica quæ dicantur 280. quomodo a-
gant. *ibid.*
Parisi quid & unde 44. post colicam fre-
quens. 130
Paronychia a spasmo periostii. 37
Parotides quæ habeant signa. 77
Paroxysmi relinquit aroniam 68. recre-
menta gignit *ibid.* quid in & extra eum
agendum 10. extra eum evacuandum 68.
sub eo non movendum 225. nec venæse-
ctio instituenda 297. antea cum urina te-
nuis & post eum crassa. 157
— *febrilis* non nisi sublata causa sistendus
224.
Partes corporis conspirant 46. ex earum
structura motus, & nexu consensus.
ibid.
Partus non sine convulsione succedit 42.
sæpe post mortem matris fit 185. bal-
neis facilitatur 218. funesta gravioris si-
gna 185
Pathologia ex moruum non humorum vitio
petenda 45. nexu gaudet cum reliquis
Medicinæ partibus 2. therapiz funda-
mentum 237. minus recte plerumque
traditur 32. ejus synopsis ib. seq. igno-
rata causa ignorantiz vitium in medica-
mentiis. 236.
Petitus convehitur quandoque 41. ejus op-
pressio a spasmo tunicarum asperæ ar-
teriz 39. abscessus ejus quæ habeat signa
76. ex variolarum morbo factus ib. con-
vulsio ejus lethale signum in apoplexia.
41. pus ibi fluxum difficulter cognosci-
tur. 76.
Petes consentiunt cum ventriculo 58. ea-
rum refrigeratio cutim stringit, tormi-
na & diarrhæam movet *ibid.* quando ve-
na in iis incidenda. 300.
Podiluvium quomodo paranda 311. pulsum
mutant 140. amplissimi usus in variis
morbis 312. in primis spasms & capitis
morbis 64. laze virtutem diffundunt
312. humores derivant & fluidificant ib.
excretionem promovent. *ibid.* nocent si
mensium fluxus imminet 313. a constrin-
gentibus abstinendum. *ib.*
Pericardium sero repletum in iis, qui palpi-
tatione cordis pereunt 175
Pericranium ejus spasms efficit cephalal-
giam. 37
Peripneumonia ejus signa 18. differt a pleu-
ritide ib. quomodo gignatur 34. spas-
ms debetur ib. sæpe post colicam acci-
dit 35. ex hæmorrhoidum suppressione
106. crises servat 173. venæsectionem
poscit 300. tempestive discutienda 194.
non tam facile in empyema concedit ac
pleuritis 122. providum expectorantium
usum desiderat 269. funesta in ea signa
183. causa moris. 190
Peristilium ab ejus spasmo dolores. 36
Peristalticus motus ad sanitatem necessa-
rius. 168. quibus destruat 169. a spas-
ms.

mis investitur 37. clysteribus crebrioribus laeditur 317. labefactus quæ pariat mala 43. inversus facit iliacam. 38
Perlarum mater absorbens 244. subadstringit. 445
Perpiratio omnium excretionum præcipua 92. minor quantitate urina 150. differt a sudore 160. fordes evellit maxime perniciosas 91. & tenuissimas 160. corpus agile reddit ibid. balneis movetur 308. in morbis exploranda 8. ex quo cognoscenda ib. ab acre mutatur 8. sub quo acris statu optima 160. a frigido humido sufflaminatur 92. mutata epidemicorum morborum causa 8. sub doloribus & spasmis supprimitur. 66
 -- *suppressa* omnium maxime nociva 91. morbos gignit 8. recidivas parit 9. varia pathemata ciet 37. succos inquinat. 66.
Pessilens febris in ea crisis succedit 173
Pessilens causa mortis in ea sphacelus 194. specificum in ea 284
Petechiæ distinguendæ ab aliis exanthematibus 19. crises servant 173. qualem habeant pulsum 142. qui malus ibid. per spasmus cum damno repelluntur 35
Phagedæna ex hæmorrhoidibus suppressis 107.
Phantasia limitatam in aënis mechanicos vim habet. 203
Pharynx spasmus patitur 39. spasmus affectus coarctatus in gula sensus 21. & laxatus nimis deglutitionis vitia causa. 43
Philosophia experimentalis vires temediorum recludit. 239
Phrenitis ejus signa & differentie 21. quomodo gignatur 34. ex suppressa natium hæmorrhagia 114. jugularium sectione levatur 299. ea fit sphacelus 75. signa futura & præsentis in acutis 181
Phthisis hæreditarius morbus 28. 59. a pulmonum atonia 43. obstructis & tumefactis pulmonum vasculis 192. ex cohibito fluore albo 102. mensium suppressione & inde orta hæmoptysi 103. variolarum reliquiis 128. hæmorrhoidum suppressione 106. restagnante sanguine lochiali 105. hæmophthysi quomodo 120. funesta signa 183. suffocatione perimit 183. causa mortis in ea. 192
Physiologia quid tractet 1. cum aliis Medicinæ partibus connexionem alit. ib.
Pilula alexica præferendæ purgantibus

223. hæmorrhoides movent 107. caute tamē usurpandæ 267. intempestivus eorum usus noxius 122
 -- *balsamica* non modo intestina, sed conjunctivæ & partes afficiunt 62 post morbos adhibendæ 229. egregie effectus in uteri effectibus 62. puerperis 129. hypochondriaco malo 62
 -- *de cynoglossa* in hæmorrhagiis profunt. ibid.
 -- *de styracis* tussis egregiæ. ibid.
 -- *Vidæganis* in colica præcisa gignunt 126.
Pinguedines optima antidotos. 249
Pituitaria tunica vide tunica.
Plethora cordis. & vasorum tonum immittit 67. nociva 210. non omnium morborum causa 200. senibus etiam familiaris 294. in acutis & continuis damnoisa 295. ad vires ex atonia vasorum 43. per hæmorrhagias salutariter imminuitur 217. scarificatione absumitur. 305
Pleuritis vera a spuria distinguenda 20. utriusque signa ib. non confundenda cum pathematibus ex vermibus 87. debetur spasmis 34. inprimis pleuræ nervosæ 37. ex consolidatis antiquis ulceribus 96. hæmorrhoidum suppressione 106. crises servat 100. ardetur hæmorrhoidibus 107. gignit empyema 121. facilius concedit in empyema quam peripneumonia 112. quomodo tempestive discutienda 220. venæsectio canis in ea administranda 122. quæ in spuria quandoque in vera semper utilis 300. expectorantia caute adhibenda 269.
Plica Polonica abscissa multos morbos infert 389. specifica ipsius. 96
Podagra hæreditarium plerumque malum 112. quomodo gignatur 35. a spasmis ibid. & maxime ligamentorum 37. hinc cur gravior affligat quam æstare 91. transit in calculum 100. non semper ab hæmorrhoidum suppressione repicenda. 112. facile recidivat 124. senibus salutaris sæpe 247. ob imbecillitatem cum damno retinetur 100. scarificationem poscit 304. venæsectione intempestiva cum damno reprimatur 101. specifica in ea 285. præponere topicis tractata varia infert mala 97. retrocedens quomodo necesse 185.
Pollux nocturna ab atonia vesicularum seminalium. 44
Polypus frequentissima morborum & mortis

is causa 79. plerumque in pectoris morbis ibid. quibus familiaris 199. dextrum cut plerumque occupet cordis ventriculum 186. signa iniuncta & consummati 84. index sanguis fibrosus 148. ex suppressis mensibus 104. quomodo ascendus 199.

Polypterini hæmorrhagias causantur . 199. causa hydropis uteri 84. distinguenda a molis . 85

Potus multum facit ad sanguinis crassum 3. in morbis considerandus ibid. calidus mutat pulsum 137. frigis sanitati obest 7. mortem inducere potest 166. spirituosus largus nocet 7. item paucus . ibid. sæculentus & frigidus colicæ causa . 166

Prædici parum plerumque causas norunt 70.

Præservatio nobilissima Medicinæ pars 14. ex origine morborum discenda ibid.

Prima via earum constitutio in morbis exploranda . 11

Prognosis ex difficillimis 178. multum facit ad famam medici 13. ad finem artis proprie non spectat 177. unde petenda . 178. maxime ex observationibus 13. veteribus maxime culta 131. licet empirice 178. in ea distinguenda pathemata , tempora & corpora 189. seq. ad eam referendus in primis pulsus 130. ex sanguinis inspectione fallax 153. utilis tamen . 140.

Prolapsus ani & mori balneis reprimitur . 310.

Prostrata ulcere quandoque obsidentur 79. scierthi in iis signa & effectus . 82

Prunella quid ai. distinguenda ab aliis faucium inflammationibus . ibid.

Pueritia quid ratione structuræ peculiare habeat 5. peculiaribus morbis obnoxia . 117. quibus morbis pateat 45. qualis in ea pulsus . 138

Puerperium ad morbos disponit & cut 119. in eo utiles purgationes 128. causa sphaecelus . 198

Pulmones eorum constitutio in morbis consideranda & quomodo 9. læduntur a tussi humida diuturna 122. a reliquiis variolatum & morbillorum labem patiuntur 128. cum pleura cut in phthisi concresecant 192. sphaecelo correpti quæ habeant signa 75. atonia affecti quæ gignant mala 43. labe affecti quibus sanandi 276. quandoque inflammantur .

vid. *peripneumonia* .

Pulsus quid sit 131. causa ejus motus cordis 134. mechanice examinandus 130. experientia addiscendus 143. aliquandiu in utroque carpo tangendus ibid. horologii norma numerandus ibid. quot in minuto 136. seq. non semper unus in utroque brachio 134. ejus tantum quatuor species 130. quid ex eo cognoscendum 10. facit ad prognosin 131. ejus usum verum Veteres ignorarunt . ibid. Hippocrates parum exposuit ibid. Galenus nimis multas ejus finxit species ib. immutatur a variis causis 137. variat pro tempore febris 142. variat in capitis morbis . ibid. in catarrhis vesperi ingravescit . ibid. spasmo remittente mollescit . 143.

Pulsus aequalis non pertinet ad essentiam pulsum . 132

— *amplus* non differt a magno 133

— *celer* quid 132. respectu cordis 135

— *& frequens* separatim percipi nequit 133 seq. sine errore unus pro altero ponitur ib. febri jungitur . 141

— *ac durus* in morbis spasmodicis ac doloribus . 143

— *parvus ac durus* sanguis si exitum molitur . ib.

— *concisus* idem cum parvo . 132

— *contractus* & parvus idem . ibid.

Pulsus convulsivus dicitur respectu arteriæ 152. & morientium est . ibid.

— *debilis* quid 132. ratione cordis 135. in sue venerea , scotbuto , hydropé . 89.

— *dicrotus* inæqualis speciei . 132

— *durus & mollis* dicitur respectu arteriæ . 134.

— *& frequens* in febribus 142. inflammationibus , & doloribus ibid. plerumque in apoplexia , & epilepsia . 143.

— *formicans* inæqualis speciei 132

— *fortis* idem ac magnus . 132. seq.

— *frequent* non est de essentia pulsum 132. febrium pathognomonicum sinum 140. non tamen semper 141. seq. ante eruptionem exanthematum 142. & sub febre secundaria . ib.

— *parvus debilis & contractus* in malignis & petechialibus 142

— *languidus & inæqualis* in pectoris morbis . 143

bu-

humilis idem cum parvo 132
impetuosus & magnus unus 132. seq.
inaequalis non de essentia pulsuum ibid.
 varix ejus species 133. jungitur plerumq;
 convulsivo. 134
Pulsus intermittens quando, & cur sit 135.
 jungitur plerumque convulsivo 135. si ne
 exitio quandoque observatur 140. a lum-
 brico ibid.
latus idem ac parvus 132
magnus quid ib. respectu cordis 135
& celer in synocha 142
& creber in hamorrhagiis 143
manifestus idem ac magnus 132
myurus inqualis species 133
obscurus & parvus idem 132
parvus quid 135. respectu cordis 132
& celer in continuis malis 143
& frequens in dysenteria 92
frequent & debilis in continuis pessimus
 142
durus frequens & inaequalis in principio
 quartanæ 142
profundus non differt a parvo 132
rarus non de essentia pulsuum ib.
& mollis in lethargo & sopore 143
robustus idem ac magnus 132
seratus inaequalis species 133
tardus quid 150. respectu cordis
 135.
tremulus inaequalis species 133
vacuus idem cum parvo 132
valens & magnus unus 132
vehemens quid 132. ratione cordis
 136. in statu tertianæ, & ardeutis
 142.
vermicularis inaequalis species 133
Purgens quæ sint 256. quomodo agant
 ibid. intestinorum consensum restantur
 59. pulsuum mutant 139. ubi proficua.
 237. robustioribus danda ibid. in fluo-
 re albo & gonorrhœa usurpanda 222.
 balneis utiliter sociantur 308. postpo-
 nenda laxantibus 223. virulento ele-
 mento imbuta 256. veneni æmula fa-
 culæ pollent ibidem, nocentissima.
 ibid. nocent post iram 55. in dentiti-
 onis difficultate 56. 237. in morbis ex-
 anthematis 58. in ecetathis 102. in
 febribus 219. senibus 231. sanguinis
 circulum per vasa abdominis turbant.
 212. gignant iterum 57. alvum cur-
 posæ adstringant 167. recidivas pro-
 rant 130. tempore paroxysmi inter-
 mittentium non danda 226. clysteri-
 Tom. III.

bus non indenda 317. quando necant
 quæ habeant signa 182. Vide *excremen-
 ta alvi*.
Purgatio naturæ opus juvat 217. necessa-
 ria post morbos 127. puerperis prodest
 128. necessaria in febribus 129. & ante
 balneorum usum 311. neglecta purpu-
 ræ causa in puerperis 129. nec non in a-
 cutis. ibid.
Purpura distinguenda ab aliis exanthema-
 tibus 19. puerperis cur familiaris 129.
 ex cohibito fluore albo 102. suppressis
 lochiis 106. crises non servat 175. acutis
 ob purgationem neglectam accedit 123.
 lethali eventu 182. in principio ad-
 misit emetica vel laxantia 219. sudore
 largus in ea unde 164. per spasmodum cum
 damno recedit. 36
scorbatica efflorescens solvit hypochon-
 driacum malum. 212
Pus post inflammationem ex sanguine
 quandoque generatur 75. effusi in rho-
 racem signa 75. seq.
Purpura gradu differt 72. viribus insensa
 ibid. malignitatis causa. ibid.
Pylorus sciztho quandoque afficitur 81

Q

Quartana febris ejus differentie signa 20.
 ex scabie retro pulsa 96. laxantia & e-
 metica in principio fert 259. balnei le-
 vatur 308. specificum in ea 194. perpe-
 ram tractatur adstringentibus 123. in
 diuturna pancreas induratum 81. in
 principio qualis pulsus 142. convulsio-
 nes & epilepsias quandoque solvit 211.
 quomodo gignat hydropem 133
Quies mutat pulsus ibid.
Quotidiana intermittens ejus signa 19.
 differt a continua & tertiana duplici
 ibid.

R

Recidive eorum indicia 129. quomodo
 excludantur 9. per spasmos inducun-
 tur 38. ex suppressis criticis evacua-
 tionibus 9. palliativa cura ibidem, æ-
 gri incuria ibidem, reliquis morbo-
 rum 127. intermittentium cur-
 ram frequentes 130. quomodo arcendæ.
 ibidem.
Reliquæ morborum novos pariant morbos
 126.

Helicæ febris differt a lenta. 19. signa. *ibid.*
 nunquam salutaris. 235. a viscerum cor-
 ruptione fovetur 72. ex suppressione
 mensium 104. lechiorum. 106. nimis hæ-
 morrhagiis. 118. sudor largus in ea. unde
 164. causa mortis abscessus ruptus 194
Helleborus specificum Veteribus ad insa-
 niam. 285
 — *albus* Veterum emeticum. 251
Hemicrania quid 37. a spasmo pericranii
ibid. ex mensium suppressione 104. puer-
 perio 119. facile recidivat. 130
Hemiplexia quid & unde. 44. pulsus in ipsa
 161. causa mortis 188
Hepar non alit coalescens cum nervosis
 partibus 61. ad aroniam cur proxiim 43
 atonia laborans multorum morborum
 causa 67. scirrhus facile afficitur 83. ma-
 xime affectum in scorbuto 156. ejus con-
 stitutio in morbis consideranda 9. unde
 cognoscenda 9. lethalis corruptionis
 signa. 184. labe affectum quibus curan-
 dum 277
Hepaticæ duffus spasmo concepti diarrhæas
 & vomitus biliolos causantur 38
Hepaticis distinguenda ab inflammatione
 ventriculi 21. ejus signa 21. differen-
 tiz 22
Herpes sæpe annuus & salutaris 115
Hippocrates optima jecit artis fundamenta
 a posteris relicta 21. peritiora & præstan-
 tiora ipsius dogmata 39. parum meminit
 signorum ex pulsibus. 130
Hirudines evacuationi sanguinis. serviunt
 306 non plus quam scarificatio. vel ven-
 neseccio præstant *ibid.*
Historia morborum therapie fundamentum
 2. perfectæ sint 3. quomodo consignan-
 dæ 4. ad hypotheses examinandas uti-
 les 13
Homo triplices in eo actus obvi 203
Humores proportio elementorum 6. quan-
 titas 131. non extrahantur inter fibra-
 rum interstitia. *ibid.* cur tam varii ex
 sanguine 161. ad crassum eorum. facit po-
 tus 6
Hungarica febris a qualitate coeli derivan-
 da 93
Hydrocephalus quid sit 80
Hydrophobia ejus signa 21. differt a phreni-
 tide *ibid.*
Hydrops a scirrhus. mesenterii. distinquen-
 dus 82. ex atonia hepatis & lienis. 43.
 suppressis mensibus 104. hæmorrhoidi-
 bus. 108. uteri vitio 195. quartana 123.

nimis hæmorrhagiis 118. obstructione
 hepatis, viscerum & glandularum 194.
 pulsus in eo. qualis 143. funesta. ipsius
 signa 184. causa mortis 193. facile reci-
 divat 139. ex asthma quomodo gi-
 gnatur 39. intra duplicatam petito-
 nzi paracanthesis admittit 78. diure-
 tici optime arceantur 265. ejus specifi-
 ca. 287. uteri. fluxu sponte sanatus
 212.
 — *subitaneus* ex ruptis tumoribus serosis
 in abdomine 72
 — *saccatus* lapsu curatus. 213
 — *uteri* a. polypis. 84. ex suppressione
 mensium 104
 — *pestifer* ejus signa 89. quibus solennia
ibid. a. polypis vasorum pulmonalium
 84. ex suppressis mensibus 104. asthma
 quomodo 123. uteri. fluxu sponte quan-
 doque sanatur 212
Hypochondriacum malum affectio. generis
 nervosi 62. imbecillis nature proles 111.
 in quo consistat 122. differt a colicis. si-
 gna 78. radix & sedes in ventriculo 33. va-
 riaz causæ 111. causa prima non crudi-
 tates 62. nec unica stagnatio sanguinis
 in vasis venæ portæ 110. ex animi parhe-
 mate 54. potu. frigido postprand 55. san-
 guinis. stagnatione in visceribus abdo-
 minis 62. ex hæmorrhoidibus suppressio
 106. male curata intermitteat 122. alvi
 fluxu 123. hæreditarius morbus 117.
 fluentibus hæmorrhoidibus affligit. 117.
 hæmorrhoidalia molimina gignit. *ibid.*
 hæmorrhoidibus levatur. 108. efflores-
 cente purpura quandoque discedit 211.
 clysteribus levatur 314. cura fundamen-
 talis 62. specifica in eo præsidia 285
Hypothesis multæ in Medicina 13. quomo-
 do examinandæ *ibid.*
Hysterica cur suaveolentia ferro. aequant
 40. apoplexia. leviori cortipuntur 28
Hysterica passio hæreditarius morbus. 118.
 sedes non in utero, sed ventriculo & in-
 testinis. 60. non a nervis sed sanguine
 retinante derivanda *ibid.* ex puerperio
 119. atonia uteri 44. mensium defectu 60.
 cohibito fluore alio 102. retinante
 sanguine lochiali 109. levatur laudatio
 62. clysteribus 314. quæ præsent 61. spe-
 cificæ in ea. 285

I.

Talappa resina cur atrociam ciet pathemata .

59

Icterus flavus & niger unde t. 56. a spafmo o-

rifici choledochi 38. ex atonia hepatis

48. spafmo ventriculi 56. purgantibus ib.

venenis ib. vomitoris ib. retento mœco-

nio ib. colica ib. ita ib. febre intermit-

te ib. retentis menfibus 104. calculosis cur

familiaris 103. & colicis 126. qualis in co-

urina 136. Specifica in eo . 197

Leon intestinorum tenuiffimum & maxime

fenfibile 38. lumbricorum nidus 90. spaf-

mo affectum cauffa doloris . circa umbili-

cum 36. & colicæ bilio . 38

Liaca paffo ab inverfo periftaltico motu 37.

functæ signa 183. Sphacelo intestinorum.

necat . 192.

Imbecillitas ex præcipuis morborum cauffis

116. feq. quibus inducatur 118. quibus

cognoscatur fignis 116. feq. 23. 2. ipfius spe-

cificæ . 205

Impetigo annua & fæpe falutaris . 115*Imperceptio* cum malum in cachecticis & hy-

dropicis fignum . 74

Incidentia materiæ correctioni dicata 245.

quæ fint 246. quomodo agant ibid. & u-

furpanda 247. feq. aperiant 248. fangui-

nem depurant . ibid.

Indurfa in morbis exanthematicis non mu-

randa 58. a fudore tinguntur 161. ponde-

dere increfcant . 160

Infantes cur difficulter fudent . 162*Infantum* morbi quæ fignæ eorum 186. quæ

cauffa mortis 198

Inflammationes quomodo gignantur . 34. a-

liis fuperveniunt lethales 48. in fphacelû

demum concedunt 182. periculofiores

quandoq; fignifiora adfunt fymptomata

181. in principio quomodo difcutiendæ .

193. venæfectione difcutiuntur 207. feq.

nimia exacerbantur ib. earû Specifica 284.

Inflammatoria febres earum fpecies & diffe-

rentiæ 21. feq. ex fuppreffis menfibus 106.

recidivant quandoque 130. medicatio ear-

um 207. qualis in iis pulfus 142. nimia

venæfectione exacerbantur 207. feq. iufta

levantur . 301

Infufa vinofa laxantia præferenda purgan-

tibus 223. diaphoretica præferenda fudori-

feris ibid. theiformia potiffimam faculta-

tem aque debent . 307

Infantia hereditaria malum 1. 2. perperam

promiffæ ab hæmorrhoid. repetitur ibid.

ex fuppreffa narium hæmorrhagia 114. fa-

cile recidivat 130. hæmorrhoid. folvitur &

præfervatur 106. feq. balneis levatur 287. feq.

fcarificationem melius quam venæfectionem

fert 304. Specifica ipfius . 285

Intermittens febris micta prima in regione

54. unde fymptomata eorum ibid. quan-

doque falutares 209. quandoque extiofa

212. feq. eriam habet crifin 176. recta cam

fanandi ratio 209. & finiftra ibid. optime

præfcinditur emetico vel laxante 219.

Specifica ad curandam ipfam 283. male

curata gignit hypochondriacum malum

122. feq. conrumacia fomes 209. & fpecifi-

cæ . 283

Intestina in morbis maxime debilitant 118.

confenfum alunt cum ventriculo 56. feq.

cum membranis univerfi corporis 59. flat-

ibus obfidentur & diftenduntur 88. feq.

coalefcunt quandoq; in colica convulfiva

197. feq. quid patiantur a fpaſmo 37. in

flammatione & fphacelo . corripuntur in

dysenteria 74. eorum atonia quæ pariat

mala 43. quibus fubmoveatur 277. ab

eorum convulfiva affectione diarrhœa &

cholera 104. erofionis eorum quæ fignæ

89. labem patiuntur male tractatis alvi

fluxibus 123. fpaſmus eorum quibus tol-

landus 250. eorum inflatio quibus cu-

randa 275. languentia clyfteribus fir-

mantur 313. erofa clyfteribus confoli-

dantur . 316

— *crassa* afcaridum habitaculum . 8— *tenuium* inflammationis & fphaceli fi-

gna . 73

— *reſum* a dolore . ex hæmorrhoidibus

fphacelum patitur . ibid

Iperacantha fpecificum in dysenteria 287

ejus virtus & prærogativa . 252

Ira effectus ipfius in corpus 6. facit ad

colicam . 27. ad cardialgiam 65. ad vo-

mitum ibid. ad icterum 57. feq. ad febres

biliofas cholericas 65. atrociam ciet pa-

themata fnt calculus in cyſtide fellæ .

87. quæ poſt eam damnofa t quæ utilia .

221. feq.

Iſchiadicum malum quomodo gignatur . 35.

a fpaſmis oritur 37. fpaſmis fipatur 35.

ex menſium emanſione 105. differt a ne-

phritide 22. ex hæmorrhoidum fuppreſ-

ſione venæfectione levatur 110. repulſum

noctet 99. feq. quando in eo venæfectione in-

ſtituenda . 301

Angularis vena in melancholia . & phreniti-

de incidenda . 299.

Juvenis quid peculiate servet. 5. quibus morbis pateat 45. qualis in ea pulsus 138

L

Labor mutat pulsam 138. Vid. *morus*.

Lac optima antidotus 249. a spasms secretion ipsius interceptur 38. quando in status explicetur 25. coactum venenum emulatur 53. inflationem ventriculi caussatur 25. vid. *serum lactis asinum* specificum in podag. 285. in phthisi 286. ad longævitatē, 289.

Lactiferi ductus spasmos patiuntur 38. spasmo affecti interceptæ lactis secretionis & tumorum caussa. ibid. seq.

Læsiones externæ lethales quæ. sint 200. earum ratio intercepta humorum circulo. ibid.

Larynx spasmo afficitur 39. spasmo affecta contractivi in gula sensus caussa. ibid. irritata facit tussim ferinam. 40

Laudanum liquidum prodest in dysenteria & hysterica passione 62. in febre ardente mortiferum. 227

Laxantia Veteribus minus cognita 254. qualis sint 253. quomodo agant. 254. præfenda purgantibus 223. pro ratione circulantiarum in usum vocanda 254. profunt in principio morborum 221. ad præcavendum abortum utilia 225. in tussi cur conductant. 59

Lenta febris signa ipsius 20. differt ab hectica ibid. ex debilitate ventriculi 68. nimis hæmorrhagius 118. alvi fluxibus male tractatis 123. suppressis criticis evacuationib. 175. quomodo statim præcindenda 219. quæ in ea profint 249. caussa mortis in ea 194.

Letargus ex erysipelate repulso 98. cephalalgia & scorbuto lethali supervenit eventus. 128. qualis in eo pulsus 142. caussa mortis in eo. 188

Lien melancholiæ sedes 79. non alie consensus cum nervosis partibus 61. labem contrahit ex tristitia 79. atonia laborans quos pariat morbos 44. ei perpetam dolores in latere sinistro tribuuntur 62. post vomitum truentum magnus & putridus reperitur 105. scirrhi in eo signa 83. labe affectus quibus tractandus 276. ejus rupturæ lethalis. 80

Lypthymia atoniæ debetur 42. ex imbecillitatis systole ibid. ex præpostero topicorum usu in morbis articulatorum 99. testagante sanguine lechiali. 105

Lera multum faciunt ad morbos endemios & epidemios 15. altiora salubria 6. humilia insalubria. ibid.

Lechia nonnisi præmissis præparantibus pelenda 220. a spasms suppressuntur 35. suppressis eorum. cur adeo noxia ib. quæ inducat parhemata. 205

Longævitas ejus præsidia. 289.

Lumbri in ileo hospitantur 87. eorum indicia ib. pulsam reddunt inæqualem 140. pleuritidem meriuntur. 87.

Lunæ & venæsectionem nihil facit. um scorbuticis. 285.

Luna ad venæsectionem nihil facit. 292.

Lycopodium specific. in plica Polonica. 289.

Lympha spissa quibus dissolvatur. 249.

M.

Magnesia absorbens 244. hypochondriaciis utilis 245. ab acido soluta fit laxans. ib.

Maligna febris differt ab aliis 18. xxi. ejus quæ ibid. qualis in ea pulsus 142. qui malus ibid. in ea sanguis quandoque roseus 147. sudor largus in ea malus 164. caussa mortis sphacelus. 197

Malignitas viribus insensibilissima 73. ejus signa 10. non ex fide terminis expennenda 73. ejus caussa putredo 74. Medicis sæpe imponit. 92

Mamma spasnum experiuntur 38. tumores & abscessus earum unde. ibid.

Mandibula piscium, absorbens. 244.

Mania hæreditarius morbus 118. seq. a spasmo duræ matris 39. ejus signa & differentia 21. ex mensium 104. & hæmorrhoidum suppressione 108. cur sæpe melancholiam excipiat. 40

Manna triplici gaudet virtute. 234

Marasmus senibus familiaris 74. seq. ejus signa ib. viscerum corruptione nititur. ib.

Mars limatus absorbens 244. adstringit simul 245. ejus liquor compescit hæmorrhagias 62. ejus crocus sistit febriles motus. ibid.

Martialis pulsus mutant 121. balnearum usu secundantur. 309

Massigatoria ad arcondum miasma profunt. 270.

Materia morbi indoles ipsius ex quo cognoscenda 10. costæ signa. 16

Mechanismus corporis ejus. notitia fundamentum therapia. 2

Medendi leges. 218

— *methodus* a medico tenenda 2. consistit in.

in remotione causarum 204. naturę optima 203. *seq.* quę sit in variis morbis 206. in specificorum usu servanda. 291

Medicamenta scienda 241. quę fortia 234. quę lenia ibid. pauca & selecta usurpanda 231. *seq.* aliquamdiu continuanda 235 in eorum usu corpora distinguenda 230. Veterum annalia 235. in eorum usu corpora distinguenda 230. vires eorum non una experientia cognoscuntur ib. ægrius a priori perspicuntur 239. a Medico noscendę 236. plerumque tamen ignorantur ib. multitudo eorum causę ignorantur vitium 237. *seq.* arti noxia. ib. Vid. *remedia.*

Meditatio in morbis tempestive instituenda 219. imprudens morborum causa. 10

Medicina ob circumstantiarum differentiam difficilis 237. iudicio opus habet. 144. naturam juvat 216. naturę errores emendat 218. *seq.* hypochondriis & opinionibus resecta 13. ejus partes sunt connectę 1. ejus objectum actus in corpore mechanici 203. ejus principium non est anima 32. neque spiritus ib. sed natura corporis 4b. teste ab Hippocrate definita 30. ejus incrementa quę retardant 31. rationalis quomodo difficit ab empirica. 237

Medicus ejus officium 207. naturam imitari debet ib. 215. naturas distinguit 144. ib. iudicio excellat 2. in morborum principio & fine opem ferat 127. in semioris caute se gerat 144. felix qui 216. prognostic estimationem consequitur. 16

Meditationes nimix sanitatem labefaciunt 7. corpus debilitant 17. ad capitis morbos disponunt. 76

Medulla spinalis ejus membranę sedes morbum febrilium 14. convulsionem ibid. resolutę cum nervis suis hemiplexię & paretis causa. 44

Melancholia hæreditarius morbus 117. ejus differentię & signa 21. a spasmo durę matris quomodo 40. ex oppressis mensibus 104. hæmorrhoidibus 107. ex puerperio 112. cur in maniam transcat sæpe 114.

Membrana spāsi patet 33. nervosę spāsmo affectę dolorem faciunt 36. capitis externę cephalalgia sedes ib. cerebri spāsmo affectę melancholię, manię, apoplexię & epilepsię sedes 41. sensorii auditus susurrum & tinnitum gignant 40. spinalis medullę sedes motuum febrilium ib. convulsionum. 41

Memoria abolita ob atoniam durę matris

42. ex apoplexia quomodo. 159

Menses salutaris excretio 8. spāsmis debentur 33. eorum mechanica ratio 103. solvunt convulsiones 210. quomodo morandi & quibus 265. nonnisi premisssis præparantibus pellendi 210. specifica in vitiis eorum 287. a spāsmis supprimuntur 36. eorum loco fluunt sæpe hæmorrhoides. 105.

Suppressi nocent 9. & cur 35. quę symptomata inducant ib. per incongrua loca exitum moliantur 103. causantur vomitum & mictum cruentum ib. foribus revocantur 311. & clysteribus 314. quomodo venæsectionem ferant. 300

Menses nimium fluentes unde 44. ex hepatis & lienis vitio 65. venæsectione in brachio sistuntur. 300

Emanantes ob ætatis rationem, quę gignant mala. 105

Mensa cur optima in vomitu. 249

Mercurialia quomodo salivationem movent 272. secundantur balnei 309. in detrititionis difficultate noxia 56. minus recte parata & data nocentissima. 53

Mercurius diaphoreticus singularis. 63

Dulcis tutilissimus salivans 289. sed minus tutum laxans 288. specificum in contumacibus intermittentibus 283. non cum salibus miscendus. 288

Enteritis febris distinguenda a malignis 19. ejus signa ib.

Enteritium scitirrhosis tumoribus afficitur 82. abscessus patitur 76. scitirrhosis ejus differt a graviditate, mola, hydrope 82. ex ejus induratione atrophia ib. abscessus in eo contenti signa. 76.

Mictus cruentus ratione causarum distinguendus 23. spāsmis debetur 34. differt a stillicidio ex præputio 23. quandoque ex vesicę venis 158. tenum hæmorrhoides recte dicitur 23. subius familiaris 108. ex hepatis & lienis vitio 67. ex mensium suppressione 104. emanatione 105. hæmorrhoidum suppressione 107. maxime in senibus 108. quandoque menstrualis 104. & periodicus 108. qualis in eo urina 56. præsidia in eo 251. perperam adstringentibus cohibetur. 279

Millefolium specificum in calculosa renum dispositione 287. in hæmorrhoidum vitiis ibid.

Mercurium retentum icterum facit. 57

Moror ejus effectus in corpore 6. lienis maxime noxam afficit 79. largum pedum sudorem facit. 161. *seq.*

- ole unde 144. eorum indicia 85. distinguenda a scirrho mesenterii 83. a polyposis concretis differunt 85. clysteribus eiciuntur. 115
- Morbi** omnes generis nervosi affectibus. 46. eorum quatuor genera 33. debentur spasmis *ibid.* moribus convulsivis 38. probe dissectendis 16. variant ratione subjecti 4. ætatis 5. sexus 5. habitus corporis 5. climatis *ib.* vitæ generis 6. temperatum, constitutionis 92. per hæreditatem propagantur 5. vid. *hæreditarii morbi* recidivans: vide *recidivæ*, sæpe complicantur 9. affinitatem alunt 16. habent sensibiles remissiones 10. per observationes dignoscuntur 13. per se non sunt salutares 36. *seq.* sæpe sine sanguinis vitio accidunt 146. a læsione motuum in corpore pendunt 32. ex perversa medicatione 8. egri incuria *ib.* morborum reliquiis 126. ex nimis hæmorrhagiis frigidis 118. a solidorum vitio maximeque imbecillitate 116. eorum fundamentum ex mente Hippocratis 39. remittente spasmo solvuntur 36. spontaneus ipsorum decursus observandus et tempora morborum in prognosi distinguenda 196. eorum effectus medicamentis sæpe tribuitur. 238. per morbos quandoque curantur 211. iis tempestive occurrendum 219. vide *causæ morborum*.
- *ætatium* eorum fundamentum. 70
- *anni temporum*. 92
- *contagiosi* optime emeticis præscinduntur 219.
- *maligni* Medicis sæpe imponunt 181. quibus signis cognoscantur *ib.* funesta in iis signa *ib.* causa mortis in iis 196. vid. *malignitas*.
- *periculosi & ferales* a putredine interna. 72. Vide *acuti, chronici morbi, morborum origo*.
- Morbilli** distinguendi ab aliis exanthematicis 18. eorum signa *ib.* maligni & benigni *ib.* crises servant 473. oborto spasmo recedunt 35. qualis ante & post eruptionem pulsus 142. in principio requirunt emetica vel laxantia 219. reliquæ eorum gignunt morbos 127. hinc curate submovenda 229. inprimis alvi subductione. 127
- Morborum origo** non tam a fluidis quam solidis repetenda 145. ex observationibus addiscenda 14. cognita utilis ad præfectionem *ib.* & curationem. 12

- Morbus niger** spasmis debetur 34. quomodo succedat. *ibid*
- Mors** quid sit 187. consistit in plenaria motuum extinctione 42. ejus signa ex moribus morbosus fumenda 36. quæ sint *ibid.* 479. ejus causæ æquæ sciendæ 187. non cum morbi causa confundendæ 198. quæ sint in genere 187. & variis morbis *ibid.* anatomicè deteguntur 188. quomodo præsciendæ 198. ex veneno quomodo 42. ex ventriculi abscessu 79. præputra tumoris seroso-lymphatici in pectore 77. *seq.* vasorum sanguineorum in capite 79. hæmorrhoidalium internorum 80. ruptura lienis 81. vide *causæ mortis*.
- Mors naturalis** unde 206. quomodo diu ascendat. *ibid.*
- *subita* ex suppressis hæmorrhoidibus. 109.
- Motus** ex partium structura 46. sine sanguinis & liquidi nervi affluxu persistere nequeunt 32. solidorum & fluidorum æconomia natura 203. & Medicinæ principium 32. ejus causæ remotæ non referendæ ad Medicinam *ib.* quæ proximæ *ib.* solidorum. systalticus 203. fluidorum a centro ad peripheriâ salutaris 33. a peripheriâ ad centrum morbosus *ib.* solidorum. & fluidorum. auctor facit, & solvit morbos 203. ab iisdem pendet sanitas 32. his morbi 33. quadruplici modo læduntur. *ibid.* non valde sustendi 227. sub eorum impetu non movendum. 224
- *mechanici* Medici & Medicinæ objectum 203.
- *morbi* in nervosis partibus sedem fiunt 45. eorum quatuor genera 33. per se non salutares 36. quo sensu salutares 17. in solidis, & fluidis damnosi 117. ad prognosin seitu necessarii 2. quandoque sustendi 224
- Mors corporis** ad progressivum sanguinis motum facit 89. pulsus mutat 137
- Mucilagines** ubi prosint? 250
- Mucus** salutariter excernitur 114. pellucidus per alvum secedens unde? 167
- Muria** purgat, & clysteribus admiscetur. 314.
- Musculi** abdominis abscellum quandoque continent 75. item dorso. 76

N

- Narcotica** quæ sunt, & quomodo agant. pulsus mutant 139. cur vires deiciant

res deſiſcant 140
Nerium hæmorrhagia ſpaſmis debetur 34
 quibus ſolennis 153. ſalutaris excretio ib.
 ſuppreſſa nocet ib. ſolvit in juvenibus
 capitis morbos. 210
Natura quid ſit 31. ſecundum Veteres quid
 202. non eſt anima 203. verum Medicinæ
 principium 42. quid ei tribuerit Hippo-
 crates 30. ſola ſæpe ſanar morbos 11.
 quo ſenſu morborum medicatrix 36.
 ſæpe minus ſalutaris motus adornat .
 213. optimam ſervat medendi ratio-
 nem 204. non omnibus morbis expu-
 gnanſis ſufficit 212. Medici opem non
 excludit 216. obſtacula removere ne-
 quit 217. ſuccos vitioſos alterare non
 poteſt ibid. ſæpe non ſufficienter emo-
 ver ibid. externis in ſanando impedi-
 tur ibid. ejus pugna cum morbo quid
 36. ejus methodus in variis morbis .
 192. effectus ipſius quandoque perpe-
 ram medicamento tribuitur 239. una
 ab altera diſtinguenda 215. ſeq. quæ de-
 bilis, quæ robuſta ? ib.
Navigatio unde pathemata inſueſcit. 48.
Nauſea quibus abigenda . 275
Nephritis diſſert a malo iſchiadico 22. quo-
 modo gignatur 34. ſpaſmis ſtipatur ib.
 ex menſium emanſione 105. & ſuppreſ-
 ſione 170. maxime in ſenibus 108. ex
 atonia renum quibus traſtanda 277. eam
 prohibent hæmorrhoides. 108
 — *ſimplex* quid 22. ejus ſigna & differen-
 tiæ. ib.
 — *calculoſa* quid 22. ejus ſigna ib.
Nervi cauſa motus partium 47. conſenſus
 48. nullam violentiam ferre poſſunt ib.
 ab animi pathemate proxime afficiuntur
 ib. eorum diſtributio ſcitu neceſſaria .
 46. conſtitutio in morbis conſideranda .
 20. diſtenſio in acutis periculofa 180. læſi
 atrocia ciēnt pathemata 50. eorum
 principium commotum atrocium pathem-
 atum cauſa 44. præcordiales ſpaſmi
 affecti, quæ pariunt mala 180. pneumo-
 niaci ſpaſmo correpti reſpirationem fa-
 ciunt difficilem. ib.
Nervina clyſteribus quando indenda 314
Nervoſa parter conſenſum alunt 64. nullam
 ferunt læſionem 50. a minime molis ma-
 teriis præter naturam motus efficiunt .
 49. ab animi pathematibus proxime af-
 ficiuntur 48. in morbis poſſiſſimum pa-
 ciuntur 45. in eas maxime agunt morbo-
 rum cauſæ, & medicamenta ib. earum

conſtitutio ex urina pateſcit 158. Vid.
genus nervuſum.
Nitram fixum abſorbens 244. optimum
 temperans 246. præferendum acidis ib.
 quos præſter effectus 62. calorem extrin-
 guat 69. pulſum murat 139. ſanguinem
 fluidiorem & rubicundiorem reddit 148.
 ſpecificum in nimis hæmorrhagiis 288.
 commode miſcerit abſorbentibus 234.
 quomodo ſit antiſpaſmodicum 281. cum
 camphora ſpecificum in inflammationi-
 bus. 284
Nonnaturales rei morbos ingignunt 232. ad
 morbos ſanandos egregii uſus 233
Noſtalgia qualis morbus. 55
Nutriens analeptica optima. 273

O.

Obſi cur difficulter ſudent . 162
Oblivio obſtinata a ſuppreſſis menſibus 39.
 Vid. *memoria*.
Obſervationes eorum uſus ampliſſimus 11.
 ad perſpiciendas remediotorum vires
 proficua ib. de morborum ſpontaneo decur-
 ſu utiles. 13
Oculi deſluxione & morbos expetiuntur a
 ſuppreſſa naturæ hæmorrhagia. 113. &
 mucæ excretionē. 114
Odontalgia quid 36. a ſpaſmo ligamen-
 torum dentium ibid. ejus ſpecificum .
 285.
Oder cur peteat 43. a ſpaſmo unicæ pi-
 tuitariæ impeditur 40. erethinorum a-
 buſu læditur 296. cum guſtu alie ſym-
 pathiam . 40
 — *ſua voſentium* cur hyſtericis inſeſtus 40.
 unde pathemata ex eo. 49
Oedemata a ſpaſmo diaphragmatis quomo-
 do ? 39. ex ſcabie repulſa 96. ſuppreſſis
 menſibus 104. nimis hæmorrhagiis 120.
 aſthmate lento 124. balneis martiatis a-
 biguntur 130. nec non vaporolis. ibid.
 ſpaſmo exterioribus inducto diſparent .
 36. repulſa graviter nocent 221. ſuffoca-
 tionis cauſa. 36
Oſophagus conſentit cum ventriculo .
 74.
Ophthalmia quomodo gignatur 34. ſpaſmis
 debetur. ibid.
Opiata ex heroicorum numero 227. tutius
 omittuntur 282. debilibus exitioſa 110.
 in calculo mortifera 277. nec non ſeſce
 ardente ibid. non offerenda ubi morus
 languent ibidem ita perperam ſiſtuntur
 hæ.

hæmorrhagiæ 109. in colica gignunt 225.
 ralyticos affectus 130. clysteribus non in-
 denda 316. *Landannum*.
Opium quibus utiliter societur. *ibid.*
Opæ dimidium fluidi pariem habent. 137
 -- *calcinata* absorbent 244. diaphoresin si-
 mul movent. 243
Osteocolla absorbens. 244
Oralgia quid & unde 36
Quædam vasa in eo disrupta mortis causa
 79.
Quorum *testa* absorbens. 244

P

Palpitationis cordis minus salutaris naturæ
 motus 214. convulsionis species 41. ex
 suppressis mensibus 104. causæ mortis in
 eo polypus 191. qualis in ipsa pulsus 142
Panacea recte usurpatæ admittendæ. 183.
Pancreas scirrho obsidetur in hypocho-
 ndiacis & diuturna quartana. 81
Paracentesis in hydropse saccato proficua 78
 in ascite noxia. 80
Paracynanche quid sit 21. distinguenda ab
 aliis faucium inflammationibus. *ibid.*
Paralysis atoniæ gravior species 42. vera
 vel spuria 29. utriusque signa & sedes
 ib. spasms stipatur 35. quomodo gignat
ibid. sæpe oritur a sanguinis testa-
 gnatione 29. ex lochiorum suppressione
 105. ex apoplexia quomodo 119. post do-
 lores atroces 125. post colicam *ibid.* ce-
 phalalgis & scorbuto lethali eventu su-
 pervenit 180. facile recidivat 130. leva-
 tur balneis roborantibus 282. & vaporosi-
 sis *ibid.* nec non clysteribus 314. causa
 mortis in ea 188. *nervi epici* guttæ serene
 causæ 42. *nervorum pneumonicorum*
 catarrhi suffocativi causæ. 43
 -- *nervorum canaliculorum* surditatis causæ.
 42.
 -- *nervorum lingualium* aphonie causæ.
 43.
Parasynanche quid 21. distinguenda ab aliis
 faucium inflammationibus. *ib.*
Paragorica quæ dicantur 280. quomodo a-
 gant. *ibid.*
Paræsi quid & unde 44. post colicam fre-
 quens. 130
Paronychia a spasmo periostii. 37
Parotides quæ habeant signa. 77
Paroxysmi relinquit atoniam 68. secre-
 mens gignit *ibid.* quid in & extra eum
 agendum 10. extra eum evacuandum 68.

sub eo non movendum 225. nec venæsec-
 tio instituenda 297. antea cum urina re-
 tenuis & post eum crassa. 137
 -- *febrilis* non nisi sublata causâ sistendus
 224.
Partes corporis conspirant 46. ex earum
 structura morus, & nexu consensus.
ibid.
Partes non sine convulsione succedunt 42.
 sæpe post mortem maris sit 185. bal-
 neis facilitatur 218. funesta gravioris si-
 gna 185
Pathologia ex moruum non humorum vitio
 petenda 45. nexu gaudet cum reliquis
 Medicinæ partibus 2. therapie funda-
 mentum 237. minus recte plerumque
 traditur 32. ejus synopsis *ib.* seq. igno-
 rata causâ ignorantie vitium in medica-
 mentis. 236.
Pectus convehitur quandoque 41. ejus op-
 pressio a spasmo tunicarum asperæ ar-
 teris 39. abscessus ejus quæ habeat signa
 76. ex variolarum morbo factus *ib.* con-
 vulsio ejus lethale signum in apoplexia.
 41. pus ibi fusum difficulter cognosci-
 tur. 76.
Pedes consentiunt cum ventriculo 38. ea-
 rum refrigeratio cutim stringit, tormi-
 na & diarrhoeam movet *ibid.* quando ve-
 na in iis incidenda. 300.
Pediluvia quomodo paranda 311. pulsuum
 mutant 140. amplissimi usus in variis
 morbis 312. in primis spasms & capitis
 morbis 64. laicæ virtutem diffundunt
 312. humores derivant & fluidificant *ib.*
 excretionem promouent. *ibid.* nocent si
 mensium fluxus imminet 313. a constrin-
 gentibus abstinendum. *ib.*
Pericardium sero replem in iis, qui palpi-
 tatione cordis pereunt 175
Pericranium ejus spasms efficit cephalal-
 giam. 37
Peripneumonia ejus signa 18. differt a pleu-
 ritide *ib.* quomodo gignatur 34. spas-
 ms debetur *ib.* sæpe post colicam acci-
 dit 35. ex hæmorrhoidum suppressione
 106. crises servat 175. venæsectionem
 patit 300. tempestive discutienda 194.
 non tam facile in empyema concedit ac
 pleuritis 122. providum expectorantium
 usum desiderat 269. funesta in ea signa
 183. causæ mortis. 190
Peristilium ab ejus spasmo dolores. 36
Peristalticus motus ad sanitatem necessa-
 rius 168. quibus destruat 169. a spas-
 ms.

his invertitur 37. clysteribus crebrioribus laxatur 317. labefactus quæ pariat mala 43. inversus facit iliacam. 38
Perlarum mater absorbens 244. subadstringit. 445
Periphrasis omnium excretionum præcipua 92. minor quantitate urina 150. differt a sudore 160. sordes evellit maxime perniciosas 91. & tenuissimas 160. corpus agile reddit ibid. balneis movetur 308. in morbis exploranda 8. ex quo cognoscenda ib. ab acre mutatur 8. sub quo æstus statu optima 160. a frigido humido sufflaminatur 92. mutata epidemicorum morborum causa ib. sub doloribus & spasmis suppressitur. 66
 -- *suppressa* omnium maxime nociva 91. morbos gignit 8. recidivas parit 9. varia parhamata ciet 37. succos inquinat. 66.
Pessilens febris in ea crisis succedit 173
Pessilentia causa mortis in ea sphacelus 194. specificum in ea 284
Petechia distinguendæ ab aliis exanthematibus 19. criles servant 173. qualem habeant pulsus 142. qui malus ibid. per spasmus cum damno repelluntur 35
Phagedæna ex hæmorrhoidibus suppressis 107.
Phantasia limitatam in ætus mechanicos vim habet. 203
Pharynx spasmus patitur 39. spasmus affectus constituitur in gula sensus 21. & laxatus nimis deglutitionis vitiatæ causa. 43
Philosophia experimentalis vires remediorum recludit. 239
Phrenitis ejus signa & differentie 21. quomodo gignatur 34. ex suppressa narium hæmorrhagia 114. jugularium sectione levatur 299. ea fit sphacelus 75. signa, futura & præsentis in acutis 181
Phibisis hereditarius morbus 28. 59. a pulmonum atonia 43. obstructis & tumefactis pulmonum vasculis 192. ex cohibito eluore albo 102. mensium suppressione & inde orta hæmoptysi 103. variolarum reliquiis 128. hæmorrhoidum suppressione 106. restagnante sanguine lochiali 105. hæmoptysi quomodo 120. funesta signa 183. suffocatione perimit 183. causa mortis in ea. 192
Physiologia quid tractet 1. cum aliis Medicinæ partibus connexionem alit. ib.
Pilula alexica præferendæ purgantibus

223. hæmorrhides movent 107. caute 122. men usurpandæ 267. intempestivus casus usus noxius 142
 -- *balsamica* non modo intestina, sed conjunctas & partes afficiunt 62. post morbos adhibendæ 229. egregie effectus in uteri cæcibus 62. puerperis 129. hypochondriaco malo 62
 -- *de cynoglossa* in hæmorrhagiis profunt. ibid.
 -- *de styracis* tussis egregie. ibid.
 -- *Psidæganfi* in colica præfina gignunt 126.
Pinguedines optima anisodis. 249
Pituitaria tunica vide tunica.
Plethora cordis. & vasorum tonum immutavit 67. nociva 210. non omnium morborum causa 200. senibus etiam familiaris 294. in acutis & continuis damosa 295. ad vires ex atonia vasorum 43. per hæmorrhagias salutariter imminuitur 257. scarificatione absumitur. 305
Pleuritis vera a spuria distinguenda 20. utriusque signa ib. non confundenda cum pathematibus ex vermibus 87. debet spasmis 34. inprimis pleuræ nervosæ 37. ex consolidatis antiquis ulceribus 96. hæmorrhoidum suppressione 106. crises servat 100. arceat hæmorrhoidibus 107. gignit empyema 121. facilius concedit in empyema quam peripneumonia 112. quomodo tempestive discutienda 220. venesectione cause in ea administranda 122. quæ in spuria quandoque in vera semper utilis 300. expectorantia cause adhibenda 269.
Plica Polonica abscessa multis morbos infert 389. specifica ipsius. 95
Podagra hereditarius pleuræque malum 112. quomodo gignatur 35. a spasmis ibid. & maxime ligamentorum 37. hinc cur gravius affligit quam æstus 91. transit in calculum 100. non semper ab hæmorrhoidum suppressione rependa. 112. facile recidiva 124. senibus salutatis sæpe 247. ob imbecillitatem cum damno retinetur 100. scarificationem poscit 304. venesectione intempestiva cum damno reprimatur 101. specifica in ea 285. præpostere topicis tractata varia infert mala 97. retrocedens quomodo necesse 185.
Pollasio nocturna ab atonia vesicularum seminalium. 44
Polypus frequentissima morborum & mortis

— *humilis* idem cum parvo 132
 — *impetuosus* & magnus unus 132. seq.
 — *inæqualis* non de essentia pulsuum ibid.
 variæ ejus species 133. jungitur plerumq;
 convulsiuo. 134
Pulsus intermittens quando, & cur sit 135.
 jungitur plerumque convulsiuo 135. si ne
 existio quandoque observatur 140. a lum-
 brico ibid.
 — *latus* idem ac parvus 132
 — *magnus* quid ib. respectu cordis 135
 — *et celer* in synocha 142
 — *et creber* in hæmorrhagiis 143
 — *manifestus* idem ac magnus 132
 — *myurus* inæqualis species 133
 — *obscurus* & parvus idem 132
 — *parvus* quid 135. respectu cordis 132
 — *et celer* in continuis malis 143
 — *et frequens* in dysenteria 92
 — *frequens* & *debilis* in continuis pessimis
 142
 — *durus frequens* & *inæqualis* in principio
 quartanæ 142
 — *profundus* non differt a parvo 132
 — *rarus* non de essentia pulsuum ib.
 — *et mollis* in lethargo & sopore 143
 — *robustus* idem ac magnus 132
 — *severus* inæqualis species 133
 — *tardus* quid 130. respectu cordis
 135.
 — *tremulus* inæqualis species 133
 — *vacuus* idem cum parvo 132
 — *valens* & magnus unus 132
 — *vehemens* quid 132. ratione cordis
 136. in statu tertianæ, & ardentis.
 142.
 — *vermicularis* inæqualis species 133
Purgentia quæ sint 256. quomodo agant
 ibid. intestinorum consensum testantur
 59. pulsum mutant 139. ubi proficua.
 238. robustioribus danda ibid. in fluo-
 re albo & gonorrhœa usurpanda 222.
 balneis utiliter sociantur 308. postpo-
 nenda laxantibus 223. virulento ele-
 mento imbuta 256. veneni æmula fa-
 cultate pollent ibidem, nocentissima.
 ibid. nocent post itam 55. in dentiti-
 onis difficultate 56. 231. in morbis ex-
 anthematis 58. in catarrhis 102. in
 febribus 219. senibus 237. sanguinis
 circulum per vasa abdominis turbant.
 312. gignunt ichterum 57. alvum cur-
 posæ adstringant 167. recidivas pro-
 rant 130. tempore paroxysmi inter-
 mittentium non danda 226. clystici-
 Tom. III.

bus non indecenda 317. quando necant
 quæ habeant signa 182. Vide *excremen-
 ta alvi*.

Purgantis naturæ opus juvat 217. necessa-
 ria post morbos 127. puerperis prodest
 128. necessaria in febribus 129. & ante
 balneorum usum 311. neglecta purpu-
 ræ causa in puerperis 129. nec non in a-
 cutis. ibid.

Purpura distinguenda ab aliis exanthema-
 tibus 19. puerperis cur familiaris 129.
 ex cohibito fluore albo 102. suppressis
 lochiis 106. crises non servat 175. acutis
 ob purgationem neglectam accedit 123.
 lethali eventu 182. in principio ad-
 mitte emetica vel laxantia 219. sudor
 largus in ea unde 164. per spasmodum cum
 damno recedit. 36

— *febricitans* efflorescens solvit hypochon-
 driacum malum. 211

Pus post inflammationem ex sanguine
 quandoque generatur 75. effusi in rho-
 racem signa 75. seq.

Purpura gradu differt 72. viribus insensa
 ibid. malignitatis causa. ibid.

Pylorus sciztho quandoque afficitur 81

Q

Quartana febris ejus differentie signa 20.
 ex scabie retro pulsa 96. laxantia & e-
 metica in principio fert 259. balnei le-
 vatur 308. specificum in ea 194. perpe-
 ram tractatur adstringentibus 123. in
 diuturna pancreas induratum 81. in
 principio qualis pulsus 142. convulsio-
 nes & epilepsias quandoque solvit 211.
 quomodo gignat hydropem 238

Quies mutat pulsum ibid.

Quotidiana intermittens ejus signa 19.
 differt a continua & tertiana dupli-
 ci. ibid.

R

Recidivæ eorum indicia 129. quomodo
 excludantur 9. per spasmos inducun-
 tur 38. ex suppressis criticis evacua-
 tionibus 9. palliativa cura ibidem, æ-
 geti incuria ibidem, reliquis morbo-
 rum 127. intermittentium cur-ram
 frequentes 130. quomodo arcendæ.
 ibidem.

Reliquia morborum notos pariant morbos
 126.

126. tempeſtive ſubmovendæ. 127
Remedia in claſſes diſtinguenda 242. qua-
 tuor ſumma genera ibid. circa mate-
 riam, vel motum occupantur ibid. in
 fluida vel ſolida agunt ibid. principia
 eorum paucis cognita 240. per chy-
 miam recluduntur 239. eorum operan-
 di ratio ſcitu neceſſaria 3. plures la-
 tet 240. vires eorum non abſolutæ 11.
 eorum effectus a priori indagandus .
 240. non tamen ſemper cognoscitur .
 ibid. ſeq. quomodo cognoscendus 11. o-
 peratio eorum obſervanda 11. ex cauſis
 proximis & experientia petenda 243. a-
 ctio in corpus phyſicum & vivum gratis
 diſtinguitur 239. in nervoſas partes ma-
 xime & proxime agunt 243. non ſemper
 morbos ſancant 11. ſub initium & finem
 morbi præſtinanda 219. ſeq. eorum mul-
 titudo ſingularum cognitioni obſeſt 232.
Vid. medicamenta
diætetica præſterenda phatmacut. ib. ſeq.
 — *fortia* debilibus exitioſa 109. in vigore
 morbi non offeſſenda 219. a liberaliori co-
 rum uſu cavendum . 224
Renes conſentiunt cum ventriculo 124. ſeq.
 abſceſſibus patent 77. atonia affecti quæ
 pariant mala 35. debilitati gignunt cal-
 culum 124. inflammationes , ulceratio-
 nes ibid. ſigna puris in iis 77. labefacta-
 ti quibus firmandi 276. ulcerari quomo-
 do tractandi . 247
Reſpiratio difficilis ex reſtagnante ſanguine
 lothiali 105. anxia a ſpſmo nervorum
 pneumonicorum 180. in acutis mala ib.
Rhabarbarum cur tutiſſimum laxans in dy-
 ſenteria 234
Rachitis in ea proſunt balnea 310
Rheumaticæ febres unde 209. naturæ & artis
 methodus medendi in ea . 216
Rheumatici dolores balnei martiatis levan-
 tur 309. ſeq.
Rheumatismus hæreditarius morbus 116. e-
 jus cauſa 27. quomodo gignatur 35. a
 ſpſmis nervoſarum membranarum 37.
 ejus ſigna 27. diſſert ab arthritide ibid.
 venæſectione gignitur quando que 302.
 quandoque æreſcit ib. ſcarificatione cu-
 ratur 304. ejus ſpecificum lumbrici ter-
 rectes . 285
Roborantia varia eorum genera 283. ſubla-
 ta morbi cauſa 224. & finito morbo uſur-
 panda 228
Robur unde pendat 224. ex vigore motus
 cognoscitur 116. ſeq. ſolidorum ſanita-

tem ſulcit 117. analepticiſ minus reſtau-
 ratur 273. *Vide vires* .

Robuſti qui ſunt

116. ſeq.
Rubeſcencia morbos capitis levant 62.
 narium hæmorrhagias cômpeſcunt .
 64.

Ruſus hypochondriaciſ familiares 42.
 per convulſivum motum eliduntur .
 ibid.

• S

Sagapnum cur hyſtericiſ utile 282. ſpeci-
 ficum anthelminticum 287. clyſteribus
 commiſcendum . 316

Salia optima laxantia 254. ſeq. clyſteribus
 utiliter commiſcentur 313. ſeq. tempo-
 re paroxiſmi intermittentiũ non dan-
 da 226

— *fixa & neutra* optima diuretica 264
 — *per incinerationem parata* abſorbent .
 244.

Saliva ex glandulis 39. per ſpſmos ni-
 mium elicitur ib. ſub ſalivatione cur
 ſorceat 182. ſeq.

Salivantia potentiſſima chymica 270.
 ſeq. quæ ſunt ibid. quomodo agant .
 271. ſeq.

Salivatio quomodo ſuccedat 271. median-
 tibus ſpſmis fit 36. mercurialibus 39.
 ab acri humore ibid. non impetuoſe mo-
 venda 223. non ſemper ad curam luis ve-
 nereæ neceſſaria . 272

Sambuci cortex medius ſpecificum in iſte-
 ro 287

Sanguis præcipuus corporis humor 144.
 gravior aqua 148. proportio ſolidi, &
 fluidi in eo 136. ab acidis coagulatur. 148
 ab alcaliniſ & niſro funditur magis & ru-
 ſceſcit ib. quomodo examinandus ib. ſeq.
 qui bonus nondum eviſum 144. diſſer-
 ratione temperamenorum 137. qualis
 plethoricorum 67. cholericoꝝum 137. hy-
 ſtericarum . . . ſcorbuticorum 148. malus
 aſpectu ſæpe in ſanis 145. & bonus in
 ægris ibid. non ſolum qualitate, ſed et-
 iam quantitate peccat 102. *Vide ple-
 thora* cur ex eo tot ſeparentur humores
 161. quoties una hora circumvolvatur .
 137. inter interſtitia fibrarum non ex-
 travaſatur 132. in febrilibus corruppi-
 tur 65. dyſcraciaſ ipſius ex urina pate-
 ſcit 153. ejus inteſtina commotio ſudo-
 ris cauſa 162. idem venæſectione & ſca-
 rificatione elicitur 148. ex eo prognoliſ
 lu-

sumenda 41. quæ tamen fallax 144. de
Circuli sanguinis.
Sanguis congruatus quibus dissolvendus .
 289.
 — *plane non concrefcens* unde . 148
 — *crassus & niger* vitiosus ad stagnationes
 & inflammationes pronus 146
 — *extravasatus* nocet 143. mortis causa .
 87. seq. in cerebro quando necet 180
Sanguis fibrosus malus 148
 — *floridus* nimis malus, & unde 147. in
 febri maligna, & spasmodicis morbis .
 148. non largiter extrahendus ib.
 — *seresus* nimis cur vitiosus . 147
 — *spissus & impurus* quibus corrigatur .
 248.
Sanguinis defectio per alvum funesta ex
 ruptura hemorrhoidalium 80. seq.
 — *motus* Hippocrat. de eo sententia 30. in
 plerisque morbis læsus est 33. a peripher.
 ad centrum morbosus ib. a centro ad pe-
 ripher. vitalis ib.
 — *progressus* motu corporis promovetur 68.
 quadruplici modo interceptur 33. in-
 terceptus quæ pariat mala 44. per caput
 a duræ matris tono pender 39. seq. impedi-
 tus in capite quos gignat morbos ibid. seq.
 quid per venam portæ interceptus 61. seq.
Sanguis a solidorum & fluidorum moribus
 pendet 33. in quo ejus fundamentum 32.
 ex mente Hippocr. 30.
Saphana incisa nocet & prodest 360. seq.
Sapi Veneris clysteribus commiscetur 314.
Scabies a suppressis mensibus 105. per spas-
 mos topicis inductos repellitur 35. repul-
 sa nocet 36. præpostere siccata quos gi-
 gnat morbos 95. seq.
Scarificatio vicaria venæsectionis 304. eun-
 dem quam venæsectio evahis sanguinem
 305. plethoræ etiā minuit 240. eva-
 cuatoria & derivatoria ibid. quibus in
 morbis utilis. 304. seq.
Scirrhi viscera, & glandulas occupant .
 81. pancreas ibid. pylorum & duode-
 num ibid. lienem 83. hepar ibidem: ex
 hæmorrhoidum suppositione 107. mesen-
 terium 82. prostratas ib. uterum 83.
 ex mentium suppressione 105. vesicam .
 81. seq.
Scorbutus in borealibus cur endemius 93.
 ex male affecto hepate 156. ejusque & lic-
 nis atonia 43. qualis in eo pulsus 143. u-
 rina 156. sanguis fero livido scædens & li-
 mosus 148. hæmorrhoidibus arcetur .
 104. quæ in eo proficiat 248. ejus spe-

cifica .
Scrobiculi cordis percussio cur lethalis 238
Scitio tadaverum utilis 12. ad observatio-
 nes necessaria 11. causas morborum &
 mortis detegit ibid. cum judicio insti-
 tuenda. 12
Sedativa quæ dicantur 279. quoruplicita
 ibid. seq. eorum apparatus 280. seq. o-
 ptimum auctoris liquor anodynus 281.
 magnæ efficacæ ibid. caute usurpan-
 da ibidem, virium ratione inprimis
 habita 237. dolores palliative abigunt.
 ibid. præpostere data graviter nocent ib.
 seq.
Selenia acidula ad emendandum fibro-
 sum sanguinem utiles 148
Seminales vesicula eorum atonia pollutio-
 nis & gonorrhæe benignæ causa 44.
Semiotica fundamentum ejus circulus san-
 guinis 144. caute colenda a Medico .
 ibid.
Sensitus quid peculiare habeat ratione stru-
 cturæ 5. qualis in ea pulsus 138. quibus
 morbis pateat 45
Sensus venæsectionem utiliter ferunt 294.
 sanguineas excretiones salubres expe-
 riuntur ib. cur difficulter sudent 166.
 morbi eorum unde 294. cur morbis ex
 impuritate obnoxii . 95
Sensus a spasmi sensoriorum læduntur 40.
 ab atonia duræ matris abolentur 42.
Sepia ut absorbens 244. specificum in gonor-
 rhæa 246
Sepsica tendinosi & nervosi partibus ini-
 mica 48
Sermo mutat pulsum 137. insensior quo-
 modo circulum sanguinis promoveat 64.
Serum impuritatem contrahit 68. redundat
 sæpe 114. sæpe extravasatur 80. fu-
 perfluum salutariter excernitur 114. ex-
 travasatum in cerebro quomodo nocet .
 189. flavum vel lividum sanguini innatans
 quid indicet 147. limosum copio-
 sum in live venerea ib. paucum in arden-
 tibus 148. salsum satietatem diureticis
 expurgatur . 264
Serum lactis dulce egregium 235 continuua-
 to usu juvat . ibid.
Sexus facit ad morbos 117. mutat pul-
 sum 137. in historiis morborum recen-
 sendus . 5
Simplia pure talia non dantur 236. præ-
 ferentia compositis 232. Veteribus ma-
 ximum usus 236. Medicis perperam sper-
 nuntur ibid. quæ ex iis præferenda ibi-
 dem,

dem, usurpanda quando vires indagandæ. 241.
Singultus a convulsione diaphragmatis 41.
 refrigeratione stomachi 37. præpostero
 topiorum usu in morbis articulorum .
 100. inflammationi ventriculi accedens
 malus 214
Sinus frontales quandoque abscessum fo-
 vent 77
Sinus erectus in morbis acutis cur tam no-
 xius. 97
Solida agant in fluida eademque corrum-
 punt. 64
Somnolentia, ex tonq duræ matris deper-
 dito 48. ex apoplexia quomodo gigna-
 tur 119
Soporosi affectus vide letargus .
Spasmodici morbi multæ eorum species 28.
 qualis in his pulsus 143
Spasmo morbosus motus 206. quadruplex
 205. quomodo cognoscendus 179. effe-
 ctus in corpore 206. rarius a denso &
 crasso sanguine fuscitatus 146. multo-
 rum morborum causa 35. sanguinis cur-
 sum intercipit 40. perspirationem sus-
 flammant 37. hæmorrhagias suppri-
 mit 35. alvum adstringit 37. motum
 peristalticum invertit ib. secretionem
 actis intercipit 39. gignit stranguriam
 37. atrophiam 39. utim ibid. pulsus
 convulsivum 180. salivationem 39. asth-
 ma ibid. faciem Hippocraticam 180. ner-
 vorum tensionem ib. oppressionem pe-
 ctoris 39. contrictivum in gula sensum
 ibid. mentis capitisque morbos ibidem,
 respirationem anxiam 180. anxietate
 rem ib. vomitus ib. dolores varios 36.
 febrium accessiones 41. sensus lædit 40.
 succos inquinat 76. seq. excretionem tur-
 bat 66. renes reddit urinas 155. in-
 cureque pariat mala ibid. febrium for-
 malem rationem absolvit 33. adest in
 hæmorrhagiis ibid. inflammationibus
 34. capitis morbis ibid. catarrhis,
 diarrhæis, teridivis 35. retrocessione
 exanthematum ibid. in acutis mali o-
 minis 179. relinquit atoniam 45. non
 tam noxius quam atonia 44. morbos
 facit & solvit 225. remittens morbos sol-
 vit 35. utilem quandoque effectum præ-
 stat 47. salutatis quomodo dignoscen-
 dus 206. levatur liquore anodyno 61.
 oleo amygdalarum dulcium 62. balneis
 108.
Specifica dantur 249. quo sensu intelligen-

da ibid. quæ sint in variis morbis 182.
 operantur per consensum 62. non sola
 juvant 299. certa methodo usurpanda
 ibid. anie eorum usum corpus præpa-
 randum ibid. maxime locam habent ubi
 genus nervosum a virulenta causa
 p. n. commoratur. 50
Sphaculus ex inflammatione fit 182. mortis
 plerumque in morbis canis 11. signa fa-
 cti 182. in ventriculo ex veneno 79.
 duodeno ibid. tenuibus ib. recto & vi-
 steribus abdominis 74. utero ib. maraf-
 mo ib. membranæ cerebri ibid.
Sphincter ani relaxatus feces involuntarie
 dimittit. 43
 — *vesica urinariæ* spasmo affectus urinam
 retinet & stranguriam facit 35. resolu-
 tus urinam involuntarie fundit 132. ex-
 ulceratur male tractata gonorrh. 35. seq.
Spirituosa fluida coagulant & solida strin-
 gunt 279
Spiritus non sunt Medicinæ principium 32.
Sponsæ cruentæ ejus signa 38. differt ab
 hæmoptysi ibid.
Stablini laudatus 110
Sterilitas unde 42. ex puerperio 119
Sternutatio quomodo contingat 41. a con-
 vulsione fibrarum nervosarum in naribus
 ibid.
Sternutatoria quæ sint & quomodo agant 269
Stomachica quæ sint 275. eorum usus in va-
 riis casibus. 276
Strabismus ex epilepsia quomodo 120
Stranguria quid 37. ex spasmo sphincteris
 vesicæ ibid. & urethæ 38. qualis in ea u-
 rina 158
Struthura corporis quæ sana, quæ morbida
 117. in senibus & infantibus peculiaris .
 vide corpus .
Studia debilitant ventriculum 55. corpus
 malum hypochondriacient 6. disponunt
 ad capitis morbos 5. Vide *meditationes* .
Stavescentia cur ferre nequeant hysterice
 40. cur tam atrocia paræmata cient 47.
Subiectum ejus cognitio ad historiam mor-
 bi necessaria. 4
Sublingualis vena in cephalalgia & ophthal-
 mia utiliter inciditur 299. in angina cum
 periculo pertunditur. ib.
Sudor differt a perspiratione 160. unde
 ib. ejus causæ 162. subtiliores sanguine
 sordes 160. & sulphurea retinentia e-
 vehit 160. odore & colore prædurus 162.
 cur pro differentia locorum varius ibid.
 sub quo aere prodeat 160. sæpe saluta-
 ris

ria 210. in paroxysmis nullus 164. post
eos multus læp̄ nimius *ibid.* quandoque
criticus 171. corpus debilitat 160. pedum
largus a motore 127. quibus moveatur
163. *vid. sudorifera*, præstigia ex eo 164.
nimius quomodo compescendus 164.
suppressus nocet 8
Sudor acris scorbutum præscindens 210
— *axillarem* & pedum non secandus 101
— *frigidus* & *colliquans* unde 43
— *nocturnus* salutaris 114. cohibitus mor-
bos gignit multos *ibid.*
Sudorifera quæ sint 162. evacuantium ge-
nus 179. eorum suppellex & modus agen-
di *ibid.* rarius locum inveniunt 259. qui-
bus in morbis proficua 266. cum suffi-
cienti vehiculo propinanda 261. in con-
tagiosis vitanda 260. in exanthematicis
ad pellendum non danda 260. post iram
& alvo clausa novia *ibid.*
Sulphur specificum in phthisi 286
Suppuratio quibus promovenda 241
Surditas unde oriatur 42. in febre acuta
quandoque critica 120
Suspirium aurium a spasmō membranatum
sensorii. auditus 40
Synanchis anginae species 20. seq. quomodo
distinguenda ab aliis inflammationibus
ibid.
Syncope ab apoplexia distinguenda 28. seq.
atonix debetur 42. causa systole cordis
intercepta. *ibid.* ex suppressione mensium
104. qualis in dispositione ad eam pul-
sus 142. lethassis in parturientibus signa
183. causa mortis in ea 190
Synocha a veteribus continens dicta 17. ejus
signa *ibid.* qualis in ea pulsus 142. crises
servat 172
Systole suscitatur diastolen & a diastole susci-
tatur 131. viget in arteriis 130. cordis
pulsuum causa 134

T

Tabachus in suetus. cur fumo infestus 47. cur
alvum stimulet 56
Tartari sal absorbens 244
— *vinum* absorbens *ibid.*
Tartarus in urina unde 157. *vide urina.*
Temperamentum facit ad mutationem pul-
sus 137
Temperantia eorum virtus & apparatus
245. triplici agunt ratione 246. cautela
in eorum usa *ibid.*
Tempestatum vicissitudines morborum epi-

demiorum causæ 92
Tendo læsus atrociter parit pathemata 50
Terebinthina oleum exteriis in suppressio-
ne urinæ utile 63
Terra sigillata abturbens 244. adstringit
simul 245
Terror ejus effectus in corpore 6. facit ad
colicam 26
Tertianæ febri ejus species, differentiæ &
signa 19. convulsiones & epilepsias quan-
doque solvit 211. in statu ejus qualis
pulsus 142. laxantia & emetica in prin-
cipio admittit 219
Therapia quid sit 2. consistit maxime in
judicio *ibid.* ejus cardo in quo vertatur
16. nititur morborum cognitione 116.
ejus fundamenta 2. præcipuum patholo-
gia vera 237. nexu gaudet cum physio-
logia & pathologia 2
Timor ejus effectus in corpore 6
Tinea capitis repulsa epilepsiam & capitis
morbos, cæcitatem & ophthalmiam
gignit 95
Tinnitus aurium membranatum sensorii
auditus spasmō 40. & nimia humidita-
te 43
Tonicus moris viget etiam in arteriis 131
Topica in morbis articulorum præpostere
adhibita graviter nocent 98. cutis efflo-
rescentias repellunt. 20. in arthritide
cur noxia 27
Traumatica quæ sint 277. quomodo agant
278. qua ratione iis utendum 279. opti-
mum spiritus vini *ibid.*
Tumores in mesenterio, dorso, duplica-
tura peritonæi utero & ovario gignun-
tur 78. rupi subitanci hydrotis causa.
ibid.
— *serosa-lymphatici* intra membranatum
duplicaturas colliguntur 77. difficulter a
priori cognoscuntur 78
Tunica pituitaria spasmō affecta mucici-
tationem impedit 40. & odorem cum
gusto lædit *ibid.*
Tussis ejus variae species probe discernen-
dæ 28. quandoque salutaris 8. spasmis
stipatur 35. ex variolarum & morbillor-
um reliquiis 128. quandoque a venæ-
sectione gignitur 202. pectoralibus caute
excipienda 114. in ea utilis massa pilularum
de styrace 62. *vide expectorantia.*
Tussis convulsiva ab irritatione laryngis &
tunicæ bronchiorum 41. ex ventriculi
cruditatibus 57. infantibus cur familia-
ris 28. cur ei complieetur vomitus 57
— *se-*

- *serina phibifica* minus salutaris naturæ motus 214
 -- *humida a pulmonum atonia* 43. difficilis curatu 122. dulcia non fert *ibid.*
 -- *pulmonalis quæ* 28
 -- *phibifica signa* *ibid.*
 -- *stomachalis* licca vel humida 278. ejus materia later quandoque in duodeno *ib.*
Tympanitis quid? 88. a flatibus intestina distendentibus *ibid.*

V

- Variola* distinguendæ ab aliis exanthematibus 19. quotuplices *ibid.* crises servant 101. qualis in iis sanguis 96. ante & post eruptionem pulsus 142. per spasmus cum dispendio recedunt 35. naturæ methodum & ordinem quam maxime li-sunt 219. in principio postulant emetica vel laxantia 220. eorum reliquiæ multos gignunt morbos 127. hinc sollicite evitendæ 117. funesta in iis signa 182
Vasa brevia facile rumpuntur 79. rupta vomitum cruciatum faciunt *ibid.* sæpe lethalem 104
Vasa sanguifera eorum atonia causa morborum 43. rumpuntur quandoque et mortem gignunt 79
Vena artetis continuz 130
Vena porta peculiatis structuræ & officii 106. atonia affecta morborum causa 43. fluxus hæmorrhoidalıs causa 106. impedito per eam progrefsu sanguinis morbos creat 62
Venasellio cur vere utiliter instituitur 192. non semper ad æquinoctium differenda *ibid.* ter in anno quibusdam celebranda *ibid.* seq. pulsus murat 139. systolen cordis & vasorum auge 68. eundem quam scarificatio elicit sanguinem 148. naturæ opus in morbis juvat 217. hæmorrhagias sæpe promover 288. urinam elicit *ibid.* cur alium quandoque movet *ibid.* ad longævitatem confert 294. multa plethoricis præstat emolumenta 68 utilis est hystericiis 61. hypochondriacis 62. senibus 289. in morbis ex suppressione hæmorrhoidum 110. in renum vitiiis 124. ad præcavendos morbos 291. & ad præcavendum a botum 125. in inflammationibus 208. in febribus continuis & acutis 265. in exanthematicis 297. seq. in morbis capitis a congestione 298. in pleuritide & peripneumonia 302. in co-

lica convulsiva 303. sit sufficiens 301. quando in pede vel brachio instituenda 300. in sensibilibus quomodo perpetranda 301. in exanthematicis cum distinctione administranda 296. podagram quandoque cum damno reprimat 101. perperam superato vix morbo adornatur 293. in pleuritide quandoque empyema ciet 122. paroxysmis morborum noxia 297. catarrho quandoque advocat 302. in colica flatulenta nocet 303. quibus indicetur & interdicitur 293. sub lingua in cephalalgia & ophthalmia utilis 299. sed in angina peticulosa *ibid.* in fronte jugulo & pone aures non sola semper sufficit *ibid.*

Venasellio evacuatoria, revulsoria & derivatoria quæ 300

-- *nimia* in inflammationibus 207. & si sanguis tenuis & floribus noxia 148

Vena celerrime totum nervosum systema afficiunt 61. pulsus mutant 140. per spasmus necant 42. sphacelum ingigunt 73. non prokime inflammationem inducunt 52. signa funesta 182. causa mortis ex iis sphacelus ventriculi & intestinorum 196. eorum antidota oleosa 53

Veneræ lues ex gonorrhæa male curata oriri potest 102. dolores quibus stipatur distinguendi ab arthritide 27. pulsus in ea languidus 143. serumque sanguinis limosum 44. non semper salivatione eget 272. balneis vaporosis levatur ejus specifica 288

Venus nimia corpus debilitat 117. & intempestiva facit ad colicam & cardialgiam 27

Ventriculus in omnibus fere morbis ejus actio læditur 52. a nimis studiis 56. & morbis maxime debilitatur 118. ab animi pathematibus afficitur 55. a vermibus obidetur 86. seq. consensum alit cum omnibus nervosis partibus 51. cum capite 55. œsophago 57. diaphragmate & pulmonibus 58. seq. intelligentis *ibid.* renibus *ibid.* pedibus 59. cute *ibid.*

Ventriculi atonia quæ pariat mala 43. quibus fulcienda, v. *stomachica*.

Ventriculi erosio differt ab ejus inflammatione at. quæ habeat signa 89

Ventriculi inflammatio differt ab ejus erosione, cardialgia & aliis inflammationibus 21. ex mensum suppressione. 104. erysipelate male tractato 98. præpostero 100

topicorum usu in morbis articularum 100. potu frigido mitior 21. feralis in cutis signa 180
Ventriculi inflatio differt a cardialgia 24. ejus signa *ibid.* 88. ab atonia ipsius oritur 43. ex suppressione mensium 104. infantibus & hypochondriacis solennis 25. 88
Ventriculi spasmus parit cardialgiam 36. inflationem nec non vomitum 38
Ventriculi sphaecelus quæ signa habeat 73. ex veneno 196
Ventriculi ulcus observatum 78. quæ signa ipsius *ibid.*
Vir quos gignat morbos 92. qualis in eo pulsus 138
Vermes eorum varia genera 87. *seq.* in ileo lubenter hospitantur 88. ob consensum intestinorum atroci ciet pathemata 53. quæ si in ventriculo 88. ileo *ibid.* vel crassiss *ibid.* suscitant convulsiones, insolita pathemata & febres *ibid.* præfidia adversus eos 197. quo demum necent *ibid.* Vide *ascarides*, *lumbri*.
Verigo causa proxima quæ 41. *seq.* quandoque ex ventriculo 54. ex crassa lactea repulsa 95. lochiorum suppressione 105. scarificationem melius fert quam venesectionem 304
Vesica scirrho afficitur sæpe 81. & ulcus contrahit 78. atonia affecta calculum concipit 33. vesicæ sphincter. Vide *sphincter*. 63
Vesicatoria lippitudinem discurant 63. in apoplexia & capitis morbis utilia *ibid.* asthma ex tepulis achoribus tollunt 95. intermittentium paroxysmos sistunt 63. vide *cantharides*. 51
Vespa punctura atrociam ciet pathemata 51
Vibri qui iofalubris 6. facit ad morbos epidemios 15. in historiis morborum enumerandus 6. durior facit ad scorbutum *ibid.*
Vigilia mutat pulsum 138
Villosa tunica vasculosa & cellulosa 39. obstructa diarrhoeæ causa *ibid.*
Vinum clystere injectum roborat 314
Vini spiritus opimum traumaticum 279. clystere injectum inebriat 317
Pipera decoctæ specificum in curis defædationibus 290 eorum pinguedo specificum in pellucula oculi *ibid.*
Pires corpori insunt mortices 72. unde dependant *ibid.* eorum causæ manifestæ *ibid.* ex quo cognoscendæ 230. multum faciunt ad sanitatem & morbos 5. in

morbis considandæ *ibid.* cum remediorum efficacia comparandæ 230. a copia sanguinis quandoque depressæ 293. prostratæ malignitatem indicant 10. analeptici minus reficiuntur 275. in malignis quibus rescillandæ 284. clysteribus rescillantur 315. Vide *robur*
Virilis ætas quibus morbis pateat 45. qualis in ea pulsus 138
Viscera eorum consuetudo in morbis consideranda 9. ex urina patescit 158 eorum corruptio in hæctica præsto est 72. quibus cognoscatut lethalis 183. quomodo attendenda 199. sphaecelo correpta quæ habeant signa 74
Visceralia quæ sint 276. quomodo agant 277. variis sunt usus *ibid.*
Visas a spasmu nervi optici læditur 40. a vermibus perit *ibid.* clysteribus illustratur 314
Visa generi quodlibet peculiates alie morbos
Viridulum album specificum in epithosa 289
Ulex in quo differat ab abscessu 78. serum sæpe utiliter evacuat 113. ex hæmorrhoidum suppressione 107. variolarum & morbillorum reliquiis 128. quæ signa si in ventriculo 78. *seq.* vesicæ *ibid.* prostratis 79. antiquum præpotere consolidatum varios gignit morbos 96. cæcitatem 115. v. *abscessus*.
Unicornis animale & fossile absorbens 244
Volatilia pulsum mutant 339
Vomica quid sit 76. quibus signis cognoscenda *ibid.*
Vomitum convulsionibus accensendus 41. a spasmu ventriculi 38. quomodo succedat 41. salutaris sæpe excretio 211. lætentibus præstans *ibid.* ex calculo quomodo 224. a bile acri biliosus 38. ex calculo quandoque lethalis 124. inflammato ventriculo superveniens minus salutaris naturæ motus 214. quibus movendus v. *emetica* quibus compescendus 275
Vomitus cruentus differt ab hæmoptysi 22. signa ejus *ibid.* 80. quomodo succedat 33. fit ex valis brevibus 80. ratione causatum differt 23. ex hepatis & lienis vitio 67. mensium suppressione 105. & emanatione 105. ex induratione lienis post paraly sin funestus 83. perperam adstringentibus cohibetur 287
Urticæ spasmis parent 38. motu peristaltico gaudent *ibid.* a spasmu urinam sup-

- supprimunt *ibid.* ab utina cum dolore distenduntur *ibid.*
- Urethra* spasmus. patiens facit stranguriam 38
- Urina* excretorium præcipuum 149. perspirationem quantitate superat *ibid.* ejus examen 151. *seq.* elementa 152. proptorio solidi 151. color unde 152. quantitas unius diei 151. ex liquidis potissimum generatur 149 ex potu non recipit solidum 151. ex sanguine suscipit particulas sulphureas 153. nec non crassiores sordes 160. largiter fluens sæpe salutaria 211. supprimitur sæpe 264. spasmus urinariorum ductuum 38. uretheres distendit quandoque *ibid.* involuntarie cur suat 43. difficulter in scirrhus vesicæ redditur 82. in morbis inspicienda 11. vide *romantia* qualis in calculo 86. scarbuto 157. *ictero ibid.* senibus 158
- *alba* in hypochondriacis unde 58
- *aquea* quibus in morbis 153. unde 154. *seq.* in febribus quid portendat 154 quæ poscat medicamenta 159
- *crassa* morbis declinantibus 156. post febrium paroxysmum 155. nimis diu fluens mala 156
- *crystallis referta* ubi? 158
- *furfuracea* in vesica erosa *ibid.*
- *jumentorum* differt ab humana 153
- *oleosa* unde & quid indicet 158
- *parca* in stranguria 159
- *purulenta* in exulceratione æonum & vesicæ 158
- *rufa* sine sedimento quando & unde 155. in inflammationibus mala 156 quæ poscat medicamenta 159
- *sabulosa* in nephritide 157. quæ requirat media 159
- *sanguinolenta* ubi & unde 158. Vide *missus cruentus.*
- *spissa & glutinosa* ubi 157
- *sartaro referta* in dispositione ad calculum 178. quibus tractanda 159
- *senilis* in omnibus spasmodicis morbis 76. in paroxysmis febrium 155
- *turbida & crassa* in gonorrhœa 157
- *vaccina* intestine utiliter bibitur 153
- Urina sedimentum* quid indicet 155. nullum in febribus post paroxysmos malum. *ib.*
- Urina sartarum* unde 157
- Urinarii ductus* motu peristaltico gaudent 38. spasmus concipiuntur 138. atonia afficit ex urina crassa dignoscuntur 158
- Uromantia* utilis ad cognoscendos & curandos morbos 158. abusus obnoxia 149
- Uteri hamorrhagia* probe distinguendæ 23. quæ periculosa & abortus nunciæ 24. quæ salutaris *ibid.* post abortum & partum ex uteri labe 125
- Uterina* balnearum usus socianda 309
- Uteri* partibus nervosis non annumerandus 60. atonia afficitur quid inde 44. sphacelo corripitur 74. apostemate afficitur 76. scirrhus contrahit 83. sub partu quandoque rumpitur 81. puerperio facile labem contrahit 119. a suppressis menibus varia patitur mala 105. non est sedes mali hysterici 60. ejus structura causa fluxus mensium 103. ejus hydrops a polypis 84. ex ejus debilitate varii morbi 125. ejus inflammatio lethalis in puerperis quibus firmandus 277. ejus morbi curantur balneis 278. nec non clysteribus 282
- Vulnra* vide *lesiones*
- Vulneraria* quæ sint 277. quomodo agant 278. in longis quibusdam morbis utilis 279. optimum spiritus vini *ibid.* *seq.*